


578.15-1

6.1.2

PLANTAE PREISSIANAE.



PLANTAE PREISSIANAE

SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM

QUAS

IN AUSTRALASIA OCCIDENTALI ET MERIDIONALI-
OCCIDENTALI ANNIS 1838 — 1841

COLLEGIT

LUDOVICUS PREISS,

PHIL. DR. ACAD. CAESAR. LEOPOLD. CAROL. NATUR. CURIOS. ET REG.
SOCIET. BOT. RATISBONENS. SODALIS, CET.

PARTIM AB ALIIS PARTIM A SE IPSO DETERMINATAS
DESCRIPTAS ILLUSTRATAS

EDIDIT

CHRISTIANUS LEHMANN,

M. ET PH. D., HIST. NAT. PROF. P. O., HORTI BOT. DIR., BIBL. P. CIVIT. HAMB.
PRAEF. PRIM., ORD. BORUSS. AQUIL. RUB. CL. III. EQUES, ACAD. CAESAR. LEOP.
CAROL. NAT. CURIOS. ADJUNCTUS, CET.

VOL. I.

HAMBURGI,
SUMPTIBUS MEISSNERI.

1844 — 1845.

38029

RB 581 9941 LE#

LRBM00173780

MURATIAN OTTAVIAN

1911

CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

1911

LUDOVICUS MILES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

1911

CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

1911

CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

1911

V I R O

CELEBERRIMO PRAECLARISSIMO

GUILIELMO JACKSONIO HOOKER

**EQUITI,
HORTI BOTANICI REGII KEWENSIS DIRECTORI,
ETC. ETC. ETC.**

**HUNC LIBRUM AMICAE OBSERVANTIAE PUBLICUM
MONUMENTUM ESSE VOLUIT**

J. G. C. Lehmann.

P R A E F A T I O.

Ludovicus Preiss, Philos. Dr. vir clarissimus, summo investigandae perscrutandaeque naturae studio commotus, ante aliquot annos adhibita Hamburgi diligenti praeparatione in occidentalem et meridionali-occidentalem Australasiam proficisci constituit. Quod iter laboribus et difficultatibus impeditissimum quam prospero successu perfecit, rebus naturalibus. e Preissiana collectione in musea translatis satis probatur, quae illorum corporum naturalium, quae antehac rara e Britannia ad nos migrare solebant, nunc opera ejus copiam non exiguam possident. Quanti vero thesauri ad botanicen, quae sine dubio imprimis ab eo adjuncta et aucta est, ex hac expeditione redundaverint, hic ipse liber videtur testari.

In Europam Preissius anno MDCCCXXXII reversus quid in universum itinere suo consecutus sit ipse narraturus, plantarum, quas collegit, in notitiam omnium perferendarum curam mandavit mihi. Ex quarum ingenti multitudine, quae vel se-

cundum familias distribui haud brevi temporis spatio potuerat, facile cognovi, mihi soli opus suscepturo vires facultatesque ad examinandas describendasque omnes non esse suffecturas, maxime quum publici muneris officiis tum perquam occupatus otium, quo tantum opus perficerem, non haberem. Praeterea censi, in illustrandis tot plantis fore, ut conjuncta opera virorum in hoc negotio versatorum, quorum pro suo quisque commodo familias sibi describendas eligeret, non minus ad augendam doctrinam quam ad opus celerius absolvendum conferret. Quod consilium a plerisque viris rei botanicae peritis etiam extra fines Germanicos est comprobatum. Nam praeter eos viros doctos, quos ipse invitaveram, multi rei herbariae cultores, Clarissimi Preissii rogatu arcessituque commoti *), sese in opere edendo mecum laborare velle ultro professi sunt, ita ut, quamquam majorem plantarum partem, quam antea describendam mihi elegeram, aliis tradebam, unicuique satis dare non possem. Quibus omnibus viris spectatissimis pro liberalitate et benevolentia mihi exhibita, pro insumpto studio et diligentia plurimas ago gratias. Nomina hic enumerare non attinet, singulis enim operis partibus, cui summae laudi sunt et decori, praescripta reperiuntur.

Etiam si certa quaedam ratio, qua omnes familiae determinarentur et explicarentur, a me proposita, a reliquis comprobata minus esset, tamen a me non potuit impediri, quin in expositionis genere inter singulos commentarios discrepantiae passim conspicuae essent. Cujus varietatis caussa partim quidem in ingenio singulorum scriptorum, quorum alii accuratiore et uberiore, alii concisiore scribendi genere delectantur, partim vero et in exemplarium natura, quae haud semper eadem erat, est sita.

*) In ephemeridibus Florae 1842 No. 34.

Diversis temporibus complures investigatores, recentioribus imprimis diligentissimum J. Drummond Scotum, in eisdem fere regionibus Australasiacis, ad quas Clarissimus Preiss appulsus est, haud paucas plantas collegisse viris botanica arte eruditis satis est cognitum. Auctam Australasiae austro-occidentalis floram uno conspectu comprehendendam proposuit Vir Clarissimus J. Lindley in commentatione „a sketch of the vegetation of the Swan-River Colony“, de plantis Drummondianis Vir Celeberrimus et Excellentissimus G. J. Hooker ingeniosissime passim disseruit. Harum plantarum jam antea congestarum numeros ubicumque indicari potuerunt, indicare non praetermisimus; etiamsi neque Drummondianam neque reliquas collectiones omnes inspicere semper licuit.

Accuratissima vero diligentia collocata est in proferendis numeris, quibus eae plantae Preissianae, quarum plura exemplaria exstabant, prius quam distributa est collectio, ideoque longe prius, quam hic liber editus est, insignitae sunt. Quicumque igitur plantas a Clariss. Preissio collectas acceperunt, in libro nostro et nomina et illustrationes earum, quatenus natura plantarum id feret, invenient. Praeterea observationes, quas Clariss. Preiss inter colligendum ipse de stirpium magnitudine, florum colore, aliisque rebus scitu dignis vel adeo futuris investigatoribus utilibus fecit, signis „ „ inclusàs addidimus.

Denique monendum est, nonnullas esse plantas, quae, quum exemplaria earum casu in aliarum familiarum loculos inrepserint, non ab iis, qui familias, ad quas pertinent, illustraverunt, sed ab iis, ad quos temere venerunt exemplaria, descriptae sint. Sic *Lawrencia squamata* (pag. 242) ab Illustrissimo Nees ab Esenbeck determinata est, non vero a Clarissimo Miquel Dr., qui quum reliquas omnes *Malvaceas* collectionis Preissianae adumbraret, hanc in manibus non habuit.

VIII

Ubicumque hoc accidit, adscripto auctoris nomine suum cuique vindicavi, et, si fieri potuit, has plantarum descriptiones e loco alieno in suum locum transtuli. Quae praeterea addenda vel emendanda reperientur, indicesque integri, quorum secundus ordinem numerorum herbarii Preissiani sequetur, alteri hujus operis volumini, in quo de plantis Monocotyledonibus et Acotyledonibus agetur, subjungentur.

Dabam Hamburgi pr. Cal. Sextiles MDCCCXLV.

J. G. C. Lehmann.

In his foliis interjunctis de
scriptae aut notatae sunt

Plantae

Novae Hollandiae colo-
niae australis,

quas

aut ipse observavit vel
aut ab aliis communica-
tas exploravit

Ferdinandus Müller,

Philos. doct. reg.

1847 seq.

Adelaidae.

Abbreviationes: hb. St. — herbarium
A. Caroli Stuart, hortulani —
hb. J. — herbarium A. J. J. J.,
hortulani —

"Lalupung pouda'ig, Nagafuit
"in Tokumaiis"

Chamisso.

Prot. Aphyllae!

Acacia spinosus? Benth (Pl. H. 172)

St. 4. rufescenti differt, ramis spinosis, ac-

renatis, bracteis minimis, ab A. L.

longonacarpa capitulo 5-7 floris, co-

rotella ovata, seminibus septa mine-

ribus. Typi nudi adpropt. etc. Frut. ^{frut.} ^{frut.}

Indus Ind. Citab. 1848. Si florum

(Cekaparinga! Samfirab, Daulbey bay, Doffen)

~~A. rigidissima. Serotinus Pl. 63~~

~~Typi (ab antiochensi ramis) rigidissimas~~

~~capit. proceris, 5-7 floris, exsertis~~

~~ab A. longonacarpa corolla ovata~~

~~ab A. rufescenti differt, bracteis~~

~~minimis, seminibus septa mine-~~

~~ribus. Typi nudi adpropt. etc.~~

~~Indus Ind. Citab. 1848. Si florum~~

~~(Cekaparinga! Samfirab, Daulbey bay, Doffen)~~

~~stabra, ramulis striato-pulchris, spine-~~

~~rosissimis, aphyllis, acuminatis, bracteis~~

~~minimis, seminibus septa mine-~~

~~ribus. Typi nudi adpropt. etc.~~

~~Indus Ind. Citab. 1848. Si florum~~

~~(Cekaparinga! Samfirab, Daulbey bay, Doffen)~~

~~stabra, ramulis striato-pulchris, spine-~~

~~rosissimis, aphyllis, acuminatis, bracteis~~

~~minimis, seminibus septa mine-~~

~~ribus. Typi nudi adpropt. etc.~~

~~Indus Ind. Citab. 1848. Si florum~~

~~(Cekaparinga! Samfirab, Daulbey bay, Doffen)~~

~~stabra, ramulis striato-pulchris, spine-~~

~~rosissimis, aphyllis, acuminatis, bracteis~~

~~minimis, seminibus septa mine-~~

~~ribus. Typi nudi adpropt. etc.~~

~~Indus Ind. Citab. 1848. Si florum~~

~~(Cekaparinga! Samfirab, Daulbey bay, Doffen)~~

~~stabra, ramulis striato-pulchris, spine-~~

~~rosissimis, aphyllis, acuminatis, bracteis~~

~~minimis, seminibus septa mine-~~

~~ribus. Typi nudi adpropt. etc.~~

~~Indus Ind. Citab. 1848. Si florum~~

~~(Cekaparinga! Samfirab, Daulbey bay, Doffen)~~

~~stabra, ramulis striato-pulchris, spine-~~

~~rosissimis, aphyllis, acuminatis, bracteis~~

LEGUMINOSAE.

(Auctore C. F. MEISNER.)

MIMOSEAE.

ACACIA (Linn.) Willden. Endl. gen. n. 6834.
Bentham in Hooker London Journ. of Bot. I.
p. 318. sq.

Series I. PHYLLODINEAE Benth. l. c. p. 322.

I. APHYLLAE, phyllodiis nullis. (Benth. l. c.)

1. *Acacia restiacea* Benth. l. c. p. 323, n. 1.

In locis limoso-arenosis ad radices montis Bakewell (York) d. 3. Sept. 1839. specim. florifera Herb. Preiss. No. 971.

β *scoparia*, nob., ramis iterato-ramosis, erectis, bracteis ad gemmularum basin ovato-lanceolatis.

In rupestribus ad latus occidentale montis Currie (York) d. 10. Apr. 1840. fructifera Herb. Preiss. No. 972°.

Forte n. sp., sed ex specimine suppetente unico, deflorato, non definienda. Accedit ad *A. spinescentem* Benth., sed rami haud spinescunt.

„Frutex 6-pedalis, ramis pruinosis.“ *Rami* nunc simpliciores, stricti, nunc ramosi et saepius flexuosi. *Gemmulae* ad ramulorum ultimorum nodos minutae, sessiles; *bracteae* squamiformes erectae, fuscae, tenuiter striatae, 2-3 lin. longae, apice bifidae (e stipulis 2 inferne connatis conflatae) basi dilatata 1-1½ lin. latae; *bracteolae* paucae, imbricato-adpressae, ovatae, obtusae, minute puberulae. *Flor.* . . . *Legumen* (fragmenta separatim sub n. 972 missa) lineari-moniliforme, continuum, 1½? poll. longum, rectiusculum, glaberrimum, 1-loculare, 2-valve, 5-6-spermum, stipitatum, stipite lineari compresso, valvis coriaceis, extus secundum longitudinem tenuiter reticulato-venosis fuscis, intus laevibus pallide rufis, marginibus haud incrassatis, foveis seminiferis ellipticis 2-2½ lin. longis 1½-2 lin. latis, isthmis planis circ. 1 lin. longis latisque. *Semina* nigra, nitida, obovata, 1½ lin. longa, 1 lin. lata, facie una rotundato-convexa, altera medio obtusissime carinata; strophiola albidula, submembranacea, ovata, acuminata, dimidiam fere partem seminis a latere amplectens eique adpressa.

2. **Acacia? tetragonocarpa** *n. sp.*, glabra, ramis ramulisque muticis, sulcatis, folii rudimento squamiformi lineari brevi suffultis; pedunculis axillaribus, subsolitariis, submonocephalis, minute bracteolatis; capitulis 3-1-floris; calyce minuto, obtuse 4-lobo; corolla striata, 4-fida; staminibus inclusis; legumine stipitato, acuto, subincurvo, acute tetraquetro, angulis nerviformibus aequalibus, faciebus lineari-lanceolatis planis, superiore et inferiore medio sutura tenui nerviformi vix prominula percursis caeterum laevibus, lateralibus reticulato-venulosis; seminibus 2-1 longitudinalibus, oblongis, strophiolatis.

In solo subtrufoso-arenoso prope villam b. Spencer (Plantagenet) d. 8. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 866.

Species facie simillima *A. restiaceae* Benth., sed foliorum vestigiis manifestis, inflorescentia et praecipue legumine distinctissima, forsani novi generis pignus. — *Caules* e radice simplici verticali parce fibrosa numerosi, $1\frac{1}{2}$ -2-pedales, „decumbentes“, graciles, penna corvina fere tenuiores, teretes, egregie sulcato-striati, virides, a basi inde ramosi, nodis haud incrassatis, internodiis stricte continuis 1-3-pollicaribus. *Foliorum* rudimenta 1-2 lin. longa, fusca, ramo plus minus adpressa, supra canaliculata. *Pedunculi* filiformes, tenues, 5-6 lin. longi (nonnunquam gemini) basi apiceque (rarius etiam secundum longitudinem) bracteolis paucis squamiformibus vix semilineam longis muniti, demum recurvi. *Alabastra* oblonga, acutiuscula. *Corolla* flava? infundibuliformis, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, calyce fusco triplo longior, egregie striata, persistens, semi-4-fida, lobis erectis, acutis. *Stamina* numerosa, persistentia, haud exserta. *Legumen* coriaceum, fuscum, glabrum, circ. pollicare, stipite 2-4 lin. longo, angulis plus minus prominulis carinaeformibus, faciebus 2 lin. latis, dorsali et ventrali demum secundum suturam (facile saltem pressione fissilem) dehiscentibus?, valvis crassiusculis. *Semina* subsessilia, pendula, valvarum foveolis immersa, oblonga, fusca (immatura) 2-2½ lin. longa, strophiola adpressa truncata pallida triplo longiora.

II. ALATAE, phyllodiis decurrentibus. (Benth. l. c. p. 323.)

3. **Acacia alata** *R. Brown.* — DC. prodr. 2. p. 448.

a genuina nob., phyllodiorum mucrone recto v. (sursum) incurvo. — *A. alata* Benth. l. c. p. 324, n. 4. Wendl. diss. t. 1. Bot. Reg. t. 396.

In humidis umbrosis ad ripam fluvii Canning, Jul. 1841. cum flor. et fr. Herb. Preiss. No. 997. (Drummond n. 306! et ex parte 307!)

„Frutex 5-pedalis.“

β platyptera nob., phyllodiorum mucrone (deorsum) recurvo, ramorum alis plerumque latioribus. — *A. platyptera* Lindl. in Bot. Reg. 1841. misc. n. 10. Bot. Mag. t. 3933. Benth. l. c. n. 5. —

Swan River. (Drummond. n. 307! ex parte.)

Nisi graviter fallor, a genuina *A. alata* haud specificè distincta.

4. **Acacia diptera** *Lindl.* Swan River (Bot. Reg. 1839, Append.) p. XV. n. 62. Benth. l. c. n. 6.

a latior nob., caulibus ramisque latius alatis (5-8 lin. latis) inferne et in costa plus minus pilosis (raro glabris) pilis patulis mollibus. — *A. diptera β erioptera* Benth. l. c. Bot. Mag. t. 3939! (ex ic.)

In arenosis sylvae prope Perth. d. 8. Maj. Herb. Preiss. No. 995, et in limoso-calculosis inter frutices sylvae prope Halfwayhouse (Darling's-range) d. 12. Sept. 1839. No. 996 cum fl. et fr.

β **angustior nob.**, caulibus vix 1-3 lin. latis, plerumque hispidulis, pedunculis solitariis v. geminis, rarius brevissime racemosis; capituli diametro plerumque vix longioribus. — *A. diptera* Hook. ic. t. 369!

In glareosis ad jugum montium Darling's-range prope cataractam, d. 3. Aug. 1839. — Herb. Preiss. No. 993. in asperis ad latus occidentale montis Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. (No. 394.) et hinc inde in arenosis subumbrosis sylvae ad fluv. Cygnorum, d. 23. Jul. 1839. (sine No.)

Caules annotini, 2-pedales. **Legumen** (unicum, separatim sub n. 995 missum) coriaceum, planum, continuum, glaberrimum, subnitidum, bipollicare, 5-6 lin. latum, falcato-oblongum, ex apice rotundato oblique minuteque mucronatum, basi in stipitem brevissimum attenuatum, suturis nerviformibus incrassatis obtusissimis laevibus, valvulis transverse pulchre venosis leviter torulosis. **Semina** 12, transversa.

5. **Acacia stenoptera** Benth. l. c. p. 325, n. 8.

In arenosis ad fl. Cygnorum ubique, d. 12. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 991. et inter frutices sylvae districtus Sussex, d. 19. Dec. 1839. No. 992.

„Radix lignosa, caules annotini, pedales, v. frutescentes adscendentes.“ **Phyllodia**, maxime infima, interdum (praecipue specim. No. 991.) rectiuscula, margine superiore prope basin obsolete glandulifera. Folia infima nonnunquam perfecta, bipinnata, 1-juga, rhachii 1-1½ poll. longa anguste alata, petiolulis 3-6 lin. longis vix alatis, foliolis 2-jugis oblique obovatis medio 1-nerviis penniveniis mucronulo innocuo acutatis, jugi exterioris majoribus petiolulum aequantibus. **Legumen** desideratur.

6. **Acacia incurva** Benth. l. c. p. 325, n. 10.

In arenosis apertis inter frutices densos haud longe a villa col. Erwin, d. 24. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 990.

„Frutex erectus, 1-2-pedalis.“ **Phyllodia** medio crasse acuteque costata, quasi ancipiti-tetragona, patentissima, a basi leviter recurva, deinde vel recta vel apice paulo incurva v. rarius subrecurva, interdum bipollicaria, vix unquam linea 1 latiora.

7. **Acacia graminea** Lehm. delect. sem. Horti Hamburg. 1842, glabra, stipulis obsoletis; phyllodiis longissimis, subcompresso-filiformibus, trifariam angustissime decurrentibus, brevissime sphacelato-mucronatis muticisve, infra medium glandula poriformi munitis, 1-nerviis, nervo crassiusculo marginibus alisque scabriusculis; pedunculis solitariis, brevibus, 1-cephalis; capitulis multifloris.

In solo humoso vallis prope Mahogany creek (Darling's-range) d. 25. Apr. 1840. Herb. Preiss., No. 984 (Drummond n. 304.)

„Frutex 12-pedalis.“ (An inventor lapsu calami 12-ped. pro 1-2-ped. scripsit, quae statura e plantae aspectu verisimilior videtur?) **Rami** ramulique gracillimi, adscendentes, inferne acute angulati nec vere alati, extremitates versus 3-alati, alis vix ½ lineam latis cum venis 3 tenuioribus alternantibus. **Stipulae** exiguae, lanceolato-subulatae, fuscae, cito deciduae. **Phyllodia** 4-8-pollicaria, ½ lin. lata, semierecta, apice saepius recurva, marginibus nerviformibus cum costa alisque sub lente papilloso-scabriusculis, glandula foveaeformi in margine superiore 10-15 lin. a basi distante. **Pedunculi** 3-6 lin. longi, subtetragoni, glabri, scabriusculi, demum patuli. **Capitula** magnit.

seminis *Viciae sativae*, circ. 20-flora. *Flor.* 5-meri. *Calyx* turbinatus, corolla dimidio brevior, lobis brevissimis obtusis. *Legum.* — Species *Alatas* inter et *Calamiformes* ambigua, illis tamen propius quam hisce affinis; valde accedit ad *A. calamifoliam* Sweet Bot. Reg. t. 839, quae ex ic. differt ramulis subteretibus, phyllodiis brevioribus, capitulis racemosis, caet.

8. ***Acacia extensa* Lindl.** Swan River p. XV. n. 64. Benth. l. c. p. 343, n. 68.

In rupestribus ad portum Princess Royal Harbour, m. Dec. 1840. Herb. Preiss No. 983.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* inferne acute angulati, superne 3-alati, alis $\frac{1}{2}$ -1 lin. latis margine scabriusculis. *Stipulae* obsoletae. *Phyllodia* fere *A. gramineae*, sed saepius breviora, paulo crassiora et firmiora, stricta, apice brevissime uncinato-mucronulata. *Pedunculi* vix 3 lin. longi, subteretes, laeviusculi. *Capitula* pisi magnitudine. *Legumen* (separatim adjacens) anguste lineare, rectum, 3-pollicare, $1\frac{1}{2}$ lin. latum, multiarticulatum, glaberrimum, laeve, obsolete venulosum, isthmis linea transversa (saepe obsoleta) notatis articulo oblongo (3 lin. longo) utrinque convexo parum angustioribus, suturis nerviformibus paulo incrassatis obtusis pallidis. — Species a. cel. Benthani inter *Calamiformes* suas (§. 5. l. c. p. 341.) recensita, sed secundum nostra saltem specimina (nisi, quod dubitamus, a planta Lindleyana specificè differant) certe ad *Alatas* transferenda.

III. **ARMATAE**, ramis apteris, stipulis spinescentibus, phyllodiis ex ovato ad lineare, pungentibus 1-v. rarius 2-3-nerviis, inflorescentia capitata simplici v. rarius subracemosa. (Benth. l. c. p. 326.)*

9. ***Acacia teretifolia* Benth.** l. c. n. 13.

In arenosis inter frutices prope praedium rusticum Maddington ad fluv. Canning (Perth) d. 2. Nov. 1839 fructifera Herb. Preiss. No. 998. et prope catartactam ad caput fl. Cygnorum, sterile, d. 26. Jul. 1839. No. 975.

„Frutex 1-1 $\frac{1}{2}$ pedalis.“ *Pedunculi* fructiferi semipollicares, crassiusculi. *Legumen* sessile, lineare, subcompresso-cylindricum, leviter arcuatum, utrinque acutum, 2-3-pollicare, 2 lin. latum, sublignoso-coriaceum, glaberrimum, laeve, fuscum, suturis obsoletis v. sulciformibus (interdum guttulas gummi sicci diaphani exsudatas ferentibus) valvula altera v. rarius utraque medio nervo longitudinali plerumque obsoleto percursa.

10. ***Acacia loricina* n. sp.**, ramis teretibus, costato-striatis ramulisque cano-tomentosis; stipulis setaceo-spinescentibus, rectis; phyllodiis tetragono-filiformibus, rectis v. recurvo-arcuatis, mucrone brevi recto pungentibus, 1-nerviis, glabris, marginibus nerviformibus eglandulosis; pedunculis axillariibus, solitariis, brevibus, erectis, monocephalis, tomentosis, fructiferis elongatis phyllodium subaequantibus deflexis; capitulis parvis, multifloris, glabris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 973.

*) ***A. crassistipula* Benth.** l. c. n. 12. (Drummond n. 295!) inter plantas Preissianas deest. — Idem valet de ***A. congesta* Benth.** l. c. p. 327, n. 19. (Drummond n. 243!) cujus legumen lineare, valde arcuatum, sesquipollicare, 2-3 lin. latum, 2-5 spermum, inter semina paulo contractum, suturis obsoletis submarginatum, valvis convexis enervibus pallidis.

„Frutex pedalis, ramis flaccidis.“ *Phyllodia* 6-10 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Pedunculi* floriferi 2-3 lin. longi, niveo-tomentosi, fructiferi 6-7 lin. longi, fusci, glabrescentes, arcuato-deflexi. *Capitula* (floribus nondum apertis) vix grani piperis magnitudine; alabastra obtusa, 5-gona. Legumen (nondum perfecte maturum) lineare, attenuato-substipitatum, compressum, continuum, pollicare, lin. 1 latum, leviter arcuatum et torulosum, cano-tomentosum, demum glabrum, longitudinaliter nervoso-striatum, 3-4-spermum, suturis simplicibus acutiusculis. — Differt ab *A. teretifolia* Benth.: ramis tomentosis, haud angulatis, stipulis tenuioribus erectis ramo fere adpressis rectisque, phyllodiis tenuioribus et brevioribus mucrone fortiore pungentibus, caet.; ab *A. barbinervi* Benth.: stipulis erectis, phyllodiis glabris, tetraquetris nec planis, dimidio angustioribus, brevius mucronatis; ab *A. striatula* Benth.: phyllodiis 1-nerviis, haud divaricatis, et ab *A. sulcata* R.Br., cui etiam accedit, pubescentia, phyllodiis incurvis pungentibus, caet.

11. *Acacia barbinervis* Benth. l. c. n. 14.

In limoso-calculeosis prope cataractam ad caput fluvii Cygnorum d. 16. Jun. 1840. Herb. Preiss. No. 988.

„Frutex vix pedalis.“

12. *Acacia nervosa* DC. mém. lég. p. 444; prodr. 2. p. 249, n. 6. Benth. l. c. p. 327, n. 17.

In limoso-calculeosis in summitate montis Greenmountain, alt. 800 ped., d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 936. (Drummond n. 298!)

„Frutex 1-pedalis.“ *Phyllodia* constanter videmus glandula poriformi (nunc in medio fere margine superiore, nunc 2-3 lin. a basi sita) munita, modo (praecipue in specim. Drummondianis) 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicaria 6 lin. lata, mollo (ut a Candollio describuntur) dimidio fere minora. *Legumen* (unicum, separatim sub n. 936 missum, immaturum) sesquipollicare, 2-3 lin. latum, coriaceum, laeve, glaberrimum, spiraliter tortum, utrinque attenuato-acutum, valvis planis enerviis, suturis valde incrassatis teretibus medio linea tenui nerviformi percursis. — Cum *A. hastulata* Sm., cui soli comparanda a Candollio dicebatur, nullam plane similitudinem monstrat, dum contra, ut recte jam observavit cl. Bentham, primo intuitu ad *A. myrtifoliam* Willd. valde accedere videatur.

13. *Acacia Bagsteri* (nonne rectius *Baxteri*?) Benth. l. c. n. 16?

In limoso-arenosis porrectis sylvae prope oppidum York, d. 5. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 977. (specim. manca.)

„Frutex humifusus.“ Ramuli subsperescentes. Stipulae dilapsae. *Phyllodia* semipollicaria, 3-4 lin. lata, submutica. *Capitula* pauca, pedunculis 2 lin. longis, flor. nondum expansis.

14. *Acacia Hügelii* Benth. in Hüg. Enum. p. 42, et apud Hook. l. c. n. 22. Hügel Bot. Archiv t. 10!

In sylvaticis arenosis prope Limekiln (Perth) d. 5. Nov. fructifera No. 961. et in colliculis ad portum Leschenault (Wellington) d. 13. Dec. 1839. florens No. 953. Herb. Preiss.

Legumen (fere maturum) sessile, lineare, falcatum, pollicare, 2 lin. latum, planum, obtusum, basi attenuatum, puberulum, 2-3-spermum, inter semina paululum angustatum, venis longitudinalibus tenuibus irregulariter anastomosantibus lineatum, suturis nerviformibus v. subincrassatis obtusis. *Pedunculi* fructiferi phyllodio paulo longiores; plerumque arcuato deflexi. *)

*) Nova sp. hic iusserenda est: *Acacia Shuttleworthii* nob., hispido pilosa, ramis teretibus; stipulis minutis, subsperescenti setaceis, phyllodiis oblique

15. **Acacia obovata** Benth. l. c. p. 329, n. 24.

β **minor** nob., stipulis spinescentibus, phyllodiis $\frac{1}{2}$ -1-pollicaribus pedunculo longioribus. —

In glareosis inter frutices montis Greenmountain (York) d. 26. Apr. 1840. florens, Herb. Preiss. No. 931.

„Frutex 1-1½-pedalis.“

16. **Acacia urophylla** Benth., in Bot. Reg. 1841, misc. p. 24, n. 61., et in Hook. Lond. Journ. l. p. 329, n. 25. —

In lapidoso-sublimosis umbris montium continuorum Darling's range, haud longe a capite fluvii Cygnorum d. 9. Aug. 1839, Herb. Preiss. No. 918. et in humidis umbris ad ripam fl. Canning, m. Jul. 1841. No. 913, (steril.)

„Frut. 3-4-6-pedalis.“ Specim. glaberrima, phyllodiis summis vix 1-1½-pollicaribus 8-10 lin. latis, inferioribus duplo majoribus, margine levissime crenatis, glandula conspicua ovali concava ad basin marginis superioris, petiolo semipollicari utrinque puberulo. Variat etiam (No. 913.) phyllodiis fere lanceolatis 2 poll. longis 5-7 lin. latis.

IV. **TRIANGULARES**, ramis apteris, stipulis setaceis v. subnullis, phyllodiis parvis plus minus triangularibus 1-v. rarius plurinerviis, angulo inferiore mucronato, superiore mutico plerumque glandulifero, inflorescentia simplici capitata. (Benth. l. c. p. 330.)

17. **Acacia decipiens** R. Br. DC. prodr. II. p. 449, n. 3. Benth. l. c. n. 27. — *Mimosa decipiens* Koen. Bot. Mag. t. 1745. —

In littore arenoso ad Middleton Bay. d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 964.

„Frutex 5-pedalis.“

β ? **incrassata** Benth. l. c. — *A. incrassata* Hook. ic. t. 370.

In regionibus interioribus Australiae merid.-occid. m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 962. et in glareosis sylvae prope fontem Bejoording (Victoria) d. 15. Mart. 1840. fructifera No. 967 (Drummond n. 296!)

„Frut. 3-pedalis.“ Legumen pollicare, 1-1½ lin. latum, suturis incrassatis. Specim. Preissiana alia (No. 967.) ab icone paulo recedunt phyllodiis apice plerumque truncatis, angulo superiore minus elongato marginibusque

obovatis v. suborbicularibus, mucronulatis, undulatis, 1-2-nerviis, obscure penniveniis, punctato-scabris, marginibus vix incrassatis, superiore prope medium glandulifero; pedunculis axillaribus, solitariis, phyllodio brevioribus, capitulis parvis 10-12-floris villosis; legumine brevi, late oblongo, compresso, 2-3-articulato, utrinque rotundato, puberulo. — Swan River. (Drummond n. 294! in Herb. Shuttleworth.) — Omnes partes pube brevi, molli, in ramis pedunculis floribusque densiore, patula, in leguminibus phyllodiisque parciore et brevior, tectae. Phyllodia 5-6 lin. longa, 3-5 lin. lata, nervo conspicuo parum excentrico in mucronulum excurrente, accedente saepius nervo altero tenuiore illum inter et marginem superiorem (magis arcuatum) medium tenente plerumque obsolete v. ante marginem evanescente. Pedunculi 5 lin. longi. Legumen circiter semipollicare, 3 lin. latum, articulis linea impressa interstinctis, valvis levissime convexis, suturis simplicibus obtusis. — Species proxime affinis **A. Hügelii**, sed notis indicatis satis superque distincta, nec non accedens ad **A. idiomorpham** et **obovatam** Benth., et **A. sertiformem** et **piligeram** Cunningham, quae abhorrent sive stipulis longioribus recurvisque, sive phyllodiorum forma et magnitudine, cnet.

rhomboidalis *formell*
 in hb. Stuart.
A. adiantophylla *formell* *ms.*
 in hb. *Blancovskiana*
A. rotundifolia *Hook?*
cyrtophylla *formell*
ramulis angulatis puberulis.
ramum glabris, stipulis minutis
tubulosis perispermatis saepe
curvatis, phyllodii *glabris* *tri-*
angulati vel rotundati *rhomboidalis*
plurimque *quae leniter exsertis, curva*
modo in mucronulum exsertente
foliatis *absolutis*, *dimidia superiore*
phyllodii inferiore duplo latiore glandulam
obsoletam gerente saepe in angulum
acutum producta, mucronis *axilla-*
ribus foliatis phyllodii aequantibus
A. hastulata *W.* *affinis*
A. et cyrtophyllae
Acacia rhomboidalis *formell*
 Hb. i. b. b. *formell* *aut par-*
ata!
 var. *pubescens*. Ad *luminis* *mur-*
rai *ripas* *arcuatas*. Legumen ab
truncato *subcylindrico*. *Brac-*
teolus *ovatus*. *Stipula* *obovata* *glabra*
lodiculorum *forma* *agglutina* *legali*
paucum *abharrens*. *Hb. A. 184.*
forma *legalis* *legit* *Stuart* *in*
folia *argillacea* *quae* *viv.* *Stueck*
formell *formell*. — *Barrogetta* *rauge*
Sept 1848 — *Marcello* *Sept*
Beyle-rauge *(cyrtophyllae)* *Nov.*
An *collibus* *montibus*
varia *mutatis* *variis*, *ut* *vivetur*
et *per* *luminis* *Cunn* *et* *octava*
affinis. *Folia* *saepe* *latiora* *quam*
longiora
Acacia *clavata* *formell* *formell*
in *speciem* *reperendam* *frustra*
invenit = *A. hungarica*.

X *A. neurophylla*! Ferd. mull. § IX

(forte in sect. vij Werth pertinet,

~~cujus definitionem desidero~~)

~~ramis angulatis verrucatis, pappi~~

~~lis deciduis~~

~~phyllodii conicis~~

~~laetis lineariibus~~

~~apicibus latioribus~~

~~utrisque attenuatis bi- vel plurinerviis~~

~~in aequo longis, glandula marginali obsoleta~~

~~capitulo brevioribus ebracteatis, glabris,~~

~~Interfructuosa "Murray frons" juxta~~

~~inferiorem partem fluvii Murray! Oct.~~

~~1848. Fructus 1-3' erat. Phyllodia 1-1 1/2~~

~~ly 1 1/2-2" lt. Maxime affinem habuit~~

~~fructum Scariae glanduliferae. De~~

~~specim. novum floribus a. et. m. m.~~

~~ex eodem loco communicatum phyllo-~~

~~dis paullo latioribus r. r. r.~~

Ab *A. foliophyllae* deriviente modo

aemula ~~typis~~ ^{rigidioribus} curvis ni-

gidulis, myrtodis, supra ~~mutum~~

net, prope medium latioribus

nervis magis eminentibus, capitulis

parum minoribus brevius fo-

deraculatis. et, r. r. r. bractea

absente! In numero Pine Forest

prope Oppidum Gaolani! 15-16' Dampby

Wangere, r. r. r. 4-5' long. globosus.

X *Scaria hirsutiaria*, Ferd. mull.

A. clara La Schode!

in olivis, floribus prope totius Whea
Norton. ^{viduatus & nullus}

Fructus 3-5' trahitur B. spinosam

aemulam ~~viduatus~~, quoniam in pro-

misura aemula. Legumen hispidum

oleaginum oblique lauculatum

phyllodii oblongo v. ovali spatulato

et pallidum longe & paucis. latior

4 N. Gunnini ^{Anth.} hb. St. T. n. 380

~~Sub haenamine accipiflorum~~
~~forte a el Docter definitum,~~
~~quae. & descriptum maxime~~
~~videtur affinis. Anth: primo n.~~

St. T. n. 380, Oct. 1848. ^{alt.}
^{St. T. n. 380 nido}
~~Phyllodia p. crinum nostrum~~
~~potius basi truncata quam~~
~~occinata? Eppig-forest. 635~~
~~variat. &~~

~~p. monumbus firdmell. Ibidem.~~

x Acacia acutissima firdmell.

^{Al. J. Zuck}
^{1857, 31.} Praeridenti proxima videtur, foli-
orum longioribus, ^{glabris} acutius angu-
lo superiore magis acuto
et legumine (immature) gla-
briuscula, plegoperno, eton-
tatis longo, quod in illa ~~immatura~~
~~immatura, folio globosum, & clau-~~
~~disoriminatur.~~ ^{anthesis putacit}
in montium lateribus, prope
Cafaratas, Loffy-ranges & Outkap-
Anth. Exeunte hieme et ineunte
vere.

Fructus diffluo-expansus interdum
protrahitur, rari ac u. (nam
longi capitula p. albidis luteis
in montibus scopulosis juxta
St. Outkaparinga, utrogen loco
(vid. ant.) rara!

minus incrassatis; alia (No. 962.) phyllodiis saepe latioribus quam longis, angulo superiore subinde obtusissimo.

γ? elongata Benth. l. c.

In solo sylbinoso juxta oppidum Guildford, d. 29. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 955.

„Frutex spithameus, erectus,“ ubique breviter molliterque puberulus. Phyllodia 4-5 lin. longa, 3-7 lin. lata, margine inferiore subrecto, nervo arcuato in mucronem brevem saepius deorsum spectantem excurrente, venis nonnullis (plerumque 2-4 magis conspicuis) e nervo ortis versus angulum superiorem obtusum glanduliferum convergentibus ibique evanescentibus.

δ? trapezoidea DC. l. c. β. — A. decipiens, var. praemorsa Bot. Mag. t. 3244!

In colliculis arenosis ad mare prope Vasse, d. 25. Dec. 1839. fructifera Herb. Preiss. No. 968.

„Frut. 12-15-pedalis.“ Phyllodia pleraque 8-10 lin. longa, 4-5 lin. lata, ramorum sterilibus nonnunquam pollicaria 8-10 lin. lata, a basi ad angulum superiorem 2-pollicaria; omnia tenuiter foliacea (nec coriacea) pallida, margine haud incrassata. Legum. lineare, arcuatum, bipollicare, 1-1½ lin. latum, obtusissime subtetragonum, suturis incrassatis marginatum, valvis planis laevibus vix torulosis.

18. **Acacia cuneata Benth.** in Hügel Enum. p. 42, n. 125; ap. Hook. l. c. p. 332, n. 32.

In clivulis calcareis juxta oppidum Freemantle, d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 957. (Drummond n. 297!)

„Frut. 4-9-pedalis.“ Pedunculi initio 3 lin. longi, demum phyllodia subaequantes. Adjectae sunt leguminis valvulae separatae, lineares, 2-2½ poll. longae, 2 lin. latae, valde arcuatae, incrassato-marginatae, vix torulosae, extus pube densa patula molli canescentes, — an vere ad hanc plantam pertinentes?

β? glabra nob., glaberrima, stipulis obsoletis fugacissimis, phyllodiorum nervo parum excentrico margini inferiori approximato, angulo superiore glandulam concavam gerente, pedunculis phyllodio brevioribus.

Cum praecedente Herb. Preiss. No. 957. d. 15. Aug. 1839. No. 956.; et in arenosis inter frutices vix penetrabiles insulae Rotenest d. 19. Aug. 1839. florens No. 954.

An n. sp.? Inter *A. decipientem γ.* et *A. cuneatam* ambigua; phyllodia praeter nervum nunquam exacte centralem glandulamque magis conspicuam omnino posterioris. „Frutex 4-7-ped., erectus; flor. fragrantēs.“

19. **Acacia divergens Benth.** ap. Hook. l. c. p. 331, n. 28.

Ad sinum Regis Georgii III., m. Nov. 1840. fructifera Herb. Preiss. No. 960.

20. **Acacia horridula n. sp.**, ramis teretibus, pubescentibus; stipulis setaceis, rigidis, subpersistentibus; phyllodiis patentissimis, ovato-v. lanceolato-triangularibus, 1-nerviis, pungenti-mucronatis, glabris, angulo superiore parum prominente minute glandulifero; pedunculis brevibus, capitulis 2-3-floris; legumine sessili, lineari, tereti, utrinque acuto, obscure venoso-lineato.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 965, cum fruct. jun. et in arenosis ad fluv. Canning (Perth) d. 4. Dec. 1839. florescens No. 1151.

„Frutex 2½-pedalis.“ *Stipulae* semi-erectae, 2-3 lin. longae. *Phyllodia* patentissima, crassiuscula, rigidissima, avenia, 3-4 lin. longa, 1-2½ lin. lata, nervo recto, angulo superiore basi approximato parum prominulo subinde obsoleto, glandula minuta. *Pedunculi* fructiferi phyllodium aequantes, floriferi dimidio breviores. *Flor.* 4-meri, calyce brevissime obtuseque 4-lobo dimidiam corollam aequante. *Legum.* bipollicare, 1½ lin. latum, junius minute cano-puberulum, demum glabrescens. —

Ab *A. biflora* R.Br., cui simillima quidem, evidenter tamen differt legumine nequaquam marginato; ab *A. triangulari* Benth.: phyllodiis longioribus quam latis, rigidis, spinescentibus, nunquam 2-nerviis; a reliquis affinis denique (*A. divergente*, *decipiente*, *hastulata*) capitulis 2-3-floris etc.

21. *Acacia triangularis* Benth. in Hüg. En. p. 42, in not.; ap. Hook. l. c. n. 30.

In region. interior. Australiae merid.-occid., Herb. Preiss. No. 966. et in sublimoso-glareosis sterilibus sylvae cis fluv. Gordon (Hay) d. 7. Nov. 1840. fructifera No. 963.

„Frutex 3-pedalis.“ Legumen (junius) lineare, suturis crassiusculis marginatum, valvis parce puberulis mox glabris. (Flor. non vidimus.)

22. *Acacia hastulata* Sm. DC. prodr. II. p. 449, n. 5. Bot. Mag. t. 3341! Benth. ap. Hook. l. c. n. 31. —

In solo arenoso-turfacco ad Stirling's terrace (Plantagenet) d. 21. Sept. 1840, florens Herb. Preiss. No. 959.

„Rami 2-3½-pedales.“

23. *Acacia bidentata* Benth. l. c. p. 333, n. 38.

β *pubescens* nob., ramis phyllodiisque minute puberulis.

In arenosis planitiei ad fluv. Avon, 9 mill. ab oppido York, d. 10. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 958, florif. et in sterilibus sylvae ad montem prope praedium rusticum Dom. Barker, d. 11. Apr. 1840. sterilis No. 969. —*)

„Frutex decumbens v. 1-1½-pedalis.“ Ramuli divaricati, pallidi, saepe nivi. Phyllodia crassiuscula, dente superiore semper obtusissimo, inferiore acuto v. obtuso nunquam pungente, nervis vix conspicuis.

V. PUNGENTES, ramis apteris, stipulis setaceis v. obsoletis, phyllodiis rigidis acuminato-pungentibus subulato-teretibus v. planis angustis 1-plurinerviis, inflorescentia capitata simplici v. spicata. (Benth. in Hook. Lond. Journ. 1. p. 334.)

24. *Acacia latipes* Benth. l. c. n. 40.

β *pubescens* ramis cano-tomentosis, phyllodiorum nervis minute pilosiusculis.

*) Novam hujus sectionis speciem ad calcem addere liceat: ***Acacia Latrobii*** nob., glaberrima, ramis gracilibus acute angulatis; stipulis obsoletis; phyllodiis oblique oblongis v. subtriangulari obovatis planis, infra apicem obtusum mucronulatis, 1 nerviis, nervo subcentrali ante apicem evanescente, venis obsoletis, margine inferiore parum arcuato, superiore curvato prope medium obscure glandulifero; pedunculis axillaribus aggregatis, 1 cephalis, phyllodium subaequantibus, capitulis parvis multifloris. In colonia ad „Port Philipp“ Australiae meridionali-orientalis legit cl. Latrobe, coloniae praefectus (v. s. in Herb. Musei Neocomensis.) Phyllodia 5-8 lin. longa, 2-3 l.

In planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. sterilis Herb. Preiss. No. 989.

(Nec flores, nec fruct. vidimus, caetera vero cum diagnosi l. c. bene conveniunt.)

25. **Acacia cochlearis** Wendl. — DC. prodr. 2. p. 451, n. 24. Benth. l. c. n. 41. — *Mimosa cochlearis* Labill. Nov. Holl. t. 234!

In arenosis prope oppidum Freemantle (Perth) d. 15. Aug. 1839. florens Herb. Preiss. No. 933. (Drummond n. 288! cum fr.) — *)

„Frutex 8-pedalis.“

26. **Acacia sulcata** R.Br. — DC. l. c. p. 450, n. 15. Bot. Reg. t. 928! Benth. l. c. n. 45.

In rupestribus summitatis montis Clarence (Plantagenet) d. 30. Sept. 1840. florens Herb. Preiss. No. 978.

„Frutex 6-pedalis.“

27. **Acacia Benthamii**, n. sp., glabra, ramulis subteretibus; phyllodiis patulis, rigidis, linearibus, rectis, planis, acuminato-pungentibus, striato-plurinerviis, supra basin attenuatam obscure glanduliferis; pedunculis solitariis geminisve, brevibus, capitulis multifloris; sepalis liberis, angustis, apice sphacelato-spathulatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis m. Nov. 1840. Herb. Preiss. florens No. 949. (Drummond n. 284!)

Rami ramulique stricti, interdum obsoletissime angulato-striati, juniores apice minute puberuli. *Phyllodia* coriacea (in specim. Preiss. crassiuscula) 1-rarius $1\frac{1}{2}$ poll. longa, vix ultra lineam lata, recta v. levissime incurva, mucrone recto fere 1 lin. longo, nervis 3 tenuibus bene tamen conspicuis. *Pedunculi* 2 lin. longi, glabri, in specim. Drummondianis semper solitarii semierecti, in Preissianis plerumque gemini divaricato-patuli. *Capitula* pisi magnit., aurea, glabra, calyce dimidiam corollam aequante. Legumen ignot. — Affinis sequenti, sed glabritie fere perfecta, phyllodiis duplo majoribus, pedunculis semper conspicuis facile distinguenda; nec non *A. striatulae* Benth. (n. 47.) quae differt (ex diagn.) phyllodiis divaricatis v. recurvis, subcompressis, dimidio minoribus.

28. **Acacia sessilis** Benth. l. c. p. 336, n. 48.

In colliculosis et arenosis sylvaticis ad fluv. Cygnorum, prope praedium rusticum Dom. S. Moore, d. 29. Jun. Herb. Preiss. No. 979. cis oppidum Guildford, d. 14. Sept., No. 980. florens, et in districtu Wellington d. 23. Nov. 1839. fructifera No. 982.

lata, mucronulo innocuo, saepius obsoleto, nervo interdum margini inferiori paulo approximat. Pedunculi capillares, plerumque phyllodio paulo breviores. Capitula circ. 10-flora, magnit. sem. Viciae sativae. Flor. 5-meri, sepalis subliberis linearibus ciliatis. Affinis *A. translucens* Cunn. (Benth. l. c. n. 143.) et *vestitae* Ker (ib. n. 87.) sed ab illa phyllodiis 1-nerviis apice haud incrassatis, ab hac inflorescentia non racemosa distincta; nec non *A. amblygonae* Cunn. (ib. n. 35.) quae differt pubescentia, phyllodiis plurinerviis, etc. — Species inter Triangulares et Uninervias latifolias ambigua, illis tamen potius quam hisce adscienda.

*) Species, ut videtur nova, sed e speciminibus sterilibus mancis haud definienda, hinc *A. cochleari* et *venulosae* Benth. (l. c. n. 152.) inde etiam *A. spirorbi* Labill. (Benth. n. 185.) affinis, in planitie arenosa sylvae inter praedia rustica dom. Barker et Lennard d. 12. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 937. — „Frutex 3 pedalis.“

„Frutex 1-4-pedalis, erectus. Flor. fragrantēs.“ Legumen lineare, rectum, continuum, 1-1½ poll. longum, 1½ lin. latum, attenuato-substipitatum, mucronato-acuminatum, suturis incrassatis obtusissimis marginatum, 2-5-spermum, inter semina quandoque constrictum, valvis leviter torulosis arachnoideo-lanatis demum glabrescentibus. — Phyllodia saepe in eodem specimine ½ et 1 poll. longa, ½ lin. lata, nunc dense approximata, nunc remotiora, semirecta v. patentia.

29. **Acacia sphacelata** Benth. l. c. p. 338, n. 54.

In lapidosis ad tergum montis Currie (York) d. 15. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 985. (Drummond n. 299!)

„Frutex 4-6-pedalis.“ Ramuli divaricato-patentes, pube brevi densa albidula lanato-tomentosi, v. (in n. 299.) subglabri. Phyllodia 4-8 lin. longa, patentia, 4-sulco-tetragona, recta v. vix arcuata, basi v. subtus pubescentia aut (in n. 299.) glaberrima. Legumen (separatim sub. n. 985 missum) lineare, valde arcuatum (semilunare) circ. semipollicare, 1½-2 lin. latum, 2-5?-articulatum, atrofusum, glaberrimum, suturis obsoletis, valvis parum convexis obscure venoso-rugulosis.

VI. CALAMIFORMES, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis elongatis subulatis v. subcompresso-linearibus, mucrone brevi vix pungente saepe recurvo, inflorescentia capitata simplici v. breviter racemosa. (Benth. l. c. p. 341.)

30. **Acacia leptoneura** Benth. l. c. n. 64.

Phyllodia pleraque pollicaria v. parum longiora, raro 2-pollicaria. (Drummond n. 303!)

?? **pungens** nob., phyllodiis duplo fere crassioribus, nervis magis conspicuis, mucrone recto pungente. An species distincta? Accedit etiam ad *A. colletioidem* et *striatulam* Benth. l. c. n. 46. 47.

In regionibus interior. Australiae merid. occid. m. Oct. 1840. sterilis Herb. Preiss. No. 976.

31. **Acacia Hookeri**. n. sp., ramis teretibus, apice minute puberulis; stipulis linearibus, deciduis; phyllodiis anguste linearibus, rectis v. arcuatis, muticis glabris v. parce ciliatopilosiusculis, supra planis v. canaliculatis, dorso convexo obsolete nervoso-striatis; pedunculis solitariis geminisve, phyllodio demum aequalibus v. sublongioribus, capitulis parvis, multifloris.

In solo sublimoso prope villam Cl. Mitchell ad fluv. Cygnorum, d. 29. Jun. 1839. florens Herb. Preiss. No. 981. (Drummond n. 300!)

„Frutex vix pedalis.“ Rami tennes, rectiusculi, plerumque graciles, fusci, tuberculoso-cicatratis, inferne glabri nunc simpliciter foliosi a medio inde floriferi, nunc conferte ramulosi cinerascens. Stipulae subfoliaceae, rigidae (haud spinescentes) erectae, lanceolato-lineares, acutae, 1½-2 lin. longae, ½ lin. latae, paucae hinc inde superstitēs. Phyllodia erecta, 5-11 lin. longa, ¾ lin. lata, obtusa v. acuta, nunquam manifeste mucronata nec pungentia, recta v. leviter recurvo-arcuata, raro subincurva, nervis striolisque obsoletis v. nullis, marginibus obtusis, facie superiore in specim. Preiss. plus minus concava, in Drummondianis plana v. subplana. Capitula aurea, diametro 2 lin., evolutione ab apice ramorum incipiente, descendente! Pedunculi glabri, 1-cephali, filiformes, superiores phyllodia sensim decrescen-

Linnell

* *A. diffusa*! ^{Linne} Ken. (sax. v. Benth.)

Parmanetia prope Launceston 2-3'
Oct. 20. 1848. hb. St. H. n. 16! *Thidum* in
stratificatione *Caris arcuatus*, subinde
prostratum. hb. St. H. n. 32! Secundum
diagnosin Donii nostra vix a *plagi* in
montibus caeruleis occurrente differat
p. 21.

A. repens! Good muc. pag. 11. (sent D)

glabra apice ^{marginibus} ~~versicolora~~ ^{marginibus} ~~rugulosis~~ angu-
latis falcatis, phyllodiiis ^{marginibus} ~~linearibus~~ ^{marginibus} ~~fulvala~~
tis rigens purgalli mucronatis ^{marginibus} ~~unco~~
usque ^{marginibus} ~~notissime~~ ^{marginibus} ~~subtragonis~~ ^{marginibus} ~~basif~~
lata ^{marginibus} ~~legilibus~~ ^{marginibus} ~~glandula~~ ^{marginibus} ~~minutissima~~
marginibus ^{marginibus} ~~mariora~~ ^{marginibus} ~~prope~~ ^{marginibus} ~~basin~~ ^{marginibus} ~~incidente~~
nodululis ^{marginibus} ~~trifloribus~~ ^{marginibus} ~~solidariis~~ ^{marginibus} ~~phyllodii~~
suplo ^{marginibus} ~~bravicularis~~ ^{marginibus} ~~iniquis~~ ^{marginibus} ~~nucis~~
F

x *G. calamifolia* Sweet hb. St. 185. F

3-4' tall, rather branched stems & flowers etc. - ^{fruits}
gumminess fragments at nodes have ^{as 10'} pinnate
leaves, buds large, axillary, etc.

Miconia gracilis frequent. fruit 5-6 1/2 yellow.

~~*C. diffusa* (L.) DC. No. 188. Vahl. *Cruciferae*~~
Legum. frum.

~~Am. phyllis phyllanthoides, spec. imend. gain~~
~~It was similar to Am. Squart, qui~~

in plantations spread fl. May + June

receptum 24. 4. 1711. *receptum* 24. 4. 1711. *receptum* 24. 4. 1711.

1972 Under a tree 6-8 m by 1 1/2 m by 1/2 m. Frappant. mounds, all

Heard Rock N. B. 152. 1004

~~breve et cetera ad hoc speciatim affinitas, ad
admodum. Genuerunt enim speciatim cum, de
admodum. Genuerunt enim speciatim cum, de~~

~~Qua 4 quadrilateris de videtur plene~~

~~of inf. V.S.L. fol. n. 116 or thereof concerning~~

Vivaries acillaris! Bth. ^(K) ^{! Apt}

Tasmania! 1841

Differs specimen meum valde non.

ramulis angulatis et phyllodiscreis

1. *Strigops flavus* M. *Sauv. St. Paul*

4-5th Cervicis pedunculis ad 4 mm.

Flores pauci in capitulum congesti

15 macrophylla, phyllodes depa-
lciatibus, lili.

nerve vel leuiter curvatis. Sp.

... ..

tia aequantes v. paulo superantes, 5-6 lin. longi, inferiores dimidio breviores. *Alabastra* obtusissima. *Sepala* libera, spathulato-linearia, obtusa, apice haud sphacelata, corolla semi-5-fida dimidio breviora. *Legum.*..... — Species habitu proxima *A. sulcatae*, sed distinctissima phyllodiis minoribus, inermibus, exsulcis, caet.

32. ***Acacia squamata* Lindl.** Swan River (Bot. Reg. 1839. Append.) p. XV, n. 63. Hook. ic. t. 367! Benth. l. c. p. 343, n. 69.

In limoso-calculosis sylvae district. York, d. 12. Sept. 1839. deflorata Herb. Preiss. No. 970. (Drummond n. 305!)

„Frutex 2-pedalis.“ *Legumen* (junius) lineare, planum, continuum, rectum v. subtortum, utrinque attenuatum, glabrum, 1-1½ poll. longum, 2 lin. latum, suturis nerviformibus acutis anguste marginatum.

VIII. *) UNINERVIAE, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis 1-raro 2-nerviis forma variis haud pungentibus, inflorescentia capitata simplici v. racemosa. (Benth. l. c. p. 345.)

33. ***Acacia Meisneri* Lehm.** Delect. Sem. h. Hamburg. 1842, glaberrima, glauco-pruinosa, ramulis ancipitibus triquetrisve; phyllodiis obovato-oblongis, subcuneatis, oblique submucronato-acutis, 1-nerviis, penniveniis, planis, plerumque eglandulosis, capitula solitaria multiflora superantibus.

In limoso-arenosis sylvae prope oppidum York, d. 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 930.

β ***angustifolia* nob.** phyllodiis lineari-lanceolatis, subfalcatis, tenuioribus.

In colonia Swan River legit Jac. Drummond, n. 292!

„Frutex 7-9-ped., pruinosis.“ *Rami* stricti, inferne teretes, subangulato-lineati, cicatricibus prominulis quasi dentati, fusci; apice ramulique acute angulati, compressi v. triquetri, plus minus glauci. *Stipulae* caducae v. nullae. *Phyllodia* nunc valde pruinosa-caesia, nunc viridia, pleraque 10-12 lin. longa (raro paulo longiora) 3-4-lin. lata (in var. β 10-15 lin. longa, 2 lin. lata) subpetiolata, plus minus obliqua, mucronulo obtusiusculo brevissimo acuminata, rarius obtusa, nervo centrali v. vix excentrico venisque copiosis parallelis tenuibus rectis parum prominulis (ubique tamen conspicuis) margine superiore circa medium obsolete glandulifero v. saepius nudo. *Pedunculi* filiformes, 3-4 lin. longi. *Capitula* magnit. grani piperis, alabastris obtusissimis, floribus minutis. *Legumen* junius lineare, tortum, laeve, glabrum, ½-1 poll. longum, 2 lin. latum, 1-3-spermum, utrinque et inter semina angustatum, valvis planis, suturis obsoletis: *maturum* (unicum, separatim sub. n. 930 missum, an vere ejusdem speciei?) 3-4-pollicare, egregie moniliforme, fere rectum, 10-12-spermum, isthmis 1-1½ lin. latis, 1-2 lin. longis haud articulatis, loculamentis ovalibus 4 lin. longis 3 lin. latis aequaliter convexis enerviis laevibus, suturis obsoletis. *Semina* lenticulari-oblonga, nigra, laevia, vix nitida, caruncula parva obtusa. — Species valde, ut videtur, affinis *A. ancipiti* DC. (nobis haud visae) et forsan ejusdem var.?: recedit tamen glaucescencia et phyllodiis angustioribus, mucronulatis.

*) E Benthamii §§. VII et XI, et e serie II, inter plantas Preissianas et Drummondianas nullam speciem invenimus.

34. **Acacia celastrifolia** Benth. l. c. p. 349, n. 92.

In regionibus interior. Australiae merid.-occid., m. Febr. Herb. Preiss. No. 915. et in montosis glareosis sterilibus distr. Grantham, d. 21. Mart. 1841. No. 916. (Drummond n. 281!)

„Frutex $2\frac{1}{2}$ -6-pedalis, glaucus.“

35. **Acacia myrtifolia** Willd. — Bot. Mag. t. 302. DC. prodr. 2. p. 452, n. 32. Benth. l. c. n. 93.

In rupestribus promontorii Cape Riche et montis Baldhead, d. 20. Nov. 1840. cum fl. et fr. Herb. Preiss. No. 917.

„Frut. 5-pedalis.“ — Specim. cum Sieberianis (n. 437!) exacte congrua.

36. **Acacia marginata** R. Br. — Wendl. diss. t. 5. DC. l. c. n. 41. Benth. l. c. p. 350, n. 94. — *A. trigona* A. DC.! 8^a not. pl. rar. Jard. Genev. p. 20. (fide specim. ab auctore.)

In turfosis per hiemem inundatis prope villam b. Spencer (Plantagenet) d. 11. Oct. Herb. Preiss. No. 920. et in glareosis sylvae ad latus meridionale montis Clarence, d. 30. Sept. 1840. No. 927, ex parte cum fl. et fr.

„Frut. 4-8-ped.“ Legumen, ut videtur, omnino *A. myrtifoliae*, sed nondum maturum et paulo tortum.

$\beta^?$ **angustata** nob., phyllodiis elongato-linearibus (3-4 poll. longis, 2-raro 3-4 lin. latis) nervo crassiore, racemis abbreviatis in apice rami corymboso.-approximatis. — An species distincta?

Herb. Preiss. No. 927 ex parte. —*)

37. **Acacia Lindleyi** n. sp., glaberrima, glauca, ramulis subflexuosis, acute triquetris, lineatis; phyllodiis coriaceis, elongato-lanceolatis, obtusis (?) basi longe attenuata glanduliferis, 1-nerviis, parallele pinnato-venosis, marginatis, planis; racemis axillaribus, brevibus, oligocephalis, pedunculis longis, capitulis majusculis dense multifloris; sepalis 5 subliberis, spathulato-linearibus, truncatis, glabris, corolla angusta 5-fida plus dimidio brevioribus, ovario glabro.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 947.

*) Addere hic liceat speciem nondum descriptam: **A. glaucifolia**, Baumann! (cat. hort. Bollwill. et Mulhus. 1843, p. 24.) glaberrima, glauca, inermis; ramis gracilibus, subangulatis; stipulis obsoletis; phyllodiis triangularibus, 1-nerviis, penniveniis, nervo subcentrali arcuato in anguli inferioris mucronulum innocuum excurrente, angulo superiore obtuso glandula minuta (rarius nulla) munito; racemis terminalibus et e summis axillis polycephalis, phyllodio longioribus, pedunculis brevissimis, capitulis multifloris. Colitur in hortis Baumannianis Mulhusiae et Bollwiller, Alsaciae, ubi vivam florentemque vidi. Species forsan Triangularibus adsocianda, quibus phyllodiis convenit, sed capitulis racemosis ab omnibus abhorrens; affinis **A. cultriformi** Cunn., ex Hook. ic. t. 170, quae differt phyllodiis longioribus, angustioribus, marginibus rectilineis, nervo excentrico, racemis longioribus, capitulis minoribus longius pedunculatis. — Rami circ. pedales, simplices, nutantes, dense foliosi. Phyllodia 5-8 lin. longa, 3-5 lin. lata, marginibus (praecipue superiore) plus minus arcuatis, interiore et inferiore subinde fere rectis, venis tenuibus, anastomosantibus. Racemi circiter pollicares, 6-10-cephali, paniculam terminalem parvam formantes, pedunculis 1 lin. longis, capitulis globosis pisi magnitudine aureis.

[illegible]

Ramus inferne subteres. *Phyllodia* erecta, rigida, 8-pollicaria, 1 poll. lata (omnia plus minus mutilata, unico minus laeso obtuso mutico) nervo centrali crassiusculo, utrinque obtuse prominulo; venis creberrimis, tenuibus, angulo valde acuto e costa utrinque nascentibus, rectis, parallelis, vix 1 lin. ab invicem distantibus, obscure anastomosantibus; marginibus nerviformibus, vix incrassatis. *Racemi* ante evolutionem squamis tecti, 4-6-cephali, interdum phyllodio parvo interrupti; *squamae* ovatae, acutae, 3 lin. longae, 2 lin. latae, striatae (hinc inde ad basin superstitis); rhachis vix 3-5 lin. longa; pedunculi 8-10 lin. longi substriati, patuli v. demum deflexi. *Capitula* aurea, diametro 4 lin., flor. 2 lin. longis, pallidis, tenere membranaceis; corollae tubus anguste cylindricus, demum basi fissa (in petala singula soluta) e calyce subsistente secedens, limbi lobis erectis angustis acutiusculis. *Stamina* parum exserta, basi monadelphae. *Stylus* capillaris, longius exsertus, basi flexuosus. *Legumen* — Species ab omnibus distinctissima; phyllodiorum forma, magnitudine et colore quidem ad sequentem accedens, sed ad Bentharii subsectionem quartam (*Squamatas*) referenda.

38. ***Acacia cyanophylla* Lindl.** in Bot. Reg. 1839, misc. not. p. 45, n. 64. Benth. l. c. p. 352, n. 101.

In arenosis subhumidis ad ripam fl. Cygnorum, d. 17. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 925; (Drummond n. 284!)

„Frutex 12-18-pedalis, divaricatus; incolis: Black Wattle,“ *Phyllodia* plerumque multo minora, praecipue angustiora, quam plantae cultae.

39. ***Acacia microbotrya* Benth.** l. c. p. 353, n. 104.

In glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, d. 12. Apr. 1840. florens Herb. Preiss. No. 923. (Huc quoque, v. forsan ad *A. subcoeruleam* Lindl., Benth. l. c. n. 97, referenda videntur specim. sterilia, in rupestribus vallis Toodyay, Victoria, m. Mart. 1840 lecta, Herb. Preiss. No. 939.)

„Frut. 7-pedalis. Flor. suaveolentes.“ — A diagnosi l. c. paulo recedit glaucescentia nulla, phyllodiis apice parum angustatis et glandula a basi plerumque magis (6-7 lin.) distante. Ab *A. leiophylla* Benth. differt phyllodiis acutis, vix marginatis et racemis haud ramosis. *)

40. ***Acacia leiophylla* Benth.** l. c. n. 99.

β? ***microcephala* nob.**, racemis subsimplicibus, capitulis parvis.

In regionibus interior. Australiae meridionali-occidentalis m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 921.

*) Hujus loci n. sp. est: ***A. myriobotrya* nob.**, glauca? glabra; ramulis subangulatis, mox teretibus, divaricatis; phyllodiis linearilanceolatis, utrinque longe attenuatis, acutis, subfalcatis, planis, haud marginatis, tenuiter 1-nerviis et penniveniis, glandula minuta a basi remota v. saepe nulla; racemis patulis, polycephalis, phyllodio brevioribus subsessilibus, pedunculis patentissimis capitula multiflora aequantibus; sepalis spatulatis (sphacelatis? nigricantibus) glabris, corolla dimidio brevioribus. — Swan River (Drummond n. 286!) — *Phyllodia* vix coriacea, 3-5-pollicaria, 2-6 (plerumque 3) lin. lata, nervo tenui plerumque plus minus excentrico, venis tenuissimis confertis subparallelis, glandula 6-10 lin. a basi distans, minuta, nunc nulla. *Racemi* indivisi, 1-1½-pollicares, 15-20-cephali, demum patentissimi, summi in paniculam subaphyllam congesti, rhachi strictiuscula, pedunc. 2-3 lin. longis vix 1-2 lin. ab invicem distantibus. *Legum.* — Species proxima ***A. microbotryae* Benth.** et ***penninerviae* Sieb.**, ab illa distincta phyllodiis haud marginatis, glandula a basi remota, racemis longioribus polycephalis et calyce; ab hac phyllodiis minus coriaceis, angustioribus, glandulis obsoletis, racemis simplicibus brevioribus haud laxis et calyce. Ab ***A. leiophylla*** et ***falciformi* Benth.** l. c. n. 99 et 100 abhorret phyllodiis inmarginatis, racemis nec flexuosis nec ramosis nec tomentosis, calyce, etc.

Forte n. sp., sed specim. nimis imperfecta. *Phyllodia* margine tenuissimo nerviformi sanguineo haud incrassato cineta, mucronulo terminali v. laterali (rarius nullo) munita; glandula nunc unica 1-4 lin. a basi distante saepe obsoleta, nunc duabus, altera prope medium marginis sita. *Racemi* 8-10 lin. longi, plerique haud ramosi, rhachi demum subflexuosa. *Capit.* (flor. nondum expansis) magnit. grani piperis. *Legum.* omnino *A. leiophyllae*. — Ab *A. amoena* Wendl. (Benth. l. c. n. 113) cui valde accedere videtur, differt phyllodiis vix marginatis, racemis multo brevioribus, caet.

Alteram varietatem (nisi forte speciem distinctam) e speciminibus suppetentibus sterilibus haud determinandam, phyllodiis longioribus (3-3½ poll. longis, 3-5 lin. latis) utrinque magis angustatis falcatisque, subeglandulosis diversam, sistere videntur specimina „in solo sublimoso-arenoso distr. York d. 8. Mart. 1840“ Herb. Preiss. No. 922. (? Drummond n. 291.) — „Arbor circiter 30 pedum. Aboriginibus: *Menna*.“

41. *Acacia xanthina* Benth. l. c. p. 355, n. 111.

In calcareis subhumidis ad ripam fl. Cygnorum prope oppidum Freemantle, d. 23. Aug. 1839. florens Herb. Preiss. No. 928. (Drummond n. 283!)

„Frutex 16-pedalis. Ramuli pruinosi. Phyllodia verticalia.“ Axillae hinc inde gallas duras rugosas ferunt, Raphani siliquam fere simulant.

42. *Acacia subbinervia* n. sp., glabra. ramulis angulatis, mox teretibus; phyllodiis lanceolato-linearibus, subfalcatis, utrinque attenuatis, immarginatis, apice obtuso recurvo hinc mucronulatis, 2-nerviis, nervo altero subcentrali, altero margini superiori approximato tenuissimo superne evanescente v. interdum deficiente, venis tenuibus obsoletisve, glandula a basi distante obsoleta v. nulla; racemis phyllodio multo brevioribus, simplicibus, oligocephalis, capitulis multifloris, calyce truncato-dentato.

In colliculis arenosis insulae Rotenest, d. 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 924. (Drummond n. 285!)

„Frutex 6-pedalis.“ — A praecedente proximè affini differt: glaucescine nulla (exceptis forsan ramis phyllodiolis junioribus) phyllodiis minus rigidis, plus dimidio angustioribus (2½-raro 3½ lin. latis) haud marginatis, nervis tenuioribus, altero centrali v. vix excentrico, racemis phyllodio dimidio v. plus brevioribus, capitulis paucis (3-6) minoribus. Phyllodia saepe puncticulis elevatis copiosis (ut in *A. xanthina* sed minoribus) granuloso-scabriuscula. — Valde quoque accedit ad *A. rostelliferam* Benth. n. 114, sed huic tribuuntur phyllodia crassiuscula, 1-nervia.

43. *Acacia crassiuscula* Wendl. diss. p. 31, t. 8. DC. prodr. 2, p. 453, n. 47, Benth. l. c. n. 115?

In arenosis ad portum Princess Royal Harbour, d. 27. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 929.

„Frutex 6-7-pedalis.“ Phyllodia e medio apice mucronulo recto brevissimo sphacelato subito acutata v. interdum rotundato-obtusa (nec, ut ap. DC. l. c. dicuntur, apice rotundato inflexo mucronata) et capitula tantum 12-15-flora. Praeterea specimina Preissiana a Sieberianis haud differunt.

44. *Acacia ramosissima* Benth. l. c. p. 356, n. 116?

In solo sublimoso et glareoso sylvae cis fluv. Gordon (Hay) d. 7. Nov. Herb. Preiss. No. 951. et ad radices montis Bakewell (York) d. 30. Mart. No. 940. in solo coenoso exsiccato ad marginem lacus Mathildae (Hay) d. 7. Nov. No. 941.

ad promont. Cape Riche, d. 10. Nov. 1840. No. 952. et in region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. No. 943.*)

„Frutex 3-5-pedalis, pruinosis.“ Specimina (pleraque manca v. sterilia) in descriptionem bene quadrant, excepto tantum calyce truncato (nec sepalis liberis sphacelato-spathulatis.)

45. **Acacia apiculata** n. sp., glabra (junior glauca?) ramis acute triquetris; phyllodiis crasse coriaceis, oblongo-lanceolatis, mucronulo acuto subincurvo apiculatis, vix marginatis, subimmerse 1-nerviis, aveniis, planis, basi obsolete glanduliferis; racemis (?), phyllodio longioribus (?) legumine coriaceo, oblongo, continuo, complanato, anguste marginato, juxta suturas transverse venoso, seminibus oblique transversis.

In glareosis sterilibus porrectis promont. Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 919.

Species, ut videtur, affinis *A. ancipiti*, *ellipticae* et *oleaeifoliae* (Benth. l. c. n. 82, 83 et 90) tamen certe distincta, sed e specimine suppetente unico floribus carente et legumen unicum gerente non satis cognita nec rite collocanda. — „Frutex 2-pedalis.“ *Phyllodia* pollicaria, 4 lin. lata, utrinque (apice praecipue) parum angustata, apice nunc sensim in mucronulum abeuntia, nunc rotundato-obtusissima et subito mucronulo $\frac{1}{2}$ lin. longo acuto leviter incurvo rubro apiculata, plana, integerrima, margine tenuissimo nerviformi sanguineo saepe obsoleto, textura crassa subcarnoso-coriacea (unde facies exsiccatione rugulosae) nervo vix prominulo parum excentrico margini superiori paululum approximato. (Flor. non vidi.) *Pedunculus* gracilis, circ. semipollicaris, teretiusculus, cicatriculis obsitus (hinc verisimiliter racemoso-polycephalus.) *Legumen* sesquipollicare, 5-6 lin. latum, subsessile, utrinque obtusnm, breviter acuminatum, glaucum, 6-spermum, suturis nerviformibus tenuibus, valvis coriaceo-membranaceis parum toruloso-convexis nudis aveniis.

46. **Acacia dentifera** Benth. in Botanist, 4, t. 179; ap. Hooker l. c. 363, n. 139. Bot. Mag. t. 4032.

In limoso-arenosis et lapidosis planitie prope Maddington ad fl. Canning, d. 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 932. in jugo montium Darling's-range (Perth) m. Sept. 1841. No. 944. et in depressis ad fl. Murray (Wellington) d. 7. Dec. 1839. No. 946. (Drummond coll. I, sine No., et II. n. 298!)

„Frutex 4-8-pedalis.“ *Stipulae* nunc fugacissimae, nunc subpersistentes, in eodem ramo saepe variae, superiores scil. setaceo-lineares subfalcatae, 3-4 lin. longae, erectae, diu persistentes; inferiores 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longae dentiformes, manifeste spinescentes, basi crassiusculae. *Phyllodia* recta v. levissime incurva v. falcata, saepe 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. lata, apice interdum uncinato-recurva et utrinque glandulis minutis fuscis punctata, venis nunc obsoletis, nunc conspicuis (quamvis tenerrimis) parallelis. *Pedunculi* 5-8 lin. longi, gemini, rarius solitarii, debiles, in specim. nostris semper 1-cephali sed prope medium constanter sive bractea exigua sive cicatricula denticuliformi muniti. *Legumen* sessile, lineare, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longum, 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latum, membranaceum, glabrum, inter semina (4-6) leviter contractum, suturis obsoletis, valvis turgido-convexis laevibus v. obsolete venoso-rugulosis. Specim. nostra, etsi inflorescentia stipulisque in diagnosi haud exacte quadrent, tamen nonnisi varias hujus speciei formas, nec ab hac ipsa nec inter se certis limitibus distinctas, sistere opinamur. An species potius *Armatis* adsocianda?

*) **A. nerliffolia** Cunn. Benth. l. c. p. 337, n. 117., species in ora orientali detecta, nuper, ni fallor, a Drummondio in colonia ad fl. Cygnorum reperta (ejus No. 291?) inter plantas Preissianas non occurrit.

IX. BRACHYBOTRYAE, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis 3-multinerviis inermibus, inflorescentia capitata subsimplici v. saepius breviter racemosa. (Benth. l.c. p. 363.)

47. **Acacia heteroclita** n. sp., glabra ramulis angulatis, mox teretibus; phyllodiis linearibus, rectiusculis, utrinque attenuatis, mucrone vix pungente subrecurvo acuminatis, acute sulcato-trinerviis, glandula supra basin minuta v. nulla; pedunculis axillaribus solitariis geminisve, monocephallis, capitulo vix longioribus; sepalis liberis, anguste spatulatis, apice sphacelatis.

Ad promont. Cape Riche, d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 938.

Facies et phyllodia fere *A. trinervatae* et *elongatae* Sieber (Herb. Nov. Holl. n. 445, 443!) — a priori diversa phyllodiis longioribus, minus rigidis, vix pungentibus, pedunculis dimidio brevioribus; a posteriore pedunculis nunquam racemosis (plerumque solitariis et brevioribus) ramulisque glabris; ab utraque praeterea phyllodiis apice *sensim* in mucronem angustatis, glandula (etsi obsoleta) saepius obvia, et praecipue sepalis liberis corolla vix dimidio brevioribus apice nigricantibus. Ab *A. multinervia* et *eglandulosa* DC. discrepat phyllodiorum forma, nervatione, glandula etc.

Ejusdem speciei var. (nisi forte n. sp.) recedens tantum phyllodiis paulo rigidioribus latioribusque (fere 2 lin. latis) apice simpliciter acutis v. breviter mucronatis vix acuminatis, nervis acutius prominulis, nobis videtur stirps a cl. Preiss in region. interior. Australiae merid.-occ. m. Nov. 1840 lecta (No. 950.) propter capitula nondum evoluta haud certe determinanda.

48. **Acacia cyclopis** Cunningham. in G. Don gen. syst. 2. p. 404. Benth. l. c. p. 367, n. 153.

In arenosis ad fl. Cygnorum et ins. Rotenest, d. 26. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 926.

„Arbuscula 16-ped., ramis subfastigiatis.“

49. **Acacia melanoxylon** R.Br. Benth. l. c. n. 154. var.?

In arenoso littore maris prope Vasse (Sussex) m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 948. (Ad Port Philipp in ora australi orientem versus a cl. Latrobe lectam vidi in Herb. Mus. Neocomens.)

Specimina sterilia, quaedam gallis squarrosis fere strobiliformibus ad latera ramulorum et in axillis phyllodiorum subsessilibus (inflorescentiis? insecti cujusdam acu mutatis) insignia. „Frutex 3-pedalis.“

X. JULIFERAE, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis forma variis, haud pungentibus, plerumque plurinerviis, inflorescentia spicata. (Benth. l. c. p. 369.)*

50. **Acacia ephedroides** Benth. l. c. p. 370, n. 162.

In rupestribus sylvae cis Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 974.

„Frutex 8-pedalis.“ Ramuli subcompresso-obtusanguli, juniores minute cinereo-puberuli. Spicae in uno specimine oblongae, fere semipollicares, in altero (caeterum penitus simili) fere globosae.

*) **A. filifolia** Benth. l. c. n. 161. (Drummond n. 302!) in collect. Preissiana non occurrit. — Spicae fere globosae.

Pis in nostra orata ia Will. felix invenitur.
Cylindricum invenimus. Haec namque non
maxime: cf. Galathea p. 100.

(1) *Akontophylla* (ser. me.)

+ *A. mucronata*! ^{non W. & A.} Stuart (etiam

Mildenerianae magis quam
aliis propinqua sed ad hoc
phyllodiis lato-linearibus
(haud lineari-spatulatis) pluribus
nerviis, nervo medio prominenti
(haud 1-3 nerviis) apiculatis
(vix mucronatis) Al. A. flor
humida cistinta videtur phyll
haud apice attenuatis sed fere
rotundato-abtusis cum apicula
et vix lineari-lanceolatis
sed elongatis lato-linearibus
(inter ambas quasi media).
Prope urbem Launceston, Terr.
N. H. n. 17. Oct 20. 1848. 5-6'

A. delisiflora Benth.

Al. H. N. H. Penuli, hb. N. 695. Nov
8-10' Annon varietes? praecedentis.

+ *A. Exjordus* Tiller! p. 85.

A. brachystachys Ferd. M. in l.

ramis velutinis quae angulatis
phyllodiis ^{interdum} inaequilatis lanceo-
latis vel angusto lanceolatis mu-
ronato-attenuatis 3-4 ^{nerviis}
glabris nervis pilulosis, parvis (ra-
rissimis oppositis nervis) nervis axilla-
ribus solitariis vel pluribus ag-
gregatis cylindricis, pedunculatis
phyllodio plures linearibus, pro-
pulis persistensibus ^{spinalibus}

In camporum fruticeis prope
Bat. et. Dammerort versus Ki-
voti Bay. part 1-3'. Phyllodia
1' vel paullo longiora breviorave
2-4" alt. Spicae plurimum 1" longae
An pro propria, sed potius modo a
boni diagnosi dignissimae speciei quae
cum cylindricis sed non elongatis
A. peigianipennis Cunningham & A. L. f. p.
Loddig huc relata ab auctoribus

Akontophylla propinqua (Loddig)

51. **Acacia oncinophylla** *Lindl.* Swan River p. XV, n. 66. Benth. l. c. n. 165.

In rupestribus aridis montium Darling's range prope Preiss's well. d. 16. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 914, (Drumm. coll. I.!)

„Frutex 5-pedalis.“ — *Legumen* (separatim adjacens) lineare, subtoruosum, 1-1½ poll. longum, 2 l. latum, continuum, plano-compressum, breviter albido-villosum, 5-8-spermum, suturis nerviformibus inconspicuis glabriusculis. *Semina* ovali-lenticularia, atro-fusca, nitida, caruncula albida bicruri semiamplexa.

52. **Acacia doratoxylon** *A. Cunningh.* Benth. l. c. p. 373, n. 174?

In rupestribus ad radices montium Currie (York) d. 10. Apr. 1840. Herb. Preiss. (No. 935, „arbor circiter 35-pedalis, junior tota pruinosa“) et in sublimosis distr. Minto, d. 8. Mart. 1841. (No. 945, „frutex 12-pedalis“)

Specimina insufficientia, praeter locum natalem et phyllodia longiora (8-10-pollicaria, 1½-3½ lin. lata) diagnosi bene congrua. *Spicae* pleraeque defloratae. *Legumen* (separatim adjacens) omnino *A. acuminatae* Benth., cui planta nostra admodum similis videtur, sed calyce subtruncato certe distincta.

53. **Acacia acuminata** *Benth.* l. c. p. 373, n. 175. (Drummond n. 287!)

β *ciliata nob.*, phyllodiis anguste linearibus, margine diu brevissime denseque albo-ciliatis. — *A. Lehmanni* Preiss. mss.

In solo sublimoso-arenoso sylvae circa oppidum York. Herb. Preiss. No. 934.

„Arbor circ. 35 pedum, diametro 6-8 unciarum, gracilis, glaberrima; epidermis laevis, subnitida, cinerea. *Rami* subfastigiati, teretes, albo-cinerei. *Phyllodia* patentia, 6 unc. et ultra longa, 1½-2 lin. lata, adultiora bivenoso-striata“ (quod specimina suppetentia haud ostendunt.) „*Spicae* erectae, graciles, unciam longae, floribus flavis aggregatis. *Sepala* 4 ovata“ (potius spathulata) „concava, acuta. *Legumen* non vidi. — *Obs.* Radicem adstringentem aborigines comedunt eamque remedium optimum contra odontalgiam, scorbutum dentiumque cariem habent. Arboris lignum siccum, odore baccarum Rubi Idaei insigne, ab iisdem ad varia arma (v. g. „Keili et Mero“) conficienda adhibetur. Arbor, ab indigenis *Manjart* ab incolis Anglis *Raspberry-jam* vocatur.“ Ita Preiss in schedis.

54. **Acacia microneura** *n. sp.*, ramulis subangulatis mox teretibus phyllodiisque junioribus minute cinereo-puberulis; phyllodiis anguste linearibus, subflexuosis falcatisve, utrinque attenuatis, apice subulato-acuminatis recurvis vix pungentibus, eglandulosis, tenerrime nervoso-lineatis, nervo medio saepe crassiore; spicis (?) ovatis v. globosis, sessilibus, solitariis geminisve, multifloris; calyce breviter dentato, corollam dimidiam aequante, vix puberulo.

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 942.

Affinis praecedenti et *A. leptoneurae* Benth. (an igitur potius ad *Calamiformes* referenda?) sed ab omnibus satis distincta. *Phyllodia* 3-4 lin. longa, vix linea una unquam latiora, rigida, medio crassiora, nervo medio tenui plerumque conspicuo prominulo, lateralibus utrinque 2-3 tenerrimis parallelis. *Capitula* (ut in *A. ephedroide*) perfecte globosa aut vix ovata, nunquam vere spiciformia. *Legumen* desideratur.

**Series II. BIPINNATAE, foliis perfectis bipinnatis,
pinnis 1-plurijugis.**

XIII. PULCHELLAE, inermes v. spinis axillaribus armatae, inflorescentia capitata v. spicata simplici, capitulis spicisve axillaribus, singulis e gemmula multibracteata ortis.
(Series III, Benth. l. c. p. 386.)

55. **Acacia nigricans** *R.Br.* Bot. Mag. t. 2188. DC. prodr. 2. p. 466, n. 179. Benth. l. c. n. 219. — *Mimosa nigricans* *Labill.* Nov. Holl. 2, p. 88, t. 238!

„In rupestribus montis William ad portum Princess Royal Harbour, d. 30. Sept. Herb. Preiss. No. 887. et planitie collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. (No. 889. ex parte) nec non in limoso-lapidoso cacuminis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. 1839. No. 891. florens et fructifera (Drummond n. 314!)

„Frutex 2-4-pedalis.“

56. **Acacia obscura** *Alph. DC.* in 6^e not. pl. rar. Jard. Genev. p. 23, n. 10, t. 3. Benth. l. c. p. 387, n. 220?

In rupestribus planitie collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 889, ex parte (specim. insufficiens, floribus nondum expansis.)

„Frut. 3-pedalis.“

β ? **canescens nob.**, cano-pilosiuscula, pinnis sub-1-jugis, foliolis 2-3-jugis lineari-spathulatis margine revolutis apice obtuso subrecurvis, legumine undique pilis albis brevibus villosulo-hispidulo.

Ad sinum Regis Georgii III. absque florib. Herb. Preiss. No. 910.

An n. sp.? Specim. insufficiens. Pinnarum par inferius superiori aequale aut plerumque deficiens; foliola 3-4 lin. longa, propter margines arcte revolutos in media facie inferiore sibi contiguos vix $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata.

γ ? **Preissiana nob.**, tota hispidula, pinnis 1-3-jugis, foliolis 3-5-jugis linearibus margine revolutis hispidulo-scabris.

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 885:

„Frutex pedalis.“ — *A. Preissiana* *Lehm.!* delect. sem. Horti Hamburg. 1842.

Forsan cum β propriam speciem sistens, foliola ejusdem magnitudinis et formae, apice tamen nunquam dilatata nec recurva, paulo magis scabriuscula. Caules, petioli pedunculique pilis patentibus v. retrorsis satis dense hispiduli.

57. **Acacia strigosa** *Link.* — DC. prodr. 2, p. 466, n. 180. Benth. l. c. p. 387, n. 222.

β **brevifolia nob.**, ramis hispidulis, dense foliosis, pinnis 1-rarius 2-jugis petiolisque 2-3 lin. longis, foliolis 2-3-jugis ovalibus v. obovatis (1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longis) margine subrevoluto serrulato-ciliatis v. saepius demum nudis.

In solo turfáceo-arenoso ad Stirling's-terrace (Plantagenet) d. 22. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 902.

+ Araria Bnderiana! Th. 88

glabra, ramulis angulatis max
 sutibus, phyllodis elongata
 linearibus obtusis apiculatis
 basi et apicem versus angu-
 stioribus coriaceis tenuiter
 marginatis univariis longi-
 tudinaliter venosis, glandula
 infra medium ^{retia} (a basi ~~diffusa~~
 remota, ramis axillaribus
~~6-10~~ ^{capitulo} 6-10 germi-
 nibus ante anthem phyllodis
 cuplo brevioribus

Fr. 5-6. Ar. pl. Murray. Feb. 48.
 Spinnina folium gemmifera vid.
 nisi A. ~~ramulosa~~ ^{affigens} ~~occidentia~~
 Phyllodia ad 3" lg. 2" lt.
 Hb. V. 180!

Series II Botryophalae!
 Benth. C. I.

+ A. maritima! G. Benth.

Ad maris litora Tarranica.

Hb. St II, 588. Anth: hieme
 exserte

^{in foliis} ~~robustorum~~ ^{in foliis} ~~speciminum~~ ^{foliata} ~~pauciora~~ ^{pauciora} ad 7 redunda et ramis
 passim in paniculata axillarem
 collecti ^{ramulorum} ~~paniculis~~ vix univariis sub
 densi adpressis laxis non stri-
 atis ut et. Prutham docet, quo
 signo haec species etiam ab A.
^{minutissima} ~~descolore~~ ^{signata} ~~quae~~! —

4 *Cravaria diffusa* Ker. ^{live} 87

^{st. erecta} ~~erecta~~ ^{ramis} ~~ramis~~ ^{ovatis}
In collibus petracis ad
portum cygnoarum. ^{floribus}
~~feriens~~ ^{tera} ex st. Stuart quam
legitimae hb. St. 613. 4-5'

3 *brachypoda* Ferdm.
induratis (sicciter) capitulum
aequantibus phyllois multoties
brevioribus.

Ad ripas fluviu St. Pauli Nov
49. hb. St. 5621. 5-6' alt.

Cravaria parvulus ! W.

Ad litus juxta urbem Georgi, Tasmanniae hb
St. 934. fr. 4-5.

4 *Cravaria striata* ! W.

3. *latifolia* Ferdm.
^{phyllois} ~~phyllois~~ ^{ovatis} ~~ovatis~~ ^{2 plo} ~~2 plo~~ ^{3 plo} ~~3 plo~~ ^{lati-}
Kangeroo ^{island} ~~island~~ ^{in ripis} ~~in ripis~~ ^{2-3' diff} ~~2-3' diff ^{oribus} ~~oribus~~ ^{non} ~~non ^{floribus} ~~floribus ^{brevius pedunculatis} ~~brevius pedunculatis~~
fructum (vidi) George-town.~~~~~~

Juxta portum cygnoarum.
2-3' hb. St. 5647. Nov 1849

^{forte} ~~forte~~ ^{proxima} ~~proxima~~ ^{st. saligna} ~~st. saligna~~

Mult. huius viximiliter magis
affinis quam st. salicatal.

4 *binervis* ! Ferdm. ^{phyllois} ~~phyllois~~ ^{binervis} ~~binervis~~

4 *deallata* Lk. ^{ann ver} ~~ann ver~~ ^{B misis} ~~B misis~~

^{cothy} ~~cothy~~ ^{lurres} ~~lurres ^{quorum} ~~quorum ^{interdum} ~~interdum ^{folo} ~~folo ^{fructu} ~~fructu ^{arborescente} ~~arborescente ^{humilitate} ~~humilitate~~~~~~~~~~~~~~

^{ad montem} ~~ad montem~~ ^{Gambis} ~~Gambis ^{non} ~~non ^{arboresc} ~~arboresc ^{foliis} ~~foliis~~ ^{minus} ~~minus ^{pilis} ~~pilis~~~~~~~~~~

^{bracte} ~~bracte ^{pube} ~~pube ^{glaucis} ~~glaucis ^{foliolis} ~~foliolis~~ ^{minoribus} ~~minoribus~~~~~~~~

et floribus pallidioribus. Sed botanici
Tasmaniae explorare relinquit, an
sit species propria an varietas.

„Frut. 4-pedalis.“ Legumen glabrum caeteraque omnia cum descriptione apud Benth. exacte conveniunt.

58. **Acacia Endlicheri** *n. sp.*, ramis strictis, apice subangulatis, glabris v. pilosiusculis; stipulis lineari-setaceis, ciliatis; foliis glabris, petioli glandulis 2-3 concavis, seta terminali subciliata, pinnis 2-3-jugis; foliolis jugi infimi 2-jugis, superiorum 5-7-jugis, oblongis, obtusis, margine revoluti nudis; pedunculis folio subbrevioribus, capitulis globosis, glabris.

In districtu Plantagenet m. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 888 et 905.

„Frutex 1-2-pedalis.“ — Simillima *A. strigosae* et forte potius ejus var. Constanter tamen differt foliolis numerosioribus (plerumque 5-6-jugis) margine nunquam serrulato-ciliatis et pedunculis folio plerumque brevioribus 6-7 lin. longis. *Legumen* non vidimus.

59. **Acacia denudata** *Lehm.!* delect. sem. Horti Hamburg. 1842.; glabra, ramis divaricatis, angulatis, rigidis, subspinescentibus, spinis axillaribus subnullis; foliis subsessilibus, petiolo brevi v. subnullo in spinulam excurrente et ad hujus basin glandula concava longe stipitata munito, pinnis 1-jugis; foliolis 5-jugis, lineari-oblongis, obtusiusculis, planis, nudis; pedunculis solitariis geminisve, folio longioribus, capitulis multifloris glabris, calyce truncato-dentato subciliato.

In depressis umbrosis prope Woodman's-point, d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 893. (Drummond n. 312!)

β **gracilis** *nob.*, ramis gracilibus, laxis, vix angulatis, foliis sessilibus plerumque spina axillari praeditis, glandula petiolari tenuissima v. saepe nulla, pedunculis folium vix superantibus. — An *sp. distincta*?

In umbrosis ad ripam fluvii Preston (Wellington) m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 904.

γ **spinosissima** *nob.*, ramis gracilibus, teretibus, lineatis, ramulis divaricato-patentibus subangulatis; spinis axillaribus solitariis geminisve, subulatis, patentissimis gemmuliferis, altera longiore (saepe semipollicari) glandula petiolari minuta (vix 1 lin. longa) v. saepissime nulla, foliolis linearibus, pedunculis solitariis capitulum aequantibus (3-4 lin. longis.)

Colitur in Horto Baumanniano Mulhusiae Alsatorum, ubi florentem vidi vere 1843.

„Frutex (Preiss. No. 893.) 5-pedalis.“ *Rami* rigidi, crassitie fere pennae anserinae, subflexuosi, teretes, lineis nerviformibus a foliorum insertionibus decurrentibus acute prominulis, alas angustissimas referentibus (in β et γ obsoletis) angulati, glaberrimi; ramuli late divergentes, rigidi, apice subspinescentes (in β et γ debiliores et inermes) internodiis $\frac{1}{2}$ -1 poll. longis. *Spinae* axillares, tenues, rectae, 2-6 lin. longae, in β et γ fere semper, in α rarius obviae. *Stipulae* setaceae, 1-2 lin. longae, fugaces. „*Folia* glauca, plus minus sensitiva“; petiolus nunc subnullus, ad punctum fere tuberculumve et setam terminalem reductus, nunc (No. 893.) 2-4 lin. longus subpersistens; seta terminalis crassiuscula, rigida, 2-3 lin. longa, recta v. subreclinata; glandula pinnarum jugo interposita, 1-2½ lin. longa, subrecta, stipite apice in cyathulum dilatato; pinnarum rhachis 3-8 lin. longa, tetraquetra, rigida, decidua aut (in specim. Drummond.) post foliorum lapsum persistens et

spinulam simulans; foliola caduca, 3-4 lin. longa, 1-1½ lin. lata (in β et γ fere dimidio minora et diutius persistentia) obscure 1-nervia, avenia, integerrima, glaberrima. *Pedunculi* erecti, filiformes, teretes, glabri, e gemmula minute squamellata nascentes, ½-1 poll. longi. *Capitula* globosa, pisi magnitudine, circ. 30-flora, flava, glaberrima, receptaculo parvulo ovato papilloso. *Calyx* membranaceus, turbinatus, 5-gonus, oris dentibus 5 brevibus latiusculis obtusis sub lente ciliolatis. *Corolla* 5-fida, calyce vix dimidio longior. *Ovarium* glabrum. *Legumen* *A. pulchellae*, cui stirps nostra proxime affinis, sed distincta ramis angulatis, petiolo aristato, axillis saepius inermibus, caet. Varietates indicatae facile pro totidem speciebus haberi possent, nisi formis intermediis, praecipue speciminibus Drummondianis, arctissime invicem connecterentur.

60. **Acacia pulchella** R.Br. — Bot. Cab. t. 212. DC. prodr. 2, p. 455, n. 73. Benth. l. c. p. 387, n. 224.

α **glaberrima** nob., omnibus partibus penitus glabris.

In arenosis sylvae ad fl. Cygnorum Herb. Preiss. No. 884 et. 907. (Drummond n. 310.)

β **hispidula** nob., ramis pube brevi patente albida plus minus hispidulis, demum glabratiss.

In limoso-calculosis sylvae inter Mahogany creek et Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 908. (Drummond n. 309, 311!)

γ **hispidissima** nob., ramis pilis albidis patentissimis dense hispidis. — *A. hispidissima* DC. l. c. n. 74. Benth. l. c. n. 226.

Ad fluvium Canning (Perth) d. 4. Dec. Herb. Preiss. No. 899 in lapidosis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. No. 895. et ad radices montium continuorum Darling's-range prope cataractam, d. 26. Jul. 1839. (No. 908.) (Drummond collect. I.)

Valde suspicor, praeter duas sequentes etiam *A. lasiocarpam*, *fagonioidem* et *denudatam* ad hanc speciem mire polymorpham reducendas esse.

61. **Acacia lasiocarpa** Benth. in Hügel. enum. p. 43, n. 130; ap. Hook. l. c. p. 388, n. 225.

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 906. (Drummond n. 313!)

62. **Acacia Cygnorum** Benth. l. c. n. 227.

In depressis arenosissimis ad ripam fl. Cygnorum prope Freemantle, d. 14. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 897. in glareosis et sublimosis sylvae prope oppidum Guildford, d. 9. Aug. 1839. No. 886, 898, et inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, d. 12. Apr. 1840. No. 909. in clivulis arenosis prope oram maris, d. 23. Sept. 1839. No. 900. in lapidosis et subumbrosis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. 1839. No. 892, 894 et 896. (Drummond n. 308!)

„Frutex 2-5-pedalis. Aboriginibus *Päjang*.“

β **sedifolia** nob., foliolis 2-3-jugis, crassiusculis, abbreviatis (1-1½ lin. longis) margine revolutis, legumine pilosiusculo.

In sublimoso-glareosis sylvae district. Hay, d. 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 911.

„Frut. 2½ pedalis.“ — *A. sedifolia* Lehm.! mss. in Herb. Preiss.

γ ? **minutifolia** nob., ramosissima, ramis filiformibus rigidis flexuosis, foliis vix 2 lin. longis, foliolis 1-2-jugis vix 1 lin. longis.

In region. interior. Australiae merid.-occid., d. 7. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 912.

Forsan species distincta. Flor. et fr. ignoti.

Post *A. maritimanam* inferenda:

Secs. *Julibrissinae* Don.

A. inallipina W.

(*Unia* ^{foliis ~~typinnatis~~} *puris* *tenusque*
e *Diemenia* *cognita* Di.
agropis *mutanda* *reptata*
dispositionis capitulorum
quae *raremapia* *procedum*
rhachiu *propta*, *tamen* *hi*
raremapia *compofiti* *funct*
e *plurimique* *terminalis*
quales ^{etiam} *imago* *rudis* *xyl*
graphica *in* *Don* *gen* *fig* *et*
illustrat. *A. daltata*

(*gen* *in* *numerosis* *internorum*
regionum *versus* *limites*
circutales *coloniae* *Nor. Gall*
afralis *videt* *existencia* *num*
alia *pu* *arbor* *folius* *pin*
nalis *donata*) *agropis*
nulla *linea* ^{istud} *ab* *A. inallipina*
distat, *tamen* *forte* *pu* *propria*
cujus *diagnosis* *concedenda*).

In *loris* *varis* *Sarmatian*
Arbor *30-40' pi* *N. (10-20'*
pi *Don)* *Sept* *15* *1848* *hb* *N. II*
n. 28.

Secs. *Ellixia* (Durax) *Junna*.
A. lophantha W.

Frequenter *in* *hortis* *ad* *un*
bur *Adlaides* *culta* e *forte*
in *colonia* *indigere*
Nonam *cum* *A. Lophanthode*
fectionem *sed* *vix* *purica*
exformat.

Labichea cardiophora Ford. n. l. l.
non sine dubio ad hoc genus ruli
nam ^{Hylo} ~~Hylo~~ ^{metabolo} ~~metabolo~~ (foran
cultura in putalium mutato) Ho-
minibus & fertilibus oleabus
stabilibus proprius generis vi-
deri, nisi hoc diffinitio. In
purpure & cultura ortae sunt
sistunt characteribus & foliis
impari pinnatis a *Cassia cer.*
diffini. abhorret. A culturi
Laicheis nichi notis praeter
notis indicatas floribus axilla-
ribus foliariis et si differt
satis hanc subgenus *May-*
re nomen dunt formis
Labichea biquadrata Pax?
Cassia cordifera Ford. n. l. l. in lili)
foliis pinnatis, foliales 6-8
pinnis lanceolatis recurvato-
mucronatis, pedunculis axilla-
ribus unistloris. retato super-
fieri macula cordiformi notato
flaminibus fertilibus & ribus
leguminibus oblongis glabris 3-5
pinnis.
planta erecta 2-3 pedes ramis to-
tiusque supremis oppositi puberulis
4-6^m longis 1-2^m latis, flores su-
perioribus, pinnis 2-3^m longis, pe-
dalis subgyngeuellaribus, maxi-
mo basi macula citrina cordiformi
notato, leguminibus 4-1 pollicaribus
2-3 lin. latis, 1^m long. nigro
in locis inferioribus colorata. colligit.
Long. G. S. Hart, ex quibus pinnas
pinnis erectae & merum communis a
Charles. Stuart. Jun. & S. 1848. vii. v. v.
+ *Psilostylis labicheoides* H. B.
Futle hie of a rock with thick

63. **Acacia Drummondii** Lindl. Swan River p. XV, n. 67. Benth. l. c. n. 288.

In limoso - calculosis umbrosis montium continuorum Darling's-range (Perth.) d. 13. Sept. 1839. florens Herb. Preiss. No. 901. (Drummond n. 315.)

„Frut. 4-pedalis.“ Specim. glabrescentia.

ALBIZZIA Durazzini.

Albizzia lophantha Durazz. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. 1. p. 527. — *Acacia lophantha* Willd. DC. prodr. 2 p. 457, n. 93. Bot. Reg. t. 361! Bot. Cab. t. 716. — *Mimosa distachya* Vent. Cels. t. 20. (non Cav.) — *M. elegans* Bot. Repos. t. 563.

In humosis umbrosis ad fl. Cygnorum prope Peninsulam Herb. Preiss. No. 903.

„Arbuscula 12-16-pedalis.“

CAESALPINIEAE.

LABICHEA Gaudich. Endl. gen. n. 6782.

1. **Labichea diversifolia** n. sp., foliis impari? — pinnatis, sessilibus, foliolis 6-3-1 lanceolatis, spinoso - mucronatis, coriaceis, marginatis, supra laevibus, terminali brevissime petiolulato caeteris sessilibus multo longiore, junioribus subtus ramulisque puberulis; racemis axillaribus, simplicibus v. ramosis brevibus, paucifloris, calyce corollaque 4-meris, anthera altera biloculari apice 1-porosa, altera duplo longiore acuminata apice obtusa clausa.

a **brevifolia**, foliis omnibus compositis, foliolis 3-6 brevibus, racemis simplicibus folium subaequantibus.

Inter fragmenta rupium (Quartz) ad latus occidentale montis Bakewell (York) et in rupestribus ad fluv. Canning (Darling's-range) d. 8. Sept. 1839 et m. Jul. 1841. Herb. Preiss. No. 1027.

β **longifolia**, foliis plerisque unifoliolatis, anguste lanceolatis, interdum foliolis 2 lateralibus brevibus auctis, racemosis folio dimidio brevioribus saepe ramosis (v. s. e Drummondii collect. l. in Herb. Shuttleworth.) An *L. lanceolata* Benth. in Hüg. enum. p. 41. hujus forma constanter unifoliolata?

a. „Frutex 7-pedalis.“ *Rami* ramulique patentes, teretes, glabri, nigricantes, satis dense foliosi. *Stipulae* nullae (in foliola mutatae?) *Folia* sparsa, e rami tuberculo nascentia, petiolo communi nullo; foliola divaricopatula, plerumque 2-5 (raro 6) lateralibus 3-6 lin. longa, 2-3 lin. lata, ovato-v. elliptico-lanceolata, extimo (terminali?) 8-16 lin. longo (in *β* 2-3½ pollicari) 2½-3 lin. lato, petiolulo crassiusculo vix 1 lin. longo suffulto, omnibus margine nerviformi tenui scabriusculo cinctis, rigide coriaceis, pallide viri-

dibus, supra aveniis laevissimis nitentibus glabris, subtus nervo medio valido prominente et in mucronem pungentem rufum fere 1 lin. longum excurrente costatis, obsolete pinnato-venosis (in β reticulatis) demum glaberrimis. *Racemi* axillares, solitarii, indivisi, demum folium subaequantes, laxi, pedicellis 2-3 lin. longis cum rhachi calycibusque minute puberulis. *Alabastra* oblonga, incurvo-acuminata, 3-4 lin. longa. *Sepala* 4 sordide viridia, antico (extimo) complicato-concavo undique coriaceo-herbaceo, reliquis subplanis margine membranaceis. *Petala* 4, sepalis aequilonga, suborbicularia, brevissime unguiculata, tenera, flava, aestivatione convolutivo-imbricata. *Antherae* 2 subsessiles. *Ovarium* breviter stipitatum, rufo-pilosum. *Stylus* filiformis, rectiusculus, glaber, stigmate minuto. *Legumen* lanceolatum, compressum, laeve, glabrum, suturis obsoletis, valvis demum contortis. *Semina* . . . — Species distinctissima, proxime accedens ad *L. cassioidem* Gaudich., quae (fide ic. Freyc. voy. t. 112.) differt petiolo semipollicari, foliolis omnibus inter se subaequalibus (8-10 lin. longis) spathulato-lanceolatis, oppositis, 1-3-jugis cum impari, et racemis 2-3-pollicaribus. — Var. β nostra nisi foliis saepe 3-foliolatis et anthera longiore certe uni-nec biporosa a *L. lanceolata* Benth. vix distinguenda videtur; cum α vero praeter notas indicatas omni modo congruit.

2. *Labichea punctata* Benth. in Lindl. Swan River p. XV, n. 69.

In solo sublimoso-glareoso ad radices montium Darling's-range (Perth) m. Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 1026. (Drummond collect. I et II, n. 279!)

„Suffrutex pedalis.“ *Folia* elliptico-oblonga et lanceolata, minus punctata. *Racemi* simplices aut basi ramosi.

β *lanceolata* nob., foliis omnibus lanceolatis v. lineari-lanceolatis (2-4 poll. longis, 2-7 lin. latis) supra valde reticulatis et punctato-scabris, racemis simplicibus v. basi ramosis.

In limoso-calculosis umbrosis sylvae prope Mahogany creek (Darling's-range, Perth) d. 23. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1025.*)

„Suffrut. pedalis. Flor. flavi.“ — A *L. lanceolata* Benth. abhorret antheris aequalibus conformibus, etc.

PAPILIONACEAE.

Tribus I. PODALYRIAE. Subtribus I. Eupodalyrieae, Benth. in Hügel Enum. p. 27; Ann. Wien. Mus. II, p. 65.

BRACHYSEMA R.Br. Endl. gen. n. 6425.

Meisn. gen. p. 81. (57.)

1. *Brachysema lanceolatum* n. sp., foliis oppositis v. sparsis, lanceolatis, mucronatis, reticulato-venosis, subtus

*) *Cassia nemophila* Cunn. Vogel synops. gen. Cass. p. 47. n. 158. Walpers rept. I. p. 827, a Drummondio in colonia fl. Cygnorum lecta (n. 289.) inter plantas Praecisianas non occurrit.

+ *Lappi-angue angustalati* *hinc* *ap. recurvis* *ang.*
vel *Lappi-angue*, *glaberrima rotundata verrucosa* *inter*
Cassia *variegata* *proserpa*, *pholo* *plus* *variegata*
compressa

C. Chatlainiana *Gaudich.* *congrua*
differt foliis 2-3 rarius 4-jugis pilosi-
dentatis. An distincta species. Ad
flumen Murray non rara. An spec-
imen glabrum hb. St. n. 220. hujus
loci, in hac flores & fructus desunt.

Cassia *coriarioides* *Gaudichaud* *hb. St. n. 220.*
longata *proserpa*

C. longata *proserpa* *foliolis* *bijugis.*
Legumina *a legali* *forma* *dis-*
tinguitur. In parte *intentione* *coloni-*

a lignis *St. Capt. Short.*
heperolaba *St.*
Cassia *macra* *proserpa.*

An C. micropbila *Benningh?*
specie *diagnosin* *desidero.*

foliolis *1-2-jugis* *margine* *involutis*
linearibus *terglabris* *asabellis* *floribus*
axillariis *vel* *supraciliis* *membr.* *St. n. 220.* *proserpa*
axillariis *proserpa* *legum.*
nibus *glabris* *pediculis*

et antecede *confine* *ignoscitur*
glabris *pediculis* *brevis* *nibus*
floribus *minoribus* *et foliis*
brevis *nibus*. *Saltum* *variata* *et*
cellis *nisi* *species* *nova?*

Ad flum. Murray communis.
herb. St. 222. An plantis *caput* *la-*
ocum *et* *lyandina*, *fine* *Apr. 1848.*

frutex *proserpa* *3-4' alt.*
Foliola *linear.* *lata* *posticam* *lon-*
ga. Legumina *proserpa* *et* *2* *proserpa*
nibus *obtusis* *proserpa* *compressis*
4-6 pinum. *vel 3!*

Frutex *hominem* *altus.* *Præforest*
et *tra* *Salt-rack.* *Nehr.* *- Auther*
obtus. *proserpa* *proserpa* *Strait* *halbya,*
et *tra* *mont.* *Wark* *et* *St. Murray.*
3 elongata *proserpa.*

proserpa *foliis* *macis* *alterna* *alis* *cam-*
proserpa *proserpa* *proserpa* *proserpa*
proserpa *proserpa* *proserpa* *proserpa* *hb. St. n. 220.*

Metrolaba Lipidol.

+ *Cassia* ~~nuculata L.~~
~~cagnata Juss.~~

Acronicta
Lerantho
Exonars
in diem
in uero
his
mens
forul.

foliis 2-4 jugis crassiusculis *Tan*
alato vel angusto-oblongis marg
ne subinnatis pilosis
obtusis vel recurvatis apiculatis
glandula inter omnia parig.

*Ad Catus Luningum ripae flu-
minis Murray hanc rara.*

Fract. 3-4'. Surface blue

Acetiv. variolos. synthrac. obpon

Another is: *vine, arboresc.* ^{ruscae. flor. p.} *minus fragrans*
serot. albis lob. rotundis effusis v. subrotundis.

Cassa Rustic. V. V.

x *Callosa petraea*, *pinto* *Cudnaka*.
Composita incana, folius *Yuzis*, *facialis*

Canicola linearilobus planis, 9. 1888

Enoloba depressa inter par infirmum, rariore

Hydrophyllum *racemiflorum*, cum *periantho*
racemiflorum - in *racemiflorum* *periantho*

[illegible]

glaucous, rather tomentose above, beneath
specimens of the Western variety.

*Folia pinnatifida. Petiol. Foliola parva 3 raro breviora ovata glabra
 nervis minus angulato-hastatis. Glandulae subrotundae inaequaliter*

Rhaphis *sinensis* *argentea* *longipes* *C. deplatae*. *Lepidoptera* *planum* *glabra*

complanatus pube tenuissima, foliis

cinerascens, pubescentiuscula, vix
26 annis vivis. Foliolis angustis linearibus.

2/rare 1) *pilis*, *glabris* *intus*

bus canaliculis et per canaliculos
inferiores et dum unijuga intra lumen

callosities glaberrimis, racemis raris

Cofis paucifloris folia brevioribus

In the bays of the creeks of the Barrier - now

about 26 miles from the Tarkay in lat. 32°.

+ *St. Louis*, n. 6. *Khachis* 1 1/2 - 2" lg, from 10

missa 1st l. Foliola longissime rhaetico

14 *Ch. Coarctata* glumigena Coarctata n. sp. *Ch. Coarctata* glumigena Coarctata n. sp.

1st lta. *Corymbus plumigen* *Corymbus* per maculatus
quam ei *C. leucomphalar*

sericeis glabrisve; floribus axillaribus, solitariis; calyce sericeo, ebracteolato, pedunculo triplo longiore, vexillum aequante, dimidiam carinam paulo superante.

α hypargyreum, foliis oppositis sparsisve, linear-lanceolatis, margine undulatis, subtus ramulisque argenteo-sericeis.

In planitie arenosa prope montem Manypeak l. Tjilberup (Kent) 16. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 823.

β glabrescens, foliis sparsis, lanceolatis v. oblongo-lanceolatis, planis v. vix undulatis, mox glaberrimis.

Ad promontor. Cape Riche, 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 822.

γ planifolia, foliis oppositis sparsisve, ovato-oblongis v. lanceolatis, margine planis, subtus ramulisque sericeis.

In glareosis sylvae 15 mill. a Kojonup (Goderich) m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 815.

Rami graciles, teretes, juniores compressi, sericei, demum glabri, internodiis 1-2-pollicaribus. *Stipulae* setaeae, satis rigidae; 2-2½ lin. longae, sericeae, demum recurvae glabrae. *Petoli* 1-1½ lin. longi, sericei. *Folia* in var. *α* 1-1½ poll. longa, 2½-3 lin. lata, in *β* 2-4 poll. longa, 6-10 lin. lata, in *γ* bipollicaria 9 lin. lata, mucrone subspinescente lineam longo fusco, recto v. recurvo, reticulatione eadem (tantum paulo grossiore) ac in *B. latifolio*. *Calyx* campanulatus, 6 lin. longus; lobis 5 ovato-triangularibus acutis circ. 2 lin. longis, infimo paulo profundius distincto et angustiore, superioribus duobus paulo latioribus. *Corolla* rubra? glabra; carina falcata, acutiuscula, 8-9 lin. longa; alae et vexillum calycem vix superantes — Species ex habitu et flore absque dubio hujus generis, foliis distinctissima. Petalorum forma in speciminibus perfectioribus recognoscenda.

2. ***Brachysema latifolium* R.Br.** Bot. Reg. t. 118. Bot. Mag. t. 2008. DC. prodr. 2. p. 105.

In glareosis sylvae district. Hay, 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 807.

„Frutex radicans. Legumen pisiforme.“

3. ***Brachysema undulatum*, R.Br.** Bot. Reg. t. 642. Bot. Cab. t. 778. DC. l. c.

In subarenosis inter frutices densos prope villam Spencer (Plantagenet) 5. Oct. Herb. Preiss. (No. 808, steril) et in glareosis planitiei prope lacum Mathildae (Hay) d. 7. Nov. 1840. No. 809.

„Frutex 2-3-pedalis.“ — Forma foliis sueto minoribus, 10-12 lin. longis, 5-6 lin. latis, demum glaberrimis.

4. ***Brachysema praemorsum* n. sp.**, foliis ternis oppositisque v. subsparsis, obverse triangularibus, penninerviis, angulis obtusis v. rotundatis, apice truncato v. breviter acuminato mucronulato, junioribus subtus cum ramulis pedunculis calycibusque pubescentibus; pedunculis axillaribus, solitariis, apice bracteatis, bifidis, bifloris, folio parum brevioribus; calyce laxo, ebracteolato; vexillo subpanduraeformi, exserto; filamento vexillari basi geniculato.

In solo limoso ad ripam fluvii Preston (Wellington) d. 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 824.

„Frutex 2-3-pedalis“, erectus? *Rami* primarii stricti, teretes, glabri, virescentes, crassitie calami scriptorii; secundarii ternatim verticillati, subsimplices, graciles, tenues, adscendentes, molliter pubescentes, superne compressi; internodia $\frac{1}{2}$ -3 poll. longa. *Stipulae* setaceae, 2-3 lin. longae, patulae v. recurvae, fuscae, vix rigidae, tarde deciduae. *Folia* in ramis primariis ternatim verticillata, in secundariis opposita v. rarius alterna (tumque fere semper per paria approximata) petiolo puberulo 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longo; lamina (Passiflorarum quarundam, v. g. *P. Leschenaultii* DC. *P. rotundifoliae* L., Cav. diss. t. 290, etc. forma) 9-18 lin. longa lataque, basi rotundata, lateribus leviter arcuatis, apice truncato rectilineo v. emarginato v. saepius acuminato, acumine brevi lato lobos laterales rotundatos latos vix unquam superante, mucronulo fusco rigidulo semilineam longo plerumque recurvo armato; margines (exsiccatione?) leviter recurvi et plus minus undulati; nervatio supra impressa, subtus prominula, nervo medio recto valido, venis primariis utrinque 4-5 divaricatis intra marginem anastomosantibus, interstitiis tenuiter reticulatis. *Pedunculi* erecti v. semipatentes, tenues, stricti, glabriusculi, apice compressi et bracteis 2 membranaceis lanceolatis bifidis (stipulis connatis) pubescentibus fuscis marcescentibus muniti; *pedicelli* 2 (altero interdum abortiente) incurvi v. recurvi, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longi, sicut calyces tomentoso-puberuli. *Alabastra* oblonga, subfalcata, acuta. *Calyx* late infundibuliformi-campanulatus, 6 lin. longus, coloratus (ruber? purpurascens?) semiquinquefidus, lobis (praecipue lateralibus infimoque, subcarinato-concavis) falcato-incurvis, superioribus latoribus et minus profunde divisis, infimo reliquis paulo longiore. Corollae et genitalium structura omnino *B. undulati*. *Corolla* sanguinea v. punicea? glabra, fere pollicaris; carina alaeque subaequales, longe exsertae, subfalcato-lanceolatae, obtusiusculae, basi supra auriculatae; vexilli lamina ungue longior quasi panduraeformis, sc. basi subrotunda, medio constricta, superne in processum oblongum complicato-fornicatum submarginatum e calyce paulo exsertum producta. *Filamenta* glabra, longissima, capillaria, basi complanata et brevissime monadelphae, decimo basi geniculata vexilli ungui adnato. *Ovarium* ovoideum, albido-villosum, intus glabrum, 1-loculare, pluriovulatum, stipite brevi basi annulo membranaceo fusco cincto. *Legumen*

CALLISTACHYS Vent. Endl. gen. n. 6426.

Meisn. gen. p. 81. (57.)

CALLISTACHRYA Sm. Benth. in Ann. Wien. Mus. II, p. 69.

1. **Callistachys ovata** Sims., Bot. Mag. t. 1925. DC. prodr. 2, p. 104. — Forma foliis lanceolato-v. elliptico-oblongis.

In littore arenoso prope oppidum Albany (Plantagenet) 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 849. (fl. et fr.)

„Arbuscula 8-14-pedalis.“

2. **Callistachys lanceolata** Vent. Malm. t. 115. Bot. Reg. t. 216. DC. l. c.

In solo humoso umbroso ad fl. King's river (Plantagenet) 25. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 850. (fl. fr.)

„Arbuscula 15-pedalis.“

3. **Callistachys parviflora** Benth. in Hügel enum. p. 27, n. 68. Walpers rept. 1, p. 566.: foliis oblongo-linearibus,

mucronatis, reticulatis, basi longe angustatis, planis; racemis terminalibus, laxiusculis.

In paludosis sylvae prope Toby's Julet (Sussex) 27. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 852. (fl. fr.)

„Arbor circ. 25 pedum.“ *Flores* lutei, sequenti minores. *Legumen* coriaceum, durum, oblique nervosum, omnino *C. ovatae*.

4. **Callistachys linearis** Benth. l. c. n. 67. Walpers l. c.: foliis elongatis, linearibus, mucronatis, reticulatis, margine revolutis; racemis terminalibus, laxiusculis. — Bot. Mag. t. 3882!

In limosis umbrosis ad ripam flum. Preston (Wellington) d. 1. Jan. Herb. Preiss. No. 851. in arenosis inter frutices densos ad fl. Cygnorum (Perth) d. 27. Oct. No. 853. et in paludosis district. Sussex, m. Dec. 1839. No. 854. florens et fructifera (Drummond No. 188!)

„Frutex 8-10-pedalis. Flor. purpurei.“ Variat foliis 1-4 lin. latis et flor. flavis (No. 854.) — A praecedente vix distincta nisi floribus paulo majoribus et legumine tenuiore, magis inflato, obsolete venuloso.

5. **Callistachys carinata** n. sp., ramis cano-pubescentibus apice corymbosis; foliis exstipulatis, sparsis, sessilibus, coriaceis, oblongis, utrinque obtusis, obsolete mucronulatis v. muticis, complicato-canaliculatis, subtus pubescentibus, demum glabris; racemis terminalibus, brevibus, laxiusculis.

In glareosis inter frutices ad latus meridionale collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1068.

„Suffrutex vix pedalis.“ *Rami* adscendentes, apice tantum in ramulos paucos breves subcorymbosos divisi, teretes. *Stipulae* plane nullae! *Folia* sparsa, subinde subopposite approximata, subadpressa, 4-7 lin. longa, 1½-2 lin. lata, nunc ubique aequilata, nunc apice (rarius basi) paululum dilatata, apice interdum subretusa, rigide coriacea, laete flavo-viridia, plus minus complicato-concava, nervo medio subtus prominulo carinata, caeterum laevia aut transverse venosa et subreticulata, supra glabra, subtus juniora pubescentia, marginibus simplicibus v. obsolete incrassatis nunquam recurvis. *Racemi* ½-1-pollicares (fructiferi paulo elongati) rhachi, pedicellis, calycibusque pilis albidis laxiusculis cano-hirsutis; pedicelli 1-2 lin. longi, medio bracteolis 2 oppositis lineari-setaceis 2 lin. longis pilosis muniti. *Calyx* laxus, 4 lin. longus, lobis tubo infundibuliformi longioribus lineari-lanceolatis subaequalibus. *Corolla* vitellina, glabra, calycem parum superans, petalis subaequilongis breviter unguiculatis, vexillo subrotundo, alis obovatis carinaque gibbo-semiorbiculari acutiuscula basi supra obtuse auriculatis. *Filamenta* glabra. *Ovarium* subsessile, pilosum, 1-loculare, pluriovulatum, intus glabrum. *Legumen* ventricosum-ovatum, turgidum, hirsutiusculum, bivalve, valvis intus transverse striatis nec septuligeris. *Semina* Affinis *C. sparsae* Cunn., sed jam foliis, floribus majoribus, caet. satis superque distincta.

6. **Callistachys oxylobioides** n. sp., ramulis pubescentibus; stipulis capillaribus, recurvis; foliis ternis, oppositis sparsisque, subsessilibus, oblongo-linearibus, subcuneatis, obtusis, mucronatis, utrinque reticulatis glabris, complicato-canaliculatis v. planis, margine haud recurvis; floribus axillaribus 2-3 fasciculatis, calycibus cum pedicellis (ipsis brevioribus) leguminibusque subsericeo-villosiusculis.

In arenosis sylvae prope deversorium publicum Pineapple (Perth) d. 6. Jun. Herb. Preiss. No. 842. et in calcareis inter frutices densos prope oppidum Freemantle, d. 18. Dec. 1839. No. 841.

Species inflorescentia a reliquis *Callistachyis* recedens habituque toto *Oxylobiis* (praecipue *O. capitato*) similior, sed propter legumen intus manifeste, quamvis incomplete, septulatum certe priori generi accensenda. — „Frutex procumbens v. 2-pedalis erectus.“ *Rami* ramulique teretes, strictiusculi, demum glabrati, internodiis $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pollicaribus. *Stipulae* capillari-setaceae, nigrae, glabrae, 2 lin. longae, valde recurvae. *Folia* ramorum primariorum ternatim verticillata, secundariorum opposita v. rarius sparsa, coriacea, 1-2-pollicaria, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, basin versus plus minus cuneato-attenuata, pleraque (exsiccatione?) plus minus complicata, venis anastomosantibus (subtus magis prominulis, fere *Oxylobii reticulati* more) grossiuscule reticulata, nervo medio subtus parum prominulo, mucrone tenui semilineam longo rectiusculo. *Pedicelli* 1-2 lin. longi. *Calyx* ebracteolatus, campanulatus, lobis tubo aequalibus v. demum paulo longioribus. *Alae* et *carina* subaequilongae, obtusae, purpureae, (alae apice luteae) *vexillum* iis longius, amplum, orbiculare, emarginatum, medio purpureum, margine aurantiacum. *Legumen* subsessile, subglobosum, cano-subvillosum, 8-spermum, valvis coriaceis intus glabris et septulorum membranaceorum reliquias gerentibus. *Semina* (immatura) obsolete stropholata.

OXYLOBIUM Andr. Endl. gen. n. 6427.

Meisn. gen. p. 80. (57.)

1. ***Oxylobium ovalifolium* n. sp.**, stipulis setaceis, petiolum subsuperantibus; foliis quaternatim et ternatim verticillatis oppositisque, ovalibus, obtusis v. emarginatis, mucronulatis, subtus ramulisque sericeis; capitulis axillaribus terminalibusque, breve pedunculatis, dense multifloris; calycibus leguminibusque villosis.

In glareosis inter frutices densos prope montem Manypeak (Kent) d. 27. Nov. Herb. Preiss. No. 813. et in rupestribus ad radices montis Baldhead (Sinus Regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. No. 820.

„Frutex 5-pedalis, elegans.“ *Rami* ramulique inferne teretes, glabri, apicem versus 3-4-angulati v. compressi cano-pubescentes. *Folia* 1- $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 6-9 lin. lata, alia perfecte ovalia, alia oblonga, alia obsolete ovata v. obovata, basi rotundata, apice truncata v. plus minus emarginata (nonnunquam obcordato-subrotunda) mucronulo brevissimo v. nullo, coriacea, supra laete viridia glabra venis venulisque elevatis dense eleganterque reticulata, subtus pube alba adpressa dense sericeo-villosa, demum glabrata, nervo medio subtus prominulo valido supra impresso. *Stipulae* 2-3 lin. longae, subulatae, rigidae, rectae, puberulae, demum subrecurvae deciduae. *Pedunculi* terminales et e summis axillis 3-6 lineas longi, angulati, tomentosi, corymbo composito in capitulum subglobosum contracto terminati, pedicellis 1 lin. longis ebracteolatis. *Calyx* 3 lin. longus, corolla dimidio brevior, sordide albedo-v. flavido-villosus, infundibuliformis, semi-5-fidus, lobis aequilongis ovato-lanceolatis acutis, superioribus 2 paulo latioribus. *Vexillum* subreniforme, ungue cuneato $1\frac{1}{2}$ lin. longo, lamina $2\frac{1}{2}$ lin. longa 5 lin. lata centro purpurea marginem versus basique aurantiaca; carina purpurea alaeque subaequales luteae obovato-oblongae subincurvae, vexillo parum breviores. *Filamenta* capillaria, glabra. *Ovarium* subsessile, villosum, 4-ovulatum. *Stylus* glaber, stigmate acuto. *Legumen* ovatum, turgidum, pilosum. *Semina* - Affinis *O. obovato* Benth., sed folia nunquam cuneata.

x C. arborescens ! St. Bn

Ad. Pl. Murfij, Tasm., hb. N. H. n.
286. Dec. 1848. Altitudo 15-20
ped. haud 3-6 ped. ut vult. Dan.
George-Town Dec 49.

x O. ellipticum ! St. Bn. F. D. L. !

O. rotundum hb. St. n. 25 non Rtn
quod foliis glabris fatis peruli-
are. - Alexander-river, Western
port, 6-8', hb. N. H. n. 68
et in montibus occidentali-
bus usque ad altitudinem
3000 pedum 8-10' Jan. hb.
N. H. n. 285.

x β latifolium ! fust. null.

foliis latioribus brevioribus
subrotundis : In monte St. Pauls
Tome Tasmannie, Nov. 1849. hb. N. 727

x varia sessilifolia fust. null.

Ad marginem praeclatorium prope
Gowley Bay. Subx pluriped. ^{in crinis} diffusus
(provisi p. H. & P.) A. obliqua cum
& clathrophylla proxima.

x Arctia elatrophylla, f. m. m.
Tubex humilis diffusus.

In apiculis montium Hiindro
A. portifera finillima, f. m. (Golia)
loria f. aquilata orato- abt.

x Arctia praeifolia, f. m. m.

In montibus Hiindro & Elders-ran
A. Gunnii propingua, diff. v. v.
plethoridis practa marginata, f. m. m.
tuo nao uno altrove Arctia propis, f. m.
v. d. latro figurione magis produzo.
Legum piralide fortum pilafum
1. Lath: pinuo vare.
2. glacella montium
2. latro prop Crysal brook.
Tubulus humilis diffusus.

2. **Oxylobium obovatum** Benth. in Lindl. Swan River p. XII, n. 42. Walpers rept. 1. p. 567: Lindl. in Bot. Reg. 1843, t. 36! foliis cuneato-obovatis oblongisve, obtusis retusisve, v. 2-3-lobis, mucronulatis, coriaceis; racemis axillaribus capituliformibus, densifloris, calycibus sericeo-villosis, ovario 4-ovulato.

α **latifolium** nob., foliis obovato-triangularibus, apice valde dilatato truncatis v. subtrilobis, lobis lateralibus rotundatis muticis, intermedio plerumque brevi v. obsoleto acutiusculo v. obtuso cum mucronulo recurvo.

In region. interior. Australiae meridionali-occidentalis Herb. Preiss. No. 828. (Drummond coll. I, sine No.)

β **angustatum** nob., foliis cuneato-spathulatis, apice modice dilatato emarginatis v. truncatis v. rotundatis mucronatis v. acuminato-subtrilobis, lobis lateralibus obtusis intermedio acuto saepe brevioribus. — *O. cuneatum* Benth. l. c. n. 41. Cfr. Lindl. l. c.

In rupestribus jugi montium Darling's-range, haud longe a cataracta ad caput fluvii Cygnorum (Perth) d. 16. Jan. 1840. specim. fructifera. Herb. Preiss. No. 818. (Drumm. n. 207, et coll. I, sine No.)

„Frutex 2-3-pedalis.“

3. **Oxylobium dilatatum** Benth. l. c. n. 43. Walpers l. c.: foliis basi angustatis, apice dilatato-subbilobis mucronulatis, crasse coriaceis; racemis axillaribus, dense capitatis, multifloris, calycibus sericeo-villosis, ovario 4-ovulato.

In glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard (York) d. 12. Apr. 1840. No. 827 et 834. et in region. interior. Australiae No. 1132. Herb. Preiss. specim. imperfecta.

„Frutex 3-pedalis.“

? β **trilobum** nob., foliis apice dilatato 3-lobis, lobis mucronatis, intermedio minore. — An species distincta?

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. specimen mancum Herb. Preiss. No. 827.

4. **Oxylobium reticulatum** n. sp., foliis oppositis, obovatis oblongisve, obtusis v. emarginatis, mucronulatis, grosse reticulatis, junioribus subtus ramulisque puberulis, demum glabris; stipulis setaceis, petiolo aequalibus, deciduis; racemis axillaribus, brevibus, paucifloris, calycibus cano-sericeis.

In clivulis arenosis ad littus maris, d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 840. et in region. interior. Australiae merid.-occid., m. Febr. 1841. No. 831. (Drummond n. 215.)

Species praecedenti (maxime var. β) valde affinis, sed distincta: foliis nunquam vere cuneatis, reticulatione insigni multo grossiore, stipulis brevioribus (vix 1-1½ lin. longis) tenuioribus, fere capillaribus, deciduis, racemis plerumque ad umbellam 3-5-floram redactis, calycis pube albida (nec fulvo-villosa) minus nitente. — „Frutex 2-pedalis, erectus.“ *Folia* pleraque pollicaria, 5-7 lin. lata. „Vexillum suborbiculatum, emarginatum, extus basique intus purpureum, margine intusque aurantiacum, carina alaeque purpureae.“ *Ovarium* 4-ovulatum.

5. **Oxylobium capitatum** Benth. in Hügel enum. p. 28, n. 69. Walpers l. c. p. 566. Bot. Reg. 1843, t. 16!, foliis inferioribus, obovatis, superioribus oblongis v. linearibus, mucrone recurvo; racemis axillaribus, densis, capitatis, folio brevioribus, paucifloris *).

In arenosis inter frutices sylvae prope deversorium publicum Pineapple (Perth) m. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 843. 844. (Drummond n. 214.)

„Frutex 2-pedalis, ramis strictis.“

? **β ternifolium nob.**, foliis ternatim verticillatis, crassiuscule coriaceis, ramis validioribus (nec gracilibus.) — An species distincta? Specimina manca, fructifera. Legumen 3-spermum. Semina strophiolata!

In glareoso-lapidoso inter frutices densos sylvae ad radices montis Manypeak v. Tjilberup (Plantagenet) d. 23. et 28. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 805 et 814.

6. **Oxylobium tricuspidatum** n. sp., humifusum, glabrum; stipulis rectis, spinuliformibus; foliis oppositis, subsessilibus, cuneato-obovatis, apice truncato 3-mucronulatis, utrinque reticulatis; floribus breve pedunculatis, paucis, axillaribus v. in ramulorum apice aggregatis; calycis dentibus setaceo-acuminatis; ovario 4-6-ovulato.

In sublimoso-glareosis districtus Hay, m. Oct. 1840. specim. florifera. Herb. Preiss. No. 1064. (fructifera. Drummond n. 266.)

„Frutex humifusus“, facie *Cliffortiarum* quarundam, ubique glaberrimus. *Radix* lignosa, tortuosa, digiti crassitie, *caules* emittens plures prostratos, spithamaeos, divergentes, inferne teretes, superne plus minus compresso-angulatos, ubique dense foliosos et ramosos. *Stipulae* erectae v. patulae, 1-2 lin. longae, e basi viridi paulo dilatata in mucrone pungentem rectum fuscum abeunt. *Folia* 4-7 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -4 lin. lata (petiolo $\frac{1}{3}$ lin. longo) coriacea, plana, basi rotundata v. rarius acutiuscula, apice rotundato-truncata v. rarius acutata et mucronibus 3 fuscis pungentibus armata, mucrone intermedio recto 1-2 lin. longo e nervo medio subtus prominulo, lateralibus rectis v. paulo divergentibus 1-2 lin. ab illo remotis et plerumque brevioribus e summis venis primariis ortis, venis pinnatis venulisque rete acute prominulum formantibus. *Pedunculi* axillares 2-4 fasciculati (interdum solitarii) vix calycem aequantes. *Calyx* subcampanulatus, viridis, $2\frac{1}{2}$ lin. longus (cum pedicello sub lente parce puberulus) subbilabiatis semi-

*) **Oxylobium Drummondii** n. sp., ramis apice puberulis, mox glabris; stipulis setaceis, petiolo vix longioribus, deciduis; foliis oppositis, lineari-lanceolatis, emarginato-retusis, obsolete mucronulatis muticisve minute reticulatis, mox glabris, margine nec incrassatis nec revolutis; capitulis ramulos terminantibus, densifloris, inter folia subsessilibus, calyce ovarioque villosis. — Swan River, Drummond n. 210. — **Oxylobium capitatum** valde affine, vix tamen mera ejus varietas, recedens, praeter notas indicatas, foliis basin versus vix attenuatis, rarius subcuneatis, apice magis retusis v. emarginato-bilobis, lobis rotundatis, reticulatione paulo minore et (praecipue in pagina superiore) magis obsoleta, petiolo magis conspicuo 1-2 lin. longo, maximeque racemis magis contractis, capituliformibus, nunquam immediate axillaribus, sed ramulos (etsi saepe brevissimos) semper foliosos terminantibus, floribus brevius pedicellatis v. subsessilibus folia haud superantibus, calyce fulvo-villosiusculo minus sericeo, lobis acutis non acuminatis, stylo tenuiore et paulo longiore (qui in **O. capitatum** nostro est compressus, crassiusculus, inferne paulo attenuatus.) — Ab **O. obtusifolio** Sm. apprimè differt foliis margine haud revolutis, inflorescentia, floribus minoribus caet.

* Acacia tetragonophylla, Juss Mill.

In parvis lignis pubescentibus & ad rivas
superiores prope Luvnaku.

Ad phacelatae approximanda & axillari
fol. quadrilatera auricularia. Arbuscula
6-8' vel frutx divaricatus ramis diffinis
ramis ratis rano. nigrescentibus
Auth: Sept. 0.12.

* Acacia Salix trifida, Juss Mill.

Internodia 15-20, internodia 30-40' ^{rara L'} alta.
Arbor, furcas venustas formans
rami ^{salicis} folia Babylonicae castan
medulae. ^{rami} furcus 12-18' altus. Cortex
nigrescentis qualibus ramis diffinis
nigrescentis. Casuarinae quadrivalvis
Ad rivas ut non in humidis locis.
Bark, new, Bark, creek, Crystal
Bark, Mount Remarkable, Wroughton
Auth. Linn. m. l. b. Chylodia palme
S. folium v. ad. pro populo
Lamm paula tenuiora.

* Acacia heliofolia Juss Mill.

Port Luvaku, Napan point, Daulley bay
irriguata.

Frutx 3-6' diffusus. H. & L. Infund.
Folia insigniter obtusa

* Acacia pyramantha Vth.

f. angustifolia

In arboribus resistentibus montium
Marble-ranges & laeis humilibus
ad Daulley bay. Frutx 7-8' rami
flexuosi. Lignum rari diffusi
i. l. b. Daulley bay

* Araria itcaphylla, furd Mill.

Prope A. retinodermi inferatur!
 Inter fructus 5-8' lacte virens.
 In alveis rivulorum expiratis prope A.
 Kaba, Gudnaka & Wappaena! & prope
 Anth: Kerup, iuber. Tonindi! Trilbula
 nec diffm. videtur prope aliud ab. a.
 Wuth prope Wellington lectum

* Araria cernua, furd Mill.

Sulley. creek.
 Inter 6-8', racis cernuus
 A. pyrauthae formis aegre
 Junilis diffm. vno phylloides re-
 minus vniops immarginatis
 fivibus. fl. & fr. spiderrans

* Araria Fergussoni furd Mill.

Species A. retinodermi cognata, disor-
 tur habitu fructuoso, foliis min-
 ribus lactius viridibus, pedicellis
 pe. axillaribus folit aris r. a. a. a.
 pilopulis (nec glabris)

In alveis glaciis expirantibus am-
 can prope A. Kaba.

Anth: vris exado

* Araria Wattoiana, furd Mill.

Inter annis Braughton & Kirkby - creek
 & in graminibus ad Wild Dog creek.
 Fructus sat densus parvi - 5' lacte
 virens phyllis. Folia erecta. Ram-
 adulti furci. Ab hac diffm. & glau-
 phylla innovationibus puberulis
 glaberrimis, pedicellis abbreviatis nec
 racum ex lupo, pedicellis longioribus
 & luvone florescendi. Anth: affato.

quinquefidus, lobis lanceolatis acuminatis apice fere setaceis aequilongis, superioribus paulo latioribus et altius connatis, inferiorum sinibus sphacelatis. *Corolla* calyce vix duplo longior, vexillo suborbiculato integro flavo, dorso medioque purpurascens, carina parum incurva purpurea alas oblongas flavas aequante. *Filamenta* libera, glabra. *Orarium* sessile, basi disco brevissimo cinctum, sericeo-villosum, 4-6-ovulatum, stylum filiformem incurvum acutum glabrum aequans. *Legumen* sessile ovatum, turgidum, puberulum, intus glabrum haud septulatum. *Semina* estrophiolata.

7. **Oxylobium parviflorum** Benth., in Lindl. Swan River p. XII, n. 40. Walpers repert. I. p. 566.: foliis oblongo-linearibus cuneatisve, emarginatis retusisve, muticis; racemis axillaribus et terminalibus, elongatis, laxis; calycibus subsericeis; ovario 4-ovulato.

In sterilibus sylvae prope praedium rusticum Dom. Parker (York) d. 10. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 798. et in lapidosis summitatis montis Bakewell, alt. 1200 ped., d. 5. Sept. 1839. No. 801.

„Frutex 5-7-pedalis. Carina alaeque purpureae, vexillum rotundatum aurantiacum, basi purpureum.“

ISOTROPIS Benth. Endl. gen. n. 6429.

1. **Isotropis striata** Benth. in Hügel Enum. p. 28, n. 73; Ann. Wien. Mus. 2, p. 70. Walpers l. c. p. 567: procumbens, piloso-pubescent; foliis sessilibus, inferioribus obovatis, superioribus cuneato-oblongis v. linearibus, integris; stipulis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis.

In arenosis umbris et glareosis montium continuorum Darling's-range, haud longe a cataracta, d. 26. Jul. 1839. (No. 1062 ex parte) et in solo turfoso clivuli ad portum Princess Royal Harbour, d. 28. Sept. 1840. (No. 1065 ex parte) Herb. Preiss. (Drummond n. 274.)

„Herba perennis, humifusa“ (fide Preiss. in sched. No. 1062.) „Suffrutex dodrantalis“ (Id. No. 1065.) *Folia* saepe in eodem specimine alia apice rotundata, alia truncata, alia obsolete biloba, in formam sequentis transeuntia, quam igitur mere ejusdem speciei varietatem sistere suspicamur. *Vexillum* aurantiacum, radiatum purpureo-venosum, alae carinaque atropurpureae.

2. **Isotropis biloba** Benth. l. c. p. 29, n. 74; Ann. Wien. Mus. l. c. Walpers l. c.: caule erectiusculo; foliis cuneatis, apice bilobis v. superioribus linearibus integris; stipulis inferioribus lanceolatis, superioribus parvis.

In solo sublimoso-glareoso district. Hay, d. 8. Nov. 1840. fructifera (Herb. Preiss. No. 1066.) et cum praecedente florens (No. 1062, 1065, ex parte) (Drummond n. 275, 276.)

„Suffrutex spithameus.“ — Variat caule folisque pilosis et fere glabris. *Legumen* clavato-lanceolatum, acutum, turgidum, 8-10 lin. longum, in stipitem calyce breviorum attenuatum, subdepressum, adpresse sericeo-pilosiusculum, albidum, suturis vix prominulis. *Semina* 6-8 (immatura) estrophiolata. An praecedentis var.? Folia tamen rigidiora, subcoriacea, distinctius venosa.)

* **I. Drummondii** n. sp., caulibus subsimplicibus, strictis, striatis, adpresse pilosiusculis, superne aphyllis, inferne paucifoliis; foliis coriaceis, spathulatis v. lanceo-

CHOROZEMA Sm., Benth. Endl. gen. n. -6431.

CHORIZEMA Labill. DC. prodr. 2. p. 102. Meisn. gen.
p. 81, (57.)

1. **Chorozema (Euchorozema) cordatum** Lindl. in Bot. Reg. 1838, t. 10! Walpers repert. 1. p. 567: foliis subsessilibus, cordatis, ovato-oblongis, obtusis, aequaliter spinuloso-dentatis, glabris; racemis terminalibus axillaribusque, laxis, nutantibus, paucifloris, calycis pubescentis dentibus tubo aequalibus.

In humidis umbrosisque ad ripas fluvii Canning prope Kelmscott (Perth) m. Jul. 1841. (No. 1042, fl. et fr.) et in arenosis sylvae ad portum Leschenault (Wellington) d. 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1056. (Drummond n. 185, et coll. I. sine No.)

„Frutex 1-5-pedalis, ramis flaccidis.“ — Variat foliis saepe in eodem specimine aliis sinuato-dentatis, dentibus subspinulosis, aliisque subintegerrimis sparse minuteque ciliato-denticulatis. *Racemi* saepe fere pedales. *Legumen* clavato-oblongum, turgidum, glabrum.

2. **Chorozema (Euchorozema) varium** Benth. in Bot. Reg. 1839, misc. p. 45, n. 63, t. 49! Walpers l. c.: foliis subsessilibus, subrotundo-cordatis, undulatis, spinoso-dentatis integrisque, pubescentibus; racemis erectis, multifloris, folio paulo longioribus; calycibus pilosis, basi obtusis, dentibus tubo subaequalibus.

In clivulo calcareo Arthur'shead (Perth) d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1046. (Drummond n. 184.)

„Frutex adscendens. Flores miniati.“ *Legumen* subclavato-oblongum, turgidum, glabrum.

3. **Chorozema (Euchorozema) triangulare** Lindl. in Bot. Reg. t. 1513! Walpers l. c.: foliis subhastatis, pinatifidis, spinosis, acumine integro laciniis longiore; bracteolis ad apicem pedicelli.

In calcareis inter frutices densos ad tergum montis Baldhead, d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1041.

„Frutex pedalis. Flores coccinei.“

4. **Chorozema (Euchorozema) rhombeum** R.Br., DC. prodr. 2, p. 103, n. 3. Sweet. Fl. Austral. t. 40.

latis, integris, acutis, subnervosis, demum glabris; stipulis ovato-lanceolatis; racemo terminali, laxo, pedicellis calycem aequantibus v. demum superantibus, bractea stipulaeformi suffultis. In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond (n. 277.). Herba basi suffrutescens? spithamaea. Rhizoma tortuosum, ex apice multicipiti emittens caules subfasciculatos, erectos v. adscendentes, fere junceiformes, basi stipulis ovatis imbricatis decoloribus squamatos. Folia vix semipollicaria, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, venis subflabellato-pinnatis plus minus conspicuis. Flores **J. striatae**, sed alae aurantiacae.

Acacia megaphylla, for Mull.

As eximie ac A. Parolikosostiana (Cullen)
Species insignis quantum diagnosi
docuit A. acutipili & ellipticae propinquas
inter eas hujus "alouice" A. notabilis
approximanda. Ab ultimae facillime
distinguitur: phyllodii primis ovatis
vel lanceolatis-oratis duplo
brevisioribus & capitulis axillaribus
solitariis nec racemosum dispositis
tante ramis petioli decurre petiolo
ram. alatis

In montem Dutton & Greenly int
colle "Fornhamour's Look out" Wilhelms
inde 20 mill. ibi. ad litus (Crown
pretentum & in parte australi li
toris prope Port Lincoln
Arborecula 4-5' truncata ulari
vite phaeophloia, corua intrusa
Ruth: exodo unis & multis affatis.

Acacia aneura, for Muller

In solo macro prope Ludnaka.
A. neurophyllae phyllodii adnatorum
finitis, quae et angustiorib. & vix nervatis
Quadrifida (triaculid), leguminibus vix
& florum dispositione rariora magnopere
differt. Habitum prae se fert Cassiae
phyllodineae var. ~~argenteae~~ ^{albae}
& angustipoliae.

* Acacia lirophylla, for Mel.

Posindy! Willhelmi leg. pro fl & fr.
magn. rubulorum marginis

Frut. altiss.

Spurios ab annib. mei h. l. fasci
~~separanda~~ separanda - phyllodis an
gusto lanceolatis nitidulis crasso-
riacis obsoletissime nervatis & ~~margin~~

* Acacia imbricata for Mel.

ad margines fruticium prope Dam
bey. leg. Willhelmi detexit.

A. asperae L. (ad fl. Murray de-
scriptae mihi adhuc incognita
habeo affinem. Frut. annis ali-
bis indigenos maxime singulares
facit. Ericae vel Pleurae drac-
foliis imbricatis 4-6" longis hinc
bus obtusis non nisi mucronula
brevis latere apiculatis

Frut. 3-4' altus saepe autem ad 6'
altus

Auth: primo vire

In glareosis sylvae ad tergum montis Clarence, d. 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1128. (fl. et fr.)

„Suffrutex decumbens.“

Obs. Ab hac specie vix satis distincta videntur *Ch. diversifolium*. Alph. DC. 7° not. pl. rar. Jard. Genev. p. 44, t. 8. et *Ch. ovatum* Lindl. in Bot. Reg. t. 1528. Cfr. Benth. in Hügel Enum. p. 28, n. 71.

5. **Chorozema (Euchorozema) angustifolium**
Benth. in Hügel Enum. p. 28, n. 72. Walpers l. c. p. 568.
Dillwynia? *glycinaefolia* Sm., DC. prodr. 2 p. 109, n. 9.
Bot. Reg. t. 1514!

In solo turfoso-arenoso ad Stirling's terrace, d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1127 et 1147. (fl. fr.)

„Suffrutex dodrantalis. *Vexillum* aurantiacum, alae carinaque coccineae.“
Folia 1/2 - 2-pollicaria, 1-2 rarius 2 1/2 - 3 lin. lata, basi constanter rotundata, subtus molliter pubescentia v. demum glabriuscula.

6. **Chorozema (Euchorozema) costatum** n. sp.,
ramulis pubescentibus; foliis subsessilibus, coriaceis, ellipticis v. lanceolatis linearibusve, costato-penninerviis, submarginatis, glaberrimis, margine scabriusculis, apice acuto subrecurvo pungenti-mucronatis; racemis terminalibus, laxiusculis, paucifloris; calyce piloso, basi vix attenuato, lobis acuminatis.

α lanceolatum, foliis lanceolatis (semipollicaribus, 2 - 2 1/2 lin. latis.)

In solo sublimoso-glareoso ad radices montium continuorum Darling's-range (Perth) m. Sept. 1839 et 1841. Herb. Preiss. No. 1036, fl. fr. (Drummond n. 183.)

β lineare, foliis linearibus (1 lin. latis) longius mucronatis.

In arenosis district. Victoriae, d. 22. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 1039. (sine fl.)

γ brevifolium, foliis ellipticis, parvulis (2-3 lin. longis, 1 1/2 lin. latis) apice valde recurvis, brevissime mucronatis. —

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Febr. 1841. fructif. Herb. Preiss. No. 1040.

„Frutex 1 1/2 pedalis.“

„Frutex 1 1/2 - 3-pedalis“, ramosissimus, ramis ramulisque gracilibus, adscendentibus, plerumque strictiusculis, satis dense foliosis, pube brevi adpressa canescentibus, demum glabris. *Stipulae* nullae. *Folia* sparsa, raro subopposita, rigida, laete viridia, margine tenui nerviformi sub lente parce denticulato-scabriusculo, nervo medio venisque primariis costaeformibus vix anastomosantibus utrinque prominulis, interstitiis haud reticulatis, mucrone terminali 1/2 - 3/4 lin. longo recto pungente. *Racemi* ramulos terminantes, 1 1/2 - 2 1/2 - pollicares, circ. 6-flori, laxiusculi, erecti, inferue nudi; pedicelli 1-2 lin. longi, bractea lineari minuta caducissima suffulti. *Calyx* 4 lin. longus; basi brevissime attenuata bibracteolatus, adpresse cano-v. rufo-pilosus, lobis tubo parum longioribus lanceolatis acuminatis subaequalibus, superioribus 2 paulo latioribus alte connatis. „*Corolla* coccinea“; vexillum calyce duplo longius, ungue brevi, lamina late suborbiculata (latiore quam longa) emarginata, basi macula pallidiore (lutea?) notata; carina valde curvata, obtusa (purpurea?) calyce alisque obovatis (purpureis?) paulo brevior. *Ovarium* stipitatum, villosum, 8-ovulatum. *Stylus* brevis, incurvus, glaber; stigma subcapitatum, superne penicillo brevi albo barbato.

Legumen (jam apertum, vacuum) oblongum, turgidum, pilosiusculum, bivalve, 4-5 lin. longum. *Semina* . . . — Valde accedit ad *Orthotropidem pungentem* Benth., sed jam carina admodum incurva abhorret.

7. **Chorozema (Euchorozema) reticulatum** *n. sp.*, ramis gracilibus, superne pubescentibus; foliis petiolatis, lanceolatis, submarginatis, apice recto acutis vix mucronatis, glabris, margine scabriusculis, subtus reticulato-venosis; racemis terminalibus, longiuscule pedunculatis, laxis; calyce basi attenuato, adpresse cano-pilosiusculo, lobis lanceolatis vix acuminatis.

In solo subarenoso inter frutices densos prope montem Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1045.

„Frutex 1-2-pedalis.“ — Species a praecedente, cui habitu et foliorum magnitudine formaque simillima, distinguitur: foliis minus coriaceis, rectis, vix pungentibus, venis intra marginem arcuatim anastomosantibus, interstitiis plus minus reticulatis, petiolo $\frac{1}{2}$ -1 lin. longo, racemis longioribus 8-12-floris, pedunculi parte infera nuda 2-3-pollicari, pedicellis 2-3 lin. longis, calyce vix 3 lin. longo ejusque lobis vix acuminatis. Corollam, stamina et stigma non vidimus. Vexillum (teste Preiss. in sched.) retusum, basi sulphureum. Ovarium subsessile, pilosum, 10-ovulatum.

8. **Chorozema (Aciphyllum) Henchmanni** *R. Br.* in Bot. Reg. t. 986. Bot. Mag. t. 3607.

In confragosis summitatis montis Bakewell (York) m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1048. (sine fr.)

„Frutex pedalis.“

9. **Chorozema (Aciphyllum) Baueri** *Benth.* in Ann. Wien. Mus. 2, p. 71. Walpers rept. 1, p. 568: ramis puberulis; foliis divaricatis, linearibus, pungentibus, margine revolutis, glabris, supra laevibus; floribus subsessilibus, folio subbrevioribus.

In limoso-lapidoso ad latus occidentale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1037, sine fr. (Drummond n. 192.)

„Frutex 1-2-pedalis.“ *Radix* lignosa, crassa, ramosa, subflexuosa. *Folia* interdum fere pollicaria, rigidiora et paulo latiora quam *Ch. Henchmanni*, nunc patentissima v. deflexa, nunc semierecta. *Pedicelli* 1-2-raro 3 lin. longi. *Calyx* dimidio fere longior quam *Ch. Henchmanni*. *Corolla* (fide Preiss) sulphurea (in illo pallide carnea, caeterum simillima.)

Obs. Podolobium? articulare DC. prodr. 2, p. 103, n. 6, quod jam cl. Bentham (l. c. p. 72.) „alteram hujus sectionis speciem“ esse suspicabatur, ex diagnosi saltem a speciminibus nostris *Ch. Baueri* distinguere nequimus.

10. **Chorozema (Aphyllon) daviesioides** *n. sp.*, ramosissimum, erectum, aphyllum, glabrum; ramis teretibus, costatis; ramulis folii rudimento squamaeformi adpresso acuminato suffultis, sulcato-4-6-angularis, apice mucronato-pungentibus; racemis terminalibus lateralibusque, subflexuosis, pedicellis brevibus, basi medioque bracteolatis; floribus nutantibus; calycis labio superiore truncato, emarginato, brevissime 2-dentato, inferiore 3-fido; ovario 4-8-ovulato.

Daviesia ramulosa Benth in Lindl. Swan River p. XIV, n. 56?

a **Preissianum**, calyce ovarioque glabris, pedicellis calyce multo brevioribus (plerumque vix 1 lin. longis).

In lapidosis montium cis oppidum York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1183. et in region. interior. Australiae occidentalis, d. 7. Mart. 1840. No. 1138.

β **Drummondianum**, calyce parce minuteque adpresso-puberulo, ovario setuloso-piloso, pedicellis calycem subaequantibus (2 lin. longis). — *An species distincta?*

In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond, n. 190.

Species insignis, habitu, praecipue ramificatione et foliorum genuinorum defectu *Jacksoniis Daviesiisque* quibusdam similis, sed calycis forma discrepans et propter ovarium pluriovulatum *Eupodalyrtis* accensenda. A *Chorozemate* re vera habitu magis quam characteribus (sc. vix nisi calycis labio superiore subintegro) abhorret, quare generice eam separare non audemus. „Frutex 5-pedalis.“ *Ramuli* rigidi, steriles plerumque trifidi, ultimi $\frac{1}{2}$ -1-polliares, interdum minute gemmuliferi, patentes, recti v. subrecurvi, angulis nerviformibus sub lente scabriusculis, apice sphacelato fusco nunc sensim acutato nunc subito in mucronem rectum pungentem semilineam longum excurrente. *Squamae* (foliorum rudimenta) ramis ramulisque arcte adpressae, 1-2 lin. longae, e basi triangulari latiuscula viridi carinato-costata in mucronem sphacelatum fuscum sensim abeuntes. *Racemi* summos ramulos terminantes, erecti, simplices v. ramosi, 6-10-flori, subsecundi, rhachi mutica ramulis simili subflexuosa; pedicelli 1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longi, 2-3 lin. ab invicem distantes, singuli squamula sphacelata 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longa suffulti, patuli v. recurvi, glabri v. in *β* puberuli, prope medium bracteolis 1-2 minutis acutis muniti. *Calyx* subcampanulatus, basi angustatus, subnervis, 2 lin. longus, dimidium corollam aequans; labium superius inferiore paululum longius, latum, fornicatum, levissime repando-emarginatum (*Hovea* more fere truncatum) dentibus exiguis acutiusculis divergentibus, inferioris dentibus 3 subaequalibus triangularibus acutis $\frac{2}{3}$ lin. longis rectis. „*Corolla* aurantiaca“; vexillum late orbiculare, emarginatum, centro areola atropurpurea venosa cincto marginibusque aurantiacis; alae vexillo paulo breviores, obovatae, basi brevissime auriculatae, aurantiacae, ungue falcato; carina alis brevior, ovata, ventricosa, obtusa, carnea? v. purpurascens? auriculis basilaribus minutis. *Annulus perigynus* dimidium fere calycis tubum vestiens. Genitalia calycem aequantia. *Filamenta* libera, complanata, glabra. *Ovarium* brevissime stipitatum, oblongum, stylo crassiusculo compresso glabro apice incurvo vix brevius, ovulis 4-6-8 estrophiolatis?, funiculis brevibus. *Stigma* obtusum, subcapitatum. *Legumen* (maceratione semidestructum) sessile, oblongum, turgidulum, 4-5 lin. longum, bivalve

GOMPHOLOBIUM Sm. Endl. gen. n. 6432.

Meisn. gen. p. 81. (57.)

I. Folia simplicia, solitaria, sparsa.

1. **Gompholobium ovatum** n. sp., glaberrimum, ramis angulatis compressisque; stipulis setaceo-linearibus, patentibus; foliis subsessilibus ovatis v. suborbicularibus, subcordatis, acutiusculis v. submucronatis, planis, penninerviis, supra reticulatis; pedunculis terminalibus, geminis, elongatis, me-

dio minute bibracteolatis; calyce dimidiam corollam aequante, carina nuda.

In arenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1105.

Suffrutex? ramis gracilibus subcompresso-triquetris, angulis linea nerviformi a foliorum insertionibus decurrente obsolete marginatis. *Stipulae* angustissime lineares, 1-1½ lin. longae, rectae v. recurvo-arcuatae, pallidae, diu persistentes. *Folia* sparsa, coriacea, sessilia v. petiolo fusco vix ½ lin. longo fulta, late ovata v. quandoque subrotunda, integerrima, ½-1½ poll. longa, 6-14 lin. lata, pallide viridia, nunc obsolete attenuato-acuminata, nunc obtusa, mucronulo brevissimo obtuso (rarius nullo) terminata, basi rotundata v. leviter cordata, nervo venisque supra prominulis, subtus tenuibus subimmersis. *Pedunculi* terminales, 1-flori, gemini, aequales, sesquipollicares, filiformes, erecti, singuli basi bractea solitaria lineari squamaeformi 1-1½ lin. longa medioque bracteolis 2 illi similibus approximatis (nec oppositis) muniti. *Flores* speciosi, magnitudine fere *G. barbigeri*, calyce tantum paulo minore (5 lin. longo) vix dimidium vexillum aequante, basi ebracteolata, utrinque glaberrimo, profunde 5-partito, lobis obtusiusculis. *Vexillum* amplum, coccineum? *carina* calycem aequans, alis purpureis obovato-oblongis paulo brevior, obtusa, glaberrima, pallide carnea. *Legumen*

2. **Gompholobium amplexicaule** *n. sp.*, glaberrimum; ramis gracillimis, superne subcompresso-angulatis; stipulis setaceis, minutis, recurvis; foliis subsessilibus, cordatis, semiamplexicaulibus, anguste ovato-oblongis, acutis, submucronatis, utrinque reticulatis; pedunculis axillaribus terminalibusque, solitariis geminisve, folia subaequantibus, basi et prope medium minute bracteolatis; calyce dimidiam corollam aequante, carina imberbi.

In arenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1106.

„*Suffrutex decumbens.*“ *Rami* 1-2-pedales, subsimplices, fere filiformes, basi teretes, superne (praecedentis more, sed minus distincte) angulati. *Stipulae* vix 1 lin. longae, demum nigrescentes. *Folia* 1-1½ poll. longa, 2½-3½ lin. lata, e basi rotundata plus minus (nunquam tamen profunde) cordata sursum sensim attenuata (textura, colore et nervatione omnino praecedentis) margine (exsiccatione?) plerumque leviter recurva et subundulata. *Pedunculi* ½-1-pollicares. *Flores* praecedentis, sed ⅓ minores (magnit. *G. virgati* Sieb.!) petalorum colore eodem. *Legumen* subglobosum, cerasi minoris magnitudine, laeve, prope suturas obsoletas tenuiter transverse venosum. *Semina* 12-14, funiculis longiusculis.

II. *Folia* palmatim 3-v. rarius 5-foliata, petiolo nullo v. obsoleto.

3. **Gompholobium marginatum** *R.Br.* DC. prodr. 2, p. 105, n. 5. Bot. Reg. t. 1490! — Variat petiolis, praecipue plantae junioris v. cultae vix 1 lin. et 2-3 lin. longis, pedunculis 1-floris et laxe racemoso-plurifloris.

In solo glareoso-sublimoso inter frutices prope oppidum Guildford, d. 8. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1107. (Drummond n. 219.)

„*Suffrutex spithameus.* *Flores* sulphurei.“

4. **Gompholobium pedunculare** DC. l. c. n. 6. 2

Gr. a. speciosus est pl. *orientalis*.

Gompholobium Quarkii Indum
Quarkia pallens (Lam.) Indum

Norae Hallandiae (Forse etu-
ptalivae felivis) hb. N. 828.

G. polymorpha proximum,
sed omnibus partibus majoribus
validius, pedicellis foliis brevioribus
et vexilla carina parum
breviore discriminatur.

x (Gompholobium psalmorphum B. & P.
p. erectum Juss. Mill. prope prostratum
cognatum Tasmaniae, hb. St. 639.
G. latifolium Gunn. ex Stuart.

x 6! Cornua legalis diagnosi et certissime quædam
in alioque v. ed. h. H. 112! St. M. South

[illegible]

Flower color variabilis.
 Lofty range here in the canyon, h. 5000.

et *Festmannia* distincta, an ex ea varietas
melius ad *G. grandiflorum* vel *tetrastemon-*
um ^{refertur} an *specifice separanda?*

G. univittatum
— All. Cuvier

In solo turfoso inter frutices densos haud longe a monte Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. Herb. Preiss. No. 1112. et in arenosis district. Kent, d. 19. Nov. 1840. No. 1113. (Drummond, n. 221.)

„Suffrutex vix pedalis.“ Foliola etiam foliorum superiorum saepe obovata.

Obs. Specimina Drummondiana recedunt foliorum inferiorum foliolis spathulatis, sc. ratione longitudinis angustioribus (5 lin. longis, vix $1\frac{1}{2}$ lin. latis); accedunt igitur ad *G. latifolium* Sm., quod tamen differt petiolis paulo longioribus, foliolis omnibus conformibus obtusis, carina fimbriata, caet. — *G. venulosum* Lindl. Bot. Reg. t. 1574. a nostra planta vix differt, nisi foliolis nunquam (?) obovatis, stipulis petiolo longioribus, pedunculis paulo brevioribus, petalis omnibus concoloribus vitellinis.

5. **Gompholobium tenue** Lindl. in Bot. Reg. t. 1615. Walpers repert. 1, p. 568: glaberrimum, caulibus filiformibus laevibus; foliolis 3 linearibus, angustissimis, mucronulatis, margine revolutis; floribus solitariis, pedunculatis; vexillo emarginato, carina imberbi duplo longiore.

In limoso-calculosis sylvae ad radices jugi montium Darling's-range (Perth) d. 2. Nov. (No. 1109, ex parte) in limosis sylvae prope fl. Vasseriver (Sussex) d. 24. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1111, et in regionibus interior. Australiae meridionali-occident., m. Oct. 1840. No. 1114. (Drummond n. 222: et coll. 1 sine No.)

? β **volubile** nob., caulibus volubilibus, stipulis (2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longis) foliolisque longioribus (plerumque sesquipollicaribus). An spec. distincta? (Herb. Preiss. No. 1109 ex parte.)

Species admodum variabilis, a praecedente, cui foliis superioribus floribusque simillima, distinguenda foliis omnibus conformibus et petalis concoloribus vitellinis. Suffrutex (v. „herba perennis.“ fide Preiss in sched. No. 1109.) nunc digitalis, (No. 1114.) nunc pedalis. *Caules* graciles, tenues, striati v. rarius fere laeves, erecti v. (in speciminibus nonnullis sub No. 1109, a reliquis caeterum non distinguendis) volubiles! *Stipulae* 1-rarius 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longae. *Petioli* nunc (No. 1114.) fere nulli, nunc 1-2-rarius 3 lin. longi. *Foliola* $\frac{1}{2}$ -1-rarius (in 1109.) $1\frac{1}{2}$ -pollicaria, supra obsolete transverse venulosa v. interdum (No. 1109.) laevia. *Bracteolae* superiores nunc calyci proximae, nunc in medio fere pedicelli sitae. *Carina* alaeque apice et interdum (in specim. Drummondianis nonnullis) etiam vexillum purpurea. *Legumen* brevissime stipitatum, ovato-subglobosum, magnit. cerasi minoris, glabrum, tenuiter denseque transverse venoso-lineatum, suturis nerviformibus. *Semina* 16, ovalia, subcompressa, cinerea, umbilici lateralis oblongi margine tumidulo diaphano rugoso, funiculis rectis 2 lin. longis strophiola obsoleta emarginato-biloba subcapitatis. — Var. β forsan distinctam speciem sistit, sed specimina nostra ad eam rite definiendam insufficientia sunt et ab ipso lectore a reliquis haud distincta fuerunt. In specim. Drummond. (coll. 1) ramuli interdum etiam subvolubiles videntur.

6. **Gompholobium polymorphum** R.Br. DC. l. c. p. 106, n. 8. Bot. Mag. t. 1533. — *G. grandiflorum* Andr. Bot. Repos. t. 642. (non Sm.)

In subarenosis umbrosis sylvae prope oppidum Albany, d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1108.

„Herba 1-pedalis.“ Caulis filiformis, volubilis!

7. **Gompholobium burtonioides** n. sp., ramis ramulisque teretibus, laevibus, puberulis, demum glabris; stipulis minutis, deciduis; foliis subsessilibus, inferioribus 3-, summis 5-foliolatis, foliolis anguste linearibus v. sub-

spathulatis, obtusiusculis, muticis, margine revolutis, supra ciliato-pilosiusculis demum glabris; capitulis terminalibus, sessilibus, paucifloris; calycis pubescentis corolla vix dimidio brevioris lobis breviter aristato-acuminatis.

α subspathulatum, foliolis lineari-subspathulatis.

In arenosis prope oppidum Albany, m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1100.

β subacerosum, foliolis angustissime linearibus.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1193.

„Frutex $\frac{1}{2}$ -1-pedalis, erectus, a basi ramosus; rami adscendentes, subvirgati, graciles, dense foliosi. *Petiolus* foliorum inferiorum vix ullus, denticuliformis, summorum $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. longus. *Foliola* 3-6 lin. longa, in α $\frac{2}{3}$ lin. longa, in β dimidio angustiora, 1-nervia, supra obsolete venosa. *Flores* 3-6 in capitula terminalia approximati, raro solitarii, pedunculis 1-2 lin. longis. *Calyx* 3-4 lin. longus, laxiuscule cano-pilosiusculus, lobis apice in aristam mollem 1 lin. longam attenuatis. *Petala* vitellina, concolora?; carina rubescente? imberbi calycem subaequante vexillo duplo brevior. *Legumen* subglobosum, calycem vix superans, pisi magnitudine, glabrum, 8-spermum. — Valde accedere videtur ad *G. aspalathoides* Cunn. (Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 72) quod differt: ramulis angulatis, foliis omnibus 3-foliolatis, floribus subracemosis et vexillo carinam vix superante. — Affine etiam *G. capitato* Cunn. et *G. aristato* Benth. l. c., sed ab utroque differt foliolis tantum 1-2-jugis, venosis, muticis, carina haud ciliata, et a posteriore insuper floribus pedunculatis, calycibus corolla multo brevioribus, breviter aristatis, caet.

III. Folia pinnata, rhachi conspicua, foliolis 2-multijugis cum impari.

8. ***Gompholobium aristatum* Benth.** in Hüg. enum. p. 29, n. 77; Ann. Wien. Mus. 2, p. 72. Walpers repert. 1, p. 569, foliis petiolo brevissimo 3-7-foliolatis; foliolis lineari-subulatis, rigidis, mucronatis, margine revolutis; floribus in axillis superioribus subsessilibus, calycibus longe aristatis corolla parum brevioribus legumen subaequantibus, carina ciliata.

α hispidum Benth. l. c.

In arenosis secundum fluv. Cygnorum prope oppidum Freemantle, d. 17. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1199.

Specimina nostra a descriptione l. c. recedunt foliolis 5 v. rarius 3 (nuncquam 7) floribus terminalibus solitariis (nec axillaribus) et carina brevissime ciliata. Caet. exacte congrunt. De identitate igitur vix dubitandum. — „Frutex 2-pedalis.“ Stipulae setaceae. Foliorum insertio transverse semilunaris, pallida. „Flores vitellini.“

9. ***Gompholobium capitatum* Cunn.** mss. Bot. Reg. t. 1563! Walp. l. c. p. 568; pilosum, foliolis 3-4-jugis, subulato-linearibus, mucronatis, supra laevibus, rhachi interdum subnulla; floribus capitatis, calycibus hirsutis, carina ciliata.

In arenosis sylvae district. Sussex, d. 17. Dec. 1839. (No. 1201 et in solo subturfoso-arenoso inter frutices ad Stirlingsterrace, m. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 1200.

X
G. uncinatum Lessingham
G. galiophyllum! fide Mtt.

Spec. propria non varietas G. poly-
morphi, quod ^{perianthia} pediculis longi-
oribus, caulibus glaberrimis
pubulis stipulisque aequilungis
differt et vix a Brenoniana di-
versum etiam ^{habitus} habitus vix dilicis
& florum color divergit.

Ecce G. polymorphum et tetra-
thyridem inferre nescimus!

Maxillum intus palis luteum v.
sub sanguineum aut aurantiacum
basi luteum! Carina luteo-al-
bida extus apice nigro-virex-
sans basi luteola.

Fruticul. prostratus. In ma-
sibus Lotz, range unius
pl. Oukajaringa. Dec. 28. 1848.
In umbrasis praelioribus
montanis Dr. M. Harkn.
Kand ubique Mart. 1849. fide
Lynce Calycis lobi denique reflexi.
Variat corolla atrolinea vel ra-
ris vexilla intus scarlatina

Stropholobium capitatum Lumn.
S. *macropetalum* Jern. & Mee.
corolla (discolore?) calycem breviter
aristatum superante.
Stipulae spithameae, simplicissimae
quam e semine ad gl. ⁱⁿ regnum colonia
Australasicae Novae Hollandiae
austro-occidentali collecta
eduxit ibi. Car. Stuart. 16. 12. 77.

„Frutex pedalis et ultra, strictus.“ *Rami* teretes, laeves, minute puberuli. *Stipulae* setaceae, albae, $\frac{1}{2}$ -1 lin. longae, deciduae. *Petiolus* cum rhachi 2-rarius 3-4 lin. longi, quandoque brevissimi. *Foliola* 7, rarius 9 v. 5-3, subfiliformia, 2-8 lin. longa, vix rigidula, nunc breviter setaceo-mucronata et interdum subuncinata, nunc (No. 1201.) mutica, pilis albis tenerimis laxis 1 lin. longis ciliata (juniora fere arachnoidea) demum glabra. *Capitula* plerumque, 3-flora, rarius pluri-v. 1-flora. *Calyx* dense cano-villosus, pedicello longior v. subaequalis, 3 lin. longus, lobis arista $1\frac{1}{2}$ lin. longa acuminatis petala paulo superantibus. *Petala* vitellina, concolora, carina vexillo brevior breviter denseque albo-ciliata. *Legumen* subglobosum, laeve, 8-spermum, magnit. seminis *Viciae* sativae. *Semina* pallida, flava. — A *G. aristato* distinguitur praecipue petiolo conspicuo, foliis tenuioribus minus rigidis et corolla calycem haud superante.

10. **Gompholobium Shuttleworthii** n. sp., ramulis teretibus, puberulis; stipulis obsoletis; petiolo brevissimo, foliolis 5 (raro 7 v. 3) filiformibus, obtusiusculis, submuticis, margine revolutis, laevibus, glabris; racemis terminalibus capituliformibus, pedunculatis, 3-6-floris, alabastris carinato-5-gonis; calycis lobis acutis, muticis, extus glabris, intus ad marginem pubescentibus, corolla parum brevioribus, carina minute ciliata.

In calculosi ad radices jugi montium Darling's-range (Perth) d. 17. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1178. (Drummond n. 200 et coll. 1 sine No.)

„Frutex $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ -pedalis.“ a basi ramosus, ramis erectis gracilibus satis dense ericoideo-foliosis. *Stipulae* lineares, semilineam longae, fugaces. *Petiolus* $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. longus. *Foliola* rigidula, $2\frac{1}{2}$ -5 lin. longa. *Pedunculus* communis $\frac{1}{2}$ -1 poll. longus, nudus; pedicelli apici approximati, 2 lin. longi, bractea parum brevior lineari subpersistente fulti. *Calyx* $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longus, atropurpureus (in sicco nigricans), ante expansionem ovatus breviter acuminatus, basi vix attenuata bracteolis 2 linearibus sinus attingentibus 1 lin. longis munitis, lobis obsolete 1-nerviis aestivatione valvata marginibus contiguis in carinam prominentibus, unde alabastra egregie pentagona videntur. *Petala* „rubro-purpurea“, breviter unguiculata; vexillum suborbiculare, leviter emarginatum, calyce $\frac{1}{3}$ v. vix dimidio longius, basi purpureum; carina falcato-oblonga, apice rotundato purpurea, margine superiore minute albo-ciliata, alas obtusas dimidio angustiores calycemque subaequans. *Gonitalia* glabra. *Ovarium* breviter stipitatum, 4-ovulatum, stylo filiformi falcato acuto. *Legumen* subglobosum, valvis transverse tenuissime venulosis, suturis obsoletis. *Semina* (immatura) ovalia, pallida, funiculis vix 1 lin. longis. — Accedit ad *G. glabratum* DC. (Sieber n. 362!) sed foliolis fere teretibus, inflorescentia maximeque calyce angulato abunde distinctum.

11. **Gompholobium viscidulum** n. sp., ramis subangulatis, glabris, glutinoso-viscidulis; stipulis obsoletis; foliis pinnatis, petiolatis, jugis distantibus; foliolis 5-9 filiformibus, apice obtusiusculo mutico subuncinatis, margine revolutis, laevibus, glabris v. parce ciliato-pilosiusculis; floribus terminalibus, solitariis, breviter pedunculatis, alabastris sub-5-gonis; calyce mutico, glabro, dimidiam corollam aequante, carina nuda?

In glareoso lapidosis ad latera collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1196.

Praecedenti habitu, foliorum florumque forma et magnitudine et legumine simillimum, sed notis indicatis, praecipue foliorum rhachi 3-4 lin. longa,

foliolorum jugis lineam ab invicem distantibus inflorescentiaque facile distinguendum. A *G. uncinato* Cunn. differt foliis pinnatis petiolatis, foliolis duplo longioribus minus uncinatis, floribusque. — „Frutex sesquipedalis, foliis viscosis.“

12. **Gompholobium venustum**, *R.Br.*, DC. prodr. 2. p. 106, n. 11. (non Reichenb. ic. exot. 1. p. 54, t. 76, quae certe ad *G. pinnatum* Sm. spectat!)

In solo torfoso-arenoso inter frutices densos planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1102.

„Flores incarnati.“ *Calyx* dimidiam corollam superans, brevissime acuminatus. *Legumen* subglobosum, pisi magnitudine, brevissime stipitatum, glabrum.

13. **Gompholobium tomentosum** *Labill.* Nov. Holl. 1. p. 106, t. 134! DC. l. c. n. 9. Bot. Reg. t. 1474.

In arenosis circa oppidum Perth, d. 20. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1198. (Drummond No. 202.)

„Frutex 1-3-pedalis. Flores sulphurei.“

14. **Gompholobium Preissii** *n. sp.*, molliter laxaque pilosiusculum, stipulis minutis; foliis pinnatis, 6-8-jugis, rhachi longiuscula, foliolis anguste linearibus, margine revolutis, acutiusculis v. minute mucronulatis, apice paulo dilatatis saepiusque recurvis, punctato-scabriusculis, terminali caeteris brevior saepius latiore obtusoque; capitulis terminalibus 3-1-floris, sessilibus, foliis superatis, floribus breve pedicellatis; calyce piloso, corollam dimidiam superante, lobis breve setaceo-acuminatis, carina imberbi.

In solo subturfoso-arenoso inter frutices ad Stirling'sterrace, m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1194. (Drummond n. 201.)

Praeter notas indicatas praecedenti simillimum. — „Frutex 1-2-pedalis, strictus.“ Specimina Drummondiana fruticosa, semipedalia; Preissiana vero herbacea? digitalia, radice simplici, caule a basi diffuse ramoso. *Stipulae* subulatae, $\frac{1}{2}$ -1 lin. longae. *Folia* subsessilia, plerumque 14-foliolata, rhachi 3-7 lin. longa, foliolis jugorum superiorum 3-6 lin. longis $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ lin. latis, infimorum et terminali (apice saepe 1 lin. lato) dimidio brevioribus, plerisque propter mucronulum minutum recurvum obtusa mentientibus. *Flores* paulo minores, sed (in sicco saltem) ejusdem coloris ac *G. tomentos*.

15. **Gompholobium Knightianum** *Lindl.* in Bot. Reg. t. 1468! Walpers repert. 1. p. 568: glabrum, foliis petiolatis; foliolis 3-15, subrotundis obovatis ovatis linearibusque, mucronatis; cymulis terminalibus, pedunculatis, foliorum longitudine.

G. heterophyllum Cunn. in *G. Don* gen. syst. 2, p. 118.

In limoso-arenosis montis Bakewell (York) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1104. et in subarenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. No. 1103. (Drummond n. 220. et coll. I. sine No.)

„Suffrutex $\frac{1}{2}$ -1-pedalis.“ Flores et legumina *G. venusti*, paulo tantum minora.

Subtribus II. *Pultenaeae*, Benth. in Hügel Enum. p. 30;
Ann. Wien. Mus. II, p. 73.

BURTONIA R.Br. Endl. gen. n. 6423. Meisn.
gen. p. 81. (58.)

I. Folia trifoliolata; pedicelli axillares, ad apicem ramorum
glomerati, Benth. l. c.

1. **Burtonia scabra** R.Br. DC. prodr. 2, p. 106, n. 1.

In solo turfoso-arenoso circa oppidum Albany (Plantagenet) d. 21. Sept., et floribus albis d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1177.

„Frutex 3-pedalis.“ Flores interdum albi. Legumen subglobosum, pubescens, magnit. nuclei cerasini.

2. **Burtonia pulchella** n. sp., ramis laevibus, apice puberulis, mox glabris; foliolis laevibus, glabris, angustissime linearibus, obtusis, muticis, rectis, margine revolutis; pedunculis axillaribus, folio brevioribus, calycem aequantibus, basi medioque 2-bracteolatis, calycis lobis margine intus pilosiusculis.

In arenosis sylvae inter oppida Perth et Guildford, d. 28. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1173. (Drummond n. 199.)

Praecedenti simillima, sed distincta glabritie, foliolis laevibus obtusioribus, vix ac ne vix uncinatis, perfecte sessilibus, basi haud angustatis, et legumine plus dimidio minore, glabro. — „Frutex 2-pedalis, strictus. Flores roseo-violacei.“

3. **Burtonia villosa** n. sp., ramis foliis calycibusque breviter villosis; foliolis breviter petiolulatis, lineari-subulatis, obtusiusculis, muticis, margine revolutis, demum glabrescentibus punctato-scabris; pedunculis axillaribus, folia subaequantibus, calyce brevioribus, basi medioque bracteolatis.

In subarenosis sylvae prope montem Wuljennup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1172.

Facies *B. scabrae*, sed facile distinguenda ramorum foliorumque pubescentia fortiore et longiore, foliis paulo crassioribus brevioribusque, 4-5 lin. longis (in illa saepius 6-7 lin. longis) nunquam uncinatis, floribus majoribus (pro genere maximis, speciosis) calyce 4 lin. (in illa vix 3 lin.) longo extus undique sed breviter subsericeo-villoso. — „Frutex 6-pedalis.“ *Calyx* viridis, ultra medium 5-fidus, lobis oblongo-lanceolatis acutis aequilongis, superioribus 2 paululum latioribus et altius connatis. *Vexillum*, amplum 6-7 lin. longum et paululum latius, suborbiculare, emarginatum, persicinum, basi medio luteum; ungue sesquilineam longo; *alae* parum breviores, obovato-oblongae, persicinae, basi luteae et utrinque breviter auriculatae; *carina* alis paulo brevior, obovata, acutiuscula, carnea, apice purpurascens, margine superiore recto, inferiore valde curvato. *Filamenta* filiformia, glabra, rufa, pistillum aequantia, carinam subsuperantia, antheris oblongis. *Stylus* inferne valde dilatatus, compressus, margine superiore ciliatus, apice filiformis glaber, stigmatibus subcapitato minuto glabro. *Legumen* *B. scabrae* (insecti cujusdam e Hymenopterorum ordine exuvias includens: semina destructa).

II. Folia simplicia, sparsa; corymbi terminales. Benth. l. c.

4. **Burtonia conferta** DC. prodr. 2, p. 106, n. 4. Benth. in Hüg. enum. p. 30. Bot. Reg. t. 1600.

In arenosis sylvae cis oppidum Guildford et ad radices jugi montium Darling's-range, d. 17. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1174; in arenosis inter frutices humiles vallis prope Two peopled Bay No. 1175. et clivuli ad portum Princess Royal Harbour No. 1176. nec non ad promontorium Cape Riche No. 1179. m. Nov. 1840. (Drummond n. 197, 198 et coll. I sine No.)

„Frutex 1-2-pedalis. Folia interdum No. 1176. purpurascentia. Flores No. 1175. coerulei.“ — Variat foliis 3-10 lin. longis, nunc tenuiter filiformibus, nunc crassioribus, corymbis laxiusculis contractisque, pedicellis 3-10 lin. longis. *Legumen* globosum, magnit. pisi, glabrum.

5. **Burtonia diosmaefolia** Benth. in Hügel enum. p. 30, n. 82; Ann. Wien. Mus. 2, p. 73. Walpers rept. 1, p. 569: foliis confertis, oblongo-linearibus lanceolatisve, obtusis, crassis, carinatis ramisque glabris; floribus capitato-corymbosis, calycibus leguminibusque pilosissimis.

In solo turfoso-arenoso prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 13. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 857. et in limoso-arenosis sylvae ad fluv. Avon, 10 mill. ab oppido York, d. 10. Sept. 1839. No. 858.

„Frutex 1-sesquipedalis. Vexillum flavum, alae carinaque rubro-purpureae.“

β **glabrescens** nob., pedicellis calycibusque glabrescentibus glabrisve.

In arenosis ad Sinum Regis Georgii III., d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 883.

6. **Burtonia? tenella** n. sp., glaberrima; caulibus prostratis, gracillimis, ramosissimis, ramis filiformibus; foliis angustissime linearibus, acutis, subcarinatis; corymbis 3-1-floris, floribus parvulis; calyce profunde 5-partito, lobis setaceo-linearibus aequalibus; legumine subsessili, lanceolato, compresso, tenuiter marginato, parce adpressequ pilosiusculo.

In arenosis inter frutices prope oppidum Perth, d. 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 878.

An novum genus? Praeter habitum tamen et praecipue leguminis formam cum *Burtoniae* characteribus bene convenit. — „Suffrutex prostratus.“ Caulis sesquipedalis et ultra, a basi inde ramosus, penna corvina vix crassior, teres, laevis; rami multo tenuiores, filiformes, internodiis 2-4 lin. longis (in caule saepe duplo longioribus.) *Folia* sparsa, simplicia, exstipulata, semipatentia, 2-4 lin. longa, vix $\frac{1}{3}$ lin. lata, complicato-canaliculata, rigidula, acuta, margine sub lente parce punctato-scabriuscula. *Pedicelli* terminales gemini, rarius terni v. solitarii, 2-4 lin. longi, subaequales, erecti, nudi v. infra medium bracteolis 2 oppositis setaceis fugacissimis muniti. *Flores* vix 3 lin. longi. *Calyx* corolla circ. $\frac{1}{3}$ brevior, viridis, fere regularis, lobis lineari-setaceis erectis carinatis basi paululum dilatatis tubo turbinato duplo longioribus, infimo caeteris paulo longiore, sinibus acutiusculis extrorsum in denticulum exiguum saepe sphacelatum plicato-prominulis. *Petala* lutea, brevissime unguiculata; vexillum ovatum, obtusum, integrum; alae carinaque aequales; rectiusculae, oblongae, obtusae, supra basin vix auriculatae, vexillo parum breviores. *Filamenta* libera, glabra. *Ovarium* subsessile, sericeo-pubescent, 2-ovulatum. *Stylus* capillaris, incurvus, glaber, ovario

longior, basi vix dilatatus, stigmatе acutiusculo. *Legumen* brevissime stipitatum, 3-4 lin. longum, 1 lin. latum, lanceolatum, rectum, breviter acuteque acuminatum, pilis brevibus adpressis parce conspersum, valvis parum convexis, suturis tenuibus nerviformibus. *Semina* estrophiolata (immatura).

JACKSONIA R.Br. Endl. gen. n. 6434. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Jacksonia floribunda** Endl. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 197; nov. stirp. decad. 1. p. 76, n. 87. Walpers rep. 1. p. 569: ramulis sterilibus compressis (phyllodia referentibus) oblongis, basi cuneatis, sinuato-dentatis, utrinque venosis glabris; floribus racemosis, calycibus sericeis corolla longioribus; legumine stipitato.

In arenosis supra oppidum Guildford (Perth) d. 20. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 811 et 812.

„Frutex 2-4-pedalis, erectus.“

J. densiflora Benth. in Lindl. Swan River p. XIII., n. 44, ab hac vix satis distincta videtur.

2. **Jacksonia alata** Benth. in Hügel enum. p. 30, n. 83; Ann. Wien. Mus. 2, p. 74. Walpers l. c., ramis ramulisque subangulatis, bialatis, inermibus, apice sericeis; floribus subsessilibus, racemulosis; calycibus corolla longioribus sericeis; legumine sessili.

In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond (coll. I, sine No.)

Ramuli stricti v. rarius hinc inde obsolete flexuosi, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. lati. *Calyx* basi minute bibracteolatus, nec (ut a cl. Benthham describitur) ebracteolatus.

β **flexuosa** nob., ramulis egregie flexuosis, compressissimis, foliaceo-bialatis (1-2 lin. latis.) — An distincta species? — sed praeter notam indicatam omnia *J. alatae*.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1119. (Drummond n. 193 et coll. I, sine No.)

3. **Jacksonia Sternbergiana** Hügel Bot. Archiv t. 3! Benth. l. c. n. 84. Walpers l. c., ramis laxе divaricatis; ramulis alternis, angulatis, glabriusculis, apice spinescentibus; floribus lateralibus, laxе racemosis; legumine longiuscule stipitato, ventricosо.

In arenosis ad fluv. Cygnorum, d. 16. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1076. (Drummond coll. I.)

„Aboriginibus *Käbbur*. Frutex 4-12-pedalis, ramis pendulis.“ *Ramuli* steriles ultimi 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicares, stricti, pungentes. „*Flores* aurantiaci.“ *Calyx* ante expansionem 4 lin. longus, obovato-oblongus, brevissime acuminatus, teres, (sepalorum marginibus inconspicuis vel obsoletissime prominulis) glaber. *Stamina* aptera! *Ovarii* stipes $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ lin. longus.

β **puberula**, nob., summitatibus calycibusque (leviter 5-costatis) minute sericeo-puberulis (pedicellis interdum vix 2 lin. longis.) — An species distincta? (Vidimus specimen unicum, insufficiens.)

In porrectis arenosis sylvae prope Bassandeen ad fluv. Cygnorum, d. 23. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1072.

„Frutex 2-pedalis.“

γ **filicaulis nob.**, glaberrima, ramis ramulisque tenuissimis, angulato-filiformibus (vix $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ lin. crassis) debilibus. — An n. sp.?

In colonia ad fl. Cygnorum legit Drummond, No. 260.

4. **Jacksonia sericea Benth.** l. c. n. 85. Walpers l. c.: ramulis brevissimis spinescentibus ramisque angulatis pubescentibus; floribus solitariis geminis v. subracemosis, bracteolis infra apicem pedicelli, calycibus sericeis; legumine brevissime stipitato, ventricoso.

In arenosis inter frutices ad lacus prope Woodman's point (Perth) d. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1158.

„Frutex adscendens, divaricatus.“

5. **Jacksonia gracilis n. sp.**, ramis teretibus, striatis ramulisque angulatis gracillimis minute cano-puberulis, sterilibus indivisis inermibus; floribus laxe racemosis, subsecundis, pedicellis calyce dimidio brevioribus infra apicem bibracteolatis; calycis sericei lobis tubo triplo longioribus, linearibus, brevissime acuminatis, erectis; ovarii villosi stipite calycis tubum parum superante.

In arenosis circa oppidum Perth, d. 29. Nov. 1839.

„Aboriginibus *Waljumei*. — Frutex decumbens.“ — An *J. sericea* var.? Differt tamen ramis gracilioribus, minus acute angulatis, inferne teretibus, ramulis subfiliformibus debilibus fere omnibus floriferis, sterilibus abbreviatis spinescentibus vix ullis, floribus paululum majoribus, 4 lin. longis (in illa 3 lin. longis) magis sericeis, calycis laciniis demum egregie convolutis vix $\frac{1}{4}$ lin. latis. *Filamenta* aptera. *Legumen* non suppetit.

6. **Jacksonia dumosa n. sp.**, tota subsericeo-puberula; ramis teretibus, striatis, junioribus angulatis, sterilibus ditrichotomis indivisisve mucronato-pungentibus; floribus ad ramulorum apicem racemosis, majusculis; pedicellis calyce quadruplo brevioribus, apice v. medio bibracteolatis; calycis lobis semierectis; ovarii villosi stipite calycis tubo brevissimo duplo longiore.

In arenosis ad fluv. Cygnorum, d. 13. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1081. in calcareo-arenosis district. Wellington, m. Dec. 1839. No. 1069. in solo sublimoso distr. Hay, m. Oct. 1840. No. 1070. et in solo humoso ad ostium fl. King'sriver (Plantagenet) d. 25. Nov. 1840. „Frutex 2-3-pedalis. No. 1071.“

β **glabrata**, ramis ramulisque (tenuibus, plerumque divaricato-2-3-fidis rigidis) glabratissimis, floribus sericeis.

„In Australia occidentali“ Herb. Preiss. No. 1075.

„Frutex 12-18-pedalis,“ ramosissimus, ubique (v. in β calyce tantum) eodem modo puberulus ac *J. sericea* et *gracilis*, ramis validis, strictis, ramulis sterilibus erectis v. demum squarroso-divaricatis, compresso-angulatis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ lin. latis, in mucronem spinescentem rectum fuscum excurrentibus, nunc valde rigidis spiniformibus, nunc tenuioribus vix rigidis, forma et magnitudine variis, 3-12 lin. longis, aliis indivisis, aliis furcatis v. bis bifi-

Fuchsia Ruarsiana. Lindm.

Fragmenta vidi plantae
e femine in Australia selice
colleto cultae a H. Ru-
arsia communiat. v. 1872.
Stenuburgiana n. 11. 11. 11. 11.
max. cognatae. Hb. St. 750.



dis trifidisve, crure medio indiviso, lateralibus 2-3-fidis. *Flores* „aurantiaci“, magnitudine et forma fere *J. Sternbergianae*, sed pedicelli multo breviores et calyx extus sericeus ante expansionem subpentagonus, lacinii vix acuminatis. *Ovarii* fulvo-villosi stipes $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longus. — Valde accedere videtur ad *J. furcellatam* DC., quae discrepat ramulis inermibus omnibus (?) furcellatis. A *J. gracili* et *sericea* distinguitur floribus circ. $\frac{1}{3}$ majoribus, calycis lobis latioribus planisque et praecipue ramulis sterilibus plerumque 2-3-fido-ramosis; a *J. spinosa* denique, cui ramulorum sterili forma proxime accedit, differt ramis pubescentibus, floribus plus duplo majoribus et ovario longius stipitato *).

7. **Jacksonia spinosa** R.Br., DC. prodr. 2, p. 107, n. 2. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 74. — *Gompholobium spinosum* Labill. Nov. Holl. 1, p. 107, t. 136! (Lam. ill. t. 949, f. 4.)

In clivulis arenosis ad sinum Two-peopled Bay, d. 23. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1074.

„Frutex 3-4-pedalis.“ *Rami* ramulique glabri, juniores tantum minutissime puberuli. *Flores* paululum minores quam in icone citata et *legumen* subfalcatum. De identitate tamen vix dubitandum.

8. **Jacksonia horrida** DC. l. c. n. 3. Benth. l. c.

In arenosis circa oppidum Albany (Plantagenet) d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1080.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* validi, fortiter costato-angulati, apice acute triquetri, pube brevi cano-villosi v. demum glabri; steriles folia simulantes, crasse coriacei, rigidissimi, $\frac{1}{2}$ -fere $1\frac{1}{2}$ lin. lati, in mucronem rectum fuscum abeuntes, trifidi (raro indivisi) cruribus plerumque semipollicaribus lanceolato-linearibus nervo excentrico valido subtus carinatis quasi triquetris, lateralibus divaricatis saepe furcatis. *Flores* fere *J. dumosae*, sericei. *Calyx* 4 lin. longus, pedicello fere duplo longior; lobis planis, brevissime acuminatis, corollam parum superantibus, demum reflexis. *Petala* subaequilonga, vexillo alisque aurantiacis, carina purpurascente. *Filamenta* aptera. *Ovarium* villosum, stipite calycis tubum superante circ. 2 lin. longo. *Legumen* oblongum, turgidum, 4-5 lin. longum, arcuatum, puberulum v. demum glabrescens, intus minutissime puberulum, epicarpio ab endocarpio demum facile secedente.

9. **Jacksonia capitata** Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 74, n. 9. Walp. l. c.: ramis ramulisque inermibus, aphyllis, teretibus, striatis, subglabris; floribus ad apicem ramorum capitato-corymbosis; calycibus pubescentibus, corollam aequantibus, sub-5-partitis.

In solo sublimoso-glareoso district. Peel; m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1078.

*) Ejusdem affinitatis nova sp. est: **J. hakeoides** nob., ramis ramulisque teretibus, leviter striatis, demum glabris, sterilibus rigidis 2-3-fidis, cruribus divaricatis pungenti-acutis mucronatisve plerumque iterum 2-3-fidis; floribus ad apicem ramulorum racemosis; pedicellis calyce triplo brevioribus, prope apicem bibracteolatis; calycis extus fulvo-villosi lobis breviter acuminatis, patulis; ovarii villosi stipite calycis tubum brevissimum vix superante. In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond, n. 261. Species insignis, a praecedentibus distincta praecipue ramis ramulisque (immo sterilibus) teretibus v. vix ac ne vix compressiusculis $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. crassis (duplo crassioribus quam *J. dumosae*) leviter v. obsolete sulcato-striatis (folia **Hakearum** et **Petrophilarum** quarundam imitantibus.) *Flores J. dumosae*, calyce tantum pube longiore et laxiore villosiusculo.

„Suffrutex vix pedalis,“ caespitoso-multicaulis, caulibus ramisque erectis v. adscendentibus, debilibus, filiformibus, levissime striatis, subsericeo-incanis, demum glabratis. *Capitula* plerumque 3-flora, pedicellis vix lineam longis bractea minuta ovata acuta fusca suffultis. *Calyx* $2\frac{1}{2}$ lin. longus, basi adpresse bibracteolatus, sericeo-villosus, profunde 5-partitus, lobis linearibus planis breviter acuminatis semipatentibus. *Filamenta* aptera. *Ovarium* subsessile.

10. **Jacksonia restioides** *n. sp.*, aphylla, ramis ramulisque inermibus, teretibus, leviter sulcato-striatis, subsericeo-incanis, demum glabrescentibus; racemis terminalibus, laxe paucifloris; floribus majusculis, subsecundis, brevissime pedicellatis; calyce sericeo-villoso, basi valde attenuata bracteolis 2 lanceolatis cuspidatis adpressis munito, 5-partito, lobis lanceolatis acuminatis erecto-patulis vexillo brevioribus alas carinamque superantibus, filamentis apteris, ovario stipitato.

In arenosis sylvae prope praedium rusticum Dom. S. Moore ad fl. Cygnorum, d. 14. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1079. (Drummond n. 263.)

„Suffrutex 1-1 $\frac{1}{2}$ -pedalis, praecedenti similis, sed statura altiore, robustiore, ramis distinctius striatis, inflorescentia et praecipue floribus duplo majoribus (5-6 lin. longis) distantibus in pedicellum 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longum sensim attenuatis bene distinctus. *Calyeis* lobi tubo infundibuliformi vix longiores. *Vexillum* suborbiculare, emarginatum, aurantiacum; alae falcatae, flavae, carina purpurea ventricosa obtusa paulo longiores. Cyathulus perigynus plus dimidio calycis tubo adnatus ovarii stipitem aequans, fere 2 lin. longus, margine staminifer. *Ovarium* intus puberulum.

11. **Jacksonia Lehmanni** *Meisn.* aphylla, inermis, ramis ramulisque teretibus, profunde sulcatis, saepe incurvis, junioribus pubescentibus, mox glaberrimis; floribus lateralibus sparsis v. laxe racemosis, majusculis, pedicellis, calycem subaequantibus medio 2-bracteolatis, alabastris incurvo-rostratis; calyce adpresse puberulo, lobis lanceolatis acuminatis corollam superantibus, petalis subaequilongis, filamentis apteris, ovario stipitato.

In arenosis planitiei prope praedium rusticum Maddington ad fluv. Canning, d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1077. (Drummond No. 262.)

„Frutex pedalis,“ habitu florumque magnitudine et forma praecedenti similis, facile tamen distinguendus ramis fortiter sulcatis, fere angulatis, sterilibus nonnunquam subdichotomis aut flexuosis, nonnisi prima juventute pubescentibus; pedicellis circ. 4 lin. longis, medio (nec apice) bibracteolatis, alabastris egregie acuminatis; calycis pube brevissima vix sericea, tubo attenuato lobis triplo brevior ovarii stipite breviter superato. — Specimen Drummondianum nobis obvium (imperfectum) paulo recedit ramis plerisque minus profunde sulcatis, pedicellis dimidio fere brevioribus et alabastris 5-gonis.

DAVIESIA Sm. Endl. gen. n. 6435. Meisn.
gen. p. 81. (58.)

1. **Daviesia juncea** Sm., DC. prodr. 2, p. 114, n. 12.
Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 75, n. 2.

In arenosis sylvae prope oppidum Perth, d. 22. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1159. in glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, d. 12. Apr. No. 1181. et in solo subturioso humido inter frutices prope montem Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840 No. 1160. (Drummond No. 237.)

„Frutex 1-3-pedalis.“ *Rami* apice saepius plus minus spinescentes. *Flores* „coccinei“ (fide Preiss in sched. No. 1160.) v. „atropurpurei, vexillo margine supra aurantiaco“ (fide Preiss in sched. No. 1159.)

2. **Daviesia divaricata** Benth. in Hügel Enum. p. 31, n. 87; Ann. Wien. Mus. 2, p. 75, n. 3. Walpers rept. 1. p. 570: glabra, ramis floriferis aphyllis, teretibus, sulcatis; racemulis lateralibus, bracteis minutis.

In arenosis sylvae prope lacum Kei-er-mu-lu vel Monger'slake (Perth) d. 16. Jan. Herb. Preiss. No. 1167. et in arenosis prope Perth d. 22. Sept. 1839. No. 1166. (Drummond No. 239, ex parte.)

„Aboriginibus *Manö*.“ — Frutex (fide sched. No. 1167.) 2-4-pedalis, erectus, — v. 10-15-pedalis (fide sched. No. 1166.) „*Vexillum* rotundatum, emarginatum, aurantiacum; *alae carinae* atropurpureae.“ *Pedicelli* apice articulati. — An *D. paniculata* Benth. l. c. satis distincta? *Rami* huic apud Hügel l. c. dicuntur „apice spinescentes“ (ut in *D. divaricata*) in Ann. Wien. Mus. l. c. vero „apice inermes.“ *Racemuli* in specimenibus nostris omnibus sunt laterales, — in *D. paniculata* vero dicuntur terminales et *rami* minus validi.

3. **Daviesia hakeoides** n. sp., glaberrima, ramis ramulisque teretibus, striatis, undique foliosis; foliis adscendentibus, rigidis, teretibus, striatis, mucronato-pungentibus, inferioribus compressis planisve linearibus; racemulis axillaribus, brevissimis, paucifloris, basi bracteis; bracteis squamiformibus, imbricatis, concavis, subpersistentibus, pedicellos subaequantibus; calycis dentibus brevissimis, carina falcata obtusiuscula.

Occurunt formae tres sequentes.

α **robusta**, foliis elongatis (2-4 poll. longis) crassioribus (diametro fere lin. 1) ramisque rigidissimis (Preiss. No. 1156.)

β **intermedia**, foliis elongatis (2-4-poll.) tenuioribus (diam. $\frac{1}{3}$ lin.) ramisque modice rigidis (Preiss. No. 1157.)

γ **gracilentia**, foliis plerisque abbreviatis (1-1 $\frac{1}{2}$ -poll., raro longioribus) tenuibus (diam. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ lin.) modice rigidis, ramis gracilibus laxis. (Drummond No. 258.)

α Inter fragmenta rupium prope Cataractam ad caput fl. Cygnorum, d. 25. Jul. Herb. Preiss. No. 1156. et β in solo sublimoso „Colonial Church Grant“ (Perth) d. 29. Jun. 1839. No. 1157. γ in colonia ad fl. Cygnor., Jac. Drummond, No. 258.

„Frutex 1-2-pedalis, erectus.“ Inflorescentia omnino *D. juncea*. *Racemi* ante expansionem strobiliformes, 2-3 lin. longi. *Bracteae* pallide

rufae, laeves, inferiores minores vix $\frac{1}{2}$ -1 lin. longae, semiorbiculares v. late ovatae, obtusae, arcte adpressae, superiores sensim majores; summae laxae, 1-2 lin. longae, obovato-oblongae, obsolete 1-nerviae, convolutae-concavae, acutiusculae (fere cochleariformes.) *Pedicelli* persistentes, apice articulati. *Calyx* rubescens? vix 1 lin. longus, corolla duplo brevior, turbatus. *Petala* rosea? vexilli centro carinaeque apice atropurpureis. *Genitalia* glaberrima. (Legumen non vidimus.) — Folia inferiora saepe perfecte plana, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora teretia v. obsolete triquetra, basi paulo dilatata sensim in ramum deliquescentia, apice in mucronem fuscum $\frac{1}{2}$ -1 lin. longum sensim excurrentia. — Proxime accedit ad *D. genistifoliam* et *collettioidem* Cunn. (Benth. in Ann. Wien. Mus. II, p. 75.) sed ab utraque foliis longioribus, racemulis brevioribus (?) et praecipue bracteis distincta. *)

4. ***Daviesia colletioides* A. Cunn., Benth. in Ann. Wien. Mus. p. 75, n. 6. Walpers rept. I. p. 570.** (sphalnate „coluteoides“) glabra, ramis rectiusculis; foliis lineari-teretibus, subenerviis, crassis, rigidis, apice spinescentibus; racemis folio subduplo brevioribus; carina subrostrata calyce vix duplo longiore.

In solo turfoso planitie prope oppidum Albany, d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1180. et in region. interior. Australiae meridionali-occid. No. 1163.

„Frutex bipedalis.“ *Folia* 6 lin. (raro 10-18 lin.) longa, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. lata, recta, patentia, basi haud incrassata, enervia et sicut rami leviter ruguloso-striata. *Pedicelli* 2-4 e rhachi brevissima v. subnulla quasi fasciculatim orti, 2-3 lin. longi, basi bracteolis exiguis patulis cochleariformibus suffulti, apice articulati, calyce subduplo longiores. *Calyx* corolla dimidio brevior, purpureus, turbatus, subpentagonus, dentibus brevibus acutis. „*Corolla* coccinea“, petalis subaequilongis, carina valde inflexa breviter obtusiuscule subrostrata apice purpurea. *Genitalia* glaberrima. *Ovarium* lanceolatum, falcatum, haud gibbum. — Specim. No. 1163. (mancum) recedit habitu robustiore, foliis saepe sesquipollicaribus, apice plerumque leviter recurvis; absque dubio tamen ejusdem speciei forma.

*) Hujus loci sunt novae species duae inter Preissianas haud obivae: ***D. Benthamii*** nob., glaberrima, ramis foliisque teretibus, leviter rugoso striatis; foliis patentibus, strictis, rigidis, mucronato-pungentibus; racemulis axillaribus, brevissimis, paucifloris; bracteis minutis, laxis, concavis; pedicellis exsertis, calycem brevissime dentatum subaequantibus, carina acutiuscula. — Swan River Drummond No. 241. Similis ***D. hakeoidi***, sed facile distinguenda foliis patentibus rectis (1-2 $\frac{1}{2}$ poll. longis, diametro $\frac{1}{2}$ lin.) basi vix ac ne vix dilatatis ramisque potius rugoso-striatis quam nervoso-sulcatis et bracteis omnibus minutis patulis. — An ***D. genistifolia*** Cunn. quoad specimen Baueriana ex ora occidentali-australi? (cfr. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 75.) At ***D. genistifolia*** ex ora orientali (secundum specimen nostra Andersoniana, cum diagnosi bene congrua) certe diversam speciem sistit.

D. chordophylla nob., glaberrima, ramis gracilibus, teretibus, acute costatis; foliis longissimis, laxis, filiformibus, sulcato-striatis, scabriusculis, breviter mucronatis v. demum muticis; racemis axillaribus terminalibusque laxis, pedunculatis, basi nudis, pedicellis basi bractea exigua acuta stipatis; calycis dentibus brevissimis obtusiusculis, superioribus 2 brevioribus obtusioribus, carina obtusa. — Swan River No. 239, ex parte, et 240. — Folia 3-9-pollicaria, diametro semilineae, incurva v. varie flexa, rarius strictiuscula, parum rigida, vix pungentia, mucrone brevissimo nigricante cito deciduo, nervis sub lente dense punctulato-scabriusculis. Racemi circiter pollicares, solitarii v. in summis axillis 2-3 fasciculati, erecti, apice tantum aut a medio inde floreri, pedunculo prope basin bractea unica vix conspicua munito; pedicelli filiformes 1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longi, nunc 1-2 lin. abinvicem distantes, nunc valde approximati et corymbum umbellaeve imitantes. Calyx turbinato-campanulatus, sesquilineam longus, corolla vix dimidio brevior, coloratus, laevis. *Petala* aurantiaca, carina apice purpurascens. *Genitalia* glabra. *Ovarium* lanceolatum, inferne gibbum.

Davidia notabilis, Sird Mueller
^{puticosa}
 In interioribus Nov. Holl. austr.
 montem M. Remarkable versus
 Primo vire: finem Spenceri versus
 D. collisoidem inter et D. Ben-
 thami videtur media, ab illa
 foliis (phyllodii?) vix crassis, ea-
 demis folio triplo brevioribus
 pedicellis brevioribus, fere lineam
 longis. Saepius calycum argenteis
 vexillam quam ultra petala
 longiare ergo corolla calyce
 plus quam duplo superiore,
 nigris ovario gelatoisiorum
 et D. Benthami
 Differt: phyllodii fere compressis
 et suspensilem etiam aliis notis
 comparanda extrinsecus.
 Corolla colore Platylobii marrobrun-
 ceo callosis utriusque. Caudicibus mope-
 rium in Crypsal. brook.
 Fructus paucis. racemosis.
 et th: primo vire.

Daviesia ulicina Smith

D. aricularis hb. M. 815 non Sm.

Varae Hallandiae (ubi?)

Var: foliis angustioribus, quam
juniperinam dicere queas.

+ Daviesia pinnatifida, Ford Mill.

~~Post Linnæum~~ Wilhelmsii. Ducco. forum
nagel. ~~Wilhelmsii~~ ^{hab. ad m. argentinum}
D. phylladi valde affinis, ex frustis legu-
miniferis praecipue differt: pedicellis
calycum vix angulatum longis adnatis
aequantibus. Fructus 3-4.
Auth: primo ore.

5. **Daviesia brachyphylla** *n. sp.*, glaberrima, foliis brevibus, crassis, rigidis, teretibus, semipatentibus, rectis, apice obtusiusculo mucrone recto pungente armatis ramisque laevibus v. obsolete rugoso-striatis; racemis axillaribus fasciculiformibus, vix folium aequantibus, paucifloris, basi minute bracteatis, pedicellis calyci subaequalibus, calycis viridis dentibus brevibus acutis, carina obtusiuscule subrostrata.

In planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. Herb. Preiss. No. 1162. et in region. inter. Austr. merid.-occ., m. Nov. 1840. No. 1161. (Drummond n. 242.)

Praecedenti adeo similis, ut pro ejus varietate brevifolia et parviflora haberi posset, attamen, ni fallor, notis indicatis specificè distincta. — „Frutex bipedalis.“ *Folia* 2-3-raro 4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. lata, saepe coerulescentia, mucrone $\frac{2}{3}$ lin. longo atrofusco recto v. raro subrecurvo. *Calyx* 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longus, sub lente punctatus, caeterum laevis v. obsolete costato-pentagonus. Legumen coriaceum, triangulare, rostratum, 6 lin. longum, 4-5 lin. latum, laeve, glabrum, valvis convexis, stipite calycem haud superante. (Caet. omnia *D. colletioidis*.)

6. **Daviesia physodes** *A. Cunn.* in G. Don gen. syst. 2, p. 125. Benth. in Hügl. Enum. p. 31, n. 89; Ann. Wien. Mus. 2. p. 75. Walpers repert. 1. p. 570., glabra, ramis rectiusculis; foliis linearibus v. subteretibus, striatis, apice spinescentibus, versus apicem saepe dilatatis et utrinque binerviis; carina subrostrata, calycem duplo superante.

In arenosis, prope oppidum Freemantle, d. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1164. in sylva et collinis prope Preston Creek (Perth) d. 28. Jul. 1839. No. 1184, 1170. locis depressis hyeme inundatis prope oppidum Perth, d. 23. Sept. et 2. Oct. 1839. No. 1165, 1169. et in rupestribus prope Preissvelli (Darling's-range) d. 16. Jul. 1840, No. 1168. (Drummond No. 236.)

„Frutex 1-5-pedalis, erectus, pruinosis.“ *Rami* teretes, rugoso-striati, apice subspinescentes. *Folia* polymorpha, saepe glauca; nunc omnia subulata, 2-8 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata, teretia, recta v. levissime recurvo-arcuata; nunc nonnulla aut pleraque compressa, linearia, verticalia, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, apice vix dilatata aut supra obtuse gibba; nunc denique (et quidem ramorum tam fertilium quam sterilium) aut omnia aut tantum inferiorum nonnulla plana, verticalia, cuneata, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 1-2 lin. lata, apice supra in processum margini superiori continuum erectum 2-8 lin. longum 1-2 lin. latum sursum attenuatum muticum, infra in angulum triangularem pungenti-mucronatum margini inferiori continuum rectum v. refractum 1-2 lin. longum producta, nervis duobus e folii basi in apicis angulum quemque excurrentibus, interstitiis venoso-rugosis, marginibus nerviformibus. *Inflorescentia* et legumen praecedentis, *flores* tantum paululum majores „miniati“, carina apice atropurpurea breviter rostrato-acutiuscula.

7. **Daviesia incrassata** *Sm., DC.* prodr. 2, p. 114.

In limoso-calculosis sylvae prope Halfwayhouse (Darlings-range) 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1150 et in asperis montis Greenmountain (Perth) 26. April 1840. No. 1155.

„Frutex bipedalis.“ *Rami* spinescentes, patentissimi. *Folia* basi lata verticaliter inserta, patentissima, 1-4 lin. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, enervia, leviter rugulosa, margine utroque v. rarius superiore solo arcuato, mucrone brevi recto pungente. *Pedicelli* solitarii, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi, basi minute bracteati, calyce colorato acute denticulato paulo longiores. *Corollae* magnitudo,

structura, color et legumen *D. brachyphyllae*. *Genitalia* glabra. *Ovarium* lanceolatum, margine inferiore gibbo, stipite calycem paulo superante*).

8. **Daviesia polyphylla** Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 58. Walpers rept. 1. p. 570: glabra, ramis inermibus, angulatis, angulis angustissime subalatis; foliis lanceolatis, leviter recurvo-falcatis v. rarius rectiusculis, marginatis, 1-nerviis v. striato-rugosis, pungenti-mucronatis, crassis, basi plus minus angustata haud decurrentibus; racemis fasciculiformibus, folio brevioribus; calyce pedicello sublongiore obsolete 5-gono; carina semilunari, antice subdilata vix rostrata, acutiuscula.

In limoso-calciosis ad latus occidentale montis Greenmountain (Perth) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1149. (Drummond No. 232, 233. et coll. 1.)

Species *D. angulatae* Benth. simillima quidem, sed notis indicatis certe distincta et facile dignoscenda. „Frutex bipedalis.“ Ramorum anguli minus prominuli, vix alati; folia dimidio breviora et pro longitudine latiora, 3-6 lin. longa, 1-2 lin. lata (in illa 6-12 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. lata) plus minus falcata, raro recta (in illa strictissime recta, rarius levissime incurvo-falcata) flores dimidio minores, calyce semilineam longo; petala subconcolora, carnea v. purpurea? (in illa rubra v. aurantiaca? vexilli medio carinaque saturatioribus) carina 2 lin. longa, extra medium latior, apice atropurpureo minus attenuata (in illa 3 lin. longa, extra medium sensim attenuata.) — A *D. incrassata* haec et praecedens species differunt ramis inermibus folisque minus patentibus.

9. **Daviesia Preissii** n. sp., glabra, ramis inermibus, teretibus, strictis v. obsolete flexuosis; foliis verticalibus, linearibus, leviter incurvis rectisve, rigidis, pungenti-mucronatis, nervoso-pluristriatis, basi nec angustatis nec decurrentibus; racemis axillaribus, brevissimis, paucifloris, pedicellis calyce longioribus; carina falcata, erostri, acutiuscula, staminibus monadelphis, legumine stipitato, acute brevirostri.

In sublimoso-glareosis prope praedium rusticum D. Hassel (Hay) m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 1153.

„Frutex 1 $\frac{1}{2}$ -pedalis,“ glaucus? *Folia* $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, 1 lin. lata, plerumque recta, rarius leviter incurvo-falcata v. apice levissime recurva, haud marginata, sed nervis 3-5 aequalibus parallelis tenuibus sulcato-striata, basi nequaquam angustata nec decurrentia, mucrone 1 lin. longo recto fusco. *Racemi* solitarii, basi minute bracteati, cum pedicellis 3-4 lin. longi. *Flores* pro genere majusculi, 4 lin. longi. *Calyx* coloratus, campanulatus, 1 $\frac{1}{2}$ lin. longus, basi attenuatus, dentibus subaequalibus acutis erectis tubo vix brevioribus. *Vexillum* luteum, late obovatum, alis parum longius; *alae* carinae, lineari-oblongae, obtusae, subrectae; *carina* purpurea, semilunaris,

*) *D. angulata* Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 57. Walpers rept. 1. p. 570: glabra, ramis 4-5 gonis, angulis hinc inde anguste alatis; foliis linearibus et lineari lanceolatis, subfalcatis rectisve, spinulentibus, validis, crassis, marginatis, laevibus v. substriatis, basi vix attenuata non decurrentibus; racemulis fasciculiformibus, folio dimidio brevioribus; calyce pedicello subbreviore, laevi; carina basi subito incurva, antice attenuata rostrata, recta, acutiuscula. In colonia Swan River legit Jac. Drummond No. 231. (Inter plantas Preissianas non occurrit.)

Caricovia latipes, ferd Mueller ^{van pa umbilica}
glabra, foliis lanceolato-pubulatis ^{ad anglicis} ~~pubulatis~~
micronatis basi latissima vorticati
decurrentibus, congruis folio dupla
brevioribus vel aequalibus, calyce
pedicellum subaequante, legumine ses-
ili vix micronata.

in fruticetis juxta Dornbey bay. Wilhelm
Species in genere quam maxime insignis
cum D. pubescens, rostrum typum formans
Folium validus densissimus ambitu glabro
ramuli 1/4 - 1' longi erecti basi foliorum
decurrentibus a ^{ca}eti. Folia divaricata
plurimae 1 - 1 1/2" longa superius pubulata at
gestata coriacea interdum paulo falcata
nervulis longitudinalibus deus striata &
more marginem superiorem nervo prominente
pinnatifida, ^{ram}ate basin circiter 3" longa latam
divaricata; parte adnata foliorum liberam
magnitudinis proaequans. Bracteolae pa-
lato-runcatae ^{ostiolae angustae} ~~angustae~~ paulisper viliola-
tibus brevissimis. Flores Legumen coriaceum
glabrum laevique ^{madidum} ~~madidum~~ triangulare
lat. angustum 4 - 5" longum 3 - 4" ^{et} ~~et~~ ^{robustum}
limina (vix ^{stam} ~~matura~~) ovata compressa su-
perius ^{in oculis} ~~in oculis~~ nigrescentibus ~~adpressis~~ varie-
gate; prophylla crassa ~~albida~~ ^{flava} ~~albida~~ ^{flava}
breviora integra legumine quater brevior.
Rath, primo m. Febr. Dec. Jan.

acuta, 1 lin. lata, alis angustioribus aequilonga. *Stamina* omnia in tubum connata! *Legumen* coriaceum, glabrum, laeve, triangulare cum rostro (lineam longo acutissimo) 5 lin. longum, 4 lin. latum, turgidulum, stipite calycem paulo superante, suturis obtusiusculis (haud nigro-marginatis) vexillari leviter convexo-arcuata. *Semina*

10. **Daviesia spinosissima** *n. sp.*, glabra, ramis terebibus, sulcatis, multifariam densissime foliosis; foliis patentissimis, crassis, rigidissimis, verticalibus, linearibus, rectiusculis, sulcato-striatis, attenuato-spinescentibus, basi lata subdecurrentibus; pedunculis axillaribus 1-floris; subsolitariis, folio dimidio brevioribus, calycem subaequantibus, calycis lobis superioribus brevissimis; carina falcata, obtusiuscula; staminibus monadelphis; ovario subsessili.

In solo glareoso inter frutices prope montem Wuljenup (Plantagenet) d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1152.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* validi, penna anserina parum tenuiores, apice subcorymboso-ramosi, de facto teretes, sed costis obtuse prominulis a foliorum basi decurrentibus quasi sulcato-multanguli, undique foliis fere spiniformibus horridi. *Folia* vix lineam ab invicem distantia, ordine spirali $\frac{3}{8}$? disposita, angulo recto patentia, recta v. levissime recurvo-arcuata, 5-6 lin. longa, ex ima basi ($1\frac{5}{4}$ lin. lata) sensim attenuata et in mucronem fuscum acutissimum $\frac{1}{2}$ -1 lin. longum excurrentia. *Pedunculi* solitarii (rarissime gemini) 2-4 lin. longi, basi minutissime bracteati. *Calyx* viridis v. subcoloratus, enervis, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longus, campanulatus, basi attenuatus, dentibus 2 superioribus brevissimis, inferioribus 3 tubo parum brevioribus lanceolatis rigidis subcarinato-complicatis sinubusque acutis. *Vexillum* *Alae* *Carina* calyce duplo longior, semilunaris, exauriculata, apice atropurpurea, infra carnea? *Stamina* omnia in tubum connata! *Legumen* (separatim sub eodem No. missum) fere praecedentis, sed erostre, rufofuscum, laeve v. obsolete venulosum, stipite calycem subaequante, suturis linea nigra utrinque comitatis, superiore recta, inferiore angulo recto rotundato curvata. *Semina*

11. **Daviesia flexuosa** *Benth.* in Hügel Enum. p. 32, n. 90; Ann. Wien. Mus. 2. p. 75. Walp. rept. 1. p. 570: glabra, ramis ancipitibus v. angulatis, flexuosis; foliis divaricatis, crassis, rigidis, linearibus, acutis, spinescentibus, sulcatis; racemis folio vix brevioribus, carina obtusa.

In turfoso-arenosis ad Stirling's terrace (Plantagenet) d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1180 ex parte.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* saepe (praecipue inferne) stricti acuteque quadranguli, superne plus minus compressi, ramuli tantum extremi vario gradu flexuosi. *Folia* verticalia, 2-5 lin. longa, apicem versus attenuata, basi vix 1 lin. lata, in ramuli angulum angustissime decurrentia. *Flores* magnit. et colore *D. polyphyllae*. *Calyx* coloratus, $1\frac{1}{2}$ lin. longus, pedicellum aequans v. paulo superans, dentibus lateralibus brevissimis obtusiusculis, infimo acuto, labio superiore truncato. *Ovarii* glabri stipes calyce brevior. *Legumen* (separatim adjacens) subcoriaceum, nitidum, glabrum, subsessile, falcato-triangulare, 8 lin. longum, 4-5 lin. latum, brevissime acuteque rostratum, sordide flavo-fuscum, nigro-punctatum, margine inferiore acuto angulo recto rotundato curvato, superiore obtuso leviter arcuato, valvis parum convexis. *Semina* oblonga, fere 2 lin. longa, turgida, nitida, sordide flavo-virentia, nigro-punctata, strophiola carnea crassa integra vix dimidio longiora.

12. **Daviesia decurrens** *n. sp.*, glabra, ramis strictis, acute triquetris; foliis verticalibus, rigidis, linearibus, rectis v. vix falcatis, pungentibus, trifariam anguste decurrentibus, tenuiter nervoso-multistriatis; racemis axillaribus folio dimidio brevioribus, pedicellis calyce subbrevioribus bracteola cochleariformi patula suffultis; calycis dentibus brevibus; carina falcata, obtusiuscula; staminibus liberis; ovario stipitato.

In arenosis sylvae prope oppidum Perth, d. 22. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1147 a. (Drummond No. 234.)

„Frutex 2-3-pedalis, erectus.“ *Rami* graciles, erecti, angustissime alato-triquetri. *Folia* 5-15 lin. longa, 1-2 lin. lata, a basi (in ramum anguste decurrente) ad apicem pungenti-mucronatum sensim attenuata, nunc strictissime recta, nunc levissime recurvo-falcata, semipatentia (vix unquam angulo recto patentia.) *Racemi* multiflori, rhachi brevissima; pedicelli circ. 1 lin. longi, bracteas calycesque subaequantes. *Bracteae* stramineae, striatae, initio imbricatae, demum patentes, inferiores sensim breviores. *Flores* magnitudine. *Ervi* hirsuti. *Calyx* coloratus, turbinato-campanulatus, labio superiore truncato, inferioris dentibus 3 triangularibus acutiusculis. „*Vexillum* rotundatum, emarginatum, planum v. subrecurvum, basi atropurpureum, apice aurantiacum; *alae carinae* (angusta) vexillo breviores, atropurpureae. *Genitalia* glabra, antherae flavae.“ *Ovarii* stipes calycem paulo superans. *Legumen* desideratur,

13. **Daviesia prionodes** *n. sp.*, glabra, ramis striatis, alato-triquetris; foliis verticalibus, rigidissimis, lanceolatis oblongisve, subrecurvo-falcatis, pungenti-acutis, basi lata decurrentibus, tenuissime striato-multinerviis; racemis axillaribus folio brevioribus; pedicellis calyce brevioribus, bractea cochleariformi patula subpersistente suffultis; calycis dentibus brevibus; carina obtusiuscula; staminibus liberis; ovario stipitato.

In limoso-calculosis jugi montium Darling's-range (Perth) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1148. et in region. interior. Australiae occidentalis, d. 12. Mart. 1840. No. 1141. (Drummond No. 235.)

An prioris var.? Differt tamen ramorum frondisque colore subglaucoviridi, foliis duplo-triplo latioribus (usque ad 4 lin. latis) semper, etsi leviter, arcuatis saepeque angulo recto patentibus, magis decurrentibus ideoque ramis latius alatis, nervis tenuioribus v. interdum obsoletis. Caet. omnino praecedentis. *Legumen* (immaturum) 4 lin. longum latumque, fere aequilatero-triangulari, obtuse rostratum, marginibus a basi angulo recto divergentibus, superiore leviter gibbo-convexo, inferiore in angulum obtusissimum deorsum valde producto.

14. **Daviesia quadrilatera** *Benth.* in Lindl. Swan River p. XIV, n. 59. Walpers rept. 1. p. 571: glabra, glauca, ramis teretibus; foliis verticalibus, oblongo-quadrilateris, planis, angulo inferiore affixis, angulo superiore interiore rotundato, exterioribus spinescentibus, superioris spina sursum, inferioris deorsum tendente; racemulis folio sublongioribus.

In regionibus interioribus Australiae occidentalis fragmentum sterile Herb. Preiss. No. 1139. (Drummond No. 228.)

x *I. mimosaoides*. HBK.! In collibus Loftij-
rouge dictis frequenter hb. A. 219. hb. 724.
In collibus Lepidosis minus parti-
libus et montium Dryli-range
alibique. Invenitur Var. 1848.
Frutex nudum unum vel plures
albus striatus. Flores aliquando
fragrans. Fluitans - rouge!

Tota glaberrima. *Folia* $\frac{1}{2}$ -1-pollicaria, 2-4 lin. lata, nervosa. *Racemi* 6-8-flori, pedunculati, subumbelliformes, pedicellis valde approximatis 1-2 lin. longis basi minute bracteatis. *Flores* praecedentibus dimidio majores. *Calyx* viridis, turbinatus, basi attenuatus, subcostato-pentagonus, dentibus brevissimis latis acutiusculis. *Petala* carnea? *vexillum* calyce plus duplo longius; *carina* latiuscula, subacuta, apice purpurascens. *Filamenta* libera. *Ovarium* lineare, infra gibbum, stipite calycem superante, stylo capillari longiusculo. Legumen non vidimus.

15. **Daviesia pedunculata** Benth. l. c. n. 60. Walpers l. c. p. 571: humilis, ramis subteretibus, pubescentibus; foliis oblongis, utrinque attenuatis, spinescentibus, glabris; pedunculis folio pluries longioribus, apice umbelliferis.

In limoso-arenosis inter frutices ad radices jugi montium Darling's-range (Perth) d. 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1043. (Drummond No. 229.)

β **minor nob.**, foliis linearibus, inermibus, brevissime mucronulatis, subnerviis, aveniis, pedunculum aequantibus v. subsuperantibus, umbellis 2-3-floris.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberuphills (Kent) d. 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1154.

"Frutex procumbens v. ascendens." *Rami* ramulique glaberrimi, v. in β minutissime puberuli. *Folia* $\frac{1}{2}$ -1-poll. longa, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. (in β 1- $1\frac{1}{2}$ lin.) lata, brevissime petiolata, 1-nervia, pennivenia. *Pedunculi* 1- $1\frac{1}{2}$ -pollicares, tenues, sparse minuteque bracteati; pedicelli 4-6, umbellati, basi bracteis minutis cincti, 2-3 lin. longi, apice articulati, subpersistentes. *Calyx* coloratus, basi attenuatus, labio superiore subintegro, inferioris dentibus 3 brevibus acutis. *Petala* carnea? *carina* latiuscula, erostris, subacuta. *Filamenta* libera. *Ovarii* glabri stipes calyce brevior. *Legumen* (in α ignotum) in β parvum, subsessile, mucronatum, valvis parum convexis*).

16. **Daviesia nudiflora** n. sp., glabra, ramis inermibus, teretibus, apice subangulatis comosis; foliis horizontalibus, sessilibus, rigidis, lanceolatis, pungenti-acuminatis, basi valde attenuatis, planis, tenuiter marginatis, 1-nerviis, utrinque penniveniis; pedunculis axillaribus v. folii rudimento spinuliformi suffultis, unifloris, folio multo brevioribus,

* **D. Drummondii** n. sp., glabra, ramis inermibus, strictis, acute triquetris; foliis sessilibus, horizontalibus, rigidis, elliptico-lanceolatis, planis v. complicatis, submarginatis, apice subrecurvo mucronato-spinescentibus, 1-nerviis, aveniis, marginibus nervoque in rami angulos decurrentibus; pedunculis axillaribus solitariis, 1-floris, folio dimidio v. plus brevioribus, calycis labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus 3 brevibus acutis; *carina* falcata, angusta, obtusa; filamentis liberis; ovario subsessili glabro. — Swan River, James Drummond n. 227. — *Folia* 3—6 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, utrinque aequaliter attenuata, laevia v. subinde obsoletissime pennivenia, marginibus subincrassatis fere nerviformibus apice in mucronem fuscum pungentem fere lineam longum excurrentibus basi in rami costam deorsum deliquescentem productis, nervo medio subtus conspicuo apicem versus saepe evanescente basi magis prominulo et cum rami angulo (acuto quidem, nec tamen unquam alaeformi) continuo. *Pedunculi* constanter solitarii, 2-3 lin. longi, supra medium articulati, apice vix in crassati, basi minute bracteati, bracteis paucis obtusis concavis patulis vix $\frac{1}{2}$ lin. longis. *Calyx* sesquilineam longus, corolla duplo brevior, coloratus, laevis, basi breviter et abrupte attenuatus, dentibus vix $\frac{1}{2}$ lin. longis. *Petala* carnea v. aurantiaca? *vexilli* basi *carinae*que apice purpureis. Legumen non vidimus.

laxiuscule pluribracteatis, sursum incrassatis, persistentibus; calycis dentibus brevibus, acutiusculis; carina valde incurva, acuta, subrostrata; legumine subsessili.

In arenosis sylvae prope Kei-er-mu-lu v. Monger'slake (Perth) d. 16. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1143. (Drummond n. 226.)

„Frutex 2-pedalis, erectus.“ *Rami* inferne tenuiter sulcati, apice corymboso-ramosi, ramulis erectis gracilibus rectis hinc inde (praecipue ad pedunculorum basin) spinula subadpressa 1-2 lin. longa fusca (folio abortivo) praeditis, apice foliosis. *Folia* perfecta 1-2½-pollicaria, 3-6 lin. lata, coriacea, pallide viridia, erecta, utrinque aequaliter angustata, recta, plana v. subcomplicata, apice spinescente recto fulvo valde pungentia, venis tenuibus copiosis nervoque medio subtus magis prominulis. *Racemi* totam fere ramulorum partem aphyllam et subinde axillam unam alteramve summitatis foliosae occupantes, solitarii, erecti v. patuli; pedunculus communis vix 1-2 lin. longus, bracteis pluribus spathulatis obtusis laxis fulvis dense obsitus, transiens in pedicellum unicum 2-3 lin. longum basi filiformem pallidum sursum sensim incrassatum et nigricantem (⅓ lin. crassum) cum calycis basi indistincte articulatum persistentem, apice post floris lapsum truncato. *Flores* magnitudine et forma *D. Drummondii*, *carina* tantum apice magis attenuata et hamato-inflexa. *Filamenta* libera. *Legumen* glabrum 6-7 lin. longum, brevissime acuminatum, suturis tenuibus nerviformibus, superiore recta, inferioris angulo recto rotundato, valvis planis v. subconvexis laevibus v. tenerrime venosis. — Species insignis, a *D. Drummondii* distincta ramis teretibus, foliis angustioribus rectis venosis, ad pedunculorum basin abortientibus, pedicellis incrassatis, carinae forma, caet. — Accedit quoque ad *D. umbellatam* Sm., quae ex ic. Labill. N. Holl. t. 137. differt: ramis apice spinescentibus, foliis angustioribus, pedunculo duplo longiore apice 3-floro, pedicellis haud incrassatis, caet.

17. **Daviesia daphnoides** n. sp., glabra, glaucescens, ramis teretibus apice ramulisque angulatis; foliis horizontalibus, subsessilibus, coriaceis, lanceolatis, utrinque attenuatis, mucrone brevi pungentibus, nervo venisque obsoletis; racemis axillaribus brevissimis, laxe paucifloris, minute bracteatis; calyce basi attenuato, pedicello longiore; carina obtusiuscula.

In planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1144. (Drummond n. 225.)

Praecedenti primo vultu, praecipue foliorum forma et magnitudine, similis, sed bene distincta: ramis apice acute triquetris v. subancipitibus, foliis brevius mucronatis, nervo venisque utrinque subimmersis multo minus conspicuis, et inflorescentia. — „Frutex 2-3-pedalis.“ *Racemi* 2-4 lin. longi, 3-5-flori, pedunculo tenui, pedicellis sparsis ½-1 lin. longis basi bractea exigua concava patula fultis. *Flores* praecedente paulo minores, rubri v. aurantiaci? calyce basi magis attenuato. *Legumen* desideratur.

18. **Daviesia horrida** Preiss mss., n. sp., glabra, ramis teretibus, apice ramulisque aphyllis, spinescentibus, rigidissimis, corniformibus, simplicibus v. divaricato-2-3-fidis, squamula minuta suffultis, inferioribus foliosis: foliis horizontalibus, coriaceis, planis, lanceolatis v. linearibus, pungentibus v. demum inermibus obtusis, 1-nerviis, obsolete venosis; racemis e ramulis aphyllis lateraliter ortis, brevibus, laxe sparsifloris bracteatisque, calyce acute dentato, ovario subsessili.

Dorus Alnus Jan. pub. Capella ex Bro.
aurantia

x *D. umbellulata* ! Smith. *D. angustifolia* Db.

D. umbellata Labillardiere !

Port. Philipp. ! Joiss. V. 1. *D. ulirina* hb. St.

Lofty range ! Calyais laciniae glandulosa.
221.
fimbriolatae, folia subtus pubescentia. frequentes
invenitur floribus flavis, ad riv. St. Pauli (12

D. fruticosa ~~fruticosa~~ ^{prostrata} ramis hispida;
folia subtus pubescentibus. Vix distincta
species, praeter notas datas etiam tem-
pore florificationis minus duas serione
uliorum ! Lofty-range ! hb. Spec. 200.

D. angustifolia Candolle. Lofty-range,

Barossa-range, Beryl-range, in val-
libus et montibus - vire 1845. -

Ad urbem Launceston, Tarn, hb. St. J.

Fr. 72, fr. 1-2' (*D. ulirina* St. nov. Sm.)

Frutis erust - 5' Corolla aurantia.

purpurea, fundo obscura. (atro-ignea)

nam *D. umbellulata* Nov. Holl. et
quae *Saxmanniae* et *nostra* hanc *St. Pauli*
habent *dispositi* *quadrantes* *hanc* *auri* *quae* *St. Pauli*
folia *aurantia* *nostra* *hanc* *St. Pauli*

D. umbellulata hb. St. J. Fr. 72.

aut speciem propriam (habitu du-
plo majore floribus, corollis magis
tuberculatis vix ulla alia nota
distinguendam) praebet aut prius
formam normalis Smithianam
appet

Fr. 5-4' ad fl. South Esk river, hb. St. J.

Fr. Oct. 25. 1845.

x *D. divaricata* Griseb.

validior, ramulis horizontalibus
patentibus, foliis latioribus,

In convallibus super saxosis petraeas
prope portum agnorum hb. St.

J. 606. 4-5' alt. Nov. 49.

In regionibus interior. Australiae meridionali - occidentalis m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1142. et in limoso-arenosis ad latus montis prope cataractam ad caput fl. Cygnorum, d. 26. Jul. 1839. No. 1171. (Drummond n. 230.)

„Frutex 3-pedalis.“ *Rami* tenuiter striati, aphylli, nunc validi circiter pollicares basi fere lineam crassi, nunc tenues longiores et magis sulcati, recti v. levissime incurvi, squamula triangulari acuta vix lineam longa adpressa fusca suffulti, hinc inde minute gemmuliferi. *Folia* sessilia, 1-5-pollicaria, $2\frac{1}{2}$ -5 lin. lata, obsoletissime marginata, nervo venisque nunc semiimmersis (faciebus potius dense leviterque rugosis quam nervoso reticulatis) nunc acutiuscule prominulis, mucrone brevi recto demum saepius deciduo. *Racemi* $\frac{1}{2}$ -1-pollicares, interdum ramosi, pedicellis 1-2 lin. longis bractea patula concava obtusa vix 1 lin. longa fusca suffultis. *Calyx* corolla dimidio brevior sesquilineam longus, subhemisphaericus, basi attenuatus, laevis, dentibus brevibus acutis. „*Petala* flava“, *carina* falcata obtusa. *Filamenta* libera. *Ovarium* glabrum, lanceolatum, inferne gibbum, stipite calycem haud aequante. — Species inter Benthamii §§. 2, 3 et 5 ambigua, proxima *D. umbellulatae* Sm., praecipue var. *angustifoliae* Labill. N. Holl. t. 137, quae differt foliis multo brevioribus, inflorescentia etc.; nec non ramis sterilibus et inflorescentia simillima *D. divaricatae* Benth., sed distincta ramis sulcato-angulatis foliosis, caet.

19. **Daviesia longifolia** Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 61. Walp. rep. 1. p. 571: glabra, foliis longe linearibus, compressis, apice subincurvo muticis, striatis; racemulis axillaribus, laxis, folio brevioribus; ovario sessili.

In arenosis plantitiei district. Sussex, d. 23. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1184.

„Frutex decumbens.“ *Rami* graciles, pedales et ultra, compresso-angulati, angustissime subalati. *Folia* 3-6-pollicaria, 1-2 lin. lata. *Racemi* axillares et terminales, erecti, 1-3-pollicares, saepe gemini; pedunculi filiformes, a medio inde laxe-pluriflori; pedicelli patuli, 2-6 lin. ab invicem distantes, tenues, 2-4 lin. longi, persistentes, bractea foliacea setacea 1-5 lin. longa decidua suffulti. *Flores* magnitudine, forma et? colore praecedentis. *Calyx* viridis, labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus brevissimis obtusiusculis. *Petala* parum inaequilonga, purpurea? *carina* obtusiuscula. *Filamenta* libera. *Legumen* non suppetit.

20. **Daviesia alternifolia** Endl. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 149; Nov. Stirp. decad. 1. p. 48, n. 54. Walp. 1. c. p. 570: foliis alternis, oblongis, apice subspinescentibus; involucri subtriflori bracteis scarioso-membranaceis, ovalibus, planis.

In solo turfoso-arenoso plantitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 855.

„Frutex decumbens. *Bractae* post anthesin clausae. *Vexillum* emarginatum, igneum, basi sulphureum; *alae* purpureae.“ *Legumen* acutum, vix $2\frac{1}{2}$ lin. latum, basi turgidum.

21 **Daviesia oppositifolia** Endl. 1. c.; decad. p. 49, n. 56. Walpers 1. c.: foliis oppositis v. ternis, elliptico-oblongis, marginatis submucronatis; involucri triflori bracteis coriaceis, complicatis.

In glareosis inter frutices densos sylvae prope montem Wuljennap (Plantagenet) d. 20. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 856.

„Frutex 5-pedalis.“ *Legumen* inaequilatero-triangulari, 6 lin. longum, 3 lin. latum, obtusum, vix mucronulatum, sutura superiore levissime arcuata, inferioris angulo fere recto rotundato, valvis levissime convexis tenuiter re-

ticulato-venosis. *Semina* ovalia, turgida, fusca, laevia, subnitida, stropholiola pallida vix $\frac{1}{3}$ longiora.

22. **Daviesia cordata** Sm. DC. prodr. 2, p. 114, n. 10.
Bot. Reg. t. 1005!

In limoso-calculosis sylvae cis Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1137. et in rupestribus sylvae montis Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. No. 1136. (Drummond No. 223.)

„Frutex 2-3-pedalis.“ *Folia* patentia, 2-6-pollicaria, 1-2½ poll. lata. *Pedunculi* axillares 1-3, folium subaequantes v. dimidio breviores, infra apicem corymbiflorum bracteis nonnullis minutis dentiformibus sparsis, apice vero bracteis cordatis 4-6 lin. longis 4-5 lin. latis submembranaceis corymbum involucrentibus deciduis praediti; pedicelli 2-3 lin. longi, singuli bracteolis minutis linearibus suffulti. *Flores* pro genere majusculi. *Calyx* corolla dimidio brevior, coloratus, campanulatus, basi breviter angustatus, 3 lin. longus, costato-5-nervis v. laevis, labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus 3 late triangularibus acutiusculis $\frac{2}{3}$ lin. longis. *Carina* obtusa. *Filamenta* libera. *Ovarium* subsessile.

23. **Daviesia rhombifolia** n. sp., ramis inermibus, teretibus, apice angulatis, glabris v. pubescentibus; foliis sparsis, subsessilibus, torsione baseos verticalibus, rigide coriaceis, rhombeo-subrotundis ellipticisve, mucronato-pungentibus, planis, 1-nerviis, reticulato-venosis; racemis axillaribus brevissimis fasciculiformibus, basi bracteatis, pedicellis persistentibus apice demum incrassatis; calycis subcostati labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus brevibus acutiusculis, carina obtusa, legumine sessili.

In arenosis sylvae districtus Sussex, d. 17. Dec. 1839, fructifera Herb. Preiss. No. 1145. et in glareosis prope fontem Ronau'swell (Darling's-range) d. 25. Apr. 1840. No. 1146. (Drummond n. 224.)

„Frutex 1½-2-pedalis,“ subcorymboso-ramosus. *Rami* graciles, recti v. adscendentes, semipatentes, apice sulcati acuteque compresso-angulati, nunc (sicut reliquae partes) glaberrimi, nunc No. 1146 superne pube brevi patente hispiduli. *Folia* 6-15 lin. longa, 3-16 lin. lata, basi apiceque acuta, lateribus rotundatis, margine nerviformi paululum incrassato, nervo venisque irregulariter anastomosantibus utrinque prominulis, apice plus minus acuminato in mucronem rectum validum acutissimum $\frac{1}{2}$ -1 lin. longum rufum excurrente. *Racemi* 2-6-flori, sessiles, rhachi subnulla, bracteis squamiformibus $\frac{1}{2}$ -1 lin. longis obtusis concavis imbricatis demum patentibus diu persistentibus, pedicellis filiformibus 2-3 lin. longis apice articulato demum paulo incrassatis. *Calyx* coloratus, sesquilineam longus, corolla dimidio brevior, nervis interdum prominulis, dentibus tubo triplo brevioribus. *Petala* purpurea? *Filamenta* libera. *Legumen* 7 lin. longum, 4-5 lin. latum, subacuminato-acutum, laeve, glabrum, angulo inferiore fere recto, margine superiore levissime incurvo. — Proxima *D. ruscifoliae* Cunn., quae differre videtur ramulis spinescentibus et foliis ovatis 4 lin. longis”).

*) *D. virgata* Cunn. Bot. Mag. t. 3196. Walpers l. c. p. 569. ad Port Philipp lecta est a cl. Latrobe, fide specim. in Herb. Mus. Neocom.

D. mucifolia! Allan Cunningham
Diagn. Austral. in *Ann. G. Don* 1837. *D. Pirrattii*!
Daviesia Pirrattii (ex Mill.)

ramis ramulisque pinguo attenuatis sulcato-
 angulatis hispidulis, foliis ovalibus vel
 rotundis pubescentibus mucronatis planis
 marginatis coriaceis virentibus, floribus axil-
 laribus solitariis bracteatis, calycis laciniis
 acutis triangularibus superioribus latioribus
 D. latifoliae, postquam, quae tamen valde differt!
 In vicina flumina Torrens (Wm. angl. ab eadem)
 Adelaide. Stuart. N. 202. In parvis collibus
 fragmenta, subpedalis in punctis sicut puci-
 ris viximiliter elationis, rami caespitici, ru-
 nus angustius, racemuli p. gallicae pubes-
 centia alba patula vestiti. Fol. 2-3" (longo)
 1/2-2" lata. Flores magnitudinis foliorum
 calypso linearis, dentib. hinc lineariibus corolla
 duplo brevior. Petal. rotundato-recurvum, lan-
 guineum coriaceum, alis parvis longior. Legu-
 men subuloides cum longuissimis 2" (longu-
 itate) longis, succulentis lobis, calceis calceis
 variegatis.

D. virgata Cunningham.
 Nomen eximie honoravit, diagnosis componere
 non licuit. Port. Philipp. (Lays). N. 16.

D. latifolia! *N. P. 7. D. L. h. 6. 65.*
 elata *D. mimosa* in Nov. Holl. a. 1848.
 occisus Tasmanica in collibus
 Nov. 5. 1848. pr. 3-4'. h. 1. 1. 39
 New Norfolk.

D. pubescens (ex Gmel.)

Viminaria densidata Smith.

1. Ad fluv. Torrens, hb. St. n. 213. hb. 7.59.
Onkaparinga, Tannunda, et
paluds circa montem Gambier.

VIMINARIA Sm. Endl. gen. n. 6436. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Viminaria denudata** Sm. Exot. Bot. t. 27. Bot. Mag. t. 1190. DC. prodr. 2. p. 107. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 76. — *Daviesia denudata* Vent. choix t. 6. — *Sophora junceae* Schrad. Sert. Hannov. t. 3.

In solo subarenoso ad fluv. Cygnorum, d. 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1023. (Drummond n. 249.) Vidi etiam specimina ad Port Philipp lecta. (Herb. Mus. Neocomens.)

„Frutex 12-20-pedalis, ramis pendulis.“ — Specimina Drummondiana cum Sieberianis (Herb. Nov. Holl. n. 369; fl. mixt. n. 553.) exactissime congruunt; Preissiana nonnihil recedunt calyce quidquam minore et ramis acutius lineatis.

2. **Viminaria? Preissii** n. sp., floribus racemosis, calyce bilabiato impunctato, labio superiore latiore sublongiore acute bifido, inferioris laciniis erectis angustis acutissimis.

In subarenosis hyeme inundatis ad fluv. Canning m. Aug. 1841. Herb. Preiss. No. 1024.

An potius *Sphaerolobii* sp.? Sed praeter calycem omnia *Viminariae*. „Frutex bipedalis.“ *Racemi* laxiflori, pedicelli remotiores et solitarii, calyce breviores, vix 1 lin. longi, calycis labium superius fere lineam longum.

SPHAEROLOBIUM Sm. Endl. gen. n. 6437. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Sphaerolobium stenopterum** n. sp., ramis angulatis, anguste alatis; calycis impunctati tubo labiis brevior; carina obtusa, alas superante; ovario stipitato; stylo subexserto, apice hinc membranula auriculato.

In subarenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1117.

Ramorum alae inferne 1-2 lin. latae, superne multo angustiores et in angulum acutum nerviformem abeuntes. *Racemi* 4-6-flori. *Calyx* pedicello fere duplo longior, circ. 2 lin. longus, corolla dimidio brevior, dentibus plerumque nigro-marginatis. *Legumen* subglobosum, vix grani piperis magnitudine, laeve, glabrum, atrum. — Species proxima *S. alato* Benth., sed notis indicatis, praecipue stylo alato, bene distincta.

2. **Sphaerolobium grandiflorum** Benth. in Hügel Enum. p. 32, n. 93; Ann. Wien. Mus. 2. p. 76. Walpers rept. 1. p. 571.: ramis teretibus; calycis tubo labiis aequilongo; carina arcuata, extus obtusissima, intus obtuse producta; stylo a basi arcuato, apice subexserto recurvo hinc membranaceo.

In solo turfoso-arenoso clivuli prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1116. (sine fr.)

„Frutex 2-3-pedalis. Flores ignei.“ *Calyx* dense nigro-punctatus.

3. **Sphaerolobium fornicatum** Benth. l. c. n. 94. Walp. l. c.: ramis teretibus; calycis tubo labiis subaequilongō; carina apice extus fornicato-producta, intus obtusa; stylo supra basin geniculato, apice incluso hinc membranaceo.

In solo humoso inter gramina alta prope villam Dom. Helms (Perth) d. 24. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1124. et in turfoso-humidis ad radices montis Melville (Plantagenet) d. 21. Oct. 1840. No. 1122.

„Frutex 3-5-pedalis. Rami patentes,“ saepius, steriles praecipue, foliis oppositis capillaceis 1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longis patulis remote obsiti. Flores nunc subverticillati, nunc sparsi, „igneo-aurantiaci v. purpurei.“ Legumen subglobosum, latius quam longum, vix grani piperis mole.

4. **Sphaerolobium medium** R.Br. DC. prodr. 2. p. 107. n. 2.

In solo humoso in umbrosis inter frutices densos prope lacum Kei-er-mu lu vel Monger'slake (Perth) d. 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1115 b. (Drummond coll. I. sine No.)

Species inter praecedentem et *S. vimineum* vere intermedia, illi styli carinaeque forma, huic florum magnitudine calyceque similis, ab illa distinguenda floribus minoribus et calycis labio superiore minus cuneato, ab utraque calycis tubo labiis brevior et corollā amoene, rubrae (purpureae?)^{*)}.

5. **Sphaerolobium acuminatum** Benth. l. c. n. 95. Walp. l. c.: ramis teretibus; calycis tubo labiis multo brevior; carina oblonga, recta, acute acuminata, vexillum superante; stylo basi rectiusculo, apice incurvo hinc anguste membranaceo.

In limoso-calculosis montium continuorum Darling's-range (Perth) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1123. —? in sublimoso-arenosis sylvae district. Wicklow, m. Oct. 1840. (No. 1126, specim. imperfect.) — in solo subarenoso inter frutices densos prope montem Wuljenup, d. 13. Oct. No. 1120.) alibique in distr. Plantagenet, m. Dec. 1840. No. 1118. (Drummond n. 216, 218.)

ROEA Hügel. Endl. gen. n. 6438. Meisn. gen. comm. p. 350.

1. **Roea linophylla** Hügel mss. Benth. in Hügel. en. p. 34, n. 99; Ann. Wien. Mus. 2. p. 77. Walpers rept. 1. p. 571: caulibus procumbentibus v. adscendentibus, filiformibus, tenuissimè striatis; foliis anguste linearibus; pedicellis calycis tubum aequantibus, bracteis bracteolisque diu persistentibus.

In solo sublimoso ultimorum arborum Peninsulae (Perth) d. 30. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 880, et in distr. Plantagenet, m. Dec. 1840. No. 1115 a et 1121. (Drummond n. 252.)

„Herba perennis, procumbens v. adscendens, 1-1 $\frac{1}{2}$ pedalis.“

*) *S. vimineum* Sm. DC. l. c. n. 1. Bot. Mag. t. 969. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 76. — *S. minus* Labill. N. Holl. t. 138. (Lam. ill. t. 952.) Swan River, Drummond n. 217 et coll. I. — A cl. Preiss. non lectum.

Sphaerolobium citrinum Juss. & Mill.

- S. In monseblaffi* ^{range} *S. vimineum* hb. V. 219.
rostr. - In rusticis vasis fl. Onkoparinga
nuit
aboy
flor. frutt. 2-1 1/2' crassus. Floribus non
coloribus paullo majoribus, ramis
parum profundius stricatis gliffue
videtur a *S. vimineum* et habitu
minus compacto. Dec. 20. 1848 Sm.
In rura *S. vimineum* Sm. &
minus Labillard. Synonyma?
Anne illud nostrum hoc die-
menicum designat?
Near Cyper - Bay Nov 49, hb. St. C. 66
Vireo minima ad 2' alta stricissima!
S. vimineum! Sm. V. D. L. hb. Stuart. 48!
Loc. 1st river Port Moresby, George Town
1st an. flor. rubicundis!

+ *Pultenaea* ^{prostrata} ~~*Sarriculata*~~! *Sarriculata*
prostr. *S. vestitam* & *S. pedunculata*
latam infus.

Pultenaea? *Calceolaria* ~~*fastidiosa*~~
~~*Rejju* *guaris* videtur ab *duplex*~~
~~*Crucianum* *recom*. *definitionum* *veritas*~~
duplex V. D. L. Stuart.
in *ostrata*, *caucis* & *longatis* ^{subulata} *gracilibus*
falis *canaliculatis* ~~*incurvatis*~~ *aristatis*
lis *spatulato* *linearibus* *glabris* ^{*pedunculatis*} *axi-*
libus *vitis* *ramulorum* *apicem* *prostrato* *longis* ^{*subulata*}
lis *ramulis* *perennantibus* *fructu* *stall*
conjug. *me* *co* *major* *mentibus* *fructu* *stall*
longis *caucis*, *caucis* *jugis* *longis*, *lobis* *caucis*
folis *longioribus* *pedunculatis*, *ovillo* *subro-*
latis, *alio* *ramum* *superantibus* *longiore*
bractea *prostrata* *involvente* *fugacis*
lima *bracteis* *nativi* *radiales* *pedunculatis*
fructum *inflatu* *fructu* *cum* *alio* *an-*
raciatum *parva* *offere* *violacea*
In *folis* *humida* *fructus* *litoralis* *In*
caucis *bay* *divi* *hb* *Stuart*
fructus *radiales* *prostratis* *offere* *violacea*
radiculata

Affinis hinc virtus *Oxycobium Pullinacae*
Hb, Pullinacae & ita una Liebm!

Comp. *Sclerothamnus spinulosus* ^{nihil}

Phyllota ? eleusifera fere nulla

Hb omnibus apud Don clypeatis
foliis canaliculatis et bracteis flore
brevioribus olivacea. An Koebe fide
jugenda cupit definitionum clypeo
Hb Ph. lobata Wenth. dignoscitur
glabritie calycis ramulorumque
& erecta. Gleditsie. Hb. Stir. V. 197 207 56
3 pinastata. Hb. Lips. V. 26.

2. **Roea nudiflora** *n. sp.*, caulibus erectis v. adscendentibus, costato-angulatis; foliis confertis, spathulato-lanceolatis, acutiusculis, planis; pedicellis calycis tubo brevioribus, bracteis bracteolisque nullis v. fugacissimis.

In solo subturfoso-arenoso circa oppidum Albany (Plantagenet) Cape Riche et Toby's Julet (Sussex) d. 27. Dec. 1839. et 25. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1018.

„Suffrutex dodrantalis.“ *Caules* praecedente vix crassiores, attamen haud laxi, simplices, conspicue sulcati et superne fere angulati, inferne dense foliosi, apice in racemum aphyllum simplicem $1\frac{1}{2}$ -2-pollicarem erectum 10-16-florum abeuntes. *Folia* 3-6 lin. longa, 1-2 lin. lata, basi attenuata subsessilia, avenia, nervo medio vix conspicuo immerso. *Flores* patuli v. nutantes aut demum deflexi, 4-5 lin. longi, structura et colore praecedentis. *Pedicelli* vix 1 lin. longi, apice basique cicatriculas bractearum et bracteolarum jam ante floris expansionem delapsarum (nusquam superstitum) exhibentes. *Stylus* apice refracto barbatus. *Leguminis* stipes calycem paulo superans.

PHYLLOTA (DC.) Benth. Endl. gen. n. 6439.
Meisn. gen. comm. p. 350. Pulteneae sect. II:
DC. prodr. 2. p. 113.

Phyllota barbata *Benth.* in Hügel. Enum. 2. p. 33, n. 97; Ann. Wien. Mus. 2, p. 77. Walp. rep. 1. p. 572: ramulis subsericeis; foliis glabris, muticis, minute tuberculis, floralibus bracteolisque flore brevioribus; spicis terminalibus, brevibus, paucifloris; corollis calyce sericeo plus duplo longioribus, vexillo integro; stylo hinc a medio ad apicem dense barbato, caeterum glabro v. basi villosulo.

Inter frutices densos in turfosis promontorii Cape Riche (Kent) d. 17. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 846.

„Frutex 4-pedalis.“

AOTUS Sm. Endl. gen. n. 6440. Meisn. gen.
p. 81. (58.)

1. **Aotus gracillima** *n. sp.*, ramis gracilibus, laevibus, glabris, apice minute puberulis; foliis sparsis v. suboppositis, erectis patulisve, anguste linearibus, obtusis v. mucronulo exiguo innocuo recurvo apiculatis, laevibus, glabris, margine revolutis, supra convexis v. obsolete 1-sulcis, axillis 1-3-floris; pedicellis brevissimis calycibusque adpresse pilosis, calycis labio superiore truncato levissime emarginato.

Inter frutices in depressis arenosis prope oppidum Perth d. 20. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 863. (Drummond n. 246 et coll. I.)

β **uncinata**, foliis patentibus, brevibus (vix $2\frac{1}{2}$ lin. longis) apice magis recurvo-mucronulatis.

In region. interior. Australiae meridionali-occidentalis. Herb. Preiss. No. 869.

Ab *A. villosa* Sm. (fide specim. Sieber.) cui habitu, foliorum, longitudine florumque dispositione structura et magnitudine convenit, differt: glabritie, foliis haud punctato-scabris et floribus copiosissimis, spicas 3-5-pollicares foliosas satis densas formantibus. Specimina Drummondiana No. 216. forsau identica cum planta Hügeliiana quam cl. Bentham (Ann. Wien. Mus. 2. p. 78.) aut *A. villosae* var. *microphyllam* aut propriam speciem sistere suspicatur. Var. β nostra fortassis species distincta, sed specimina iusufficiencia. Flores in axillis solitarii, subsessiles, rari, calyx paulo major et villosior. Petala non vidimus. Legumen calyce paulo majus, subrotundum, compressum, pilosum, 2-valve. Caet. omnia ut in α .

2. ***Aotus intermedia* n. sp.**, ramis gracilibus, strictis, laevibus foliisque junioribus tomentoso-pubescentibus; foliis sparsis et suboppositis, patulis, anguste linearibus, obtusis, muticis, laevibus, mox glabris, margine revolutis, supra 1-sulcis, axillis 1-3-floris; floribus subsessilibus, calycis laxo cano-villosi labio superiore acute bifido.

In subarenosis planitieci inter frutices densos prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. et 14. Oct. Herb. Preiss. No. 864, 1192. et in region. interior. Australiae merid.-occid. m. Oct. 1840. No. 871.

Species pubescentia ad *A. virgatam*, habitu et foliis laevibus vero ad *A. gracillimam* accedens, ab utraque tamen, ni fallor, bene distincta. A posteriore differt ramis strictioribus, foliis plerisque duplo longioribus (semipollicaribus) floribusque paulo majoribus. Bracteolae duae ad pedicellorum basin laterales, oppositae, ovatae, obtusae, concavae, 1 lin. longae, puberulae, saepius diu persistentes, in *A. gracillima* vero fugacissimae, ante florum expansionem jam defluentes.

3. ***Aotus procumbens* n. sp.**, procumbens, ramis pubescentibus, apice adscendentibus et cum foliis junioribus patentim pilosis; foliis sparsis oppositisque v. ternatim approximatis, patulis, linearibus, obtusiusculis, muticis, mox glabris, margine revoluti subscabris laevibusve, supra convexis laevibus nitidis exsulcis, subtus canaliculatis, saepius subtortis; pedicellis geminis v. solitariis, brevissimis, calycis laxo cano-pilosiusculi labio superiore acute bifido.

In arenosis sylvae ad fluv. Cygnorum, d. 9. Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 845. et in region. interior. Australiae merid.-occid. No. 882.

A praecedente, cui proxime affinis, dignoscitur statura humili, ramis „procumbentibus“, vix spithamaeis debilibus adscendentibus apice pilis patentibus fere lineam longis mollibus albis (etiam in foliis novellis parce obvis) dense tectis, foliis 5-11 lin. longis more *Dillwyniarum* saepius tortis, supra rotundato-convexis exsulcis (v. basi tantum obsolete 1-sulcis) laevissimis v. rarius secus margines punctis prominulis paucis scabriusculis. Calyx nunc No. 845. ejusdem magnitudinis ac *A. intermediae*, nunc vero (No. 882, cui etiam folia pleraque majora, 8-11 lin. longa, et robustiora) paulo major. Species in speciminibus perfectioribus denuo examinanda.

4. ***Aotus? dillwynioides* n. sp.**, ramis gracilibus, erectis, glabris, apice pubescentibus; foliis sparsis v. suboppositis, anguste linearibus, obtusis, muticis v. submucronulatis, laevissimis, glabris, supra canaliculatis, subtus convexis; floribus axillaribus, subsolitariis, spicam terminalem foliosam saepe interruptam formantibus; pedicellis brevissimis,

Notus villosa! Smith.

In arundinis ad portum regiarum
Tasmaniae, Hb. N. III, 645. Nov. 49.
Frutix *Liquidalis*. Cum in eodem
loco ubi et *Stuart* ~~habet~~ ^{habet} ~~detexit~~
quaque occurrunt aliae plantae
verae Hollandiae pro australi
proprie, hanc non diversam
considero ab Australi ~~notis~~
michi non nisi e brevissima
phrasi auctoris cognitam.

Nota: Notis species a Dillwynis
foliorum marginibus revolutis mi-
involuto parillime sunt insigni-
tadae,

x *A. ferruginea* Labillardiere

P. laevis Griseb.

Folius lanceolatis supra leu-
vibus. Cum folium modo
progenitum in promptu
visio, an character notatus
stabilis et specificae valoris
annon.

F.D.L. ! hb M. J. Ings.

decussatim 4-bracteatis, bracteis 2 inferioribus ovatis, superioribus 2 longioribus angustioribusque; calyce albo-villoso, labio superiore bifido, inferiore 3 partito, lobis omnibus acuminatis; vexillo dilatato; stylo brevi, crassiusculo, glabro.

In arenosis subhumidis planitie ad fluv. Canning. m. Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 872.

Species *Aotum* inter *Dillwyniam* que ambigua, praecedentibus habitu simillima, nec generice ab iis separanda, nisi invita natura, quamvis characteribus pluribus, sc. pedicellis bracteolatis, vexilli lamina latiore quam longa et foliis marginum involutione *supra* (nec *subtus*) canaliculatis potius cum *Dillwynia* quam *Aoto* conveniat immoque stylo brevi crassiusculo ab utroque genere recedat. *Semina* non vidimus, sed ovula ne vestigium quidem strophilorum ostendunt. — „Frutex 4-5-pedalis.“ *Rami* teretes, tenues, striati, purpureo-fusci, laeves v. minute denseque papilloso-punctati. *Folia* 3-4-lin. longa, plerumque subteretia (diametro vix $\frac{1}{4}$ lin.) raro explanata $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. lata, apiculo vel nullo vel brevissimo innocuo subrecurvo. *Flores* in axillis plerumque gemini; pedicelli 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi, bracteis fuscis puberulis tecti, bracteis 2 inferioribus circ. 1 $\frac{1}{2}$ lin. longis 1 lin. latis ovatis obtusiusculis subconvexis, superioribus 2 paulo longioribus et dimidio angustioribus acutiusculis. *Alabastra* ovato-oblonga, breviter acuminata. *Calyx* dimidiam corollam paulo superans, 3 lin. longus, labiis aequilongis tubo paulo longioribus, lobis lanceolatis acuminatis, superioribus vix latioribus sed altius connatis. *Vexillum* emarginatum, dimidio latius quam longum, aurantiacum v. miniatum? basi purpurascens, *alis* concoloribus anguste oblongis obtusis parum longius; *carina* carnea? calycem haud superans, rectiuscula, oblonga, obtusa, *alis* brevior, pistillum totum includens. *Ovarium* sessile, oblongum, villosum, stylo brevissimo (vix $\frac{2}{3}$ lin. longo) crassiusculo incurvo longius; *stigma* capitatum; *ovula* 2, funiculis brevissimis affixa, subrotundo-reniformia, estrophilata.

5. ***Aotus cordifolia* Benth.** in Hügel Enum. p. 33, n. 96; Ann. Wien. Mus. 2, p. 78. Walpers rept. 1. p. 572: foliis ternatim verticillatis, ovato-lanceolatis, basi cordatis, margine revoluta undulato-denticulatis, supra reticulato-venosis.

Inter frutices densos in solo humoso ad marginem lacus prope oppidum Perth, d. 14. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1050. (Drummond n. 251.)

„Frutex 4-6-pedalis.“

6. ***Aotus passerinoides* n. sp.**, ramis erectis, gracilibus; foliis ternis v. subinde sparsis, sessilibus, erectis, ovato-oblongis, obtusiusculis, muticis, margine leviter revolutis ramisque adpresse sericeo-villosis, supra demum glabrescentibus; floribus axillaribus, subsolitariis, sessilibus, folio brevioribus; calyce parvo, membranaceo, basi villosa, superne glabro, labii superioris truncato-emarginati inferiorisque 3-fidi lobis ciliatis; stylo inferne barbato.

In turfoso-humidis inter frutices densos planitie prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 868.

Species praecedenti affinis, distinctissima, pulchella, habitu *Passerinarum* et *Gnidiarum* quarundam Capensium. *Caules* „sesquipedales, stricti“, vix penna corvina crassiores, nunc simplicissimi, nunc parce ramosi v. apice subcorymbosi, inferne nudi et foliorum cicatris levissime prominulis notati,

superne dense foliosi, pube molli adpressa albida sericea canescenti-villosi, internodiis 3-5 lin. longis. *Folia* plerumque exacte ternato-verticillata, nonnunquam (praecipue inferne) verticillorum solutione sparsa, 3-5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, basi minus quam apicem versus attenuata. *Flores A. cordatae*, petalis, excepta carina atropurpurea, flavis. *Ovarium* sessile, subrotundum, compressum, calycem subaequans, stylo triplo brevius, apice longe comoso-villosum, 2-ovulatum. *Stylus* lateralis, capillaris, subrectus, apice incurvus, ad medium usque laxe pilosiusculus, superne glaber. *Legumen* non visum.

DILLWYNIA Sm. Endl. gen. n. 6441. Meisn. gen. p. 81. (58.)*

1. *Dillwynia (Xeropetalum) acicularis* Sieb. DC. prodr. 2. p. 109, n. 5. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 79, n. 10.

In solo limoso-lapidoso ad radices montium continuorum prope cataractam, d. 25. Jul. Herb. Preiss. No. 881. et in lapidosis cacuminis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. 1839. No. 875, (Drummond n. 243, 244, et coll. 1.)

„Frutex 1-3-pedalis, strictus.“ *Ramuli*, praecipue steriles, apice plerumque spinescentes. — Duplicem distinguere licet formam, α *longifoliam*, foliis rectis et suberectis, 5-9 lin. longis No. 881. et β *brevifoliam*, foliis patentibus saepiusque leviter recurvo-arcuatis, vix 3-4 lin. longis No. 875. Inter utramque specimina Drummondiana medium tenent foliis raro ultra 5-6 lin. longis saepiusque patulis. — Variat praeterea racemis terminalibus dense multifloris ovatis et sphaeroideis calycibusque canescentibus v. parce puberulis (specim. Preiss.) et racemis laxiuscule paucifloris, calycibus parce puberulis (Drumm. n. 244 et coll. 1) et glabris pauloque minoribus (Drumm. n. 243.) — A. sequente differt praecipue foliis firmioribus, plerumque strictis, nunquam tortis.

2. *Dillwynia (Xeropetalum) laxiflora* Benth. in Hügel Bot. Archiv t. 9; Ann. Wien. Mus. 2. p. 79, n. 11.: ramis adpresse pubescentibus; foliis subpatentibus, rectis, muticis vel mucrone innocuo incurvo, glabris v. junioribus puberulis; racemis subpaniculatis, terminalibus, laxis.

*) E prima generis sectione (*Dillwyniastrum* DC.) nulla species inter *Prisjanas* occurrit. Habemus vero inter plantas *Andersonianas* circa *Sydney* lectas **D. phyllicoidem** Cunn. (Benth. l. c. n. 2.) **D. adenophoram** Endl. Nov. Stirp. decad. 1. p. 24, n. 30, et novam speciem, quam hic describere liceat. **D. bruniolides** nob., ramis ramulisque corymbosis, canescenti-puberulis; foliis sparsis, approximatis, patulis, rectis v. subrecurvis, haud tortis, brevibus, obtusiusculis, muticis, dense punctato-scabriusculis, dorso subangulato-convexis, supra unisuleis; capitulis terminalibus sessilibus, calycis canescenti-villosiusculi tubo bracteis ellipticas vix superante, labio superiore acute bifido. — Species proxima **D. phyllicoidi** Cunn., sed distincta: ramificatione fere umbelliformi (nec racemosa) ramis ramulisque validioribus, magis pubescentibus, foliorum cicatricibus denticuliformi-prominulis, foliis crassioribus magisque (saepe angulo recto) patentibus glabris nunquam tortis (2-3 lin. longis) capitulis (3 12-floris, ramulos circiter bipollicares terminantibus) in ramorum apice corymbum formantibus (in illa vero ramulos laterales tenues vix $1\frac{1}{2}$ pollicares terminantibus et secus ramum primum in racemum laxum dispositis) floribus brevissimis pedicellatis acrius congestis paulo maioribus et calyce densius longiusque pubescente.

Annon L. floribunda Sm, fruticosa Linn.
 & elegans Eurl ad unam speciem sint
 undecimae? Cunninghamiana maxim
 poundum brevissimam phragm et
 locum natalum in nostram quadrat!
 Dillwynianum species (omnes?) habet
 folia margini involuta nec revoluta
 Dillwyniae species difficiliter determinan
 da nisi furmina cunctulata in promptu.

Perf. synopsis. p. 302. et 638

J. E. Smith remarks on the gen. charact. of the
 elegant. papil. pl. of N. Hall in Journal of Bot.

X *D. floribunda* Sm. hb. St. N. 210.

Sub. nomine *Notus ericifolius*.

ad fluvium Ochraparinga.

ad Goto fruticulus straphilolatis
 abhorrid! Formosae ad portum
 cognominatum. hb. St. N. 700.

~~*D. floribunda* Sm. hb. St. N. 211.~~

Enicaria loci natalis diff. var. praei.

In fruticulis distortorum ad mas
 guito - plain et in Capidopis ad
 rivulus pinn. Guiltum Bayvadas
 Anth: nre, appase

X *D. parvifolia* L. Fr. hb. St. N. 14986

In monte Luffy frequentior. fr. 2 ped. 14205

var. *D. racemosa* floribus racemoso

superior. hb. St. N. 205. In fruticulis

ad pl. Omeroy. Locin. Cit. 1848.

X *D. glauca* L. Smith.

fruticosa ad anni innotuosa

capitata. In montium praeiatis

prope Wat. St. Morris. super Guiltum

Bay (Exeunte Octob. 1848. Sm.
 St. N. 205. subulso - surinatis.

In arenosis collinis ad St. St. Pauli

hb. St. N. 500. 1. Novo Wallawian

prope per allela.

x *D. cinerascens* H. Gr.

Port Phillip! Griseb.

Ad fl. South Esk rivir Tasmania.
Oct 49. hb. N. 624. 1' alt.

P. racemosa, corymbis in ramulis
brevisimis secundum ramos racem.
Spidum.

~~*D. hispida*, L. f.~~

x *Scabra*, Schlechtendal. { 1.

Napier
1848

Latij. range 4 2' hb. N. n.
Ficillium ^{ignom.} latissimum. Capi & calis
corinaceae florum. In vallibus
silvaticis prope stat. et. Darwinport
versus Ruah-Bay. fuct. ex Oct 1-2
Oct. - hb. N. 15 - In jugo montis
Barthi Sept. Mitchellis - Barro
range - Oct. 1848. Trans p. Murray.
An at. omnibus hucusque cli-
matibus specibus & cura diversa?
D. hispida L. f. habeo var. *D. sudan.*
Caris quo etiam vix differe videtur?

x *macropoda* Griseb.

D. pedunculata Pers. Müller
nam in *Sam. Benth.*
et *D. parvifolia* propinquissima
diffinita: pedunculata corymbu-
rum elongato-hiliformibus, ca-
lycis longioribus dentibus acu-
minatis, floribus majoribus,
vix varicosis. Vexilli lobis latis
capi atro-sanguineis. In fruti-
cis montium prope stat. et. Mo-
ris versus Geithun Bay. ^{Macropoda Pers.} Ex Oct
Oct. 1848. ~~Secundum specimen~~
~~unf. habentem hanc super collecta rura~~
~~*D. parvifolia* confluit, illoque domo exan-~~
~~nauda statim~~

x *Macropoda*

pedunculata Pers. Müller
Corps ut videtur *D. bruceoides*
affinis forsan aliis generis, cum
hanc habita perulari ramisissimis
partes, quam bracteis latis & calis
significatis et vexillo triloba diducit
Vexilli lobis indivisibilibus
Fruit 2-3' Murray. versu 1' Mullington. Oct. 48
Euplexae costae hanc

In limoso-calculosis sylvae inter Mahogany creek et Halfwayhouse (Darling's range) d. 13. Sept. 1839, Herb. Preiss. No. 873.

„Frutex sesquipedalis.“ *Ramuli* vix ac ne vix puberuli, steriles apice saepius breviter spinescentes. *Folia* debilia, evidenter torta, saepe varie curvula. *Calyx* glaberrimus. *Vexilli* lamina medio atropurpurea, macula basilari lutea nulla. Caetera in descriptionem l. c. optime quadrant. A praecedente aegre distinguenda ramis minus strictis foliisque debilioribus, foliis tortis plerumque recurvo-mucronulatis, pedicellis paulo longioribus et calycis labio superiore latiore —“).

EUTAXIA R.Br. Endl. gen. n. 6442. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Eutaxia dillwynioides** n. sp., glabra, ramulis filiformibus, laxis; foliis oppositis, subteretibus, muticis, supra 1-sulcis; racemis capituliformibus, terminalibus v. axillaribus 6-1-floris; floribus subsessilibus, 2-bracteatis; calyce bractearum foliaceas aequante, membranaceo, fusco, semiquinquefido, lobis acuminate, superioribus 2 paulo latioribus altiusque connatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1191.

Species *Dillwyniam* inter *Eutaxiam* que subambigua, priori accedens habitu ericoideo foliisque (omnino *D. ericifoliae*) marginum involutione subteretibus; recedens vero calyce profundius diviso, vexillo orbiculari nec dilatato et legumine compresso vix ventricoso; potius igitur *Eutaxiae* adnumeranda, cui characteribus fere omnibus convenit, ab utroque tamen genere discrepans seminibus (si ex ovulis recte judico) haud strophilatis. — Proxime affinis sequenti, sed distincta ramis ramulisque haud strictis, foliis confertioribus internodia constanter (in illa vix unquam) superantibus nunquam planis nec canaliculatis sed sulco tantum angustissimo exaratis dorso convexis v. subcarinatis et calyce subscarioso-membranaceo fusco bracteolas duplatriplo superante laxe subturbinato, lobis tubo paulo longioribus magisque acuminatis. — „Frutex pedalis.“ *Flores* nunc 3-6 in ramorum apice approximati, capitula terminalia simulantes, nunc 3-4 ramulos laterales brevissimos terminantes, primo vultu axillares sparsos mentientes. *Petala* marcescentia, subpersistentia, forma, magnitudine et colore omnino sequentis. *Stylus* uncinatus, brevis, basi paulo dilatato pilosus, apice capillaris glaber: stigma capitatum. *Legumen* (immaturum) sessile, 3 lin. longum, 1½ lin. latum, compressum, parce adpressequ pilosiusculum, sutura superiore subrecta, inferiore arcuata, valvis vix convexis.

2. **Eutaxia ericoides** n. sp., glaberrima, ramis gracilibus, erectis; foliis oppositis, erecto-patulis, anguste linearibus, subacutis, muticis, planis v. subcanaliculatis; pedicellis axillaribus v. subterminalibus, calycis herbacei viridis labio superiore acute bidentato, inferioris lobis lanceolatis acutis.

In colonia ad flav. Cygnorum legit Jac. Drummond, n. 245 et coll. I.

*) **D. (Xeropetalum) cinerascens** R.Br. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 79, n. 12. exstat inter plantas a cl. Latrobe ad Port Philipp lectas, fide specim. in Herb. Mus. Neocomens.

? β **filicaulis**, ramis ramulisque tenellis, elongatis, floribus in ramorum v. ramulorum apice paucis (4-1) subsessilibus foliisque minoribus. — An species distincta?

In dumetis arenosis ad fl. Cygnorum, d. 9. Apr. 1839. Herb. Preiss. No. 877.

Plurimis notis convenire videtur cum *E. virgata* Benth., sed differt ramis, etsi strictiusculis, tamen debilibus, penna corvina tenuioribus (nec virgatis) foliis haud cuneatis et axillis bi-nec (nisi abortu) unifloris.

„Frutex 2-pedalis, debilis;“ rami dense corymboso-ramosi, internodiis plerumque folia aequantibus. *Folia* 3-6 lin. longa, $\frac{1}{3}$ -raro 1 lin. lata (in ramulis novellis saepe dimidio minora et confertiora) obsolete 1-nervia, avenia, plus minus complicato-canaliculata v. demum plana, rigidula, haud pungentia, laete viridia. *Pedicelli* $1\frac{1}{2}$ lin. longi, recti, medio bracteolis 2 angustis acutis 1 lin. longis ipsos superantibus muniti. *Flores* erecti v. patuli. *Calyx* viridis, $2\frac{1}{2}$ lin. longus, subcampanulatus, parum curvatus, basi brevissime attenuatus, obsolete nervosus, tubo labiis subaequali, laciniis petalis genitalibusque *E. epacridoidis*. Var. β praeter notas indicatas a planta Drummondiana non differt nisi floribus constanter dimidio fere minoribus nec unquam immediate axillaribus, sed ramulos (etsi saepe brevissimos) terminantibus. Utrum propterea specificè separanda sit nec ne, ex paucorum speciminum inspectione dijudicare non audemus.

3. **Eutaxia epacridoides** n. sp., glaberrima, caulibus strictis, simplicissimis v. parce ramosis; foliis oppositis, sessilibus, lineari-lanceolatis, subpungenti-acutis, supra concavis, dorso convexo obsolete 1-nerviis, aveniis; pedicellis axillaribus geminis, brevissimis, basi medioque bi-bracteolatis, floribus pendulis; calyce nervoso-striato, basi attenuato, labii superioris paulo longioris lobis divergentibus brevibus acutis, inferioris linearibus acuminatis.

In solo turfoso inter frutices densos prope montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 412 et 867.

„Frutex pedalis, strictus.“ Habitus quodammodo *Epacridearum* et *Struthioharum*. *Caules* ramique basi divisi, superne simplicissimi v. parce ramosi, graciles, strictiusculi, foliis quamvis copiosis non (ut in sequentibus) absconditi, cortice laevi sanguineo-fusco epidermide tenera demum longitudinaliter rimosa cinerea decidua tecto. *Folia* 6-8 lin. longa, 1 lin. lata (in ramulis interdum dimidio minora) internodio plerumque $\frac{1}{4}$ longiora, erecta, initio subadpressa, dein laxiuscula, recta v. apice subrecurva, utrinque attenuata, basi obtusa, apice acutata et satis pungentia (etsi mucrone proprio destituta, supra laete viridia et marginum involucone concava, subtus plus minus convexa et livide pallescentia, nervo medio parum conspicuo apicem versus saepius evanescente, venis obsoletissimis faciem dorsalem parallele striantibus v. nullis, facie utraque calycibusque sub lente punctato-scribiculatis. *Flores* saepe ab inferiore caulis parte incipientes, quasi spicas foliosas formantes. *Pedicelli* et singulis axillis gemini, rarius solitarii, 1- $1\frac{1}{2}$ lin. longi, constanter apice patentes v. recurvi, rubri, ima basi bractea ovata v. oblonga obtusa vix $\frac{1}{2}$ lin. longa medioque bracteolis 2 oppositis paulo minoribus acutis dentiformibus pedicello brevioribus praediti. *Calyx* herbaceus, viridis v. erubescens, infundibuliformi-campanulatus, parum curvulus, basi attenuatus, 2 lin. longus, corolla dimidio brevior, tubo labiis subaequali nervis 10 tenerrimis ad sinus et laciniarum apicem tendentibus striato, labii superioris lobis $\frac{1}{2}$ lin. longis. *Vexillum* obovato-subrotundum, leviter emarginatum, atropurpureum margine aurantiacum. *Alae* parum breviores, cuneato-spathulatae, aurantiacae, apice rotundato $\frac{2}{3}$ lin. latae. *Carina* recta, alis brevior, calyce paulo longior, lanceolata, acutiuscula, apice atropurpurea. *Ovarium* sessile, obovatum, apice parce villosum, 2-ovulatum,

omnes vaguer. Flowers plains yellow.
D. hispida L. (nomen vix aptum!)
variat ut omnes ^{plurimum} turrarum anthra-
limum communes diverso modo:
nempe in inveniente longiore
breviore, & plus minus deo
habitu proveniente diffundit
se vel erecto, gracileto ro-
bustiore, ^{magis minusve} abbreviato
vel elongato pubescentibus
vel omnino glabris, floribus
majoribus minoribus raro
paniculosa, in corymbis
racemosa etiam in racemum
elongata.
in partibus australibus maximum Flora
rare usque

D. macrophylla Guss. (vide antea)
D. hispida L. & glabra Guss. in litt.
species ambigua a D. parvifolia
foliis et racemulis pedunculatis lon-
gioribus habitu graciliore calycis
lobis aristatis, a D. hispida
habitu graciliore, foliis paullo bre-
vioribus et glabrioribus fructu purpureo,
a D. glabrissima foliis trilobis bre-
vivibus obtusiusculis, calyce lon-
gus dentato, vexillo magis
umbonato, distinta porro D. filifolia lute
aristata videtur. An sit var. D.
hispida, cui revera maxime con-
grua, posterioris investigatione
decidit.

Dilleagnia? abnormis fr. & Munda
et ultrae felis.

stylo tenui apice uncinato paulo longius; stigma minutum, subcapitatum. *Legumen* desideratur. — Affinis *E. virgatae* Benth., quae differt foliis cuneatis, muticis, pedicellis solitariis, bracteolis pedicellum superantibus, caet.

4. ***Eutaxia parvifolia* Benth.** in Hüg. Enum. p. 34, n. 102; Ann. Wien. Mus. 2, p. 80. Walp. rep. 1. p. 573: ramosissima, foliis confertis, obovatis, obtusiusculis; floribus subsessilibus; calycis labio superiore apice bifido, laciniis acuminatis, inferioris laciniis subulato-acuminatis.

In rupestribus clivuli arenosi ad portum Princess Royal Harbour m. Dec. 1840 Herb. Preiss. No. 1020.

„Frutex 4-pedalis.“

5. ***Eutaxia reticulata* n. sp.**, ramis strictis, pubescentibus; foliis ternatim verticillatis, imbricato-adpressis, ovatis, obtusis, glabris, leviter carinato-complicatis, 1-nerviis, reticulatis; pedicellis infra ramorum apicem axillaribus, solitariis; calycis villosi labio superiore acute bifido inferiorisque lobis lanceolatis acuminatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840 specimina pauca imperfecta Herb. Preiss. No. 870.

„Frutex pedalis, strictus.“ *Rami* tenues, tamen rigidi, foliis undique tecti. *Stipulae* nullae. *Folia* sessilia, 2-3 lin. longa, basi 1-2 lin. lata, obtusa, venis acute prominulis dense anastomosantibus scrobiculato-reticulata, laete viridia. *Flores* magnitudine et structura fere *E. parvifoliae*, sed calyx cano-villosus latior basi vix attenuatus et lacinae latiores minus (nec setaceo-) acuminatae. *Carina* latior ovato-oblonga obtusissima atropurpurea. *Alae* aurantiacae. *Vexillum* orbiculare, leviter emarginatum, dorso atropurpureum, antice aurantiacum. *Ovarium* subsessile, villosum, biovulatum, stylo glabro fere longius. Caet. ignota. — An vere hujus generis?

6. ***Eutaxia cuneata* n. sp.**, ramosissima, glaberrima; foliis oppositis, obovato-oblongis, cuneatis, apice rotundatis v. obtusiusculis, dorso convexis 1-nerviis subaveniis; pedicellis axillaribus, solitariis, floribus nutantibus; calycis labio superiore truncato emarginato, inferioris lobis lanceolatis acutis.

In rupestribus collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1022.

„Frutex 3-pedalis.“ *Rami* ramulique semipatentes, foliorum cicatricibus densissime denticulati. *Folia* exstipulata, decussato-opposita, coriacea, supra laete viridia, subtus saepe sanguinea, initio erecta imbricato-adpressa et plus minus complicato-concava, demum laxiuscula saepeque fere plana, nervo parum prominulo, venis supra magis quam subtus conspicuis. *Pedicelli* infra ramulorum apicem axillares, vix lineam longi, bracteolis exiguis acutis. *Calyx* subcurvo-campanulatus, sanguineus, laevis, subnervis, labiis subaequilongis, superioris laciniis 1 lin. latis. *Petala* aurantiaca v. rubra? vexillo orbiculari subemarginato medio saturatiore, carina atropurpurea fere recta. *Legumen* sessile, lanceolatum, turgidulum, parce pilosum, 2-spermum. *Semina* atra, opaca, stropholiola parva subbifida. — Affinis *E. parvifoliae* et *myrtifoliae*; a priore distincta: foliis obtusis apice magis dilatatis floribusque dimidio majoribus et praecipue calycis laciniis haud acuminatis, labio superiore brevissime emarginato; a posteriore: ramis haud virgatis, foliis magis approximatis (vix 1 lin. ab invicem distantibus) obtusissimis v. vix acutiusculis (nec unquam attenuato-pungentibus) aveniis v. obsolete penni-

venis, minoribus (3-4 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. latis) floribus solitariis, pendulis, dimidio majoribus et calyce ampliore.

7. **Eutaxia myrtifolia** R.Br. DC. prodr. 2, p. 109.
Dillwynia myrtifolia Sm. — *D. obovata* Labill. Nov. Holl. t. 140. (Lam. ill. t. 952.) Bot. Mag. t. 1274.

In divulo arenoso ad portum Princess Royal Harbour, d. 27. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1019.

„Frutex 2-5-pedalis.“

GASTROLOBIUM R.Br. Endl. gen. n. 6443. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Gastrolobium bilobum** R.Br. Bot. Reg. t. 411! DC. prodr. 2, p. 110.

In rupestribus circa oppidum Albany (Plantagenet) d. 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 799. (fl. et fr.)

„Frutex 6-pedalis.“ *Folia* pleraque non cuneata, sed arcuato-attenuata. *Racemi* fructiferi fere umbelliformes, rhachi vix 2-3 lin. longa, pedicellis radiantibus 4-5 lin. longis.

2. **Gastrolobium trilobum** Benth. in Lindl. Swan River p. XIII, n. 52. Walpers rept. 1. p. 573: glabrum, foliis oppositis ternisve, crassis, cuneato-trilobis, lobis late lanceolatis, integerrimis, spinoso-mucronatis, intermedio majore; racemis axillaribus terminalibusque, laxis, folium subaequantibus, calycis leviter sericei labio superiore longiore breviter bifido, ovario stipitato villosa.

In glareosis sterilibus prope Williams (Wicklow) m. Mart. 1841. sterile. Herb. Preiss. No. 825. (Drummond n. 187 et coll. l.)

„Frutex bipedalis.“

3. **Gastrolobium tricuspdatum** n. sp., ramis pubescentibus, foliis oppositis ternisque, cuneatis, apice truncato- v. emarginato-bilobis, medio lobisque mucronatis, supra laeviusculis, subtus dense minuteque scrobiculato-reticulatis, junioribus cano villosiusculis; pedicellis axillaribus, fasciculatis, brevissimis; calycis sericei lobis subaequilongis, lanceolatis, acuminatis, superioribus altius connatis parum latoribus, ovario sessili sericeo, stylo compresso glabro.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 839.

β **latifolium**, foliis majoribus, dilatatis, explanatis.

Swan River. Drummond n. 212.

γ **subinerme**, foliis parvis, apice rotundatis retusisve medio tantum mucronatis.

In plantie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. sterile. Herb. Preiss. No. 830.

Frutex facie fere *Lambertiae echinatae*, ramis rigidis, erectis, dense foliosis ramulisque teretibus pube molli densa brevi sordide cinerea v. albida villosa - tomentosis, internodiis semipollicaribus v. brevioribus. *Stipulae* setaceae, vix rigidae, 3-4 lin. longae, erectae, nigrae, pubescentes. *Folia* ternatim verticillata, rarius opposita v. hinc inde sparsa, rigide coriacea, laete viridia, cum petiolo (vix $\frac{1}{2}$ -1 lin. longo) 8-10 lin. longa, apice 3-4 lin. lata, complicata (in var. β 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 5-7 lin. lata plana; in γ 3-6 lin. longa, 2-3 lin. lata, explicata, margine recurvo) cuneato-attenuata, basi acuta v. rarius (in γ) obtusa, apice nunc emarginata v. satis profunde biloba, nunc (praecipue in β) rotundata v. subretusa, lobis lateralibus rotundatis (rarius acutiusculis) mucronulo pungente recto semilineam longo fusco (in var. γ deficiente) sinuque intermedio simili mucrone nervum medium terminante apiculatis, nervatione supra immersa obsoleta, subtus prominula, nervo medio crassiusculo, venis pinnatis obsoletis, interstitiis reticulatione densa minute scrobiculatis v. quasi impresso-punctatis; juniorum pagina utraque cano-villosiuscula, demum (praecipue superiore) glaberrima. *Pedicelli* in singulis axillis 2-3 (raro solitarii) e tuberculo obsoleto (racemi axi contracto) orti, $\frac{1}{2}$ -1 lin. longi, ebracteati. *Calyx* campanulatus, rufus, pube brevi adpressa albido-subsericeus, 3 lin. longus, semiquinquefido-bilobatus, lobis erectis triangulari-lanceolatis acuminatis, labii superioris altius connatis vix latioribus. (Petala staminaque non vidimus.) *Ovarium* sessile, ovatum, acuminatum, sericeo-pilosiusculum, 2-ovulatum, stylo compresso-filiformi basi puberulo supra glabro apice incurvo fere brevius. *Stigma* acutum. *Legumen* — Species stylo compresso et ovario sessili ad *Spadostylem* quodammodo accedens, sed calyce discrepans et certe *Gastrolobio* adnumeranda. Formas tres nobis obvias, etsi primo vultu foliis satis diversas, mere tamen unius speciei varietates esse, probatur foliorum consistentia et reticulatione, stipulis et ramorum pubescentia in omnibus specimenibus penitus iisdem. Var. γ sola, ejus flores ignoti, forsan specifice distincta, quod tamen dubitamus.

4. ***Gastrolobium ilicifolium* n. sp.**, ramis, foliis junioribus calycibusque subsericeo-villosiusculis; foliis ternis oppositisque, obovatis oblongisque, basi integra cuneatis, apice v. ultra medium spinoso-dentatis, planis v. undulato-sinuatis, supra laevibus, subtus penniveniis minuteque reticulatis glaucis? demum glabris; racemis axillaribus abbreviatis, calycis lobis subaequalibus, superioribus 2 altius connatis vix latioribus, ovario stipitato villosa.

In limoso-lapidosis umbrosis ad latus septentrionale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 821. et in region. interior. Australiae merid. occid., m. Febr. 1841. No. 829. (Drummond n. 211.)

„Frutex 4-pedalis,“ ramis validis, strictis, erectis, pubescentia *G. tricuspidati*. *Folia* (fere *Plagiolobiorum*) brevissime petiolata, terna v. rarius opposita, 1-2-pollicaria, 5-16 lin. lata, rigide coriacea, laete viridia (juniora subtus glauca?) reticulatione tenui densa (paulo tamen laxiore ac praecedentis); variant (saepe in eodem ramo) circumscriptione obovata, elliptica et oblonga, basin versus brevius longiusve cuneato-angustata, margine ab apice ad medium usque vel ultra sinuato-dentato, sinubus levissimis fere rectilineis aut profundioribus 1 $\frac{1}{2}$ -6 lin. latis, mucronibus $\frac{1}{4}$ -1 lin. longis, apice acuto aut praemorso-truncato (semper tamen mucronato.) *Racemi* circiter semipollicares (juniores contracti, fere capituliformes) satis dense multiflori. *Calyx* paulo minor quam praecedentis, structura fere eadem. *Corolla* calyce vix duplo longior, *revillo* suborbiculari leviter emarginato alisque „aurantiacis“, *carina* obtusissima purpurea. *Filamenta* libera. *Ovarium* longiuscule villosum, 2-ovulatum, stylo glabro filiformi compresso brevius, stipite vix calycis tubum aequante. *Stigma* obtusum. *Legumen*

5. **Gastrolobium spinosum** Benth. in Lindl. Swan River p. XIII, n. 48. Walpers rept. 1. p. 573: glaberrimum, foliis oppositis, sessilibus, late ovatis, cordatis, sinuato-dentatis, spinescentibus; racemis terminalibus, calycis labio superiore lato breviter bifido, ovario longiuscule stipitato villosa, legumine glabro.

In solo sublimoso inter rupium rimas prope Cataractam ad caput fluvii Cygnorum, d. 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1130. in planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. No. 1135. et in regionibus interior. Australiae merid.-occid. No. 1129 et 1134. (Drummond n. 186.)

„Frutex 2-4-pedalis, squarrosus.“ *Rami* juniores glauci. *Folia* eleganter denseque reticulata, nervo venis venulisque in utraque pagina acute prominulis. *Racemi* terminales et axillares, 1-1½-pollicares, folia summa duplo et ultra superantibus, pedicellis calycem subaequantibus; *calyx* 2½-fere 3 lin. longus vix dimidiam corollam aequans. *Legumen* glabrum, oblongum, subventricosum, utrinque acutum, turgidum, 5 lin. longum, valvis 2 lin. latis obsolete venosis laevibus fuscis. *Semina* oblonga, nigra, laevia, strophiolata. — Variat foliis nunc ovatis, fere bipollicaribus sesquipollicem latis, margine subnerviformi utrinque 4-5-spinoso (No. 1134.) nunc late triangulari-ovatis, saepe latoribus quam longis (5-12 lin. longis, 8-18 lin. latis) basi saepius rectilineo-truncatis, margine utrinque 2-4-spinosis (No. 1130.) foliis deltoideo-ovatis, basi semper plus minus cordatis, 8-16 lin. longis, 6-12 lin. latis, margine simplici prope medium 2-1-spinulosis v. hinc inde inermibus, spinulis totiusque laminae consistentia tenuioribus (Preiss. n. 1129 et Drumm. 186.) denique foliis spinoso-5-angulis, 4-8 lin. longis latisque basi subtruncatis.

6. **Gastrolobium Preissii** n. sp., glabrum, foliis oppositis, subsessilibus, crassiuscule coriaceis, cordatis, spinoso-mucronatis, margine sinuatis spinoso-dentatis integrisve, utrinque laevibus; racemis terminalibus axillaribusque, folio vix longioribus; calycis labio superiore breviter bifido, lobis obtusiusculis, inferioris lobis acutis vix angustioribus, ovario longiuscule stipitato villosa.

In solo sublimoso district. Hay, d. 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1131. et in region. interior. Australiae merid.-occid. No. 1133.

α foliis late ovatis (8-12 lin. longis, 7-10 lin. latis) sinuato-dentatis, dentibus spinescentibus utrinque 2-3. No. 1131.

β foliis cordato-deltoides (8-11 lin. longis, basi 3-6 lin. latis, apicem versus sensim attenuatis) integerrimis No. 1133.

Species praecedenti simillima, sed praeter notas indicatas floribus minoribus et ovario longius villosa facile dignoscenda. „Frutex 3-pedalis.“ *Foliorum* nervus venaeque primariae visibiles quidem, sed omnino immersae aut vix ac ne vix prominulae et interstitia potius minute punctulata quam vere reticulata. *Racemi* 6-10 lin. longi. *Calyx* pedicello plerumque duplo longior (2 lin. longus) lobis margine pubescentibus. *Ovarii* stipes calycem fere aequans. — A *G. cordato* Benth. differt foliis acutis, pungentibus, angustioribus, non semper integerrimis, floribus multo minoribus.

7. **Gastrolobium villosum** Benth. l. c. n. 46. Walp. l. c. p. 573: foliis oppositis, ovato-lanceolatis, cordatis, obtusis, setaceo-mucronatis, margine undulatis, subtus ramisque molliter villosis; racemis terminalibus axillaribusque

demum elongatis; bracteis lanceolatis, acutis, fuscis, calyce subbilabiato longioribus, deciduis, ovario longiuscule stipitato villosa.

In limoso-calculosis sylvae prope Halfwayhouse (Darling's-range) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 810. (Drummond n. 194.)

„Frutex decumbens.“ *Rami* adscendentes? satis firmi. *Stipulae* setaceae, 3-6 lin. longae. *Folia* 10-20 lin. longa, 5-14 lin. lata, reticulata, margine constanter integerrima inermia, interdum immo (Drumm. n. 194.) plana v. vix undulata. *Racemi* erecti, cum pedunculo 1-2-pollicari demum 5-7-pollicares, floribus (fere *G. Preissii*) oppositis v. subverticillatis, bracteis 3-5 lin. longis calycibusque pubescentibus, pedicellis calyce dimidio brevioribus. *Vexillum* aurantiacum, *carina* alaeque purpureae. *Legumen* subglobosum, pisi majoris mole, pilosiusculum, stipite calycem subaequante (immaturum.)

8. **Gastrolobium parvifolium** Benth. l. c. n. 47. Walp. l. c.: ramis pubescentibus, foliis ternis, erectis, oblongis, obtusis, mucronatis, integerrimis, crassiusculis, reticulatis, glabris, junioribus glaucis; racemis terminalibus; bracteis oblongis, fuscis, deciduis; calycis glabriusculi labio superiore lato, emarginato, ovarii villosi stipite incrassato.

In limoso-arenosis planitiei montis Bakewell (York) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1017.

„Frutex 4-pedalis.“ *Rami* graciles, erecti. *Stipulae* tenerae, setaceae, 1-1½ lin. longae, deciduae. *Folia* vix semipollicaria, sesquilineam lata. *Racemi* 2-3-pollicares. *Flores* fere *G. villosi* et *Preissii*, calyce fere *G. spinosi*, labio superiore lato truncato brevissime emarginato.

9. **Gastrolobium calycinum** Benth. l. c. n. 51. Walp. l. c.: ramis glabris, foliis ternis oppositisque, lanceolatis oblongisve, aristato-mucronatis, integerrimis, glaucis; racemis axillaribus et terminalibus laxe paucifloris, calycis ampli glabriusculi labio superiore lato bifido, ovario stipitato, legumine villosa.

In limoso-calculosis montis Bakewell (York) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 836. et in sublimosis district. Goderich, m. Dec. 1840. No. 835. (Drummond n. 203.)

„Frutex 2 3-pedalis.“ *Stipulae* setaceae, subspinescentes, demum patentes 2-3 lin. longae. *Folia* plerumque pollicaria, 5-6 lin. lata, petiolo ½-1½ lin. longo. *Racemi* 2-3 pollicares. *Bractee* fuscae, ovatae, acuminatae, florem amplexantes, 3-5 lin. longae. *Calyx* 3-4 lin. longus, latus, basi breviter attenuatus, labio superiore latiusculo bifido. *Petalorum* forma et color praecedentium. *Ovarii* villosiusculi ovato-subglobosi (mole nuclei cerasini) stipes vix calycis tubum aequans*).

*) **G. Drummondii** n. sp., ramis gracilibus, puberulis; stipulis setaceis, erectis, petiolos longiusculos vix superantibus; foliis ternis, lanceolatis, pungenti-mucronatis, reticulatis, glaucis; racemis axillaribus terminalibusque, laxiusculis, calyce pubescente. Swan River. Drummond n. 204 et coll. I. — Habitu foliisque **G. calycino** simillimum, sed notis indicatis, praecipue petiolo duplo triplo longiore (1½-2½ lin. longo) foliorum reticulatione fortiore, calyce minore (2½-3 lin. longo) adpresse cano-pubescente ejusque labio superiore angustiore facile dignoscendum. Folia nonnunquam elliptica, 14 lin. longa, 8 lin. lata.

10. **Gastrolobium oxylobioides** Benth. l. c. n. 50? Walp. l. c., β *microcarpum* nob., ramis apice puberulis; stipulis setaceis, erectis, petiolo brevissimo multo longioribus non spinescentibus; foliis ternis, elliptico-lanceolatis, spinoso-mucronatis, utrinque attenuatis, tenuiter reticulatis, subtus subsericeis; racemis axillaribus terminalibusque, folia subsuperantibus, calycis labio superiore obtuso bifido; legumine stipitato, ovato, turgido calyceque pilosiusculis parvis.

In region. interior. Australiae meridionali-occidentalis, m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 816, 817. (Drummond. n. 205.)

An nova sp.? e speciminibus suppetentibus imperfectis a diagnosi l. c. nimis brevi non satis dignoscenda, *G. calycino* foliis simillima, et calyce jam distinctissima. *Stipulae* tenues, erectae, 3 lin. longae, nunquam patentes nec spinescentes (in specim. Drummond. $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longae; petiolo vix longiores.) *Racemi* laxiusculi, bracteae fugaces, *Pedicelli* $\frac{1}{2}$ -1 lin. longi. *Flores* nutantes, iis *G. parviflori* paulo minores, aurantiaci, *carina* purpurea. *Calyx* 2 lin. longus, corolla vix dimidio brevior pubescens, labiis subaequalibus tubo basi vix attenuato brevioribus, superioris lobis parum latioribus rotundatis, inferioris ovatis acutis. *Legumen* vix 2 lin. longum (in *G. calycino* circ. duplo majus) stipite calycem (in illa vix ejus tubum) subaequante.

11. **Gastrolobium Lehmanni** n. sp., ramis tomentosis; stipulis setaceis, petiolum subsuperantibus; foliis oppositis, oblongis, obtusis, obsolete mucronulatis muticisve, margine subrevoluto obsolete crenulatis, supra reticulatis glabris, subtus adpresse cano-villosis, racemis axillaribus brevissimis, fasciculiformibus, calycibus sericeis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occid., m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 806.

Species foliis, inflorescentia floribusque *Oxylobio capitato* multo similior quam congenerum ulli. *Rami* virgati, teretes, albido-tomentosi. *Folia* $1\frac{1}{2}$ -2-pollicaria; 6-7 lin. lata, utrinque aequaliter attenuata, apice obtuso v. interdum retuso mucronulo vix conspicuo deciduo terminata, margine leviter recurvo nervulis prominulis quasi irregulariter minuteque crenulata, coriacea, supra viridia et minute reticulata (nervo medio impresso venisque inconspicuis) subtus pube albida densa adpressa brevi reticulationem praeter nervum venasque primarias occultante tecta, petiolo sesquilineam longo. *Racemi* axillares, propter pedunculum communem valde contractum obsoletum potius capitula v. fasciculus referentes, 6-10-flori, pedicellis vix lineam longis, calyce dimidio brevioribus. *Calyx* sericeus, campanulatus, semi-5-fidus, lobis 2 superioribus paulo altius connatis latioribusque. *Petalata* subaequilonga, longiuscule unguiculata, vexillo ovato-subrotundo integro medio atropurpureo margine alisque obovato-oblongis cuneatis aurantiaco, *carina* rectiuscula obtusa atropurpurea. *Filamenta* filiformia, glabra. *Ovarium* breviter stipitatum, oblongum, villosum, biovulatum! stylo tenui compresso incurvo paulo brevius. *Ovula* estrophilolata. *Legumen*.

12. **Gastrolobium obovatum** Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 53. Walp. l. c. p. 573: foliis oppositis sparsisve, cuneato-obovatis, acutis, mucronatis, integerrimis, junioribus ramisque sericeis, adultis glabris; racemis axillaribus, densis, paucifloris; calycis sericei labio superiore bifido; ovario stipitato, villosa.

fructus et semina exigentibus fructuum necessarios. 1848 et citantur Bodt infusile officina

An hinc *Gastrolabium* species?
S. microphyllum R. Br.
1. *Sclerothamnus diffusus* Ferdm.
Lignum desideratum pro ovarium
pedicellatum. Rara necrimus
an hic precipere distat ab alia
a Cl. Rois communicata, quoniam
solummodo folia latiora & bre-
viora et habitus magis rama-
tus & diffusus, ponne an ne no-
str Brunonianus sit.

ps. Remarkable genus

In arenosis inter montem Par-
kuri & fluvium Murray in fru-
tibus Oct. 1848, atque ad ripas
fluvii ipsius haud longe ab officio.
Frut. 1-2' In. In collibus
calvaris prope Enfield. Oct 2.
In frutibus juncto Gastra Lora.
fol. minoris exserta. flor. vixillum.
latum inter magis quam inter in collibus.

2. *Stricklandia* Ferdm.
alt. 1. n. 74. vide *S. microphyllum*
cruca carina magna ex parte rubella
Sept E.

S. microphyllum R. Br. Port Lewis

3. *Spinulosus* Ferdm. N. Frey.
Confer Roia? Phyllosta? decussata
Ferdm. alim, quae hujus lori
et foliis oppositis disjuncta.
Type legi plantam in fruticula
inter oppidum Strott-halbijn
& fl. murray, Oct. 1848. In frut. 1-3'.
Frut 1-3'. Pixillum luteum
purpurascens striatum. Ca-
rina (poride) purpurea. Flor. odor.
Hic Eutaxia imptifolia Schlechtend.

ps. Remarkable genus
var. rami in fruticula
inter lora & Strott-halbijn

4. *Plexilis* Ferdm. (*Gastrolabium*)
Rami tenuibus, foliis magis opposi-
tis ab antecedente abhorret.
Fructus humilis in collibus ante montes
inter Adalidis proximis. Excurrense Nov
1848.

In solo limoso-arenoso et in calciosis ad latus occidentale et septentrionale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 874, et ex parte No. 800. et in region. interior. Australiae merid.-occid. No. 819. (Drummond coll. I. sine no.)

β **verticillatum nob.**, foliis ternatim v. quaternatim verticillatis, rarius oppositis sparsisve, rhomboideo-ellipticis (6-9 lin. longis, medio 4-6 lin. latis, utrinque aequaliter cuneato-attenuatis.)

Swan River, Drummond n. 206.

„Frutex 2-3-pedalis.“ *Folia* 5-10 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -5 lin. lata, plerumque complicata et basin versus cuneato-angustata, apicem versus (nec medio) latiora, utrinque minute reticulata, apice saepius paulo recurva. Inflorescentia, petala et stamina *G. Lehmanni*, sed flores fere duplo minores. *Pedicelli* calycem aequantes v. parum breviores, $1\frac{1}{2}$ lin. longi. *Calycis* lobi setaceo-acuminati. *Vexillum* suborbiculare, levissime emarginatum. *Ovarii* breviter albo-villosi biovulati stipes calycem subaequans pilosus. *Legumen* non vidimus.

13. **Gastrolobium spathulatum Benth.** l. c. n. 54.

Walp. l. c.: foliis ternis sparsisve, spathulatis, apice dilatato retusis v. emarginato-bilobis, margine integerrimis, deorsum valde angustatis, junioribus ramisque sericeis, adultis glabris; racemis axillaribus, abbreviatis, subcapitatis; calycis sericei labio superiore emarginato-bifido; ovario stipitato, villosus.

(*callosus*) In *calciosis* ad latus septentrionale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 800, ex parte. (Drummond n. 208 et coll. I.)

„Frutex bipedalis.“ *Folia* apice emarginato-biloba, lobis rotundatis, sinu mucronulo debili recto v. recurvo deciduo munito, reticulatione paulo grossiore et stipulis longioribus quam *G. obovati*, cui inflorescentia florumque magnitudine structura et colore simillimum, *Legumen* ventricoso-ovoideum, magnit. pisi, villosiusculum, intus papillosum!

14. **Gastrolobium Brownii n. sp.**, ramulis puberulis;

stipulis minutis, setaceis, deciduis; foliis ternis oppositisque, subsessilibus, cuneato-oblongis obovatisve, obtusis, mucronatis, planis, reticulato-penniveniis, glabris, pedunculis axillaribus folio dimidio brevioribus, corymboso-paucifloris; calyce pedicello vix longiore, puberulo, dentibus 2 superioribus brevibus obtusiusculis, inferioribus 3 acutis; ovarii villosi stipite pubescente, calycem subaequante.

In rupestribus summitatis montis Wuljenup (Plantagenet) d. 13. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 802.

„Frutex 8-pedalis.“ Habitus praecedentium. Differt a *G. spathulato*: foliis basin versus minus angustatis, apice nunquam emarginato-bilobis, mucrone fortiore pungente semilineam longo recto; a *G. obovato*; foliis apicem versus nunquam attenuato-acutatis, mucrone brevior; ab utroque: foliis basi obtusis, reticulatione laxiore, venis primariis magis quam venulae interstitiales conspicuis, pedunculo communi magis conspicuo ebracteato apice tantum 2-3-floro et calyce parce puberulo vix sericeo subglabrescente’).

*) *G. Hookeri* n. sp., ramis villosiusculis; stipulis setaceis, parvis, persistentibus; foliis oppositis, ovali-oblongis, utrinque vix angustatis, basi rotundatis, apice obtuso v. subretuso submuticis, tenuiter reticulatis, junioribus pubescentibus; racemis

15. **Gastrolobium epacridoides** *n. sp.*, ramis virgatis, gracilibus, villosis; foliis ternis, exstipulatis, sessilibus, patulis, ovatis, acutis, pungenti-mucronatis, utrinque reticulatis glabris, axillis 1-2-floris, pedicellis calycem subaequantibus, calycis adpresse cano-pilosi lobis tubo brevioribus acutis, superioribus 2 altius connatis; ovario brevissime stipitato.

In rupestribus ad jugum montium Darling's-range prope Cataractam (Perth)

d. 16. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 837. (Drummond n. 196.).

„Frutex 3-pedalis.“ *Folia* sessilia, basi rotundata, haud cordata, nervo subtus acute prominulo, venis primariis in reticulatione vix distinguendis. *Legumen* ovato-globosum, nuclei cerasini mole, mucronatum, pilosiusculum, 2-spermum, intus laeve glabrum. — A *G. acuto*, (saltem quoad specim. nostra et Bot. Mag. t. 4040.) cui pubescentia, inflorescentia, florumque magnitudine convenit, differt: stipularum defectu! foliis late ovatis (3-7 lin. longis, 2-5 lin. latis) reticulatione densiore paulo obtusiore v. minus prominula, calycis lobis acutis, nec acuminatis, et petalis (praecipue alis carinaque) paulo majoribus.

EUCHILUS R.Br. Endl. gen. n. 6444. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Euchilus obcordatus** *R.Br.* Bot. Reg. t. 403! Bot. Cab. t. 60. DC. prodr. 2, p. 110. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 80.

In calculosis ad jugum montis Baldhead (Sinus Regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 804.

„Frutex decumbens. *Vexillum* alaeque crocea, *carina* purpurea.“

2. **Euchilus linearis** *Benth.* in Hügel Enum. p. 35, n. 104; Ann. Wien. Mus. 2, p. 80. Walpers rept. 1. p. 574: foliis alternis (rarius oppositis) linearibus, margine revolutis; pedicellis axillaribus, 1-floris, folium aequantibus.

In arenosis inter frutices densos prope Pineapple (Perth) m. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 879 et 1110. (Drummond n. 195 et coll. I.)

axillaribus brevissimis, fasciculiformibus, densiusculis; calyce sericeo, pedicello multo longiore, labio superiore bifido, inferiore 3-partito, lobis acuminatis; ovarii villosi stipite calycem subaequante. — Swan River. James Drummond, n. 209. — *Simillimum G. Brownii*, sed ramorum calycisque pubescentia fortiore, foliis haud cuneatis basi rotundatis v. subcordatis, mucronulo brevissimo deciduo, venis primariis in reticulatione vix distinguendis, inflorescentia densiore pluriflora et calycis dimidio longioris densiusque pilosi lobis acuminatis bene distinctum. *G. acutum* *Benth.* l. c. n. 55. Walp. l. c. p. 574. Bot. Mag. t. 4040! ramis villosis; foliis ternis, ovatis v. ovato-lanceolatis, acutis, pungenti-mucronatis, integerrimis, adultis glabris; racemis axillaribus abbreviatis, paucifloris; calyce villosa, subbilabiato; ovario sessili, villosissimo. — Swan River. J. Drummond, n. 213. — *Folia* speciminum nostrorum (cum ic. cit. exacte convenientium) 6-9 lin. longa, 2-2½ lin. lata (nunquam ovata) acutata-pungentia, grosse reticulata novella subsericeo-pubescentia. Calyx pedicello dimidio longior, 2½ lin. longus, basi attenuatus, cano-villosus, lobis tubum aequantibus acuminatis.

Remanet explorare, an amnes Sal-
 tenaeae species hinc memoratae
 ad genus contrarium pertineant
 vel sine partim ad genus Phyllo-
 (Stigmalis nullis etc.) put refragant
 Spadophytis (Salt. aff.) Lunninghami.
 n. 1. In. Brachy. etc. etc. etc.
 leaves heart shaped glaucous like European
 Euphorbias. Flowers bright yellow. etc.

x *Pullinaca triptolampra* S. & L.
 In glaucis maculis humiliorum
 in vicinia fluminis Ochaparingae
 Fruticulus decumbens, ramis adpre-
 dentibus. Mart. 9. 1849.

x { *P. fasciculata* ! Wenth.
P. Pullinaca monticola Ferd. Mee.
 et a sequenti distat foliis mu-
 coronatis magis recurvatis flo-
 ribus majoribus et forsan aliis
 notis adhuc deliquis. In var.
 Dithyriar sp. hb. N. T. II sine num.
 In montibus 3-4000' altis. n. 1. 1849.

x *Pullinaca tenuifolia* Bn.
 hb. J. n. 48 - In campis florilibus
 fistilibusque prope Rivaci Way
 Oct. 1848. et ad St. Murray in
 aruosis Oct 48. In foresta etc.
 glabrisque Ferd. Mee.

x *P. Pullinaca* montium locis aruosis
 lapideis prope stationem St.
 Morris in interioribus Nov. Hall.
 austrina Guitham Way & montium
 Burr! Oct 1848 & M.

x *Pullinaca fasciculata* Ferd. Mee.
 (non p. 58.) *prostrata*
 ad fl. Ochaparingam. Frutex dif-
 fus, prostratus. Nov. 1848.
 Formas duas satis limitatas obser-
 vare nunc: a graciliter ma-
 tura & robusta diffusa.

In collibus aru-
 osis prope rivacem
 Mart. 16. 1849

Pulsinaca largiflora Fendler

In montibus *P. ferruginea* var? olim *fm*
 collibus non Rudge, qual^{iam} *Olironyphat*
Stirilibus ramis junioribus villatis
 vixit *Stirilibus* non *Stirilibus*
 brook & haud *Stirilibus*. — fr 1-2'.

In montibus praecipue satis
Stirilibus inter *Stirilibus*;
 Lixy-range, Kugla-range
 Frut. infra simplex supra ra-
 mosus v. ramosissimus fructum
 ramos largam capitularum
 pauciflorum copiam gerens.
 Siquis in pl. viva notari:
 Frutex 1-2' ratiom humilitatis
 robustus; vexillum vitellinum
 stans & maralis atro-aurantiaca
 inae basi iterum pallide-vitellinum
 corina atro-sanguinea. Sept-Mo.

Monte M. Remarkable *Stirilibus*.

Stirilibus comparsum gibboso-ovatum
 ovatum 2-3" 1-2" glisco *Stirilibus*. *Stirilibus*
 ovoidea *Stirilibus* nigrescentia *Stirilibus* *Stirilibus* *Stirilibus*

P. cardiophylla Fendler

P. cardiophylla Fendler. antea
 minor, foliis obcordatis gla-
 briusculis.

Pulsinaca magnifica Fendler

In *Stirilibus* prope York-Town
 Frut. frut 3-4' hb. M. 951. *Stirilibus* *Stirilibus*

P. densifolia Fendler

Stirilibus nonum *Stirilibus*.

Galwa. hb. M. f. n. 8 nom. 1847.

P. bilobae & *parvifoliae* cognata,
 foliis ramis glabris distincta

P. curvifolia Fendler & *concolor* Fendler
 corollis concoloribus haud maculis
 vixitque atropurpureis notatis.

In *Stirilibus* prope George-Town,
 Jamaicanae, hb. M. 867. 1'

M. Stirilibus range *Stirilibus*

P. Gunnii 'South
velutina Jerd Miller
P. stricta hb. St. non Sims
 Sept. South Est river Tasm. hb.
 N. II n. 11! Fr. 3-4'. Oct 1848.
 A pl. *Sinusiana* (consp. diagn. Don.)
 opposit foliis supra pilis adpressis
 tenuissimis hirsutis, minutis, oblongis
 a nostra vix diversa praeterea
 indumento calycis & ramorum
 piloso-velutino rebz.
 Fruticulus hb. St. I n. 94. vix differt.
 Ad flumen (ygnat-river in collibus)
 ruperitibus 31 Nov. 49. hb St. 659.
 laxis pinnilibus ad portum ygnat-river
 hb St. 604. Ad 4' alt. Port Phillip 3-4'
 h. St. 888.

P. stricta Sims (non hb. St. 11.)
 In campis ^{intus} ad limites ori-
 entales coloniae Novae Holland.
 australis. Oct. 1848. var. ^{consolor fust. tenui}
 Stipis hucurgae vix alibi quam
 Tasmanniae (absorpta) inveniunt.
 Definitioni nimis brevis Donianae
 bene convenit praesertim si natus
 "calyx pilosus" verbum, "silky"
 combinet. Inter plantas Dio-
 nysias a ^{viam} Stuartio communi-
 catas desidero. Habitu non tam
 strictam v. diffusum hujus ab
 Jacqui! Inut. 1-2.
 ygnat river prope Cygnus-port Bay, 23
 hora austro-orientali Tasmanniae! 2-3'
 hb. St. 608.

P. unguiculata Jerd mce
 Sept. South Est river Tasm.
 hb. N. II n. 130. Fr. 3-4' Dec. 10. 48.
 A. P. *subumbellata* Stuartii
 differt capitulis modo figuratis
 bracteis aristo involucriatis, a P.
 densa foliis laxioribus, floribus
 majoribus rebz. Folia quaevis da-
 pinnatae glaucae ^{longae} ^{non colore}
 nae dispositione In collibus ad fl. St. Pauli
 11 Nov. 49. 604! hb. St.

1, *clausula*, *St. p. foliis*
 2, *Sept. 10, 1848, 1848*
 3, *1848, 1848*
 4, *1848, 1848*
 5, *1848, 1848*
 6, *1848, 1848*
 7, *1848, 1848*
 8, *1848, 1848*
 9, *1848, 1848*
 10, *1848, 1848*
 11, *1848, 1848*
 12, *1848, 1848*
 13, *1848, 1848*
 14, *1848, 1848*
 15, *1848, 1848*
 16, *1848, 1848*
 17, *1848, 1848*
 18, *1848, 1848*
 19, *1848, 1848*
 20, *1848, 1848*
 21, *1848, 1848*
 22, *1848, 1848*
 23, *1848, 1848*
 24, *1848, 1848*
 25, *1848, 1848*
 26, *1848, 1848*
 27, *1848, 1848*
 28, *1848, 1848*
 29, *1848, 1848*
 30, *1848, 1848*
 31, *1848, 1848*
 32, *1848, 1848*
 33, *1848, 1848*
 34, *1848, 1848*
 35, *1848, 1848*
 36, *1848, 1848*
 37, *1848, 1848*
 38, *1848, 1848*
 39, *1848, 1848*
 40, *1848, 1848*
 41, *1848, 1848*
 42, *1848, 1848*
 43, *1848, 1848*
 44, *1848, 1848*
 45, *1848, 1848*
 46, *1848, 1848*
 47, *1848, 1848*
 48, *1848, 1848*
 49, *1848, 1848*
 50, *1848, 1848*
 51, *1848, 1848*
 52, *1848, 1848*
 53, *1848, 1848*
 54, *1848, 1848*
 55, *1848, 1848*
 56, *1848, 1848*
 57, *1848, 1848*
 58, *1848, 1848*
 59, *1848, 1848*
 60, *1848, 1848*
 61, *1848, 1848*
 62, *1848, 1848*
 63, *1848, 1848*
 64, *1848, 1848*
 65, *1848, 1848*
 66, *1848, 1848*
 67, *1848, 1848*
 68, *1848, 1848*
 69, *1848, 1848*
 70, *1848, 1848*
 71, *1848, 1848*
 72, *1848, 1848*
 73, *1848, 1848*
 74, *1848, 1848*
 75, *1848, 1848*
 76, *1848, 1848*
 77, *1848, 1848*
 78, *1848, 1848*
 79, *1848, 1848*
 80, *1848, 1848*
 81, *1848, 1848*
 82, *1848, 1848*
 83, *1848, 1848*
 84, *1848, 1848*
 85, *1848, 1848*
 86, *1848, 1848*
 87, *1848, 1848*
 88, *1848, 1848*
 89, *1848, 1848*
 90, *1848, 1848*
 91, *1848, 1848*
 92, *1848, 1848*
 93, *1848, 1848*
 94, *1848, 1848*
 95, *1848, 1848*
 96, *1848, 1848*
 97, *1848, 1848*
 98, *1848, 1848*
 99, *1848, 1848*
 100, *1848, 1848*

1, *clausula*, *St. p. foliis*
 2, *Sept. 10, 1848, 1848*
 3, *1848, 1848*
 4, *1848, 1848*
 5, *1848, 1848*
 6, *1848, 1848*
 7, *1848, 1848*
 8, *1848, 1848*
 9, *1848, 1848*
 10, *1848, 1848*
 11, *1848, 1848*
 12, *1848, 1848*
 13, *1848, 1848*
 14, *1848, 1848*
 15, *1848, 1848*
 16, *1848, 1848*
 17, *1848, 1848*
 18, *1848, 1848*
 19, *1848, 1848*
 20, *1848, 1848*
 21, *1848, 1848*
 22, *1848, 1848*
 23, *1848, 1848*
 24, *1848, 1848*
 25, *1848, 1848*
 26, *1848, 1848*
 27, *1848, 1848*
 28, *1848, 1848*
 29, *1848, 1848*
 30, *1848, 1848*
 31, *1848, 1848*
 32, *1848, 1848*
 33, *1848, 1848*
 34, *1848, 1848*
 35, *1848, 1848*
 36, *1848, 1848*
 37, *1848, 1848*
 38, *1848, 1848*
 39, *1848, 1848*
 40, *1848, 1848*
 41, *1848, 1848*
 42, *1848, 1848*
 43, *1848, 1848*
 44, *1848, 1848*
 45, *1848, 1848*
 46, *1848, 1848*
 47, *1848, 1848*
 48, *1848, 1848*
 49, *1848, 1848*
 50, *1848, 1848*
 51, *1848, 1848*
 52, *1848, 1848*
 53, *1848, 1848*
 54, *1848, 1848*
 55, *1848, 1848*
 56, *1848, 1848*
 57, *1848, 1848*
 58, *1848, 1848*
 59, *1848, 1848*
 60, *1848, 1848*
 61, *1848, 1848*
 62, *1848, 1848*
 63, *1848, 1848*
 64, *1848, 1848*
 65, *1848, 1848*
 66, *1848, 1848*
 67, *1848, 1848*
 68, *1848, 1848*
 69, *1848, 1848*
 70, *1848, 1848*
 71, *1848, 1848*
 72, *1848, 1848*
 73, *1848, 1848*
 74, *1848, 1848*
 75, *1848, 1848*
 76, *1848, 1848*
 77, *1848, 1848*
 78, *1848, 1848*
 79, *1848, 1848*
 80, *1848, 1848*
 81, *1848, 1848*
 82, *1848, 1848*
 83, *1848, 1848*
 84, *1848, 1848*
 85, *1848, 1848*
 86, *1848, 1848*
 87, *1848, 1848*
 88, *1848, 1848*
 89, *1848, 1848*
 90, *1848, 1848*
 91, *1848, 1848*
 92, *1848, 1848*
 93, *1848, 1848*
 94, *1848, 1848*
 95, *1848, 1848*
 96, *1848, 1848*
 97, *1848, 1848*
 98, *1848, 1848*
 99, *1848, 1848*
 100, *1848, 1848*

Sclerothamnus microphyllus! Rob Brown
Haud procul ab ora apud Newcastle.
legit *Veget. N. 74* hb. ejusd.
Certe hujus generis et de specie vix dubito
quia species unicuique cognita a Brownia
etiam in litore australi nov. Holl. detecta.

(*P. daphnoides*! Sm.)

P. cuneata *Forstn.* foliis obovatis
cuneatis subretusis. Forma foliorum
paucis *P. obcordatae* inclinans
inter folia longioribus non emar-
ginatis. *Ad pl. T. Torrey! N. 7. 4*
Nunc ad *P. obcordatam* Andr. retuli,
i. e. formam magnificam. Folia
saepe tria longiora quam lata, posthinc
— prut usq. ad 3' alt. Nipillum suborbiculatum
apice sparsis basi viridis purpureis donatum.
Stamina longitudine carinae, alba. vexillo bre-
viorae carinae longiorae. In montanis: *Colloparum*
Weyl-range, Lepty-range Sept. Oct. 1846.

xv. *P. obcordata* (Rob Brown) Andr.
Lepty-range. Stuart N. 218.

quae plurimum etiam in Tasmania
legit *ad portum regnorum hb. N. 754*
legit 8-10'

P. ferruginea *Wedg. Lepty-range! Oct 47*
est. Stuartian N. 193. Coarctata P.
largiflorus nostra

Philinaca cardiophylla *Forstn. P. largiflorus!*

Sp. ut oncea clivosa diffusa *P.*
P. biloba *Wt.* non solum termina-
libus sed etiam axillaribus, floribus
infra glabrescentibus, et *P. ferruginea*
Wedg. floribus foliisque minoribus
his cordatis, a *P. lacunculosa* forma
foliorum non elliptica. *hb. J. N. 12*

Fruiter pulcherrimus rami strictis
superne pilosiusculis *auris* *foliis*
et floribus parvis *hb. J. N. 1-1 1/2*
l. long. 1 mlat., calix *bracteis* *subulosis*
candentes, laciniis subulosis, vexillum videri
striatum, alis carinae longioribus *carina*
ovata.

„Suffrutex pedalis et ultra, strictus v. adscendens. *Flores* aurantiaci.“
Legumen ovale, compressum, tumidum, 4-1½ lin. longum, 3 lin. latum, muticum, adpresse pilosum, demum glabratum, suturis acutis, valvis convexis scrobiculato-punctatis intus laevibus glabris, stipite vix dimidium calycem (reflexum) aequante. *Semina* 2, oblonga, subsessilia, umbilico laterali estrophiolato.

PULTENAEA Sm. Endl. gen. n. 6446. Meisn.
gen. p. 81. (58.)

PULTENEJA Hoffmannsegg. — PULTENAEAE sect. I, DC.
prodr. 2. p. 110.

1. **Pultenaea Brunonis Benth.** in Ann. Wien. Mus. 2. p. 81, n. 1. Walpers rept. 1. p. 574: glabra, foliis exstipulatis, anguste linearibus, apice latioribus, acutiusculis, subtus convexis enerviis; floribus ramulos terminantibus, solitariis, subsessilibus, bracteis ad basin ramulorum paucis, bracteolis exiguis nullisve; calyce brevissimo, membranaceo, subaequaliter 5-dentato; legumine compressiusculo, ovato, acuminato, calyce multo longiore.

In solo turfoso inter frutices densos planitie prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 876.

„Frutex 2-3-pedalis.“

2. **Pultenaea genistoides n. sp.**, glaberrima, ramis apice subangulatis; foliis sparsis, exstipulatis, oblongo-linearibus, obtusis, muticis, enerviis, laevibus, canaliculatis, dorso convexo apice carinato-incrassatis, junioribus ciliatis; floribus in apice ramulorum brevium basi squamato-bracteatorum solitariis, inter folia sessilibus; calyce brevissimo, subaequaliter 5-dentato; legumine brevissime stipitato, ovato-oblongo, adpresse pilosiusculo.

In solo turfoso prope villam b. Spencer (Plantagenet) d. 23. Sept. Herb. Preiss. No. 1021. et ad portum Princess Royal Harbour m. Nov. 1840. No. 1101.

Cum praecedente, cui inflorescentia et floris structura omnino convenit, propter calycem a *Pultenaeis* genuinis longe discrepantem (membranaceum, cupulaeformem, vix lineam longum) forsitan generice separanda. A *P. Brunonis* differt: ramis validioribus, subvirgatis, obsolete angulatis, nigricantibus, foliis majoribus (1-5 lin. longis, 1½-2 lin. latis) apice dorso in carinulam brevissimam obtusam albidam incrassatis, caeterum laevibus v. obsoletissime l-nerviis, nec rugulosis, squamis ad ramulorum basin duplo majoribus (1½ lin. longis) triangularibus complicatis, flore ⅓ majore. — „Frutex 1-2-pedalis. *Folia* obscure viridia. *Flores* flavi.“

3. **Pultenaea aspalathoides n. sp.**, ramis corymbosis, subsericeo-canescens; stipulis minutis, adpressis, deciduis; foliis linearibus, utrinque attenuatis, mucronatopungentibus, reticulatis, in ramorum apice fasciculato-confertis laxo ciliato-pilosis, inferne remotiuscule sparsis

glabris; floribus in ramulorum apice subsolitariis, sessilibus, folia vix superantibus, bracteolis scariosis; calyce corolla duplo brevior, membranaceo, sericeo, subaequaliter 5-fido.

In solo turfoso-subarenoso sylvae et planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) m. Oct. et Nov. 1840, Herb. Preiss. No. 838 et 1195.

Facies fere *Aspalathi araneosae*. Sequenti valde similis, sed inflorescentia et praecipue calycis indole praecedentibus affinior. A sequente differt: ramis apice corymboso-ramosissimis, ramulorum foliis approximatis fasciculos mentientibus subacerosis multo angustioribus ($\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ lin. latis) pilis tenerimis fere lineam longis patentissimis diu persistentibus constanter vestitis, floribus subsolitariis folia vix ac ne vix superantibus et praecipue calyce dimidio minore tenuiter scarioso-membranaceo bracteolas (fuscas, diaphanas, truncato-obtusissimas) vix superante. — „Frutex bipedalis.“ *Folia* inferiora remotiora, sparsa, erecta, plana, glabra, saepe 10 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, summa dimidio breviora et triplo angustiora, carinato-v. complicato-subtriquetra, omnium nervo medio venisque primariis sub angulo recto ex eo ortis marginemque petentibus vix anastomosantibus utrinque prominulis. *Bracteolae* apice subtruncatae obsolete emarginatae v. 2-3-denticulatae, evidenter e stipulis connatis conflatae. *Calyx* subturbinatus, 2 lin. longus, lobis tubum subaequantibus triangularibus setaceo-acuminatis. *Vexillum* unicolor alaeque aurantiacae, *carina* purpurascens. *Legumen* non vidimus.

4. **Pultenaea aciphylla** Benth. in Hügel Enum. p. 35, n. 105; Ann. Wien. Mus. 2. p. 81. Walp. l. c. p. 574: ramis leviter caescentibus, stipulis minutissimis, adpressis; foliis lanceolatis, rigidis, pungentibus, reticulatis, adultis glabris; floribus ad ramulorum apicem subsolitariis v. paucis fasciculatis, bracteis paucis imbricatis, leguminibus ventricosis villosis.

In solo sublimoso district. Sussex, d. 9. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 833. in solo subturfoso-arenoso ad Stirling's-terrace, d. 21. Sept. No. 847. et in planitie prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. Oct. 1841. No. 848.

β **latifolia** nob., foliis ovato-oblongis (6-14 lin. longis, 3-6 lin. latis. Nec flor. nec fr. vidi, caet. vero *P. aciphyllae*.

In solo sublimoso distr. Sussex, m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1044.

„Frutex 6-8-pedalis.“ *Folia* 6-12 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. lata, novella saepe pubescentia, mox glaberrima. *Flores* foliis summis paulo breviores. *Bracteolae* ad basin capituli 4-1-flori paucae, adpresse imbricatae, vix $\frac{1}{2}$ - 1 lin. longae, inferiores triangulares acutae, superiores obtusae, dorso sericeae. *Calyx* herbaceus, sericeus, subcampanulatus, lobis tubo longioribus lanceolatis setaceo-acuminatis rigidulis, superioribus 2 paulo altius connatis latioribusque, sinibus extrorsum denticuliformi-prominulis. *Vexillum* luteum, medio atropurpureum, flabellato-venosum; *carina* atropurpurea. *Legumen* junius oblique obovatum, compressum, 3 lin. longum, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, adpresse pilosum; maturum subgloboso-turgidum, 4 lin. longum latumque, laxè molliterque pilosum, valvis intus dense pilosiusculis! *Semina* oblonga, nigra, subnitida, stropholiola pallida biloba parum longiora. — Variat ramis ramulisque glabris v. vix sericeis et dense cano-pubescentibus. — Species meo iudicio ad generis sectionem secundam (Capitatas) nec ad primam (Paucifloras, quibus a cl. Benth. adscribitur) referenda; flores enim in nostris speciminibus, descriptioni l. c. caeterum optime congruis, plerumque 2-4 subcapitati, rarissime vero solitarii sunt et ab ipso cl. Benth. apud Hügel l. c. subcapitati, in Ann. Wien. Mus. l. c. vero subsolitarii dicuntur.

x *P. villifera*! Liebm. hb. St. A. 190.
Enhanata Day, ^{Lofty-range!} fol. 1/2-2'
P. minutifolia f. *Drum.* a. f. nov.
 foliis minoribus oblongis, legu
 (in diffinitu montis Hartke An. 48.)
 minime pubescentibus, f. *Drum.* a. f. nov.
 vixente recedens. Flor. fragrantis.

x *P. hypoleucopha*! Liebm. hb. St. 199.
 var. *Drum.* a. f. nov. erecta & decumbens
Drum. a. f. nov. *Drum.* a. f. nov.

Ab hac non distinguo varietatem
P. attenuata, fol. basi versus
 angustatis hinc *Drum.* a. f. nov.
 calioribus, chiampi habita caliori
 & ramis densius villosis extra
 abhorrens.

P. stricta Sims. V. D. L. hb. St. 91.
 fol. autem non sunt obovata sed basi ovata atq.

P. verticillata Rob. & B. ^{nucula, retusa}
P. punctulata Hook. ^{quadrant. Conf. P.}
P. stipularis! Smith. hb. L. 17.
 Lofty-range hb. St. 195.

x *P. oligantha* f. *Drum.* a. f. nov.

Drum. a. f. nov. villosa-pubescentibus, stipulis minutis
 & basi latiusculis subulatis, foliis line-
 aribus revolutis apice et basi rotun-
 datis, supra ^{laevibus} *Drum.* a. f. nov. *Drum.* a. f. nov.
 pubescentibus patentibus, clori-
 bus axillaribus foliariis pedunculatis
 latis, calicis laciniis tubum ac-
 cessantibus.

Planta fruticosa sub nomine *P.*
graviculis mox communica-
 tas hucusque ⁱⁿ *Drum.* a. f. nov. *Drum.* a. f. nov.
 fol. 2-3" longa, vix lineam lata, caly-
 2-linearis, stipulum calycis ne quidem duplo
 longius. Lignum *Drum.* a. f. nov. *Drum.* a. f. nov.
 in no- *Drum.* a. f. nov. *Drum.* a. f. nov. *Drum.* a. f. nov.
 tum pallidiusculum 1/2-2" longum 1" latum.

x *P. canaliculata*, *ferd* Mee? *Ab. St. 196.*
pubescens, ramis ramulisque ter-
resibus, stipulis linearibus basi plus
minusve latiore, foliis alternis ra-
rius suboppositis, ^{in ramulorum apice oppositis, imbricatis} ovato-
oblongis, capsulis terminatis
paucifloris, leguminibus puberulis co-
P. villosa ^{et mollis} *St. proximo accedens*, foliis
acutis longioribus 3-5 lin., capsulis
foliis non rarinatis, vexilla discolori
(purpurea citrina limbato sic sp. f.)
diffingentes. *St. proximo*, *Ab. St. 196.* *long.*
1" ^{capitulum} *long.* *St. 196.* *long.* *St. 196.*
St. 196.
St. 196.

~~*P. subumbellata* Ferd. Müller~~
~~*P. subumbellata* Hooker! No. 11. 96.~~

Ingrá. V. D. L. Miki ignota & vir hujus nomi-
nis digna floris nam sicut in capi-
tulis solum collecti & haud ulla pedunculis pra-
eclati diti! - In montibus activioribus V. D. L.
Nov 49 Jan 21. 1849. hb St. H n. 300 (fril. forma
hb St. 760 minor) - (Wpl. South Est river, hb St.
H n. 22. fr. 2-3'. Oct 1848 (fril. form. major)
A Plant. trix a proxima recedit folijs
angustioribus, melioris, valgi-
natis, firmiter pubescentibus
pro densata & abellavione, hb St. 192.

G. polyosa Jordm. hb. N. Farm. 698.

P. pedunculata Hook *P. longipes*, admodum

P. vestita? R. Brown <sup>indistinctly double long
ribes in young
lvs. occ. post.</sup>
Friticularis hirsae depressus, in
autum collium praecipue inter
fruticosa occurrit. Bigli-range
Lofty-range Nov.
Diff. paull. a diagn. previcellis solita-
ris a *P. vestita* certe valde cognata
soliorum margine non reflexo.
Ad fl. South Esk river, Ab. St J.
632 Oct 49. "Watts."

5. **Pultenaea ochreatea** *n. sp.*, glabra, ramis filiformibus; stipulis membranaceis ochreiformibus, demum laceris deciduis; foliis sparsis, lanceolatis ellipticisve, muticis, planis v. supra concavis, utrinque reticulatis; floribus; legumine ventricosso-ovali, turgido, extus intusque pubescente.

In districtu Wellington, d. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1038.

A praecedente, proxime affini, notis indicatis facile distinguenda. *Rami* tenuissimi, laxi, flexiles, laeves, apice compresso-angulati. *Stipulae* intra axillam connatae in vaginam 1-1½ lin. longam, ramum arcte cingentem, tenere membranaceam, albam, basi rufam, nitidam, ochreas *Polygonorum* e sect. *Avicularia* imitantem, mox laceram, demum deciduam. *Folia* 3-4 lin. longa, 1-1½ lin. lata, obtusa v. vix acutiuscula, absque mucrone ullo, reticulatione penitus *P. aciphyllae*. *Flores* ramulos terminantes, solitarii, pedicello brevissimo squamulis scariosis imbricatis bracteolato. *Calyx* circ. 1½ lin. longus, lobis inferioribus triangulari-lanceolatis acutis. *Petala* *Legumen* sessile, 4 lin. longum, 2½ lin. latum, obtusum, 2-spermum, suturis acutiusculis, valvis convexis extus nigricantibus minute puberulis, intus pallidis dense pilosiusculis.

6. **Pultenaea ericaefolia** *Benth.* in Lindl. Swan River p. XIII, n. 45: ramis pubescentibus; stipulis erectis; foliis sessilibus, linearibus, muticis, margine involuto subteretibus, supra sulcatis, glabris, exsiccatione corrugatis; capitulis terminalibus, dense multifloris, hinc inde proliferis; bracteis laxiuscule imbricatis, membranaceis, fuscis, 3-fidis, laciniis ciliatis, lateralibus lanceolatis, intermedia bracteolisque subulatis; calycis bilabiati lobis subulatis ciliato-plumosis.

In glareosis inter frutices montis Greenmountain (Perth) d. 26. Apr. Herb. Preiss. No. 1189. in solo turfoso-arenoso inter frutices sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. Oct. No. 1187. et in confragosis collium Konkoherup-hills (Kent) d. 19. Nov. 1840. No. 1186. (Drummond n. 248 et coll. I.)

„Frutex ½-1½-pedalis.“ *Rami* graciles, plerumque parum ramosi, apice interdum corymbosi. *Stipulae* demum semper, nec adeo tarde, deciduae. *Folia* acuta, mucosa, rarius subobtusa, patula, scabriuscula. *Involucrum* squamae laxiusculae.

7. **Pultenaea strobilifera** *n. sp.*, ramis divaricatis, pubescentibus; stipulis setaceis, minutis, deciduis; foliis brevibus, subtriquetro-teretibus, obtusis, muticis, laevibus v. minute corrugatis, supra 1-suleis; capitulis terminalibus, strobiliformibus, ovoideis; bracteis imbricatis adpressis, fuscis, pubescentibus, ovatis, apice 3-fidis, lobis lateralibus lanceolatis acuminatis, intermedio subulato; calycis bilabiati lobis acuminatis dense sericeo-plumosis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. Herb. Preiss. No. 1185. et in districtu Minto, m. Nov. 1840. No. 1190. (Drummond n. 247.)

Praecedenti admodum similis, sed specificè distincta statura humiliori („spithamaea-pedalis“) caulibus a basi jam magis et iterato ramosis, ramis plerumque trichotomis et angulo lato divergentibus, stipulis minoribus fugacibusque, foliis dimidio brevioribus (1-2 lin. longis) semper obtusis, laevissimis et subadpressis (rarius leviter rugulosis et semipatentibus, nunquam punctato-scabris) capitulis dimidio minoribus ovoideis (nec subglobosis) nunquam proliferis, bracteis arcte adpressis floribusque circ. ⅓ minoribus, calyce praecipue ⅓ brevioris et pilis arctioribus erectis mollibus albidis plumoso-ciliato

(nec pilis rigidulis rufis patentibus hispido). *Folia* juniora, aequae ac in illa, patentium hispido-ciliata.

8. **Pultenaea empetrifolia** *n. sp.*, ramulis canescentibus; stipulis membranaceis, lanceolatis, adpressis, persistentibus; foliis confertis, triquetro-linearibus, obtusis, brevibus, glabris; capitulis terminalibus, sessilibus, paucifloris, basi imbricato-squamatis, saepe proliferis; calyce bracteas bracteolasque superante, bilabiato, laciniis acutis rigidulis, inferiorum sinubus tuberculiformi-sphacelatis.

In Australia occidentali Herb. Preiss. No. 865.

„Frutex pedalis“, dense ramosus; *rami* inferne defoliati, undique stipulis fuscis acutis vix $\frac{1}{2}$ lin. longis earumve reliquiis tecti, inter stipulas pubem parcam albidam ostendentes. *Folia* vix semilineam ab invicem distantia, semipatentia, 1-2 lin. longa, mutica, laevia, glabra, dorso convexa v. triquetra, supra plana v. canaliculata. *Capitula* nucis avellanae minoris mole, 4-8-flora, plerumque in ramulum foliosum brevissimum excrescentia, basi bracteis stipularibus adpresse imbricata; *bracteae* membranaceae, fuscae, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longae, semibifidae (e stipulis duabus connatis formatae) lobis lanceolatis acutis albo-ciliatis, sinu plerumque folium genuinum viride minutum gerente; *bracteolae* paleaceae, oblongae, integrae, calyce duplo v. triplo maiores. *Calyx* 3-bracteolatus, corolla vix $\frac{1}{3}$ brevior, 2 lin. longus, glaber, subcampanulatus, tubo membranaceo tenui decolore laevi lobis paulo longiore, labiis aequilongis virescentibus, lobis triangularibus apice subcomplicatis rigidulis, superioribus duplo fere latioribus et paulo altius connatis, inferiorum sinubus in denticulum tuberculumve exiguum sphacelato-fuscum obsolete prominulis. *Petala* subaequilonga, *vexillo* subrotundo leviter emarginato medio purpureo-venoso *alisque* vitellinis, *carina* atropurpurea. *Ovarium* sessile, villosum, stylo capillari basi pilosiusculo. *Legumen* — Species nobis cognitarum nulli similis, sectioni Proliferarum adnumeranda.

9. **Pultenaea tenuifolia** *R.Br.* Bot. Mag. t. 2086. DC. prodr. 2, p. 113, n. 17. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 82, n. 36.

In summitate montis Baldhead (Sinus Regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1203.

„Frutex 6-uncialis.“

Subtribus III. *Mirbelieae*, Benth. in Hügel Enum. p. 35; Ann. Wien. Mus. 2, p. 83.

MIRBELIA Sm. Endl. gen. n. 6448. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Mirbelia (Eumirbelia) dilatata** *R.Br.* DC. prodr. 2, p. 115, n. 3. Bot. Reg. t. 1041!

In depressis subarenosis umbrosis Peninsulae (Perth) d. 27. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 1049. (Drummond n. 189 et coll. I.)

„Frutex 6-8-pedalis, gracilis“, glaberrimus. *Rami* ramulique acute angulati, stricti. *Folia* sparsa v. opposita aut terna v. quaterna v. saltem opposito-v. verticillato-approximata, reticulata, 6-10 lin. longa, apice dilatata (saepe latiora quam longa) triloba, lobis lateralibus 3-5-fidis, intermedio indiviso saepe breviora et plus minus recurvo, laciniis omnibus pun-

x Pultenaea furcata Ferdmüll.

Signosiorum a *P. stipulari*
capitulis parvifloris calycibus
bracteis ^{longioribus} ~~longioribus~~ foliis
involutis a *P. aristata* bra-
cteis latioribus, calycis don-
tibus. petalo longe-acuminatis
sed acumine tenui flexili haud
firmo pungente etc.

Trans fluvium Murray in
frutices ad rivum Salt-
Creek. Oct. exeunte. 1848. In
stipulae ferrugineae et con-
natae, ut in *P. stipulari*
^{vittata?}

Pultenaea cymbulifolia Ferdmüll.

Agst. St. Pauli, hb. St. J. 656.
4^o Nov.

x *P. scabra* ^{occidentalis}
~~*P. aspera*~~ Ferdmüller. jam antea (Vieb.)
~~erecta~~ ^{pubescentium} floribus ad apicem ra-
morum ^{reptantibus} racemosa. dissepitis, ca-
licis ^{reptantibus} linearibus oblongis acutis mar-
gine revolutis, supra punctis ele-
vatis pilos fasciculatos gem-
mibus asperis, subtus calycibusque
pubescentibus, bracteis calyce
(nulli depresso) brevioribus, stipulis
petiolo longioribus.

In fatis a *P. villosa* e iserpat.
fol. patentia serque ad 4th 3g.
Specim. fructipere fragmentum.
Lafey-range. Est var. *P. oligantha*.

P. nitens ^{et}
P. molles Ferdmüller (jam antea)
Floris & fructus defuit, sed
verisimiliter hujus generis. ab
omnibus cognitis distincta
P. parviflorae Sieber forte
proxima, fortis omnibus vil-
losis peculiaris. Lafey-range.

gentibus. *Pedicelli* axillares solitarii, raro gemini, 2 lin. longi, calycem aequantes, erecti, infra medium bracteola minuta subulata decidua muniti. *Calyx* viridis, laxe campanulatus, bilabiatus, laciniis subulato-acuminatis. *Corolla* calyce triplo longior, amoene rosea. *Ovarii* glabri, 6-8-ovulati stipes calycis tubum aequans. *Stylus* falcato-filiformis, glaber, inferne paulo incrassatus. *Legumen* exsertum, oblongum, 3-4 lin. longum, turgidum, acutum, transverse venosum, epicarpio fusco endocarpioque pallido ab invicem solutis secundum suturas dehiscens, utriusque valvis apice demum breviter fissis, endocarpium complete bilocularis sutura utraque valde inflexa intusque leviter pubescente. *Semina* parva, subreniformi-ovata, compressa, atra, nitida, estrophiolata.

2. **Mirbelia (Eumirbelia) ovata** n. sp., foliis ternis oppositisve, breviter petiolatis, patentibus, ovatis v. ovato-oblongis, obtusis, muticis, margine revolutis, supra reticulatis et punctato-scabriusculis demum glabris, subtus famulisque adpresse sericeo-pilosiusculis: floribus terminalibus 3-1 (raro 5-6) brevissime pedicellatis; calycis pilosi laciniis lanceolatis subaequalibus tubo longioribus, ovario 8-ovulato, legumine sessili villosulo.

In sublimoso-glareosis sylvae cis flum. Gordon (Hay) 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 803 et ad portum Princess Royal Harbour Dec. 1840. No. 1202.

Facies fere *Oxylobii cordifolii*, sed stipulae plane nullae et legumen omnino *Mirbeliae*. — „Frutex 2-pedalis.“ *Rami* teretes, graciles, debiles, diffuse ramosi, ramulis semipatentibus. *Folia* 3-4 lin. longa, 1-2 lin. lata, ovata, rarius subrotunda v. oblonga, basi rotundata et plerumque subcordata, nervo subtus prominulo, juniora utrinque, adulta subtus tantum adpresse albido-pilosiuscula, supra mox glabra dense reticulata et sub lente puncticulis elevatis scabriuscula. *Flores* plerumque terni ramulos terminantes (accedentibus interdum 2-3 in summis axillis, lateralibus); *pedicelli* vix lineam longi, basi bractea subulata ipsis vix longiore apiceque bracteolis duabus similibus calyci adpressis ejusque tubum aequantibus muniti. *Calyx* membranaceus, rufus, adpresse pilosiusculus, laxe campanulatus, 2-2½ lin. longus, ultra medium 5-fidus, lobis lanceolatis acutis fere aequalibus. *Petala* breviter unguiculata, *vexillo* orbiculari subemarginato alisque aurantiacis basi purpureis, *carina* obovata subrecta atropurpurea. *Ovarium* sessile, villosum, 8-ovulatum, sutura superiore valde inflexa. *Stylus* capillaris, incurvus. *Legumen* (immaturum) oblongum, calycem parum superans, turgidum, fulvo-villosum, valvis coriaceis apice bifidis intus glabris. *Semina* estrophiolata.

DICHOSEMA Benth. Endl. gen. n. 6449.

Meisn. gen. comm. p. 350.

1. **Dichosema spinosum** Benth. in Hügel Enum. p. 35, n. 106; Ann. Wien. Mus. 2, p. 84: ramis subvirgatis, glabriusculis, apice inermibus; foliis ad basin spinarum patentibus ipsis sublongioribus fasciculatis, linearibus, margine revolutis, obtusiusculis, glabris, axillis 3-1-floris, floribus sessilibus, calyce sericeo-pubescente.

In limoso-calculosis sylvae cis oppidum York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 862, et in region. interior. Australiae merid.-occ., m. Oct. 1840. No. 860. (Drumond coll. l.)

„Frutex 2½-pedalis.“ *Rami* teretes, plerumque parce ramosi. *Petala* carnea v. rosea v. purpurea? (ex Benth. flava.)

2. **Dichosema subinermis** *n. sp.*, ramis fastigiato-ramosis ramulisque tenuibus teretibus puberulis apice inermibus; foliis sparse fasciculatis, patentibus, spina axillari plerumque destitutis; linearibus, obtusis, muticis, glabris, supra convexis, subtus 1-sulcis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus; calyce subsericeo-pilosiusculo.

In solo glareoso-limoso sylvae prope oppidum Guildford, d. 8. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 859. (Drummond n. 191.)

„Frutex 3-pedalis.“ *Rami* dense ramosi, graciles, ramulis debilibus filiformibus adscendentibus elongatis, pube adpressa subsericeo-canescens, inferne glabrescentibus; lateralibus nonnunquam (rarissime tamen) apice spinulentibus inferne foliosis. *Folia* omnino praecedentis, saepe paulo tenuiora et in ramorum extremitate solitaria (nec fasciculata) infimis axillis rarissime spinulam gracilem patulam folia aequantem exserentibus. *Ovarium* sessile, 6-ovulatum. — Caet. omn. *D. spinosi*, a quo tamen notis indicatis facile dignoscitur.

3. **Dichosema racemosum** *n. sp.*, corymboso-ramosum, ramulis rigidis sulcato-subangulatis glabris apice spinulentibus; foliis oppositis verticillatisque v. subsparsis, linearibus, obtusis, muticis; margine revolutis, glabris; racemis terminalibus, brevibus, aphyllis, pedicellis geminis ternisve brevibus calycibusque pubescentibus.

In solo subturfoso-arenoso inter frutices planitie prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 861.

„Frutex sesquipedalis.“ *Stipulae* nullae. *Folia* praecedentium, sed nunquam fasciculata, opposita, rarius terna v. quaterna v. sparsa, axillis semper inermibus. *Racemi* circ. pollicares, terminales et nonnunquam e summis axillis, circ. 9-flori, bracteis minutis caducis, pedicellis calyce paulo brevioribus. *Flores* (ut reliqua omnia) praecedentium, sed ⅓ minores, et calycis (1½ lin. longi) labium superius rotundato-subtruncatum levissime emarginatum. *Ovarium* sessile, pubescens, 1-loculare? 4-6-ovulatum, stylo brevi crassiusculo pubescente apice uncinato. *Legumen* desideratur.

Tribus II. LOTEAE, DC. Subtribus I. Genisteae, DC.

HOVEA R.Br. Endl. gen. n. 6451. Meisn. gen. p. 82. (58.)

1. **Hovea pungens** Benth. in Hügel Enum. p. 37, n. 110. Hügel Bot. Archiv t. 7! Walpers rept. 1, p. 577: stipulis setaceis, foliis rigidis, linearibus, mucronato-pungentibus, margine revolutis, reticulatis, glabris v. pilosiusculis, pedicellis calyce parum longioribus, ovario stipitato glabro.

In arenosis sylvae prope Pineapple (Perth) d. 20. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1054, (Drummond n. 177 et coll. I.)

„Frutex pedalis, erectus. Flores laete coerulei.“

Pultenaea *lytophylla* *fendm.* *sp.* *alapattina*, *laurent* *laurent*
Kobler. *lytophylla* *proxima*. *lytophylla* *pluripetalis*

Pultenaea frutescens *fendm.*

In *Tasmania* australi haud
longe ab urbe Hobartown
(*Ptillyria juniperina* *Swart*)
est omnibus numeratis in de
gnat. & *Malp.* *rep.* *diffinis*
absque difficultate *diffinis*
nada, (quantum e pterapibus
diagnosibus concludendum
habet). *P. lanata* *attenua*
facie imitans, quae attamen
novae *Hollandiae* rivis etiam
e significatione speciali diffinis.
Candem sp. habes e regione *arom* *moor*
Gaiber in arenosis hieba *madidis*. *South: van*

Pultenaea Bobrii *fendm.*

lauro *rub.* *Mich.* *Nov 48*,
Vixillum *atropurpureum*, *lae* *luteae*,
varia *atra* (?) *Mich.* (*Phyllos.* *ericioides*)
A *P. leucifolia* *proxima* distat
paucis floribus majoribus, inda-
matis *paliorum* *fere* *co-* *caus-*
secute *et* *habitu* *alienu*,
In *la* *Gaolu* *locus* *Lyndoch*
valley. *Sept.* *I.*

Pultenaea halmaturorum *fendm.*

in arenosis insulae *Kangaroo-*
island. *frut.* *paucipet.*
South: acutissima!

P. purpurea *Sweet.*

In nova huius *proxima* ad
juvenda? *adfluminis*, *South*
Est *river* *sp.* - *fr.* *5-6*, *Oct*
18. *1848*. *Ab.* *N. O.* *#* *n. 6*.
Excepto *tomulo* *ramorum* *re-*
nno *haud* *purpurea* *fil.*
Nov. *Hall.* (*Goldm.* *fr.* *Diagnos.*)
congruit.

2. **Hovea stricta** *n. sp.*, caulibus simplicibus, erectis, strictis, villosiusculis; stipulis linearibus, parvis, mollibus, caducis; foliis linearibus, breviter mucronatis, margine revolutis laxe ciliatis, supra reticulatis; junioribus laxe pilosiusculis, demum glabris; pedicellis solitariis, calycem villosiusculum subaequantibus; legumine stipitato, glabro, 2-spermo.

In arenosis sylvae districtus Sussex, m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1057.

A praecedente proxime affini caute distinguenda: caulibus pedalis simplicissimis, stipulis bracteolisque complanatis nec, nisi apice, vere setaceis, haud rigidis, fugacissimis, foliis plerumque pollicaribus $1\frac{5}{4}$ lin. latis, apice obtuso mucronulo vix $\frac{1}{4}$ lin. longo apiculatis, ciliatis, pubescentia caulis calycisque paulo longiore et laxiore. Caet. omn. *H. pungentis*. (Petala non vidimus.) — A *H. ramulosa* et *pannosa* Cunn. et *H. purpurea* Sweet differt: pubescentia haud ferrugineo-tomentosa, pedicellis solitariis, caet.; a *H. villosa* Lindl.: foliis minoribus, praecipue angustioribus, caet.; a *H. Manglesii* Lindl.: stipulis haud setaceis, floribus pedicellatis, caet.

3. **Hovea trisperma** *Benth.* l. c. n. 111. Walp. l. c.: foliis inferioribus ellipticis oblongisve, superioribus lanceolatis linearibusque, supra reticulatis, subtus pubescentibus; pedicellis calyce brevioribus; legumine stipitato, glabro, trispermo.

In arenosis sylvae circa oppidum Perth, d. 8. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1051. (Drummond n. 179, 180.)

„Suffrutex pedalis, erectus. Variat floribus albis.“ *Leguminis* stipes calycem aequans.

4. **Hovea Celsi** *Bonpl.* Bot. Reg. t. 280. DC. prodr. 2. p. 115, n. 6.

Locis umbrosis in solo humoso ad margines lacus Kalbenup (Sussex) d. 27. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1053. in rupestribus sylvae ad latus septentrionale montis Melville et in chasmate ad latus occidentale montis Clarence (Plantagenet) d. 5. Sept. 1840. No. 1055.

„Frutex 5-8-pedalis, erectus, strictus.“ *Ramuli* calycesque ferruginei. *Folia* usque ad 3 poll. longa et $1\frac{3}{4}$ poll. lata“).

5. **Hovea crispa** *Lindl.?* in Bot. Reg. 1839. Misc. p. 19, n. 19. Walpers rept. l. p. 577: ramis gracilibus, pilosis; foliis ovato-oblongis, mucronatis, margine crispis utrinque pilosis; pedunculis subternis petiolorum longitudine, bracteolis sub calyce villosis setaceis; ovario stipitato, glabro, 4-ovulato.

“) **H. elliptica** DC. l. c. n. 4? — Swan River, Drummond n. 118. — Diagn. sis l. c. insufficiens, a planta Drummondiana paulo recedens „foliis emarginatis, pedicellis folio triplo brevioribus geminis.“ *Habitus H. Celsi*; folia huic similia, sed acuta v. acutiuscula. Stipulae setaceae, rigidulae, petiolo $1-1\frac{1}{2}$ lin. longo vix longiores, fugaces. Pedicelli axillares 2-4, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longi, apice setaceo-bibracteolati. Calyx 4 lin. longus, basi attenuatus, adpresse pilosiusculus, labio superiore maximo tubum subaequante, inferioris duplo brevioris lobis ovato-lanceolatis acutis. Corolla ampla, calyce subduplo longior, coerulea. Ovarii stipes calycis tubum aequans. — Species florum magnitudine reliquas omnes superans.

In glareosis sylvae montis Greenmountain (Darling's-range) d. 15. Apr. 1840. sterilis Herb. Preiss. No. 1063.

„Frutex vix pedalis,“ (bipedalis, floribus purpureis, fide Lindl. l. c.) — *Specimina* nostra tota glabra; ramuli punctis ferrugineis prominulis glandulosis? conspersi.

PLAGIOLOBIUM Sweet. Endl. gen. n. 6452. Meisn. gen. p. 85. (60.)

1. **Plagiolobium chorozeamaefolium** Sweet Fl. Austral. t. 2, foliis ovalibus oblongisve, vix marginatis, concoloribus, plus minus sinuato-dentatis, dentibus spinuloso-mucronatis, stipulis setaceis subspinescentibus; pedicellis axillaribus 2-4 calycem subaequantibus, bracteolis 2 setaceis a calyce remotiusculis ejusque tubum subaequantibus.

Hovea chorozeamaefolia DC. prodr. 2. p. 116, n. 7. Bot. Reg. t. 1524.

α subintegrum nob., ramulis pubescentibus; foliis planis, subtus parce puberulis, subintegris v. levissime sinuato-dentatis, dentibus obsoletis breviter mucronulatis.

In calciosis sylvae inter Greenmountain et Mahogany creek (Darling's-range) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1052. (Drummond n. 181.)

β dentatum nob., ramulis vix apice puberulis, foliis utrinque glabris, sinuato-dentatis undulatis, dentibus longiuscule spinescentibus.

In rupestribus ad latus montis Melville (Plantagenet) d. 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1058.

„Suffrutex sesquipedalis.“ *Radix* lignosa, crassa, divaricato-ramosa, apice multicaulis. *Legumen* *Hoveae* *Celsi*, 2-spermum, stipite vix calycis tubum aequante.

2. **Plagiolobium ilicifolium** Sweet l. c.? (Walp. rept. 1. p. 577.) foliis ovatis v. ellipticis, subtus subglaucescentibus parce pilosiusculis marginatis, sinuato-dentatis, subundulatis, dentibus stipulisque spinescentibus; pedicellis axillaribus 2-4 calyce brevioribus, vix petiolo longioribus; bracteolis 2 subspinescentibus, calyci proximis ejusque tubo (plerumque dimidio) brevioribus.

In region. interior. Australiae occidentalis, d. 7. Mart. 1840. sterile. Herb. Preiss. No. 1060. (Drummond n. 182 et coll. I.)

An vera stirps Sweetiana? An a praecedente, quacum haec a cl. Lindley conjungitur, satis distincta? Praeter notas indicatas ab ea recedit ramis validioribus, foliis crassiuscule coriaceis subtus pallidis margineque plus minus recurvo nerviformi subcartilagineo cinctis et reticulatione obsoletiore supra plerumque immersa, nec non calycis pube densiore subvillosa. *Stipulae*, bracteolae pedicellique longitudine variant saepiusque a praecedente non differunt. „Frutex pedalis.“*)

*) E genere **Platylobio**, cujus nulla species inter plantas Preissianas occurrit, novam addere liceat speciem: **P. macrocalyx** nob., foliis deltoideis ovatisve, apice

In glareis hieme inundata
vivorum Crystal Brook & Marby
~~sepe~~ niver! Auth: Sept.
habitu simillimum est D. Tasmanniana
sed ~~certis~~ aliis distinctionis. Folia
calycis & legumina sunt majora
: corollae fere glabre, et tubum

[illegible]

Borodaea ensata Sieber

x 1. In insula Van D. Land lig. Stuart. h. St. 100.
 In montibus humilibus
 Directum Phlegmaria calyce glabro vix ciliolata
 localiter nullum videtur
 occidit. Sept. Nile-river, h. St. 5. 4. n.
 salvia 10. Oct. & Nov. 1848. Frut. 4-3'
 2-3' (Caulum bracteatum longitudine vari-
 etate. hae species forte B. Solanum
 orien varietas). Ad fl. North W.
 river Tasm. h. St. n. 713, 1/2' ad
 S. procerius ferdme, ramis
 divaricatis angustioribus.
 In collibus siccis ad rivum
 St. Pauli, h. St. 5. 619.

Platylabium triangulare R. Br.
 B. M. Gayanum Hook. H. b. 947
 non Hook.
 Procerius! Ad portum
 North Tasmantiae.
 Anth. Oct. Nov.

Syn: Platylabium macrocalyx Meisner
Platylabium macrocalyx Meisner
 Ramuli esfoliationum pargina supra
 inflatu juniori pubescentis.
 In vertice montis Tormos! 8 Br. Jan 1848.
 Specimina parva. h. b. St. pin. n., h. b. 72
 Certissima hujus loci verisimilitudo
 autem novae est antiquiori B. Thur-
 rayano pariter videtur. Et adusi el-
 limi diagnosis. mihi elapsit, tamen
 parocul dubio est ex ultione. Plur-
 imis Murray ortum, ubi verisimili-
 ter planta crescit
 B. cordatifolium ferdme, foliis exorte
 cordatis, in monte
 h. b. 72. — fructu. autumnal. judas.

**BOSSIAEA Vent. Endl. gen. n. 6455. Meisn.
gen. p. 82. (58.)**

1. **Bossiaea ensata Sieber** Herb. N. Holl. n. 434! DC. prodr. 2, p. 117, n. 2.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. Herb. Preiss. No. 1033. et in glareosis ad radices montis Barrow (Plantagenet) d. 9. Nov. 1940. No. 1125. *) „Suffrutex pedalis.“ *Rami* ubique aphylli. *Calyx* pubescens. *Carina* imberbis.

2. **Bossiaea sulcata n. sp.**, glaberrima, ramosissima, ramis ramulisque aphyllis, compresso-ancipitibus, strictis, rigidis, acute sulcato-lineatis, apice-spinoscentibus, margine alternatim obtuse dentatis; floribus e ramulorum denticulis nascentibus, subsolitariis, subsessilibus, bracteolis minutis; calycis lobis subaequalibus brevibus, obtusis; carina nuda; ovario subsessili, oblique obovato-oblongo, glabro, 4-ovulato.

In limoso-arenosis planitiei ad fluv. Avon, 10 mill. ab oppido York (York) d. 10. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1028.

„Frutex 7-pedalis.“ *Rami* validi, demum subteretes, ramuli compressi, faciebus convexis lineis nerviformibus acute prominulis parallele striatis, marginibus acutiusculis tuberculis obtusis (foliorum abortivorum? v. fugacissimorum? pulvinis) 2-3 lin. ab invicem distantibus denticulatis, omnibus apice in spinam rectam 1-2 lin. longam satis validam pungentem exeuntibus. *Stipularum* foliorumque vestigia, praeter setulas exiguas in ramulorum nascentium denticulis conspicuas, nulla. *Flores* illis *B. ensatae* paulo minores. *Calyx* coloratus? campanulatus, 1-1½ lin. longus, corolla dimidio brevior, lobis tubo brevioribus (⅓ lin. longis) obtusis erectis, superioribus 2 paululum latioribus magisque rotundatis. *Stamina* monadelphia. *Legumen* (seminaturum) 4 lin. longum, 2 lin. latum, stylo multo brevior sublaterali uncinato glabro, marginibus hand incrassatis.

3. **Bossiaea paucifolia Benth.** in Bot. Reg. Jul. 1841. Misc. p. 53, n. 108. (non ib. 1843, t. 63.) Walpers rept. 1. p. 578: glabra, inermis; ramis compressis, alatis; stipu-

mucronatis, lobis basilaribus nunc acutis mucronatis nunc rotundatis muticis; bracteis imbricatis, exterioribus ovatis obtusis interioribus sensim majoribus oblongis acutis dimidium calycem aequantibus; calyce amplo, corollam subaequante, adpresse sericeo-piloso, labii superioris lobis maximis subrotundis. — Ad Port Philipp in Novae Hollandiae ora australi legit cl. Latrobe (Herb. Mus. Neocomens.) — A. P. **triangulari** R.Br., cui praeter notas indicatas, simillimum, differt: calyce duplo majore (5 lin. longo) bracteis quadruplo majoribus, foliis basi saepe inermibus rotundatisque subinde cordatis et plerumque majoribus (usque ad 10 lin. longis, 9 lin. latis.) Vexilli apex calycem brevissime superans, carina alaeque eum vix aequantes. — A. P. **obtusangulo et Murrayano** Hook. Bot. Mag. t. 3258, 3259. (Walpers rept. 1. p. 577.) nobis ignotis, satis distinctum?

*) **B. rufa** R.Br. DC. l. c. n. 3. The Botanist 2, t. 81. — Swan River. Drummond n. 258 et coll. 1. (Inter Preissianas non obvia.) — Facies omnino **B. ensatae**, sed rami hinc inde folia lanceolato-linearia 6-8 lin. longa 1-2 lin. lata obtusa submucronulata plana penninervia glabra, petiolo tenui 1 1½ lin. longo suffulta, gerentia. Calyx glaberrimus. Carina biceps, apice obtuso breviter denseque albo-ciliata.

lis membranaceis, minutis; foliis sparsis, obovatis oblongis linearibusve, obtusis retusisve; pedicellis folio brevioribus basi medioque minute bracteolatis; calycis labiis subaequalibus, tubo brevioribus, superioris breviter bifidi lobis parum latioribus.

B. virgata Hook. in Bot. Mag. (Dec. 1842.) t. 3986. Walp. rept. 2, p. 833.

Locis umbrosis in solo limoso ad ripam fluv. Preston (Wellington) d. 1. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 1029.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* fere *B. ensatae*, 2-3 lin. lati, sed foliosi. *Stipulae* fuscae, petiolo $1\frac{1}{2}$ lin. longo multo breviores. *Folia* sparsa (nec fasciculata, nec approximato-conferta) herbacea, cum petiolo 6-10 lin. longa, 2-5 lin. lata, apice obtusa v. retusa, nonnunquam obcordato-emarginata, tenuiter penninervia. *Pedicelli* solitarii, filiformes, circ. 3 lin. longi. *Flores* magnit. *B. scolopendriae*. *Calyx* $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longus, corolla duplo triplo brevior, lobis acutis. *Vexillum* aurantiacum, atropurpureo-striatum; *carina* alaeque? purpureae. *Legumen* lineare, rectum, circ. pollicare, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, apice rotundatum, 4-10-spermum, in stipitem calycem subaequantem attenuatum, valvis planis glabris laevibus, suturis vix incrassatis.

4. ***Bossiaea spinescens* n. sp.**, glabra, ramosissima, ramis adultis teretibus, junioribus ramulisque patentibus compressis subalatisve apice spinescentibus; stipulis setaceis, petiolum aequantibus; foliis confertis, obovato-oblongis, obtusis retusisve, muticis, planis; pedicellis solitariis, folium superantibus, apice bibracteolatis; calycis labio superiore lato subtruncato emarginato, inferiore brevior acute 3-dentato; carina apice minute villosa-ciliata.

B. paucifolia Bot. Reg. 1843. t. 63. (non Benth.)

In limoso-lapidosis sterilibus summitatis montis Bakewell (York) d. 11. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1031. fl. et fr. et in glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard (York) d. 12. Apr. 1840. No. 1030. fr. (Drummond n. 259 et coll. I.)

A praecedente, proxime affini, praeter notas jam indicatas differt: ramis minus gracilibus, rigidioribus, ramosioribus, ramulis distichis plerumque divaricatis, junioribus angulo fere recto patentibus saepiusque aphyllis spiniformibus, raro complanato-subalatis, subinde parum compressis vix ancipitibus, faciebz valde convexis, margine angustissimo nerviformi; foliis duplo minoribus (cum petiolo $\frac{1}{2}$ -1 lin. longo 3-5 lin. longis, 1-2 lin. latis) apice rotundatis, rarissime emarginatis, saepius ternatim pseudo-fasciculatis (lateralibus scil. revera axillaribus, ex ima basi ramuli, saepe nondum evoluti, nascentibus) stipulis setaceo-subspinescentibus; pedunculis fere semper folium paulo superantibus, apice (nec medio) bibracteolatis, bracteolis magis conspicuis $\frac{2}{3}$ lin. longis erectis oblongis acutis; calyce dimidiam corollam aequante, labio superiore quasi abscisso levissime emarginato; legumine plerumque brevior, 4-6-rarius 8-10 lin. longo, 4-6-spermo. *Valvae* intus haud septulatae! — Valde etiam similis *B. microphyllae* Sm. (Sieber Herb. N. Holl. No. 355! Bot. Mag. t. 863.) quae differt: ramulis vix compressis, junioribus puberulis, foliis coriaceis constanter late obovatis et plerumque emarginatis, pedicellis vix 1-2 lin. longis et carina imberbi.

5. ***Bossiaea Preissii* n. sp.**, glabra, ramis ramulisque foliosis, teretibus, apice vix compressis spinescentibus; stipulis spinuliformibus, petiolum brevissimum aequantibus;

Platylolium macrocalyx Meisner.

In fruticulis primum montium
Lassy - Waroffa - Bayle range
Florat (colosse).

Præloca intricatis, arbutis et
obtusis. Peristomum lato-uniforme
villosissimum citrinum basin vespis et
surgens ^{fulvo} maculatum, macula
venas emittit, ima capi citrinum.
corina ^{fulvo} purpurea. Ovis subbrevior
frutex 1-2' erectus. Stach et vixillum
cytus atropurpureo - fuscam. Corina
infra alba. Rudimentum ra-
monum longius breviusve vil-
loso-pubescentibus.

Similia Termania nulla linea
a nostris divagant. Lamoignon
Oct. Nov. 1848. fr. 1-2' hb. N. S. H
n. 61 & 378. sub nomine P. tri-
angulari, quod per maculis mani-
festis hanc bracteis (præloca
majoribus in P. mar.) introitus.
Sic sine dubio pertinet P. ablu-
gaugulum Hook sed nomen
pupinum solummodo varietati
conveniens in Meisnerianum
"macrocalyx" ~~conferre~~ est
aptius est mutandum
Inape Ivan port, hb. N. S. H
C. H. 1^h 1st.
Floris tenuis fragrautes.

formosum Smith.

In rupestribus collibus ad por-
tum oggnum. 1-2' 629 hb. N.

1. *mona gravis* 1/2 specimen by *C. strausi* *salutaria*
 2. *C. strausi* *procurans* *procurans* *procurans*

caule prostrato, foliis plurimisque
7-11 jugis pilis brevibus tosis pericarpio
oppositis ramorculis ovato-ob-
longis, racemis sat ^{ad apicula} de usis longe
pedunculatis, racina ^{angustata}
singulo contorta

In vicinia fluvii Drooughton
lois fertilibus humidis vel
pappi in nudatis. Auth. ^{pl.} Oct.

Rhizoma ligrosum. Caulis glaberrimus
striatus. Folia impari-pinnata,
foliatis 4-12-jugis, ^{suboppositis} ~~in adultis~~
ovatis brevissime ~~subellipticis~~ ^{oblongis}
obtusis adultis ovatis vel oblongis
obtusis retusiusve glaberrimis
junioribus angustioribus canescentibus,
stipula subcordatae cili-
atae nervo-striatae. Pedunculi
et axillares folium duplo superan-
tes solitarii rari striato tubu-
cati interdum pedales, erecti
aut ascendentes. Calyx breviter
pedunculatus ~~superans~~ ^{aequant} medium quin-
quefidius, lobis ~~superioribus~~ ^{inferioribus} parvis
longioribus ~~extus~~ ^{intus} glabris cinctis vel
cospulis. ~~Calyx~~ ^{lobis} ~~inferioribus~~ ^{superioribus} basi bracte-
~~oideis~~ ^{ovatis} ~~concoloribus~~ ^{concoloribus} ~~minuoribus~~
~~et~~ ^{inter} ~~mediam~~ ^{bracteolam} ~~et~~ ^{appositis}
~~minuoribus~~ ^{ovatis} ~~lanceolatis~~ ^{obtusis}
que ~~angustatis~~ ^{obtusis} ~~obtusis~~ ^{obtusis} ~~obtusis~~ ^{obtusis}
Floris ~~fragrantissimi~~ ^{fragrantissimi} ~~extus~~ ^{extus} ~~purpureis~~ ^{purpureis}
violaceis. Vexillum erectum basi
marcescente flavis ~~sinuato~~ ^{sinuato} ~~carinam~~ ^{carinam}
aequantibus alas duplo calycem triplo
superans. Carinae ~~apice~~ ^{apice} ~~acutiusculatae~~ ^{acutiusculatae}
superius angustatae ~~apice~~ ^{apice} ~~pallide flavis~~ ^{pallide flavis}
Stamina ~~multa~~ ^{multa} ~~multa~~ ^{multa} (9 & 1)

foliis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, muticis, planis; pedicellis solitariis, folium subaequantibus, medio bibracteolatis, apice incrassatis; calycis labio superiore lato, emarginato-bifido, inferiori acute 3-fido subaequali.

In glareosis sterilibus inter frutices promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. specimina pauca, manca. Herb. Preiss. No. 986.

A praecedente distincta ramis teretibus, ramulis vix compressis et foliis omnibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis 3 lin. longis vix 1-1½ lin. latis obtusiusculis subacutisve. *Corollam* non vidi. „Frutex 2-pedalis.“

6. **Bossiaea linophylla** R.Br. Bot. Cab. t. 174. Bot. Mag. t. 2491. DC. prodr. 2, p. 117, n. 4. Benth. in Hügel. En. p. 36, n. 107.

Locis umbrosis in solo humoso ad lacum Kalbenup (Sussex) d. 27. Dec 1839. Herb. Preiss. No. 1013. fructif. in subarenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 23. Sept. No. 1012. fl. et fr. et inter frutices in clivulo arenoso prope Baldhead (Sinus Regis Georgii III) d. 16. Oct. 1840. No. 1011. fl. et fr.

„Frutex bipedalis.“

7. **Bossiaea eriocarpa** Benth. in Hügel. Enum. p. 36, n. 108. Walpers repert. 1. p. 578; inermis, ramis junioribus compressis, pubescentibus; foliis oblongo-linearibus, obtusis, mucronatis; leguminis villosi unilocularis stipite calyce brevior.

In arenosis et collinis sylvaticis ad fluv. Cygnorum, d. 28. Jul. Herb. Preiss. No. 1009. fl. et fr. jun. et ad portum Leschenault (Wellington) m. Dec. 1839. No. 1005, fruct. nec non in planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. No. 1004. steril. (Drummond n. 256 et coll. I.)

„Frutex 1-1½-pedalis, ramis distichis. Flores atropurpurei.“ *Bracteolae* prope medium pedicelli caducissimae. *Legumen* 8-10 lin. longum, 2½ lin. latum, rectum, utrinque obtusum, planum, 1-loculare, 8-12-spermum, suturis paulo incrassatis, valvis pilis longiusculis albidis laxiuscule villosis. *Semina* subsessilia, transversa, oblonga, laevia, rufa, strophiliola pallida lunulata circ. duplo longiora, fere lineam longa.

8. **Bossiaea Endlicheri** nob., inermis, stipulis membranaceis, linearibus, petiolum superantibus; foliis ovalibus oblongis linearibusve, mucronatis v. muticis, subtus ramulisque teretibus villosis; pedicellis folio brevioribus, supra medium bibracteolatis; calycis adpresse sericei labiis aequalibus, superioris bifidi inferiorisque lobis acuminatis; ovario sessili, villoso.

α **ovalifolia**, foliis coriaceis ovalibus oblongisve (5-6 lin. longis, 2-3 lin. latis) margine obsolete recurvis, mucronulo tenui (rarius nullo) apiculatis, interdum demum glaberrimis.

B. ovalifolia Endl. nov. stirp. decad. 1. p. 21, n. 26. Walpers l. c.

An ab hac satis distincta *B. disticha* Lindl. in Bot. Reg. 1841, Misc. p. 38, n. 67, t. 55? quae ex ic. cum nostra bene convenit, ex descr. vero recedit foliis planis, nequaquam coriaceis, omnino laevibus, fere aveniis, sed hae differentiae forsitan ex cultura ortae.

In solo limoso inter frutices sylvae prope villam cl. Harris ad fluv. Cygnorum, d. 1. Jul. 1839. Herb. Preiss. n. 1008.

β angustifolia, foliis linearibus v. lineari-oblongis (6-9 lin. longis, 1-1½ raro 2 lin. latis) obtusis, plerumque muticis.

Swan River. James Drummond n. 255 et coll. I.

γ minor, foliis linearibus (4-6 lin. longis, vix 1 lin. latis, pedicellos plerumque superantibus) obtusis, muticis, margine revolutis.

In region. interior. Australiae occidentalis et meridionali-occidentalis, m. Nov. 1839 et. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1000.

Species satis variabilis, cujus nomen primitivum, quum non omnibus formis (certe tamen haud specificè separandis) conveniat, mutandum videbatur. *Rami* ramulique superne cano-villosiusculi, inferne glabrati. *Stipulae* omnes membranaceae, adpressae, lineares, acuminatae (in var. γ sola apice setaceae.) *Folia* plus minus coriacea, supra transverse venosa (venis in β et γ plerumque obsoletis) et sub lente minute punctato scabriuscula (in α sublaevigata) subtus viridia v. in β sordide albida (glauca?) villosa v. secus nervum solum parce pilosiuscula v. demum glabrata. *Pedicelli* 6-7 lin. longi (in γ paulo breviores) supra medium bracteolis 2 stipulis conformibus diu persistentibus (in γ saepius apici approximatis) instructi. *Calyx* adpresse sericeo-pubescentis. „*Suffrutex* pedalis v. dodrantalis, erectus. *Vexillum* flavum, carina alaeque purpureae.“ — *A. B. eriocarpa*, cui praecipue var. β et γ valde accedunt, dignoscitur stipulis omnibus membranaceis (nec superioribus setaceis) foliorum venis transversis minus conspicuis, pagina inferiore plerumque villosa, bracteolis calyci magis approximatis diutius persistentibus et calyce ramisque cano-pubescentibus.*)

9. **Bossiaea pulchella** n. sp., laxè ramosa, ramis gracilibus, teretibus, apice minute puberulis; stipulis minutis, obtusis, deciduis; foliis subsessilibus, cordato-subrotundis, acutiusculis, muticis, planis, coriaceis, laevibus, glabris; pedicellis solitariis, folio brevioribus, bracteas basilares obtusas vix superantibus; calycis glabri labio superiore emarginato-bilobo, inferiore aequali acute 3-dentato.

In umbris limoso-calciosis sylvae inter Mahogany creek et Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1032. (Drummond n. 250 et coll. I.)

Proxima *B. nummulariae* Endl. nov. stirp. dec. I. p. 22, n. 27, quae differt stipulis subulatis petiolum aequantibus, foliis mucronulatis, pedicellis folia subsuperantibus (3½ lin. longis) deflexis, caet. — „*Frutex* 2-3-pedalis, ramulis secundis.“ *Stipulae* obsoletae, vix ¼ lin. longae, membranaceae, ovatae, obtusae, fuscae. *Folia* cum petiolo (vix ⅓ lin. longo) 2½-3½ lin. longa et fere aequè lata, basi rotundata semperque cordata (sinu petiolum aequante) antice sensim angustata, nervo venisque subimmersis vix conspicuis, margine plano sub lente obsolete et irregulariter crenulato. *Bracteae* ad pedicellorum basin quatuor, decussatae, membranaceae, tenuiter striatae, ovatae v. oblongae, obtusiusculae; interiores? duae longiores, 2½ lin. longae,

*) Inter plantas a cl. **Latrobe** circa Port Philipp in N. Holl. ora australi lectas exstat **B. tenuicaulis** Grah. in Edinb. New Phil. Journ. Jun. 1840. XXIX, p. 171. Bot. Mag. t. 3895! Walpers repert. I. p. 578, quam a **B. cordifolia** Sweet. Fl. Austral. t. 20. (fide specim. in Anglia cult.) vix distinctam credimus, nisi ramorum pube brevissima adpressa, foliorum basi rotundata nec cordata et calyce paulo majore. An utraque ad **B. cineream** R.Br. reducenda?

x *P. prostrata* Br.
P. (nummularia Endlicher.)
P. ovata hb. St. fin. numm. ^{numm.}
 L'ext. range! (Ridder & notis bre
 vibus. micuare folium etridanda
 sumum. Et hac non est dubitandum!
 Voftra valde accidit *P. prostrata*
 & *indivisa*? *Pixillum* ^{intus} *fulvum* *extus* *griseo*
rubellum *venis* *rufis* *et* *luteis*.
Carina *purpurea* *alis* *longior* *vello*
provis. In *putius* *montium* *Wegle-range*
 Oct 23 *Fruticulus* *diffusus* v. *diffusus*.
 In *lucis* *varis* *Jas. hb. St. F. II n. 216.* *Oct. 48.*
prostrata *et* *depressus* *argus* *Rivati* - *Wegle* *Oct.*
P. horizontalis hb. St. F. 28.

(In *nomine* *Hookerianum*?). *Ab* *omni*
bus *quod* *Freist.* & *Don* *descriptis* *dis*
crepat. *T. G. Land!* & *n* *prois* *filvarum*
ad *l. Murphy* *river* *hb. St. F. II n.*
373. *Prostrabit* *Jam.* *16.* *1849.*
ob *folia* *opposita* *Stylolobis*
accidit!

P. cinerea! R. Br.
 Contra *cl. Stuart* *ab* *hac* *distingue*
negue *figuntum*.
In *filvarum* *prostr.* *Lauris* *St. F. 1-2.*
Oct 1848. *hb. St. F. II n. 64.*
P. tenuicaulis Graham!

provis *bona* *P. cordifolia* & *Wima*
neue *intermedia* *ultima* *ex* *Tadman*
sia *Acunum* *mentionum* *cl. Stuart*
ere *diversa.* *Post* *Philipp!* *foijs* *8.*

y. *P. corallifolia* Sweet *in*
ellidante *P. tenuicauli* *ad*
P. cineream *Sweet.* *Paul.* *1-2*
erulus. *Pixillum* *fulvum* *bellum*
carina *atra* *purpurea.*
In *fruticulis* *ad* *St. F. 14.* *Deunpore*
argus *Rivati* *Wegle* *Oct 1848.*

Poralea podotheca! Juss. Mueller.

In arena mobili riparia fluminis
Murray inter Morrocco et vaporem
orientalem parvis ^{sub} foliis aculeatis
pinnatis, pinnulis ^{sub} foliis aculeatis
bifoliatis, foliis lateralibus atilique
ovato rotundis, terminali majore
ovato, ^{sub} foliis aculeatis, ^{sub} foliis aculeatis
dentatis acule ut ^{sub} foliis aculeatis, ^{sub} foliis aculeatis
partes formae excepta corolla pube
satis brevi cineris, racem brevis
pedunculata caps multiloro ac ^{sub} foliis aculeatis
paleis duplo longiore plerumque brevior
bracteis ovatis acuminatis extus
pubescentibus intus glabris pinnatis
pinnulis o basi latiore pinnulis
atque, floribus brevissime pedicellatis
P. cinerea dicitur ^{sub} foliis aculeatis
videtur. Corolla rosea!

Anthesis aestate. Folia cum petiolo
circa 2". Flores 4" longi.

Probabile non differt a P. cinerea L., quoniam et P. Miller
hanc similitudinem rationibus et P. Lichlar repertis ^{sub} foliis aculeatis
et P. Lichlar repertis ^{sub} foliis aculeatis, ^{sub} foliis aculeatis, ^{sub} foliis aculeatis

Poralea lithyca Juss. ex Juss. Juss. Miller.

In solo fertili paene M. Gaulier!
et Wehl nescit
habitu lithycae sed vix in aliis
genus ponenda, et si liquerimus
videtur, P. Lichlar congrua
videtur, sed folia a Lichlar
acuta.

+ *Trigonella suavissima*, Lindsey

T. tenuissima Walpers (erratum)

Anthe: Sept. 072 In planitiebus humidis paulo super
rupem ludnaka ^{sub} foliis aculeatis, ^{sub} foliis aculeatis, ^{sub} foliis aculeatis

Paulo dissimulat a deff: habitu intus ere
microscopio, pinnulis uninnervis integerrimis & leg
minibus. Idem autem in natura et in parte utroque

fuscae, minutissime ciliatae, concavae, florem amplectentes, mox a basi solutae apice invicem cohaerentes et corollae apici calyptrae bilobae instar diu insidentes; interiores? duae duplo breviores, pallidae, persistentes. (Bracteas majores nunquam quidem in situ primario, scil. basi adhaerentes, vidimus, sed ex aliarum specierum analogia interiores fuisse vix dubitamus.) „Flores tristes.“ *Calyx* campanulatus, corolla plus duplo brevior, 2 lin. longus, basi vix attenuatus, lobis subaequalibus tubo brevioribus late triangularibus acutiusculis, superioribus latioribus. *Vexillum* aurantiacum, medio cum *alis* *carinae*que purpureum. *Staminum* vagina supra fissa. *Ovarium* glabrum, 2-ovulatum, stipite calycis tubum aequante. *Legumen*

10. **Bossiaea biloba** Benth. in Hügel En. p. 36, n. 109. Walpers rept. 1. p. 578: ramis subteretibus, villosis; foliis linearibus, apice dilatato bilobis; leguminibus coriaceis glabris, stipite calyce brevior.

In saxosis ad latus collis prope Cataractam ad caput fluvii Cygnorum, d. 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1061. (Drummond n. 265.)

β **stenophylla** nob., foliis linearibus (saepe $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longis, 1 lin. latis) apice nequaquam v. vix dilatatis retusis v. obsolete bilobis aut acutis mucronulatis muticisve.

Swan River. James Drummond n. 264.

Frutex 1- $1\frac{1}{2}$ -pedalis, basi ramosus, ramis erectis strictis subsimplicibus. *Folia* supra punctato-sabra. *Bracteolae* duae calyci approximatae, lineares, breves. *Corolla* calyce duplo longior, flava? v. carnea? carina valde incurva obtusa imberbi. *Legumen* 16 lin. longum, 7 lin. latum, utrinque obtusum, breviter mucronatum, 6-spermum, inter semina membranaceo-septulatum, valvis viridibus parum convexis laevibus aveniis, suturis obsoletis. *Semina* oblonga, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, fusca, laevia, opaca, strophiliola pallida crassa truncata triplo longiora.*)

LALAGE Lindl. Endl. gen. n. 6453. Meisn. gen. p. 82. (58.)

1. **Lalage ornata** Lindl. in Bot. Reg. t. 1722! ramis gracilibus pubescentibus glabrisve, apice compressiusculis;

*) E plantis Andersonianis addenda est nova species: **Bossiaea humilis** nob., ramis subdecumbentibus, debilibus, teretibus; stipulis subherbaceis, lanceolatis, acutis, adpressis, petiolo brevissimo longioribus; foliis coriaceis, obovatis ovalibusve, mucronulatis, margine subrecurvis, supra glabris subvenosis, subtus ramulisque adpresse pubescentibus; pedicellis solitariis geminisve, folio dimidio brevioribus, basi apiceque bracteis 2 linearibus deciduis instructis; calycis puberuli labiis tubum subaequantibus, superioris bifidi lobis latis divaricatis acutiusculis, inferioris brevioris trifidi lobis lanceolatis acutis. — Circa Sydney, ora orient., legit Anderson, n. 78. (v. s. in Herb. Shuttleworth.) — Proxima **B. prostratae** R.Br. et **B. ovalifoliae** Endl.; a priori (fide specim. Sieber. Hb. N. Holl. n. 351!) differt: pubescentia, ramis paulo firmioribus et crassioribus, stipulis majoribus (1 lin. longis, fere $\frac{1}{2}$ lin. latis) foliis minoribus (cum petiolo vix $\frac{1}{3}$ lin. longo 2- $2\frac{1}{2}$ lin. longis, 1-2 lin. latis) basi obtusis v. angustato-subacutis (nec emarginatis) margine plus minus recurvis (nec unquam perfecte planis) et calyce paulo majore ($2\frac{1}{2}$ lin. longo, dimidium corollam aequante.) — A **B. ovalifolia** Endl. discrepat: stipulis longo setaceis, petiolo breviori, foliis minoribus basi haud emarginatis, pedicellis brevioribus (vix 2 lin. longis.) — Vexillum alaeque lutea, carina carnea? v. purpurascens? obtusissima imberbis. Legumen desideratur.

stipulis linearibus, acuminatis, petiolo parum longioribus; foliis ovatis v. ovato-oblongis, mucronulatis, basi rotundatis emarginatisve, utrinque reticulatis glabris v. subtus pubescentibus; pedicellis geminis, petiolo duplo-triplo longioribus, bracteis interioribus ovatis, calyce sordide albido-v. fulvo-villosiusculo.

In limoso-calculosis sylvae ad Emuplain et in asperis montium continuorum Darling'srange (Perth) m. Sept. 1839 et 1841 Herb. Preiss. No. 1010 et 1002. florif. in sublimoso-arenosis sylvae district. Sussex, m. Dec. 1839. No. 999, fl. et fr. jun. et in region. inter, Australiae merid.-occid., m. Oct. 1841. No. 1007. (Drummond n. 254.)

„Suffrutex pedalis.“ Legumen fere *Bossiacae eriocarphae*, paulo tantum minus villosum. — Variat per gradus insensibiles foliis 1-2-pollicaribus, 6-12 lin. latis, basi rotundatis v. emarginatis v. leviter cordatis, subtus glaucescenti-pallidis v. viridibus vix pallidioribus, venis angulo nunc fere recto nunc plus minus acuto a costa divergentibus, petiolo 1-2 lin. longo, bracteis inferioribus (involucralibus) interioribus 3-5 lin. longis, ovalibus oblongisve, calyceque 4-5 lin. longo.

2. **Lalage? acuminata** n. sp., ramis gracilibus, simplicibus, patenti-pilosis, apice compressis; stipulis membranaceis, fuscis, striatis, linearibus, acutis, patenti-recurvis, petiolo longioribus; foliis cordato-ovatis acuminatis caudatisve, acutis, submuticis, planis, utrinque reticulatis, supra minute punctato-scabriusculis, subtus adpresse pilosiusculis, floribus

In districtu Wellington, m. Dec. 1839. sterilis. Herb. Preiss. No. 1003.

Ex habitu absque dubio hujus loci. „Suffrutex pedalis.“ *Rami* pedales, simplicissimi, stricti, pilis tenerrimis albidis patentissimis satis dense tecti, superne ancipites. *Stipulae* fere 3 lin. longae, $\frac{2}{3}$ lin. latae. *Folia* magnitudine formae fere *L. ornatae*, 15-20 lin. longa, prope basin 8-10 lin. lata, inferiora sensim acutata v. breviter acuminata, superiora a medio inde subito in acumen $\frac{1}{2}$ -1 pollicare (basi 3 lin. latum) angustata, reticulatione utrinque densiore et acutius quam in praecedente prominula.

3. **Lalage hoveaefolia** Benth. in Lindl. Swan River p. XV, n. 68. Walpers repert. 1. p. 577: ramis apice compressis, distiche ramulosis, villosiusculis; stipulis linearibus, acuminatis, petiolo parum longioribus; foliis oblongis lanceolatisve, acutiusculis, mucronulatis muticisve, basi rotundatis v. emarginatis, margine subrecurvis, utrinque reticulatis, subtus pilosiusculis; pedicellis subsolitariis, petiolo vix duplo longioribus, bracteis interioribus oblongis, calyce aureo-villoso.

In subarenosis sylvae district. Wellington, d. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss No. 1001. (Drummond coll. I.)

„Suffrutex pedalis.“ A *L. ornata* nonnisi foliis (10-18 lin. longis, 3-6 lin. latis) bracteisque interioribus angustioribus distincta. *Legumen* penitus idem. *)

*, **Lalage angustifolia** n. sp., ramis gracilibus, simplicibus, glabris, apice compressis; stipulis linearibus, acuminatis petioloque ipsis brevioribus pilosiusculis; foliis lanceolato linearibus, acutis, submucronulatis, basi obtusis, margine subrecurvis, utrin-

^{Indigofera}
^{arabanthorax}
^{procalowes} ^{et. in Metch. thm exp}
^{not 17 Nov 17. Lachlan}
Gladianthus B. Br. in St. exp.
calyx 5fidus. Scilicet longitudine subaequa-
lia. Stamina diadelphia; antherae uniformes
lobules apice confluentibus, valvula non
travia ab apice ad basin separanti
dichotomis. Trarium monopersonum.
Stylus filiculatus. Stigma obtusum.
Legumen ovatum. Cuticula cari corn-
pactum echinatum.
Herba v. suffr. glabra glaucescens, ramu-
lis angulatis. Folia cum impari
pinnata, foliol. opp. subius glau-
culosis. Spulae parvae basi pe-
toli adnatae. Flores spicati parvi
a "Herbae" ^{ut verill. accitum parvum a largu.}
^{quibus pallide lilaginum, ad basin viridius, corolla avata}
^{long. comp. comp. alij. paulo longioribus lilacina}
In ^{calycis} ^{subrotundis} ^{stert.} ^{Murray} ^{flatts}
^{Gray} ^{et fl. Murray juxta lacunas}
exstantes in ^{umbrosis} ^{humidis} ^{pappis}
frequens inter ^{humida} ^{et vespeream}
fluminis orientalem. Sol. saturate viridis vix
nitens. Folia glabra viridia graecolat
Indigofera platensis ^{Silber.} ^{Schmeller}

Folia opaca subtus etiam palli-
diora. Legumina (immatura)
nitentia.

I. brevius Wt. in Metch. trop. Auct. 385.

Indigofera brachybotrya ^{frut. m.}

In superioribus Nov. Holl. austr.
montem m. Remarkable super.
Inter Australes (*I. australis*, *fil-*
-varia, *monophylla*, *arantocarpa*
& *ovoides*) primo proxima sed
jam foliis pinnatis *trigulosis* lat-
tioribus. At *I. filvaria*
purpurea diffut habita multa
minori, ramis brevibus.
Frut. humilis vel plures pedes altus
erectus v. diffusus. Corolla rosea
In montibus *Flindersii* frequens.

4. **Lalage? stipularis** *n. sp.*, molliter patenti-pilosa, ramis teretibus, erectis, strictis; stipulis patentibus, linearilanceolatis, acutis, membranaceis, fuscis, striatis, petiolo triplo longioribus, persistentibus; foliis linearibus, mucronulatis, basi obtusis, margine revolutis, supra reticulatis; floribus

„In region. interior. Australiae occidentalis“ sterilis. Herb. Preiss. No. 1006.

Species insignis, ex habitu verisimiliter hujus generis. „Suffrutex pedalis“, pallide virens v. subglaucus? *Rami* graciles, obsolete striati, satis dense foliosi, internodiis 3-6 lin. longis. *Stipulae* 2-2½ lin. longae, inde a basi ⅓ - ½ lin. lata sensim attenuatae, tenerae, cinnamomeae, dense parallelo-lineatae, dorso pilosiusculae. patentes v. recurvae. *Folia* sparsa, petiolo vix lineam longo: lamina lineari, 12-16 lin. longa, 1-raro 2 lin. lata (foliorum infimorum nonnunquam ovali, 4-6 lin. longa, 3 lin. lata) mucronulo brevi rigidulo recto fusco terminata, basi rotundata vix angustata (saepius sub angulo recto petiolo inserta) nervo medio subtus valido, supra cum venis transversis laxè anastomosantibus parum prominulo, pagina superiore parcius breviusque, inferiore secus costam marginesque longiuscule pilosa, pilis tenerrimis, albidis, laxis, sub lente articulatis. Caet. ignota; speciem tamen adeo insignem silentio praeterire noluimus.

SCOTTIA R.Br., Endl. gen. n. 6458. Meisn.
gen. p. 83. (59.)

SCOTTEA DC. prodr. 2. p. 118.

1. **Scottia dentata** R.Br. DC. l. c. Bot. Reg. t. 1233!
Reichenb. Fl. Exot. t. 314!

In districtu Plantagenet, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1034.

„Suffrutex pedalis.“

2. **Scottia angustifolia** Lindl. in Bot. Reg. t. 1266!
Walpers rept. 2, p. 833: foliis lanceolatis sublinearibusve, basi truncatis subcordatis hastatisve, margine recurvo serrulatis; bracteolis lanceolatis, complicatis, striatis, calycem aequantibus.

In dumetis confragosis sylvae ad latus meridionale montis Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1035.

„Frutex 8-10-pedalis, gracilis. Flores sulphureo-rubri.“

que reticulatis glabris; pedicellis solitariis brevibus, calyce fulvo-villoso. — Swan River, James Drummond n. 253. — Species notis indicatis a reliquis facile distinguenda, foliis angustis (12-20 lin. longis, 1½-3 lin. latis) eorumque nervatione ad **L. stipularem** accedens, sed foliis magis lanceolatis ramisque glabris et stipulis subetaceo acuminatis demum laceris bene distincta. Bractee inferiores (involucrales) interiores bracteolaeque caducissimae. Flores omnino **L. hoveaefoliae**, calycis lobis superioribus ad medium usque solutis. Legumen ignotum.

TEMPLETONIA R.Br. Endl. gen. n. 6457.

Meisn. gen. p. 83. (59.)

Templetonia retusa R.Br. DC. prodr. 2. p. 118.

In calcareis ad latus montis Eliza d. 18. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1083. fl. et fr. et in littore arenoso promontorii Cape Riche, d. 18. Nov. 1840. No. 1082. fr. (Drummond n. 273.)

„Frutex 5-6-pedalis. Flores coccinei.“ *T. glaucam* Sims. Bot. Mag. t. 2688. DC. l. c. ad hanc reducendam esse, cum cl. Lindley (Bot. Reg. adnot. ad t. 859.) valde suspicor. E speciminibus enim nostris n. 1082 foliorum forma exacte convenit cum *T. glauca* Bot. Reg. t. 859!, sed folia non habet glauca; No. 1083 vero et 273. folia exhibent illis *T. retusae* Bot. Reg. t. 883! penitus conformia, sed in No. 1083. subtus glauca, in n. 273 vero utrinque viridia; specimina denique, quae habemus, culta foliorum forma plus minus cuneata apiceque dilatata inter utramque speciem exacte medium tenent. Flores et bracteolarum situs (circ. in medio pedicelli) in omnibus penitus iidem.

GOODIA Salisb. Endl. gen. n. 6456. Meisn. gen. p. 82. (58.)

Goodia lotifolia Salisb. parad. Lond. t. 41. Bot. Mag. t. 958. DC. prodr. 2. p. 117, n. 1.

In arenosis districtus Hay, m. Oct. 1840, delorataa cum legum. jun. Herb. Preiss. No. 1014. *)

„Frutex 4-6-pedalis.“ Obs. An hujus var.? an vero n. sp.? planta ab Andersonio circa Sydney lecta (Herb. Shuttleworth et nostr.) recedens foliis plerumque angustioribus, pedicellis brevioribus vix 2 lin. (in illa 3-3½ lin.) longis et calyce paulo minore, 1½ lin. longo.

Subtribus III. Galegeae, DC. **)

INDIGOFERA Linn. Endl. gen. n. 6530.

Meisn. gen. p. 86. (62.)

Indigofera ervoides n. sp., fruticosa, ramis gracilibus, sulcato-subangulatis, glabris, foliis pinnatis, elongatis;

*) E subtribu II, **Trifolicearum** DC., nulla species inter Preissianas occurrit; inter plantas vero a cl. **Latrobe** circa Port Philipp lectas (in Herb. Mus. Neocomens.) exstant: **Lotus corniculatus** Linn. α **arvensis** Ser. in DC. prodr. 2. p. 214, n. 42. (quem etiam prope Sydney legit Anderson?) n. 90, fide Hb. Shuttleworth.) et **L. tenuifolius** Poll. (L. corniculati var. DC. l. c.) var. **pubescens** nob. — an **L. australis** β **angustifolius** Seringe in DC. prodr. 2. p. 212, n. 27? — Species utraque in Nova Holl. vix indigena.

) **Ptychosema pusillum Benth. in Lindl. Swan River p. XVI, n. 71. (Drummond n. 261!) et **Cyclogyne canescens** Benth. l. c. n. 72. (Drummond n. 268!

?) *ambrosia portii* bot. Sidneyensis.

Medicago Murex. W.

scilicet annum ante montis Lally
ravage, Taberton, Dec. 28. 1843, circa
pagum Taberton Apr. 2. 1845; in
circumdatiōne artis Adolais Apr.
24. 1845. Toggan fuit alia tamē
fictiōne muricis vix autum fuit
indigēda. Post Lincoln

H. pativa L. Nordamerika!.

Feb. 6. 1848. quasi spontanea non
vero culta. Sol. Farthay, alitque
Indigo apulina L. *Indigo carolina* Roth
et repas pluvium torrens uubrosas rara

Goodia tomentosa Salisbury

Helix *lanceolata* *subulata* *river* *Tenn.* *1848.*
Helix *lanceolata* *subulata* *river* *Tenn.* *1848.*

Ad riparian fl. Torment. ibi, ex monothibae affluat nec non ad
montem. 10000 feet. Frut. pluriped. erect
Hy. Medicago purshii Mel. rac. apus.

49. *calicis obovato & orbiculato, rhomboidis*
extus laevigata, intus laciniata, exterior ovato lanceolata
interior subglobosa, calycibus pediculis, seminibus
obovatis. Germis! Pont. Philipp. hb. N. 584. Laur. rhomboid

various, cult. a *Ternstroemia rotundifolia* form.
will flourish, see Lab. aristatum Herb. Agn. 1848 in lit.

4111 Spencer, pers. obs. *Arctostaphylos* stems, Apr. 1940, (rarely)
Delileia var. *eff. guava* G. *Delileia* et floribus minoribus
 sequens *maritima* L. *Delileia* *maritima* L. *Delileia* *maritima* L.

Hydrocotyle transvaalensis (Lam.) DC. - *Hydrocotyle transvaalensis* (Lam.) DC.
Hydrocotyle transvaalensis (Lam.) DC. - *Hydrocotyle transvaalensis* (Lam.) DC.

28. *Leucophaea, humilis* undulata, n. sp. (Linn.)

gambelii, hirsutus, peruvianus, nigropurpureus, pur-
pureus, ruber, tomentosus, tomentosus, ... Fimbriae erectae 1-2

metallo magno alarum notatum. In hunc afi-
gurationis. Exponat. r. l. Dactylus, vultus. R. l.

St. filivatra Viebes 2-3' alt. 1848
St. australis 16' alt. 1848

Phoralea Australasica *Phoralea*

Trichys granis, Porphyrio granis novum

ab Indigera ovi appropinquat (subtusa quidem)

adhaerit, legumine artemisnivali fere unum

ante arum. diff. A Gismorio habita
proximo diff. valde tractata h.

prosp. aff. *Myrica stracheyana* fructu relict
no. 16. St. N. 215. Jan. 18

St. revolutum Thunb. Creek de G. - Hb. J. N. G.

Samnita May 1878. A. C. 48.

2 *Goodia pubescens*! Sims.

Adfl. Nib-nivir, Tasmanicae,
altit. 4-5 pedalis. Oct 1848.
Hb. N. H. n. 60.

Goodia mediago. corolla fere colore Platy-
bii. Ad rivales montium Fierders-range
prope Crayhal brook alibique locum form-
vapor. In Juncu. G. intrumica. pag. 111.
Donia, George & David Don.
not R. Br. n. 100

G. pumila! G. & D. Don.

Clianthus pumilus Banks &
Solander.

Clianthus Novo-Zeelandica in nostris
hortis saepe culta per totum
fere annum hinc floriscit.

Clianthus dampieri B. Br.

Cl. dampieri & *Cl. pumila*
formosa G. & D. Don. ^{sure, 100% of 100%}

Foliola inferiora opposita
haud superiora. pedicelli
plurimique umbellatim
aggregati, inferioris rami-
ficis racemosi.

Pulcherrima speciosae paul-
valde procurrens ^{florae} sola
adpresso, pedunculati nu-
merosi sed solitarii. Flores
speciosissimi igneo-racemosi
Florantem vidi cultam
a 14. Capt. Stuart ex in-
terioribus coloniae (Mount
Remarkable) in hortos
nostros importatam!
raro lymmina maturat
florit eustate.

In asperandis the Barrier range near the Darling
about 500, above the river, Stuart, ^{not} the ad of
speciosae gulf, ^{not} lower range, ^{not} *Cl. pumila*
U. Brown hinc plantam si primum leg-
mina probat diversa, non. *Cl. pumila*
Remocharis proponit 2 loca, distincta.

N. Port Lincoln author.
Lotus Australis! Andrews non Forsk.
 Spec. valde polymorpha etiam ab alijs
 similitudinem flaminis unius valde
 memorabilis. Vivit ~~et~~ a juvenino & vivit
 in multis locis. para.
 a. magnus, flos albi maximi hb. St 209.
 B. angustifolius Seringe, Port Philippi.
 hb. Vojts N. 4. In paucifol. Leavne.
 J. brachydonter fadnell. Ob 16. 47.
 Kallifust bay! Jan. 30. 1845. (fl. 2 fr.)
 L. discolor fadnell. Ad amnem
 Gawleri Apr 16 1845 floribus luteis
 (extra planta variat florem ^{variegatis.} colore)

[illegible]

In humidis arbor. Gaudieri
prope pagum Bethaniam
legi Apr. 1848. Nyct-rang.
Inter hunc et L. austratum
purs hybridas occurrere
videntur. Enim corollas
vidi albas, tubo-rosas-va-
riatas, majores minores
et longas breviores
et c. — In Tarmaia variis
locis quoque interioribus Hb. 2715
Pitragonolobus purpureus Moench.

Tarmanuac. Occurrit inter
glacias Martianas.
~~*Ergum hyfutum*. L.~~
Inter feges flaffim. Nov. Febr.

Cyclagyne canadensis Benth.

h. Jaffe N. 6. Boukharbay!

Nomina optimis quadrant. et classem

Seu systematica non est habita
celum mihi ignota. — Ad primum Lacynius

Cetua nutu ignota. - In praeputio & aegre
in montibus Bigli-range grami-
neis alibique frequenter. Sept. 1874.

Trigonella paraffirma Led. in Lammis 3 exim
 venticulis ad partem (Lammis) paraffirma (in part. paraffirma)
 1772. *Trigonella paraffirma* Led. in Lammis 3 exim

Triclinia viciaefolia Griseb.

Suberbaea, erecta, folialis 6-9

*jugis abundantes, arboribus
saepe abundatis, arboribus*

obtusis, truncatis inflatae diffusi,
sinuatis, triangulari ovatis, ovatis

minatio!

Specim. cultum. hb. N. n. 283. Form. —

*Staphylinus Pulchellus et in pilantibus
ante portas Beroffo. - range & Luffa*

range, Sept 1848 Aug. 1848, Guichen.
Bay, Pissam imitans.

Swainsonia galapagica (R. & S.)

In humidis ripariis, pluviosis

Murray! no. 6. 206
micimma alia micim hunt corn.

munida la culla ex-fimine - a

Start in itinere corpus molitioris

Polonia catholica, floribus. fructu.
busque maturis distincta. Jan. 161.

capilla purpurea, axillo albo.

maculato,

S. coronatellifolia *Salisbury*
dunal mobilis

[illegible]

1. *Microtus pennsylvanicus* (L.)
 2. *Peromyscus leucopus* (L.)
 3. *Thomomys talpae* (L.)
 4. *Citellus richardsoni* (L.)
 5. *Spermophilus richardsoni* (L.)
 6. *Onychomys leucogaster* (L.)
 7. *Reithrodontomys* sp.
 8. *Peromyscus* sp.
 9. *Thomomys* sp.
 10. *Citellus* sp.
 11. *Spermophilus* sp.
 12. *Onychomys* sp.
 13. *Reithrodontomys* sp.
 14. *Peromyscus* sp.
 15. *Thomomys* sp.
 16. *Citellus* sp.
 17. *Spermophilus* sp.
 18. *Onychomys* sp.
 19. *Reithrodontomys* sp.
 20. *Peromyscus* sp.
 21. *Thomomys* sp.
 22. *Citellus* sp.
 23. *Spermophilus* sp.
 24. *Onychomys* sp.
 25. *Reithrodontomys* sp.
 26. *Peromyscus* sp.
 27. *Thomomys* sp.
 28. *Citellus* sp.
 29. *Spermophilus* sp.
 30. *Onychomys* sp.
 31. *Reithrodontomys* sp.
 32. *Peromyscus* sp.
 33. *Thomomys* sp.
 34. *Citellus* sp.
 35. *Spermophilus* sp.
 36. *Onychomys* sp.
 37. *Reithrodontomys* sp.
 38. *Peromyscus* sp.
 39. *Thomomys* sp.
 40. *Citellus* sp.
 41. *Spermophilus* sp.
 42. *Onychomys* sp.
 43. *Reithrodontomys* sp.
 44. *Peromyscus* sp.
 45. *Thomomys* sp.
 46. *Citellus* sp.
 47. *Spermophilus* sp.
 48. *Onychomys* sp.
 49. *Reithrodontomys* sp.
 50. *Peromyscus* sp.
 51. *Thomomys* sp.
 52. *Citellus* sp.
 53. *Spermophilus* sp.
 54. *Onychomys* sp.
 55. *Reithrodontomys* sp.
 56. *Peromyscus* sp.
 57. *Thomomys* sp.
 58. *Citellus* sp.
 59. *Spermophilus* sp.
 60. *Onychomys* sp.
 61. *Reithrodontomys* sp.
 62. *Peromyscus* sp.
 63. *Thomomys* sp.
 64. *Citellus* sp.
 65. *Spermophilus* sp.
 66. *Onychomys* sp.
 67. *Reithrodontomys* sp.
 68. *Peromyscus* sp.
 69. *Thomomys* sp.
 70. *Citellus* sp.
 71. *Spermophilus* sp.
 72. *Onychomys* sp.
 73. *Reithrodontomys* sp.
 74. *Peromyscus* sp.
 75. *Thomomys* sp.
 76. *Citellus* sp.
 77. *Spermophilus* sp.
 78. *Onychomys* sp.
 79. *Reithrodontomys* sp.
 80. *Peromyscus* sp.
 81. *Thomomys* sp.
 82. *Citellus* sp.
 83. *Spermophilus* sp.
 84. *Onychomys* sp.
 85. *Reithrodontomys* sp.
 86. *Peromyscus* sp.
 87. *Thomomys* sp.
 88. *Citellus* sp.
 89. *Spermophilus* sp.
 90. *Onychomys* sp.
 91. *Reithrodontomys* sp.
 92. *Peromyscus* sp.
 93. *Thomomys* sp.
 94. *Citellus* sp.
 95. *Spermophilus* sp.
 96. *Onychomys* sp.
 97. *Reithrodontomys* sp.
 98. *Peromyscus* sp.
 99. *Thomomys* sp.
 100. *Citellus* sp.
 101. *Spermophilus* sp.
 102. *Onychomys* sp.
 103. *Reithrodontomys* sp.
 104. *Peromyscus* sp.
 105. *Thomomys* sp.
 106. *Citellus* sp.
 107. *Spermophilus* sp.
 108. *Onychomys* sp.
 109. *Reithrodontomys* sp.
 110. *Peromyscus* sp.
 111. *Thomomys* sp.
 112. *Citellus* sp.
 113. *Spermophilus* sp.
 114. *Onychomys* sp.
 115. *Reithrodontomys* sp.
 116. *Peromyscus* sp.
 117. *Thomomys* sp.
 118. *Citellus* sp.
 119. *Spermophilus* sp.
 120. *Onychomys* sp.
 121. *Reithrodontomys* sp.
 122. *Peromyscus* sp.
 123. *Thomomys* sp.
 124. *Citellus* sp.
 125. *Spermophilus* sp.
 126. *Onychomys* sp.
 127. *Reithrodontomys* sp.
 128. *Peromyscus* sp.
 129. *Thomomys* sp.
 130. *Citellus* sp.
 131. *Spermophilus* sp.
 132. *Onychomys* sp.
 133. *Reithrodontomys* sp.
 134. *Peromyscus* sp.
 135. *Thomomys* sp.
 136. *Citellus* sp.
 137. *Spermophilus* sp.
 138. *Onychomys* sp.
 139. *Reithrodontomys* sp.
 140. *Peromyscus* sp.
 141. *Thomomys* sp.
 142. *Citellus* sp.
 143. *Spermophilus* sp.
 144. *Onychomys* sp.
 145. *Reithrodontomys* sp.
 146. *Peromyscus* sp.
 147. *Thomomys* sp.
 148. *Citellus* sp.
 149. *Spermophilus* sp.
 150. *Onychomys* sp.
 151. *Reithrodontomys* sp.
 152. *Peromyscus* sp.
 153. *Thomomys* sp.
 154. *Citellus* sp.
 155. *Spermophilus* sp.
 156. *Onychomys* sp.
 157. *Reithrodontomys* sp.
 158. *Peromyscus* sp.
 159. *Thomomys* sp.
 160. *Citellus* sp.
 161. *Spermophilus* sp.
 162. *Onychomys* sp.
 163. *Reithrodontomys* sp.
 164. *Peromyscus* sp.
 165. *Thomomys* sp.
 166. *Citellus* sp.
 167. *Spermophilus* sp.
 168. *Onychomys* sp.
 169. *Reithrodontomys* sp.
 170. *Peromyscus* sp.
 171. *Thomomys* sp.
 172. *Citellus* sp.
 173. *Spermophilus* sp.
 174. *Onychomys* sp.
 175. *Reithrodontomys* sp.
 176. *Peromyscus* sp.
 177. *Thomomys* sp.
 178. *Citellus* sp.
 179. *Spermophilus* sp.
 180. *Onychomys* sp.
 181. *Reithrodontomys* sp.
 182. *Peromyscus* sp.
 183. *Thomomys* sp.
 184. *Citellus* sp.
 185. *Spermophilus* sp.
 186. *Onychomys* sp.
 187. *Reithrodontomys* sp.
 188. *Peromyscus* sp.
 189. *Thomomys* sp.
 190. *Citellus* sp.
 191. *Spermophilus* sp.
 192. *Onychomys* sp.
 193. *Reithrodontomys* sp.
 194. *Peromyscus* sp.
 195. *Thomomys* sp.
 196. *Citellus* sp.
 197. *Spermophilus* sp.
 198. *Onychomys* sp.
 199. *Reithrod*

campis solictis, quorum forma et parte est

2nd Mus (abundant; large normalis) *Arum*

1848. pl. noct. pub. herb. erecta. nuda. et. annua
 1848. pl. noct. nova. Caulis erecti & pro-

ovum luteo-afro. dentis; floris nictare d -
 iii. Polia in oculis 9 albis

foliolis 10-16-jugis, spathulato-linearibus, obtusiusculis, aveniis, parce puberulis, demum glabris; racemis folio brevioribus, multifloris; calycis pedicello subbrevioris puberuli subbilabiati dentibus brevissimis acutiusculis, labio superiore paulo longiore; legumine lineari, subtetragono-tereti, recto, glabro, laevi, polyspermo.

In umbrosis inter fragmenta rupium montis Mathilda, alt. 975 ped. (York) d. 11. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1067.

„Frutex 4-pedalis.“ *Rami* (facie fere *Ervi Lentis*) erecti, strictiusculi, crassitie pennae corvinae, inferne teretes; superne costis magis prominulis subangulati, saepe purpurascetes. *Stipulae* lineares, acutae, 1-1½ lin. longae, erectae, fuscae, deciduae. *Folia* 2-3-pollicaria, petiolo filiformi, jugis 2-3 lin. ab invicem distantibus, foliolis oppositis, 2-3 lin. longis, ½-⅔ lin. latis, planis, muticis, novellis subargenteo-canis, demum parce adpresseque pilosiusculis glabrisve. *Racemi* laxiusculi, 1-2-pollicares, pedicellis demum 2 lin. longis recurvis, floribus parvulis „roseis.“ *Calyx* corolla subtriplo brevior, coloratus? subcampanulatus, dentibus brevissimis. *Legumen* 12-14 lin. longum, obtusissime tetraquetrum, haud torulosum, suturis pallidis haud prominulis. — Affinis *J. Thibaudianae* DC. prodr. 2. p. 225, quae differt (ex diagn.) foliolis ellipticis retusis, legumine compresso, caet.

Tribus IV. PHASEOLEAE DC. Subtribus Kennedyae
Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 112.

KENNEDYA (Vent.) Benth. Endl. gen. n. 6641.
Meisn. gen. p. 94. (67 et 351.)*

1. **Kennedyia nigricans** Lindl. in Bot. Reg. t. 1715! Bot. Mag. t. 3652. Benth. l. c. p. 123. Walpers rept. 1. p. 757: volubilis, foliolis 1-3, ovatis, obtusis, stipulis bracteolisque lanceolatis parvis, racemis brevibus laxe plurifloris, floribus erectis, calyce rufo-villoso.

et coll. l.) inter Leguminosas Preissianas non exstant. — Inter stirpes Andersonianas circa Sydney lectas occurrunt **Swainsonia coronillaefolia** Salisb. DC. prodr. 2. p. 271, n. 2. (Anderson n. 100 in Hb. Shuttleworth) et **S. lessertiaefolia** DC. l. c. n. 3. (Anders. n. 97, ibid.) **Ervum hirsutum** Linn. circa Port Philipp legit cl. Latrobe (Herb. Mus. Neocom.) procul dubio cum cerealibus ex Europa immigratum.

*) Addere hic liceat species duas nondum descriptas, quas nuper in horto Baumanniano Mulhusiae Alsatorum vivas observavimus: 1) **K. Baumannii** nob. (in cat. hort. Bollwill. et Mulhus. suppl. 1844. p. 3, sine diagn.) fruticosa, volubilis; stipulis ovato-lanceolatis brevibus, stipellis obsoletis; foliolis 3 petiolulatis, oblongis, petiolo duplo triplo longioribus, utrinque rotundatis subemarginatisve, muticis, margine planis, sub aequalibus v. medio longiore, subtus cum ramis petiolis pedunculis calycibusque fulvo-villosiusculis, supra parce pubescentibus; racemis laxe plurifloris, petiolum aequantibus. Stirps pulchra, e seminibus incertae originis in horto Baumanniano enata, exceptis notis jam indicatis et pubescentia fortiore cum **K. rubicunda** Vent. exacte conveniens, sed foliolorum forma distinctissima. Foliola 3-6 pollicaria, 8-12 lin. v. rarius basi 24 lin. lata (nunquam ovata v. elliptica) in tota planta constanter uniformia, terminali plerumque extra medium paulo latiore, lateralibus prope basin fere semper plus minus dilatatis nonnunquam obsolete auriculatis. 2) **K. splendens** cat. hort. Bollwill. et

*Botan. Magazine of
London 1857, n. 2 p.
c. bon. icon!*

In solo humoso ad latus montis Tjalup (Kent) et ad promont. Cape Riche, d. 17. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1091.

„Frutex scandens. Flores atropurpurei.“ *Legumen* lineare, $2\frac{1}{4}$ poll. longum, 3 lin. latum, plano-compressum, rectum, acuminatum, tomentosum.

2. **Kennedyia Marryattae** Lindl. in Bot. Reg. t. 1790. Walpers rept. 1. p. 757: prostrata; stipulis bracteisque late ovatis subcordatis acutis; foliolis 3 oblongis obovatis subrotundisve, obtusis, margine undulatis, subtus ramulisque villosis, junioribus sericeis; pedunculis folio brevioribus, bifidis, 2-4-floris; calyce legumineque villosis.

K. Marryattiana Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 123. —
? *K. arenaria* ^{Nov} Benth. in Hüg. Enum. p. 38, n. 114. (quam saltem ex descriptione a speciminibus Preissianis cultisque *K. Marryattae* ab hac distinguere nequimus.)

In arenosis sylvarum ad fluv. Cygnorum, d. 3. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1095. (fl. et fr.)

„Frutex humifusus. Flores coccinei, vexillo basi aureo.“ Variat pubescentiore v. rariore (in specim. nostris semper patula) foliolis margine plus minus undulato-crispulis v. omnino planis, pedunculis 2-rarius 1-v. 3-4-floris nonnunquam folium subsuperantibus, bracteis interdum inciso 2-3-fidis.)

3. **Kennedyia bracteata** Gaudich? in Freyc. Voy. p. 286, t. 113. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 123. Walpers l. c.: stipulis foliaceis, late ovatis, acutis; foliolis 3 ellipticis, obtusis, submarginatis, margine undulato-crispis, subtus ramulisque sericeo-pubescentibus; pedunculis paucifloris, bracteis connatis infundibuliformibus, leguminibus glabris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1098.

„Suffrutex procumbens.“ *Legumen* lineare, plano-compressum, sesquipollicare, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, laeve, 6-8-spermum. *Specimina* manca, paulo recedentia foliolis acutato-mucronulatis, nec submarginatis.

Mulhus. 1841, p. 13. (absque diagn.) fruticosa, volubilis, parce minuteque adpresso-puberula; stipulis lanceolatis, parvis; petiellis setaceis, petiolulos subaequantibus; foliolis 3 subaequalibus, petiolo subduplo longioribus, subovato-oblongis, obtusis v. emarginatis, muticis, basi rotundatis, margine planis; pedunculis folio longioribus; pedicellis racemosis, calyce brevioribus, apice minute bibracteolatis; calycis laxiusculi campanulati 4-fidi basi attenuati lobis tubo subtriplo brevioribus acutis, superiore lato indiviso. — Planta pulchra, originis ignotae. Rami gracillimi, subfiliformes. Stipulae vix 2 lin. longae, subdeciduae. Petiolus totus 12-18 lin., usque ad foliola lateralia 10-12 lin. longus, petiolulis $1\frac{1}{2}$ lin. longis. Foliola herbacea (nec coriacea) 18-25 lin. longa, infra medium latiora 6-9 lin. lata. Pedunculi circ. 3-pollicares, apice racemoso-pauciflori, pedicellis 2-3 lin. longis, bracteolis minutis obtusis. Flores magnit. et forma **K. rubicundae** (v. paululum minores) sed calyx multo minus pubescens (pube minuta, parca, adpressa) lobis brevioribus subacuminatis et corolla laete coccineo-sanguinea, vexillo basi macula sulphurea notato. Alabastra sericea, breviter nostrato-acuminata.

*) **Kennedyia prostrata** R.Br. DC. prodr. 2, p. 383, n. 2, species circa Port Jackson vulgaris, etiam circa Port Philipp in ora australi crescit, fide specim. a cl. Iatrobe lect. in Herb. Mus. Neocomens.

J. Hipularis var. p. 99.
Swaenonia pharacalis ^{multiflorus} ~~herm.~~
 caule puberulo erecto, foliolis
 3-4 jugis linearibus - lanceolatis acutis
^{caulis dentibus triangularibus}
 cuneatis, stipulis oblique triangu-
 laribus lanceolatis - linearibus
 leguminibus suffraginosis,
 in calliculis annuis prope Geor-
 getown, primo vere 1848. Flores
 rubro pubescentibus magnitudi-
 ne *L. galitidis*, calyx niger.
~~parviflora, florib. dupla minimis, caly-~~
~~ce alba nigra, lobis calycis albis.~~
Swaenonia ~~X~~ *pharacalis*! ^{p. Brown}
 in South Australian Register 1850
 n. 1048. Herbar. expd.
 caule, puberulo erecto, foliolis 7-10
 jugis ovatis obtusis vel emarginatis
 cum apicula glabris margine sca-
 briculatis, stipulis oblique triangu-
 laribus obtusis, leguminibus breviter
 stipitatis.
 In parie media fructuum dupli Murray
 sub inter vasis morunda ^{Caracas} flores pallidi
 lavi ochroleuca vexillum rubello striatum
 alio carinae dilute rubra finitis. ^{Pinarum}
 Dec 1849 detest. C. B. H. R. Rara!
N. pauciflora Steud. hb. N. V. 193. c. var.
 arenaria ~~Benthani~~ ^{Wieg.}
N. major Steud. per totam americanam.
 fur Mill., *Benthani* form
 dum investigationes et. Schultze
 Sudaui. Diagnosis iterum
 minus audae sunt, nam pl. nostras
 Australes & Dieminiae diagnosi
 ambabus conveniunt. Folia
 protius orbiculata, quam obovata.
 Occurrit praesertim in umbra ar-
 borum laeis, antea igni ^{vestigatione}
 — hb. M. T. II n. 26. Sept. 10. 1848.
 f. *Guthrie* & *Dag.*
f. phyllonalyx fur Mill.
 calycis laciniis magnopere
 accitis foliaceis
 cum prior forma. Sieme.

Swainsonia palmaturorum Griseb.
in litt. ad Stuartium pinn. foliisque
caule puberulento erecto glabro
et tenuiter pelosiusculo, foliis
6-~~multijugis~~ ^{multijugis} ovato-oblongis
vix emarginatis mutuis, pinnu-
lo solum 2plo triplove superante,
ligulis calycisque ^{dentibus} tri-
angularibus acutis, ^{floribus} ~~corollis~~ ^{corollis} ~~corollis~~
suboppositis pediculis, seminibus
nigris.

Cl. Stuart detexit in insula Palma-
durina plantam fruticiferam viridem
1/2' altam Mart 1848, e vigis se-
minibus eduxit specimina necnon
benevole communicata. Corolla di-
late-purpurea, vexillum basi ma-
culis duabus albis signatum. hb. St. 728.
Hec propinqua maxima affinitate
conjuncta sunt S. nicotifolia
et S. Stuartiana, ultima parte
non specifice distincta.

Swainsonia Stuartiana Griseb.
caule erecto glabro puberulento,
foliis pinnatis foliisque glabro,
foliis 9-14 jugis oblongis vel li-
neari oblongis truncatis vel emar-
ginatis mucronulatis in basin an-
guistatis, pinnulo solum duplo
triplove superante, ligulis calycisque
dentibus dilatato triangularibus ^{corollis} ~~corollis~~ ^{corollis} ~~corollis~~
In hb. St. pinn. nom. Differt praeter cha-
racteres diagnosis floribus majoribus
pallidis, calyce glabro longius et recte
pedicellato.

4. **Kennedyia parviflora** *n. sp.*, prostrata, laxe pilosiuscula; stipulis herbaceis, ovatis, acutis, venoso-striatis, floralibus (bracteis) saepius 2-3-fidis; stipellis falcato-lanceolatis, petiolulos superantibus; foliolis 3 subaequalibus, petiolo parum brevioribus, late obovatis obcordatisve, mucosis, margine planis, lateralibus subsessilibus; pedunculis bifloris, pedicellis subaequantibus, folium subsuperantibus; calycis corolla dimidio brevioris lobis tubum subaequantibus, superiore latiore breviter bifido.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. Herb. Preiss. No. 1099. et in summitate promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. No. 1084.

„Suffrutex procumbens.“ Habitus, pubescentia, stipulae, stipellae et foliolorum magnitudo *K. prostratae*, sed foliola semper plus minus obcordata, antice (nec basi) latiora, basi cuneata, margine plana, petioli et pedicelli longiores (10 lin. longi) flores dimidio minores et petala purpurea? (in sicco violacea) vexillo basi macula sulphurea notato. No. 1084. (specim. defloratum, sine fr.) recedit foliis glaberrimis et ramis glabrescentibus.

5. **Kennedyia microphylla** *n. sp.*, fruticosa, humifusa, ramis glabris v. apice pilosis; stipulis herbaceis, ovatis, acuminatis, venoso-striatis, floralibus (bracteis) conformibus parvis, stipellis nullis; foliolis 3 subaequalibus, petiolo brevioribus, late obcordatis, mucronulatis, margine planis, venosis utrinque parce adpresseque pilosiusculis; pedunculis bifloris, cum pedicellis brevibus folium superantibus; calyce dimidiam corollam aequante, puberulo, lobis tubo sublongioribus acuminatis, superiore latiore brevissime bidentato.

In solo subcoenoso ad margines lacus Mathilda (Hay) d. 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1092.

Praecedenti characteribus plurimis florumque forma et colore conveniens, certe tamen praeter notas jam indicatas distincta ramulis e caulibus procumbentibus quasi fasciculatim nascentibus („caespitosis“ Preiss in sched.) demum elongatis laxioribus; stipulis foliolisque duplo v. triplo minoribus (hisce $1\frac{1}{2}$ -3 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ -1 lin. latis) pedicellis 1-2 lin. longis, basi bracteola solitaria stipulis conformi vix 1- $1\frac{1}{2}$ lin. longa fultis, calyce glabrescente corollaque fere $\frac{1}{3}$ minoribus. *Legumen* sessile, lineare, acutum, plano-compressum, 10 lin. longum, $1\frac{1}{2}$ lin. latum, rectum v. leviter arcuatum, leviter torosum et minute puberulum, fuscum, 6-8-spermum, suturis vix incrassatis. *Flores* hujus et praecedentis speciei omnino *Physolobii*, sed legumen compressum, nec inflatum.

PHYSOLOBIUM Benth. Endl. gen. n. 6643. Meisn. gen. comm. p. 352.

1. **Physolobium carinatum** Benth.? in Hügel Enum. p. 39, n. 115; Ann. Wien. Mus. 2. p. 124. Walpers rept. 1. p. 758: prostratum, stipulis bracteisque late ovatis, acuminatis, subconnatis; foliolis obovatis orbiculatisve, retusis, mucronulatis, margine subundulatis, subtus ramulisque pubescentibus; corollae carina apice geniculata obtusissima.

In solo sublimoso ad fluv. Vasse River (Sussex) m. Dec. 1839, fructiferum. Herb. Preiss. No. 1085. *)

„Frutex prostratus.“ *Flores* non vidimus, caet. vero in descript. l. c. bene quadrant.

2. **Physolobium elatum** Hügel Bot. Archiv. t. 2! Benth. l. c. n. 117. Walp. l. c.: erectum, stipulis ovatis v. cordatis, floralibus (bracteis) inciso-dentatis; foliolis ovatis, obtusis, mucronulatis, junioribus ramisque pilosiusculis, adultis glabratiss; pedunculis 3-4-floris, summis folia superantibus paniculatis, carina alas subaequante.

In umbrosis arenosis sylvae prope Bassandeen ad fluv. Cygnorum, d. 31. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1089. fructif. et in solo sublimoso ad fluv. Canning prope Kelmescott, m. Sept. 1841. No. 1087. florif.

Foliola (ex ic. cit.) saepe ovato-oblonga et fere acuminato-acuta (in specim. nostris vero saepius subrotunda semperque obtusa v. retusa) flores $\frac{1}{4}$ majores et calycis lobi margine paucidentati (nobis semper integerrimi.) „Suffrutex 2-3-pedalis, erectus. *Flores* lateritii.“ *Bracteas* 2-3-fidas e stipulis semiconnatis conflatas esse, probatur specimine Preissiano in unius bractee sinu foliolum genuinum nanum obcordatum gerente. *Legumen* subteres, obtusiusculum, 16-20 lin. longum, leviter arcuatum, reticulato-rugulosum, glabrum, suturis nerviformibus vix prominulis, valvis (ut in *Ph. carinato*) intus inter semina pellicula tenera alba septulatis.

ZICHYA Hügel. Endl. gen. n. 6642. Meisn. gen. comm. p. 352.

1. **Zichya villosa** Lindl.? in Bot. Reg. 1841, Misc. p. 41, n. 81. Walpers rept. l. p. 758. foliolis ovatis, acutis, subtus pallidis ramisque villosis; corymbis densis, capituliformibus, longe pedunculatis; calycis lobis tubo brevioribus; carina alis aequali; stylo apice simplici.

In clivulo calcareo-arenoso ad portum Princess Royal Harbour, d. 1. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 1086.

„Frutex prostratus.“ *Specimina* floribus carentia, haud certe determinanda; a diagnosi recedunt foliolis ($1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$ poll. longis, 1 - $1\frac{1}{2}$ poll. latis) truncato-obtusissimis cum mucronulo exiguo molli. *Pedunculi* fructiferi 5-6-pollicares, firmi, incurvi v. sigmoideo-flexuosi, persistentes. *Legumen* planocompressum, 2 - $2\frac{1}{2}$ -pollicare, 3-4 lin. latum, tomentosum, intus membranis teneris fuscis septulatum. *Semina* olivaceo-cinerea, nigro-maculata.

2. **Zichya glabrata** Benth. in Hüg. En. p. 40, adnot. Bot. Mag. t. 3956! Walpers l. c. p. 757: stipulis late ovatis,

*) **Ph. Stirlingii** Benth. l. c. n. 116. Walp. l. c.: erectum? stipulis bracteis que cordato-ovatis; foliolis late ovatis orbiculatisve, retusis, mucronatis, ramisque pilosis, demum glabrescentibus; pedunculis bifloris, carina alis brevioribus. — **Kennedyia Stirlingii** Lindl. Bot. Reg. t. 1845! Swan River. James Drummond n. 270. — Forma multiflora, pedunculis axillaribus saepius ternis quaternisque inaequalibus, uno alterove plerumque longiore folium superante apice bis v. ter bifido, brevioribus apice 1-4-floris, bracteis superioribus inciso-tridentatis, foliis glabratiss. *Legumen* non vidimus.

and C. Purdie Bayley Catalog. ? 1849.

~~Swainsonia halimaturorum~~ ~~Perdina~~

caule erecto glabro vel pilosissimo
Wagnonia grayana Lf. & *maritima* Forst. f.
Wagnonia grandiflora R. Br. in H. exp.

*Suppeditivosa pubisoma, foliis 8-10-jugis
inexpansis incano tomentosis, foliis
oblongis obtusis retusione; adultis se-
miclastratis; rhachis subinana, ra-
cema multiflora folium superante,
brachialis lanceolato linearibus acutis
aquantibus tulum calycis albo la-
ciati quinque fide, corinis acutissi-
mis longitudine. per tubi, vexilla
bicaallosa*

Common on the rich alluvial flats
on the Murray & Darling.

Strepas labialis masidas. *Floris purpurei*
Scutellaria alba maculata. 2. 66.
Maurandia Greyana Lf. bot. reg. 1846

Leptanthus pubescens, foliis 5-9-jugis
 oppositis in eadem summitatis, foliulis
 oblongis obtusis retusis; axillis
 singula bracteis; rachis pubescentia
 ramis multifloris foliis longioribus
 bracteis lateralibus lanceolatis
 limbo brevioribus tubo calycis
 albis. Canali dentati & dentibus
 obtusiusculis tubo dimidia brevioribus
 vexilla bicolora. brachyodonta pubes.

× S. incusoides ? base R. Br. L "

glabra, vauli ro. m. so, foliis 6-7
pinnis, foliolis oblonga-ovalibus ob-
tusis, racemis elongatis laxis, pedun-
culis calyce glabra quinque dentata
brevioribus, bracteis subulatis,
vexillo exalato.

..... 12h. 22

Flowers yellow! Fruit unknown.

Crotalaria Murrill R. Br.

tomentosa, foliis simplicibus ovalibus
utrinque sericeo tomentosis, petiolis
apert geniculatis, racemis terminalibus
multifloris
on the top of the ridges in pure sand
from S. L. 280-260

Wampana Behria na, from the ^{the} South West. reg. 1870

multibacca densa adfrendente basi pedunculatis, foliis
pedunculatis, ovatis, petiolis 3-5 jugis angustis
oblongis, lanceolatis bicarunculatis junioribus acutis
adultis retusis, pedunculis foliis longioribus superantibus
lobis primo capitulo congestis denique
racemosis, densis, caeteris dentibus lanceolatis
acutis sub angulatis, junioribus latioribus
late lanceolatis, bicarunculatis, leguminae pubescentes.
In natis, petiolis longioribus, junioribus latioribus
in natis, petiolis longioribus, junioribus latioribus
racemosis, densis, caeteris dentibus lanceolatis
acutis sub angulatis, junioribus latioribus
late lanceolatis, bicarunculatis, leguminae pubescentes.

Pomadynamis R. Br. C. v.

calyx 2-pid. subaequalis. Vexillum ex-
planatum, callo baseas laminae
in rugem recurvente. Carina obtusa
basin versus gibba longitudine aequa.
Haec. 2-adelpha. stamens 5 line-
aribus majoribus, reliquis atrox.
Ovarium polyspermum. Stylus
basi annuata procerus. postice
barbatus. Legumen compressum.
Ab. (Vexillum) bipid. primo - imana,
oculi angulato erecto. Folia bipinnata
foliolis oppositis linearibus obtusis
floris racemosis glavis.

Crotalaria Murrill.

J. imana R. Br. (Faustralis, J. gracilis R.)

Indigofera purpurea R. Br. (Faustralis, J. gracilis R.)

Wampana microcalyx R. Br. (Faustralis, J. gracilis R.)

foliis, oculis recto lato basi, superantibus,
lobis pilosis, lobis brevioribus, his glabris
4-5 jugis ellipticis breviter pedunculatis obtusis
reflexis, caeteris minuti pilosuli dentibus
breviter obtusis, junioribus lanceolatis - triangu-
laribus, parvis acutis, legum. - speciosum tem hab
charact. pilosis exsertis.
Pom. leguminae praefere, J. gracilis adnata
3' alta. Floris lanceolatis lilaceis. Racemis multifloris

acutis; petiolis ramisque pilosis; foliolis cuneatis, mucronatis, glabris; pedunculis folia aequantibus, subsexfloris, bracteis deciduis.

Kennedy glabrata Lindl. in Bot. Reg. t. 1838!

In solo sublimoso-glareoso ad latus septentrionale montis Clarence (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1088.

„Frutex prostratus.“

3. **Zichya sericea** Benth. l. c. p. 40, adnot.; Ann. Wien. Mus. 2. p. 123. Walp. l. c.: foliolis ovatis, obtusis, subrepandis, mucronatis, supra tenuiter, subtus dense sericeis; calycis lobis tubum aequantibus, carina alis brevior, stylo apice valde dilatato.

Kennedy dilatata Cunn. Bot. Reg. t. 1526, f. 2? ex Benth. l. c.

In arenosis ad latus orientale montis Baldhead, d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1096.

Frutex volubilis! („prostratus“ fide Preiss in sched.) Capitula 15-20-flora. Calyx pedicello longior, pube densa fusca sericeo-villosus. Corolla „coccinea“, carina atropurpurea. Caet. diagnosi l. c. bene congrua. An a *Z. inophylla* Benth. satis distincta?

4. **Zichya tricolor** Lindl. in Bot. Reg. 1839, t. 52! Walp. l. c.: foliolis ovato-oblongis obtusis v. acuminato-mucronatis, utrinque (praecipue subtus) sericeis; calyce adpresse fulvo-villoso, vexillo cuneato, alis carina obtusissima longioribus, stigmatibus minuto.

In solo sublimoso sylvae ad fluv. Canning prope Kelmscott, m. Aug. 1841. Herb. Preiss. No. 1097. (Drummond n. 272 et coll. l.)

Praecedenti simillima, sed pedunculi minus elongati, flores laxius umbellato-corymbosi (nec subcapitati) pedicelli calycem subaequant, et stigma haud dilatatum. „Frutex scandens.“

5. **Zichya Molly** Hügel Bot. Archiv t. 1! Enum. p. 40, n. 118. Walp. l. c.: foliolis obovatis, obtusis, subrepandis, infimis ovato-lanceolatis acutis, subtus tenuiter pubescentibus; calycis lobis tubo brevioribus, carina alas subaequante, stylo apice vix dilatato.

In limoso-calculosis sylvae inter Greenmountain et Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1090, ex parte.

„Frutex scandens.“ Ramis glabri, inferne nonnunquam flexuosi, juniores pedunculique pube brevi patente aureo-fusca densissime villosi. Folia ovalia, obtusissima, saepe retusa, usque ad 2 poll. longa et 12-14 lin. lata. Pedunculi 3-4-pollicares.

6. **Zichya angustifolia** Lindl. in Bot. Reg. 1839, adnot. ad t. 52. Walp. l. c.: foliolis anguste oblongis, basi latioribus, supra nitidis glabriusculis, subtus adpresse pilosis; calyce adpresse fulvo-villoso, petalorum unguibus longiore; vexillo obcordato, alis carina obtusissima longioribus; ovario praeter dorsum puberulum glabro, stigmatibus minuto.

Cum praecedente lecta et in Herb. Preiss. sub No. 1090 commixta.

„Frutex scandens.“ *Rami* inferne glabri, juniores cum petiolis pedunculisque pube brevi *adpressa* fulvo-sericei (nec villosi.) *Foliola* ovato-oblonga v. lanceolata, acutiuscula, 1-1½ poll. longa, 4-7 lin. lata. *Pedunculi* 1½-2½-pollicares. *Caet.* omnia *Z. Molly*, an igitur potius ejus var.?)

HARDENBERGIA Benth. Endl. gen. n. 6644. Meisn. gen. comm. p. 352.

1. **Hardenbergia Comptoniana** Benth. in Hügel Enum. p. 41, n. 120. Walpers rept. 1. p. 758. *Glycine Comptoniana* Bot. Reg. t. 290! *Kennedya Comptoniana* Link. DC. prodr. 2. p. 383, n. 3.

In arenosis umbrosis secundum fluvium Cygnorum prope oppidum Freemantle, d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1094.**)

„Frutex scandens.“

2. **Hardenbergia Lindleyi** nob., foliis 3-5-foliolatis, foliolis ovato-oblongis obtusis, terminali longius petiolato; stipulis anguste triangularibus; racemis pedunculatis, folio longioribus, multifloris, vexillo acuto. .

α **trifoliolata**, foliis omnibus 3-foliolatis.

In arenosis sylvae ad fluv. Cygnorum. d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1093, ex parte (Drummond n. 271.)

β **digitata**, foliis aliis 3-aliis digitato-5-foliolatis. (Preiss. No. 1093, ex parte.) — *H. digitata* Lindl. in Bot. Reg. 1840, Misc. p. 66, n. 142, t. 60! Walpers l. c. p. 758.

Nomen a cl. Lindley datum, quum nonnisi peculiari plantae statui conveniat, speciei servare non potuimus. *Specimina* Preissiana, in eodem

*) **Zichya? Latrobeana** n. sp., pumila, procumbens, ramis filiformibus cum petiolis pedunculisque breviter denseque retrorsum pilosis; stipulis parvis, ovatis, obtusis; foliolis 3 petiolo parum brevioribus, subsessilibus, obovato-subrotundis oblongisve, muticis, planis, supra glabris, subtus adpresse subsericeo-pilosis, stipellis nullis; pedunculis folio triplo longioribus, apice racemoso-paucifloris, floribus subsessilibus parvis; calyce subsericeo, breviter 4-fido, labio superiore latiore brevissime bidentato; vexillo orbiculari, emarginato, carina alis brevior. α foliolis suborbicularibus v. obovatis, obtusis v. retusis. β foliolis oblongo-lanceolatis subacutis. Utramque formam circa Port Philipp legit cl. Latrobe (Herb. Mus. Neocom.) Herbacea? v. suffruticosa, ramis digitalibus v. spithameis debilibus; pube omnium partium adpressa, subsericea, ramorum foliorumque albida, pedunculorum densiore flavescente. Stipulae lineam longae, submembranaceae, venoso-striatae. Petioli 10-12 lin. longi. Foliola in var. α 3-5 lin. longa, 2½-4 lin. lata, in β 6-8 lin. longa, 2-3 lin. lata, venis pinnatis supra conspicuis. Pedunculi axillares, solitarii, 3-4½ poll. longi, apice 5-8-flori, bracteis exiguus pedicello vix ½-2/3 lin. longo subbrevioribus obtusis. Flores 1-2½ lin. ab invicem distantes, illis *Z. glabratae* ⅓ minores. Calyx 2 lin. longus; fuscus, basi rotundatus et minute bibracteolatus, pilosiusculus, campanulatus, lobis tubo brevioribus triangularibus acutiusculis. Vexillum subrotundum, emarginatum, unicolor, alaeque lateritiae carina atropurpurea obtusissima longiores. Stigma minutum, capitatum. Legumen non vidimus.

) **H. ovata Benth. l. c. — **Kennedya ovata** Sims. Bot. Mag. t. 3169. DC. l. c. n. 6. — Port. Philipp, cl. Latrobe. (Herb. Mus. Neocom.)

Psocul. virgata introducta! Papim Tasmanni's
specimens. Dec. 1848 lib. L. H. n. 470. var. α . color removed

ramo folia 3- et 5-foliolata gerentia, caeterum iconi et descr. l. c. perfecte congrua sunt. „Frutex scandens.“ *Foliola* 2 accessoria, reliquis minora, non, ut in aliis quibusdam Leguminosis, e stipellarum transformatione oriuntur, quum stipellae verae ac immutatae ad eorum basin adsint! *Racemi* saepe 8-10-pollicares, basi interdum ramulum itidem aphyllum racemoso-floriferum emittentes. „*Flores* coerulei, nec violacei.“ *Legumen* glabrum, subteres, 20 lin. longum, diametro 4 lin., laeve, haud torosum, 1-loculare, 6-spermum, valvis intus laevissimis nec septuligeris. *Semina* concolora, olivacea, subnitida, strophiola tumida.

ROSACEAE. Iuss. Endl. gen. pag. 1240.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

Subordo II. DRYADEAE Vent. Endl. gen. pag. 1241.

SANGUISORBEAE Endl. l. c. §. 4.

ACAENA Vahl. Endl. gen. no. 6372. Meisn.
gen. pag. 105. (74.) Sect. b. AUCISTRUM
Endl. l. c.

1. *Acaena echinata* n. sp., floribus glomeratis in spica cylindrica basi interrupta dispositis, caule erecto, foliis oblongo-lanceolatis pinnatifidis subtus bracteisque hirsutis, spinis calycis conicis inaequalibus simplicibus (haud uncinatis).

In rupestribus umbrosis ad latus orientale montis Brown (York) d. 4. Sept. 1839, Herb. Preiss. No. 2395.

Acaenae pinnatifidae R. et Pav. subsimilis, differt imprimis calycis crassioribus acutis neque hamatis inaequalibus, et spica glomerata.

CHRYSOBALANEAE R.Br. Endl. gen. pag. 1251.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

STYLOBASIUM Desf. Mém. du Mus. V.
pag. 37 tab. 2. Endl. gen. no. 6417.

Meisn. gen. pag. 101 (72.)

1. *Stylobasium lineare* n. sp., foliis linearibus, floribus in apicibus ramorum racemosis, pedunculis folio bracteali longioribus minute bracteolatis.

In arvis cessatis Peninsulae (Perth) Sept 1839 et in solo limoso prope oppidulum York Martio mense. Herb. Preiss. No. 2383 et 2384.

„Fruticulus tripedalis, erectus, ramosus glaucus“ Olyrae habitu. *Folia* linearia, obtusa, basi attenuata, canaliculata, glaberrima, integerrima, inferiora pollicaria, lineam lata, superiora ramorum decrescentia et angustiora. *Rami* superiores decrescentes apicem fruticuli ramive primarii racemi compositi microphylli specie terminant. *Pedicelli* 2-4 lin. longi uniflori, bracteolis 2-3 alternis exiguus subulatis praediti.

Differt imprimis a *Stylobasio spathulato* foliis angustioribus et pedunculis longioribus.

MYRTACEAE RBr.

(Auctore J. C. SCHAUER.)

Tribus I. CHAMAELAUCIEAE DC.

Germen uniloculare. Capsula mono-vel oligosperma, indehiscens vel apice demum fatiscens. Schauer, Monogr.

Myrt. xeroc. Sect. I. in Act. Acad. Nat. Curios. XIX.

Suppl. II.

ACTINODIUM Schauer l. c. p. 175.

1. **Actinodium Cunninghamsi** Sch. l. c. *Triphelia bruniioides* R.Br. Mss. sc. Endl. En. pl. Hügel. pag. 48.

In rupestribus ad King George's Sound. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 432.

GENETYLLIS DC. Schauer l. c. p. 177.

(Polyzone, Genetyllis et Hedaroma Endl. gen. n. 6283—6285.)

1. **Genetyllis diosmoides** DC. floribus sessilibus in capitulum multiflorum subglobosum collectis, foliis subfloralibus reliquis conformibus, calycis inferiore parte polyzonata, limbi dentibus exiguis sinu lato disjunctis, staminodiis filiformi-subulatis staminibus paullo brevioribus, stylo aspergilliformi-barbato, foliis laxè imbricatis confertis lineari-subtetraquetris. DC. Prodr. III. pag. 209. Mém. Myrt. pag. 20 tab. 2! Schauer, l. c. pag. 180. tab. II. fig. A.

In rupestribus graniticis circa portum Princess Royal Harbour ad oppidulum Albany, Septembri exeunte a. 1840 flor. Herb. Preiss. No. 223.

2. **Genetyllis vestita** Endl. floribus pedicellatis in capitulum multiflorum subglobosum congestis, foliis subfloralibus quarum auctis herbaceis coloratis, calyce 5-costato laevi, limbi dentibus minimis sinu lato disjunctis, staminodiis

Chamaelaucium rotundifolium

Forst. Mll. in hb. N. 842.

Poukeae sp. Stuart n. 10.

Species adhuc dubiosa quoad
genus conditionis florum
(pifloratorum) imperfectae ergo
vix rite recognoscenda atque
habitu alieno praevita, quare
ab illis Novae Hall. occidentalis
virginiliter nomine *Psychotria*
purganda. (Forst. L. rotundifolia)

In Nova Hallandia probabiliter
austro-orientali collectam perimen-
torum accipi ab amicis Stuart.

filiformi subulatis staminibus longioribus, stylo aspergilliformi-barbato, foliis dorso vernicoso-nitentibus imbricatis obovato-oblongis. Endl. En. pl. Hügel. pag. 47. Schauer l. 1. pag. 182.

In limosis ad radices montium Darling's-range Herb. Preiss. No. 433.

3. **Genetyllis citriodora** Endl. floribus sessilibus paucis confertis foliis subfloralibus reliquis conformibus coloratis absconditis, calycis tubo subpentagono infera parte lineis undulatis exsculpto, limbi dentibus conspicuis subcontiguis, staminodiis liguliformibus truncatis stamina subaequantibus, stylo barbato. foliis glaucescentibus dorso pallidioribus oppositis oblongis lanceolato-acuminatis revolutis. Schauer l. c. pag. 183. tab. II. fig. C. *Hedaroma latifolium* Lindl. Swan River Bot. pag. VII. n. 15. tab. II. fig. B.

In rupestribus vallis catarractae ad caput fl. Cygnorum, et ad promontorium Cape-Riche, Julio a. 1839. Herb. Preiss. No. 2014.

CHAMAELAUCIUM Desf. Schauer l. c. p. 194. Endl. gen. n. 6280.

1. **Camaelaucium ciliatum** Desf. ramis abbreviatis, foliis oppositis fasciculato-confertis lineari-trigonis, floribus axillaribus, bracteolis basi secedentibus deciduis, stylo imberbi. Schauer l. c. pag. 195. Desf. in Mém. du Mus. d'hist. nat. V. pag. 40. tab. 3. fig. B 1—5.

Lect. ad Sinum Regis Georgii III. in declivitate orientali montis Baldhead, inter frutices. Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 360.

Calycis phylla tenuiter fimbriata, nec ciliata. *Staminodia* petaloidea, linearia, staminibus longioribus per paria juxtaposita.

2. **Chamaelaucium uncinatum** Schauer. ramis gracilibus; foliis oppositis, distantibus, lineari-trigonis, apice pungente recurvo; floribus corymbosis; bracteolis caducis, pellucidis, cucullatis, citra verticem callosis; calycis phyllis minutis truncatis petalisque integerrimis fugacibus; staminodiis subulatis, laevibus, stylo barbato.

In clivulis arenosis haud procul ab ora maris prope oppidulum Freemantle. Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 359. (Planta rara!)

„Frutex 5-pedalis“, ramosus, glaberrimus. *Folia* internodiis duplo fere longiora, subsemitereti-trigona in basin sensim attenuata, stricta, 6-8 lin. longa, trientem lineae lata, pallide viridia. *Pulvini* foliorum vix manifesti. *Flores* in summis ramulis hornotinis corymbosi. *Bracteolae* argenteae vertice purpuratae. *Hypanthium* obconicum, 10-costatum, ore dein truncato 2 lin. longum. *Petala* minuta, orbicularia, alba. *Stamina* declinata subinaequalia, corolla breviora; connectivum antheram glandula conspicua capitata supereminens. *Stylus* infra stigma corona pilorum barbatus.

**VERTICORDIA DC. Schauer l. c. pag. 197.
tab. IV. B. Endl. gen. n. 6279.**

1. **Verticordia Fontanesii DC.** corymbo composito, tubo calycis obconico-hemisphaerico argenteo-piloso, lobis sessilibus palmatifidis, lobulis fimbriato-incisis, petalis dorso puberulis integris, staminodiis ligulaeformibus, stylo exserto uncinato barbato, bracteolis connatis obtuse apiculatis deinde diruptis deciduis, foliis fasciculatis filiformi-semiteretibus inermibus sessilibus. Schauer l. c. pag. 199. n. 1. DC. Prodr. III. p. 209.

In rupestribus illustribus silvae prope villam Spencer ad Sinum Regis Georgii III. frutex quadripedalis; in arenosis planitie Molloy's plain dictae, districti Sussex: specimina 4-pollicaria, e stirpe anno superiori igne absumta rediviva. Floret Septembri—Decembri. Herb. Preiss. No. 172 et No. 174.

2. **Verticordia densiflora Lindl.** corymbo composito, tubo calycis hemisphaerico-turbinato argenteo-piloso, lobis unguiculatis palmatifidis, lobulis dense pinnatifido-plumosis, petalis dorso pubescentibus integris, staminodiis subulatis, stylo exserto arcuato barbato, bracteolis distinctis muticis caducis, foliis abbreviatis fasciculatis lineari-subtriquetris inermibus sessilibus. Schauer l. c. pag. 202. n. 3. Lindl. Swan River Bot. pag. VI. n. 11.

In depressis arenosis silvae cis oppidulum Guilford, et in solo sublimoso inter gramina planitiei prope Toby's inlet, Januario 1840. Herb. Preiss. No. 180.

„Frutex 2-3-pedalis.“

3. **Verticordia Drummondii Schauer.** racemo subsecundo, tubo calycis obconico glabro, lobis palmatifidis, lobulis longe aristatis pennato-plumosis, petalis subscariosis ovatis multinerviis serratis apice fimbriato-incisis glabris, staminodiis subulatis glabris staminibus duplo brevioribus, stylo exserto uncinato aspergilliformi-barbato, bracteolis caducis dorso corniculatis, corniculis rectis, foliis imbricatis spathulatis infra apicem calloso-mucronatis cartilagineo-serratis. Schauer l. c. p. 208. n. 7. tab. IV. B. fig. 8 et 9.

In depressis arenosis silvae cis oppidulum Guilford, Januario. Herb. Preiss. No. 171.

„Frutex bipedalis.“

4. **Verticordia Lindleyi Schauer.** racemo aequali, tubo calycis obconico glabro, lobis palmatifidis, lobulis lineari-subulatis aristatis pennato-plumosis, petalis ovatis multinerviis apice inciso-3-5-dentatis ceterum integerrimis dorso subvelutinis, staminodiis e basi latiore subulatis glabris staminibus aequantibus, stylo incluso arcuato aspergilliformi-barbato, bracteolis caducis dorso corniculatis, corniculis rectis patentibus, foliis laxè imbricatis obovatis oblongisve infra

Pargyphantha camphorata ^{form.}
Var. ^{Holl.}! forte austro-orientalis
no. 810
huius generi saltem videtur
proxima, sed forte novi generis
Camphorothamnus (peraphan-
thoides) dicendi typus.
Baekka camphorata Swartz
non R. Br. Perkinet enim
non ad Lintopernas sed
Chamaelauriceas

4. Stipularis, furt Mll
 pilis appressis ^{stomoseis}
 caule herbaceo foliatis 5-6
 pinnis linearibus - cuneatis, emarginatis
 racemis ~~sess~~ ^{longe pedunculatis} brevibus ~~racemosis~~
 stipulis magnis triangularibus acutis
 glandulis - parvis, pinnatis, flegumine . . .
 Intra Kabab. F. Mylo ^{lato} posside apicem rufus car.
 Stipulae notis cum S. pharaoide Mth
 convenire videtur, pharaoide pinnatis
 S. pharaoefolia ^{an} rufus ~~esse~~ varietas
~~via tamen videtur.~~ Ex unius specimenis
 nichi fragmento non cognoscendum!

4. Swainsona tephrotrocha furt Mll!
^{appressis stomoseis}
 perennans, caulibus herbaceis erectis,
 foliatis 5-9 pinnis subcuneato-oblongis
 apicibus vel recurvatis - apiculatis
 racemis multifloris ^{superatis}, calycibus
 subulnis triangularibus - subulatis, Mylo
 prope tota longitudine carinata,
 germine bracteato ^{bracteato} pappi, ^{leg.}
 In collibus aridis ^{denudatis} proae pedunculatis
 Murra Murra. ^{etiam ad rivum} ^{Thraughton}, ^{multiflora}
 nota 4-1'. Caulis pilosus & rhizomate ^{triste}
 erectus aut ascendens. Foliola 1" breviora,
 2-3" ^{et}. Stipulae lanceolato-triangularis
 subulatis acutis. Racemus ^{ill.} S. vicia
 foliis annulatus ^{quasi} ^{longe pedunculatis} ^{na} ^{leg.}
 & floris ^{conjugen} ^{minutum}, sed calycibus
 prope pilos nigricantes etiam albis ^{rostratis}
^{maximè} ^{stipulis} ^{et} ^{corollae} ^{roscar} ^{actae} ^{purpureae}
 Anth: 012.

apicem mucronatis cartilagineo-denticulatis. Schauer l. c. pag. 210. n. 8.

In turfoso-arenosis exsiccatis planitiei, in silva haud longe a villa cel. Irwin, superioris praefecti excubiarum, Julio defflor. lect. Herb. Preiss. No. 170.

„Frutex pedalis.“

5. **Verticordia pennigera** Endl. racemo subsecundo, tubo calycis turbinato glabro, lobis palmatifidis, lobulis linearibus breviter cuspidatis pennato-plumosis, petalis cuneatis multinerviis apice inciso-acute-dentatis ceterum integerrimis dorso velutinis, staminodiis lineari-subulatis glabris stamina excedentibus, stylo vix exserto arcuato plumoso-barbato, bracteolis caducis dorso corniculatis, corniculis arcuatis convergentibus; foliis imbricatis lineari-semiteretibus infra apicem mucronatis cartilagineo-denticulatis. Schauer l. c. pag. 212. n. 9. Endl. Enum. Plant. Hügel. pag. 46.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis; in clivulosis arenosis inter frutices silvae prope Bassandeen ad fl. Cygnorum. Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 182 et No. 183^b.

6. **Verticordia (Catocalypta) Lehmanni** Schauer. corymbo simplici compacto; hypanthio turbinato, basi hispidulo, appendiculis calycis capillari-multifidis reversis involucrato; calycis phyllis palmato-multifidis, lobulis simplicibus aristaeformibus: medio subulato, cuspidato, incurvato: reliquis capillaceis, divaricatis; petalis subscariosis, ovatis, apice triaristatis; staminodiis subulatis, integerrimis, glabris; stylo exserto, infra apicem redunco ibidemque externe barbato; stigmatibus minute capitato; bracteolis muticis caducis; foliis laxe-imbricatis, lineari-triquetris, inermibus.

In arenosis planitiei Molloy's plain districti Sussex, et circa Sinum Regis Georgii III. Floret Decembri. Herb. Preiss. No. 166.

Fruticulus elegantissimus, pedalis, gracilis, paucirameus, glaberrimus. Ramuli tenues, laete fusci, laeves, superiorum paria remota. Folia internodiis nunc ipsis duplo brevioribus, nunc aequalibus, nunc longioribus interstincta, 4 lineas Par. circiter metientia; carina subarguta cum latusculis laevis; color laete viridis. Pulvini foliorum vix manifesti. Alabastra oblonga. Bracteolae tenuiter membranaceae, fusco-viridulae. Hypanthii pars fertilis 10-costata; faux subaequalis paullo ampliata. Involucrum coma argenteo-nitens. Calycis phylla et corolla dilute lilacina. Petalorum lamina integra, lineam longa, concava, aristis tribus ipsam longitudine aequantibus denticuloque uno alterove accedente terminata. Staminodia punctata, semilinea vix longiora, incurvo-conniventia, stamina fere duplo superantia. Stylus 2 lineas longus; stigma exiguum atropurpureum.

7. **Verticordia Hügelii** Endl. corymbo simplici, tubo calycis subturbinato inferne hispidulo appendiculis loborum capillari-bipinnatifidis reversis coma quasi induto, lobis multifidis, lobulis capillari-pinnatifidis bipinnatifidisque. intermediis apice longe nudis aristaeformibus exsertis, petalis scariosis margine superiori fimbriatis, staminodiis petaloideis apice fimbriato-laceris, stylo subexserto piloso-barbato,

stigmatе amplo disciformi, bracteolis muticis caducis, foliis fasciculatis lineari-semiteretibus inermibus. Schauer l. c. pag. 213. n. 10. Endl. Enum. Plant. Hügel. pag. 16. n. 143.

In depressis arenosis ad radices montium Darling's-range dictorum. Octobri m. florens. Herb. Preiss. No. 177.

„Fruticulus pedalis et ultra.“

8. **Verticordia compta** Endl. corymbo simplici, tubo calycis obconico inferne hispidulo toto recondito sub involucro a limbo reverso pentaphyllo comato, lobis multifidis, lobulis lineari-subulatis apice aristaeformi exsertis plumoso-pinnatifidis, petalis scariosis margine superiori fimbriatis, staminodiis subpetaloideis laceris, stylo incluso imberbi, stigmatе capitato, bracteolis muticis caducis, foliis subremotis obovato-triquetris compressis carina laevibus recurvato-mucronulatis. Schauer l. c. p. 215. n. 11. Endl. in Annal. d. Wiener Mus. II. p. 194.

In lapidosis ad radices montium jugi Darling's-range dicti. Novembri florens. Herb. Preiss. No. 168.

„Frutex 3-4-pedalis.“

9. **Verticordia insignis** Endl. corymbo simplici, tubo calycis obconico basi hispidulo; toto recondito sub involucro reverso pentaphyllo comato, lobis multifidis, lobulis lineari-subulatis apice aristaeformibus inferius plumoso-pinnatifidis, petalis subscariosis margine superiori fimbriatis, staminodiis ligulaeformibus lacero-fimbriatis, stylo incluso imberbi, stigmatе capitato, bracteolis muticis caducis, foliis subremotis obovato-triquetris compressis carina denticulatis submucronatis. Schauer l. c. pag. 217. n. 12. tab. IV. B. fig. 10—12. Endl. Enum. Plant. Hügel. pag. 47. n. 145. Lindl. Swan-River tab. II. A.

In limoso-arenosis inter frutices supra oppidulum Guilford. Floret Octobri. Herb. Preiss. No. 167.

10. **Verticordia (Catocalypta) habrantha** Schauer: corymbo simplici; hypanthio turbinato, hispidulo, sub involucro comato reverso abscondito; phyllis calycis palmato-5-partitis, lobulis subulato-aristaeformibus; petalis mollibus, inaequaliter denticulatis; staminodiis petaloideis, basi confluentibus, palmato-7-aristatis; stigmatе subcapitato, laevi, sessili; foliis imbricatis, obovato-triquetris, inermibus.

In solo subarenoso inter frutices planitiei secundae cis fluvium Gordon (Hay). Fl. Novembri. Herb. Preiss. No. 169.

Fruticulus videtur virgatus, ramis strictiusculis. *Ramuli* fusci, glabri, resinoso-punctati. *Folia* laxè quadrifariam imbricata, brevìa, argute carinata, glabra, lineà vix majora, sicca aeruginosa. *Corymbuli* pauciflori. *Pedunculi* erecti, semuncia paullo breviores. *Involucrum* ad modum *V. insignis* confectum, argenteo-nitens. *Hypanthium* 10-costatum *Calycis phylla* reflexa. *Corolla* insignis, erecto-patens; petala suborbicularia, luteola, facie velutino-micantia et punctis saturatioribus maculata, sesquilineam longa. *Staminodiorum* lamina lata sed trientem lineae tantum alta; aristae quam

Schuermannia, Jord. All.

Flores axillares solitarii plerumque oppositi
 breviter pedunculati, vibratoeolati. Bracteolae
 oppositae distinctae membranaceae ^{prope} ~~juxta~~
 calycis basin sessiles, naviculares ~~membran-~~
~~aceae~~ carinatae ~~placum~~ ad anthesin cum-
 phloentes dein pendentes, calyx cum pedun-
 culo articulatus, tubo pro oblongo quin-
 que costato germiini adnatis carinatis,
 limbi lobis ^{putaloidis} ~~membranaceis~~ tan-
 cularato ^{antheris} ~~pululatis~~, costis tubi continuis propt.
 florum tantum deciduis. Stamina 9-10 limbo
 calycis fauris limbo inserta, quibus totidem
~~staminodiis~~ ^{staminibus} breviora tubulato-filiformia
~~gemmae~~ ^{filiformia} ~~curvata~~. Antherae globosae cornu-
~~at~~ ^{bilobellatae}, locellae dorso apertae pro-
 rotunda. Stylus ^{filiformis} ~~puberulus~~ longe exsertus
 apice 6-artellatus, stigma ^{unicapitulato lobis} ~~multiforme~~.
 Germen calyci inclusum uniloculatum
 F. Petala 5 ~~fauis~~ ^{limbo} ~~basi~~ ^{infundibula}
 fauri calycis infundibula limbi-mem-
 branacea rotunda concava connatis
^{fructus} ~~fructus~~...
 Ach. homoranthoides, fruct. ped.

Ich. homoranthoides, Forst. Moll.

Prose *Woffen* *poiet* & *int* *milliana*
+ *Anglica* *directum* *bor. occidentali*
in *Eucalyptum* *fruticetis* in *collibus*
lapidosis

O. n. dicatum vñ venerabile C. W. Schur-
mann, aboriginum ^{plagarium iuris} p^rorsus linguae
^{acrobaticum} protectori eorumq^m investigatori
quo proutique. †

Eubrychus procumbens, ramis novis brevibus
nunc ad antic. longis ramosis. ^{corolla fere totius apicis inaequali}
^{vultu} suffusa approxinata 3-8¹¹/₁₆ lg milineam crassa
brigana acuminata mucronulata inflexa
glandulis minutis aligeris tuberculata sessile
ovato ^{longo} ex trigonata. Flores in pedunculato crasso
ramulo fissis ramulorum partem superiorum axillares
bractealae spectabiles late ovatae acutae glabrae
glaucescentes, grayscui ^{Dasy} ⁱⁿ carina viridula
vel pulchre rosea, corollae 4¹¹/₁₆ longae, calycis
lobus bractealis plane occultus 3-4¹¹/₁₆ lg ultra
limbum crassus profunde quinquecostatus glaber
et vix fuscos. Petala albidia tenuissima.

calyptris lobis pergamineam longas, calyp-
tridis plus minuse reflexis acutiusculis
non ^{ut} unguiculatis, nec acutatis, plan-
tibus nigrescentibus duplo longiora.
Stylus ~~glaber~~ pollicaris vel parum bre-
vior non nisi apice ^{minutis} puberulus. Stigma
minutum capitellatum papillosum.

Fructus in nostris proximis deest.
Anth: Dec. - Fibr.

G. ~~scabra~~ hinc Darwinia inde ^(max)
sive Komorantho canicolum, ab illa
differens inflorescentia (hor in or-
dine tam infigni) prois anthracem
apertis ab utraque limbi calyp-
tridis.

Si Komoranthi proculus ^{maior} adnumerari, hinc
nostra prima exhibet anomaliam
~~calyptris~~ inter nigrescentes, procarpi-
cas & normis in H. Schurmanni
mutatur.

lamina duplo longiores, capillares, inflexae. *Filamenta* laminam staminodiorum paullo excedentia. Connectivum fere *V. insignis*.

11. **Verticordia acerosa** Lindl. corymbo laxo composito, tubo calycis turbinato glabro, lobis 5-partitis, lobulis subulatis pinnatifido-plumosis, petalis coriaceis palmato-7-9-fidis; staminodiis petaloideis oblongo-lanceolatis pectinato-serratis, connectivo apiculo brevissimo antheram superante, stylo recto imberbi andronitide longiori, bracteolis muticis caducis, foliis dense confertis semitereti-acerosis mucronatis. Schauer l. c. pag. 220. n. 14. Lindl. Swan River. Bot. pag. VI. n. 10.

In calciosis limosis ad radices montium Darling's-range, Decembri florens. Herb. Preiss. No. 176.

„Frutex 1-3 pedalis.“

12. **Verticordia (Chrysoma) Preissii** Schauer. corymbo laxo composito; hypanthio obconico; glabro; phyllis calycis 5-partitis, lobulis linearibus pennato-plumosis; petalis mollibus, palmato-7-fidis; staminodiis petaloideis, lanceolatis, superius inaequaliter tridentatis; connectivo oblongo, antheram semiamplectente, callo brevi terminato; stylo recto, imberbi, stamina subaequante; bracteolis muticis, caducis; foliis oblique mucronatis: inferioribus fasciculato-confertis, semitereti-acerosis; superioribus approximatis, sensim latioribus, ovalibus, integerrimis.

In rupestribus terrae superioris cis Halfway-house, alt. 984 pedum. Floret Septembri. Herb. Preiss. No. 175.

„Frutex pedalis,“ squarrosus. *Ramuli* inferiores steriles breves folisque fasciculatis acerosis, 3 lin. longis, consiti; superiores floriferi brachiiati, scabro-hirtelli, foliis duplo brevioribus et latioribus instructi. *Pedunculi* longe exserti, flaccidi et cum flore 3 lin. lato pulcherrime aurei. *Calyx* et *petala* aequalia, reflexa; horum laciniae capillares. *Staminodia* staminibus longioribus triente breviora, brevioribus aequalia et cum his erecta, incurva, sinibus latis filamenta excipientibus distincta, lanceolata, infra apicem utrinque uni-rarius bidentata. *Filamenta* longiuscula, filiformia, alterna breviora. Anthera nutans. *Gemmulae* geminatae, appositae.

13. **Verticordia (Chrysoma) Endlicheriana** Sch. corymbo subsimplici, conferto; hypanthio turbinato, glabro; phyllis calycis 5-partitis, lobulis subulatis aristatis pinnatifido-plumosis; petalis coriaceis, palmato-7-partitis; staminodiis petaloideis, lanceolatis, integerrimis, acuminatis, comiventibus; connectivo oblongo, antheram semiamplectente apiculoque brevi cucullato terminante; stylo recto, imberbi, stamina subaequante; bracteolis muticis, caducis; foliis imbricatis, oblique mucronatis: inferioribus semitereti-acerosis: superioribus ovalibus subcarinatis integerrimis.

In rupestribus collium Konkoberup ad promontorium Cape-Riche, et in solo subarenoso inter frutices planitieis cis fluvium Gordon (Hay). Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 179 et 181.

Fruticulus demissus, ramis sterilibus brevibus fasciculato-foliosis, floriferis confertis subfastigiatis, ramulis fuscis scabro-hirtellis. *Folia* quadrifariam imbricata, acerosa 3-4 lin., ovalia sesquilineam longa, omnia glaber-

rima nitidula. *Corymbuli* pauciflori; pedunculi folium subtendens quadruplo superantes, erecti. Flores 3 lin. lati, flavi, siccando nigrescentes. Petala adscendentia, fimbriis subulatis. *Staminodia* ab invicem satis distantia, stamina subaequantia et cum his declinata conniventia. *Gemmulae* binae.

14. **Verticordia nitens** Schauer. corymbo composito multifloro condensato, tubo calycis turbinato glabro, lobis palmato-9-fidis, lobulis pennato-plumosis, petalis subcartilagineis ovatis margine superiori inciso-fimbriatis, staminodiis lineari-subulatis integerrimis, connectivo in galeam cristatam antherae imminens extenso, stylo incluso imberbi, bracteolis muticis caducis, foliis filiformi-teretibus oblique mucronatis patulis. Schauer l. c. pag. 223. n. 16. tab. IV. B. fig. 1—5. *Chrysorrhoe nitens* Lindl. Bot. Mag. Comp. II. pag. 357.; Swan River. Bot. tab. I.

In planitie arenosa supra oppidulum Guildford. Flor. Januario. Herb. Preiss. No. 173.

15. **Verticordia chrysantha** Endl. corymbo paucifloro, tubo calycis brevi hemisphaerico glabro, lobis multifidis, lobulis lineari-subulatis pinnatifido-plumosis, petalis subcartilagineis margine superiori longe fimbriato-partitis, staminodiis linearibus petaloideis apice inaequaliter tridentatis, connectivo turgido ultra antheram apiculo tumido breviter producto, stylo incluso imberbi, bracteolis muticis persistentibus, foliis filiformi-teretibus subuncinato-mucronatis patulis. Schauer l. c. pag. 225. n. 17. Endl. Ann. d. Wiener Mus. II. pag. 195.

Var. *α* **Roëi**: staminodiis angustioribus, superne inaequaliter tridentatis ramulisque vernicosis. *V. chrysantha* Endl. et Schauer II. cc.

Var. *β* **Preissii**: staminodiis imbricatis, obovatis, acutiusculis, opacis; ramulis scabro-hirtellis, subvernicosis.

In regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis. Floret Octobri. Herb. Preiss. No. 178. *)

*) **Thryptomene** Endl. Gen. n. 6277. Schauer l. c. pag. 232. tab. VI. A. Hujus generis speciem nullam quidem retulit cl. Preissius, nihilo tamen minus quae de eo observanda habeo hie pagellis inserere jurat. Quum enim *Baeckea saxicola* nuperrime vivam examinare licuerit, cognovi eam *Thryptomenes* esse speciem. *Astreae* genus, quod, nomine insuper a Klotzschio pro genere Euphorbiacearum anticipato, eae superstruxeram (v. Linnaea XVII. pag. 238.), idcirco abolendum, species nova vero sequentibus est describenda. 1) **Thryptomene saxicola** Schauer. foliis laxe quadrifariam imbricatis, deinde recurvo-patulis, planis, obovato-oblongis muticis; pedunculis folium subaequantibus subexsertisve. **Baeckea saxicola** A. Cgh., Bot. Mag. 3060. Habitat in Nova-Hollandia austro-occidentali (v. v. c.) Floret in tepidario ineunte vere. Frutex in hortis 3-4-pedalis, erectus, virgatus, glaber. Rami tetragoni, phyllopodiis marginantibus linearibus helvolis. Folia coriacea, margine cartilagineo pellucido minute serrulato cincta, scabriuscula, obtusa vel subacutiuscula uninervia, 2 lin. circiter longa, superius unam lineam lata, laete viridia, in petiolum brevem planum appressum pallidumque abeuntia. Flores infra apicem ramulorum hornotinorum pauci, axillari-racemosi. Bracteolae scariosae, lanceolatae, canaliculatae, punctatae, hypanthium subaequant, fugaces. Hypanthium coarctato-turbinatum, viride, rugulosum. Limbus calycinus petaloideus, co-

+ Camptocorymbus Behnii Schl.
Backea elaeagnifolia Sm. Flor. fragrantibus
ad flum. murray hand procul a
monte Beeson! Nov. 1847 hb. H. 157.

+ B. crassifolia Ldl.
B. carnasolae! Sieber. affinis
Mf. B. baculifolia B. F. D. L. hb. H. 66.
vult B. ~~obtusifolia~~ ~~Stuebel in litteris!~~
vult. Divinis locis in precipitatorum
armosis aridis "Murray procul".
Petala alba orbiculata unguiculata
filamina 5 longiora 5 breviora alter-
nantia. Folia lenticulata - trigona
clavata.

F. Fructus 2-3' Anthesis vere
Euryomyrtus
+ (B.) Stuartiana prostrata - E. thymifolia Schauer
Backea ^{thymifolia} ~~affinis~~ Hook. ?
non nisi nomine per Day & Schauer.
B. axillata Stuart (non cum).

^{suffrutescens} ad flumen South Esk
prope rivum Tasmanniae
In ~~Tasmania~~ Nova Hollandia
detecta ex Walp. et ex brev.
diagnosi vix extricandum.
Anthesis: primo vere

+ B. Gunniana Schauer.
In montibus alpidibus
Tasmaniae 3-4000'
hb. N. I, 66 & H. 365.
Prostratus.
B. crassifoliae valde propinqua
Anthesis: vere, appropinqua

x *Euryomyrtus*?
 (*Backea*) *leptospermoides* Forstn.
 Frutex! In humulis nepestrilens ad
 riuum port. cygnum. - hb. M. 1636.
 ramis
 diffusus fuit int. pedalis. Folia limari
 lanceolata! E. diffusa Schauer
 (flos vitiose e Nov. Hall. indicatae)
 magnitudine affinis nisi eadem.
 (W. affinis & S. prostrata Hook?)

Leidiomyrtus ericacea Forstn.
 Nov. Hall. (fortasse austro-orient)
 hb. M. 816. Murray - frons
 d. diosmifolia Schauer (Backea
 diosmifolia Rudge) cognata
 atthan vix eadem.

Simina generis *Euryomyrtus* ut
 videtur nondum descripta in E.
leptospermoides sequente mole
 oblonga: S. reniformia et juli-
 ginea subtilissime punctata 1/4
 lineam sex uel octidia. Hilum
 irregulariter rotundato qua-
 dratum albidum centro parvis
 punctum.

x *Euryomyrtus pauciflora*, Forstn.
 In granivosis prope George
 Town! hb. M. 977.
 Suppliculus procumbens secun-
 dum diagnosin mihi maxime
 E. procumbens prostratae
 accidere videtur, quarum con-
 sistentiam in huius patria est
 Novae Hollandiae, quare non du-
 biam relinquo, donec vel iconem
 v. specimen authenticum examina-
 quo. E. prostrata fortasse non
 conj. combinare possumus cum E.
 affinis (B. affinis Hook non Eud.)

LHOTSKYA Schauer l. c. Endl. gen. n. 6276.

1. **Lhotskya ericoides** Schauer. floribus spicato-racemosis, calyce glabro, foliis exstipulatis confertissimis triquetris inermibus glabris. Schauer l. c. pag. 235. n. 1. tab. VII.

In rupestribus lateris orientalis montis Clarence (alt. 300 ped.) inque montosis ad sinum Two-peopled-Bay. Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 222.

2. **Lhotskya acutifolia** Lindl. floribus spicato-racemosis, calyce glabro, foliis stipulatis confertissimis triquetris subpungentibus acuminatis glabris. Schauer l. c. pag. 236. n. 2. Lindl. Swan River. Bot. pag. VII. n. 13. Walker-Arnott in Hook. Journ. II. tab. XV.

In rupestribus ad radices montis Melville prope oppidulum Albany, Octobri florens. Herb. Preiss. No. 224.

„Frutex 1-1½ pedalis, ramis quandoque decumbentibus.“

3. **Lhotskya brevifolia** Schauer. glaberrima; floribus axillaribus spicatis; bracteolis hypanthium aequantibus, usque ad medium connatis, apice subrecurvis, carinatis, apiculatis, disco lanceolato resinoso-punctato; foliis exstipulatis, imbricatis, brevissimis, subsessilibus, trigonis, acutiusculis, muticis, laevissimis, lucidis.

Hab. in Nova-Hollandia occidentali ad Fluv. Cygnorum Herb. Preiss. No. et J. Drummond.

Frutex pede minor, multicaulis, ramis ramulisque gracillimis, *Folia* sparsa, plurifariam imbricata vel in ramulis vegetis remotiuscula arrecta, lineam-sesquilineam longa, facie oblonga planiuscula argute marginata, dorso argute carinato punctato, superficie tota laete-viridi laevissima nitida. *Flores* parvi, infra apices ramulorum hornotinorum axillari-spicati. *Bracteolae* scariosae, subcoloratae. *Hypanthium* vix lineam longum, oblongum, fere estriatum, limbo calycino coronatum brevissimo patellari truncato phyllis vix distinctis; *corolla* sesquilinea paullo longior lilacina, petalis lanceolatis acutis.

rollae concolor, lobis 5 discretis erecto-patulis. *Corolla* dilute rosea; petala imbricata, sub anthesi conniventia calyceumque nonnihil excedentia, ante post eam depressa. *Stamina* 10. per paria petalis anteposita, uno alterove abortivo saepe 8-9, super discum epigynum carnosum planum inclinata, circa stylum brevem convergentia. *Antherae* didymae, loculis obovatois e connectivo glandula excavata flava quasi pendulis fuscis rima transversa in medio fronte dehiscentibus, (quod corrigas in caractere generis l. c. a nobis edito). *Gemmulae* geminae, adpositae, in antro germinis prorsus immersi depresso arctissimoque horizontales, spermophoro exili juxta basin unilaterali inserta. 2. **Thryptomene australis** Endl. (Schauer l. c. p. 233. Ann. des Wiener Mus. II. p. 192.) foliis quadrifariis, arrectis, carnosis, subsemiteretibus, sursum paullo incrassatis, mucrone reverso terminatis; pedunculis brevissimis. Habitat in interioribus Novae-Hollandiae austro occidentalis: Roë! (v. s. spont. in Herb. C. Vindb.) Habitu et inflorescentia priori admodum similis.

CALYCOTHRIX Labill. Schauer l. c. Endl. gen. n. 6275.

1. **Calycothrix curtophylla** *A. Cunningham.* glaberrima, foliis imbricatis brevibus oblongis obovatisve carinatis obtusis petiolatis, bracteolis basi connatis herbaceis margine scariosis carinatis cuspidatis cuspe dimidium tubi calycis excedente, floribus octandris corymbosis; aristis corolla ter fere longioribus. Schauer l. c. pag. 242. n. 3. Bot. Mag. 3323. n. 3.

In arenosis sublimosis inter frutices planitie ad radices montium Darling's-range, inque solo subturfoso silvae illustris prope oppidulum Albany, Octobri deflorata. Herb. Preiss. No. 191.

Stamina 8-9. *Petala* amoene violacea.

2. **Calycothrix Leschenaultii** *Schauer.* glaberrima; foliis quadrifariam imbricatis, brevibus, ovato-triquetris, muticis, marginibus scabriusculis, subsessilibus; bracteolis usque ad medium connatis, subherbaceis, marginibus scariosis, subventricosis, carinatis, breviter acuminatis, hypanthio quadrante brevioribus; floribus 8-13-andris, corymbosis; aristis corollam duplo excedentibus.

In arenosis planitie secundae cis fluvium Gordon (Hay.) Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 192.

Ramuli subtortuosi, grisei coloris. *Folia* sessilia vel petiolo lato brevissimo insidentia, lineam longa, pallide viridia atque opaca. *Corymbi* copiosi, pleianthi. *Bracteolae* inferne in stipitem angustum connatae, disco herbaceae punctatae, marginibus superne latiusculis scariosis minute denticulatis complexae, ampliusculae, 3 lin. circiter longae. *Hypanthium* tubulosum gracile, 4 lin. longum; *phylla calycis* obcordata, purpurascentia; aristae capillares, flexuosae. *Petala* elliptico-lanceolata, acuta, pulchre violacea, 2 lin. longa. *Stamina* inter numerum octonarum et denarium ternarium variantia.

3. **Calycothrix glutinosa** *Lindl.* glabra, foliis filiformi-triquetris inermibus petiolatis, bracteolis scariosis glutinosis acuminatis ultra medium connatis tubo calycis paullo brevioribus, floribus decandris corymbosis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 243. n. 4. Lindl. Swan River. Bot. pag. V. n. 6.

In calculosis montium Darling's-range. Floret Novembri. Herb. Preiss. No. 196.

4. **Calycothrix scabra** *DC.* ramulis villosulis, foliis scabris setuloso-ciliatis imbricatis lineari-tetragonis mucronulatis petiolatis, bracteolis basi connatis scariosis carina pilosis apiculatis tubo calycis dimidio brevioribus, floribus icosandris corymbosis, aristis corolla ter longioribus. Schauer l. c. pag. 248. n. 8. DC. Prodr. III. pag. 208. n. 3. Mem. Myrt. tab. 1.

In interioribus Australiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 188.

in unguiculatis eadem ratione cognata sunt ut nostrae novae.
Hanc *E. parvifloram* ab *E. Schrankiana*
agregis distinguere quod: ^{folijs} floribusque
multo minoribus, illis ^{haudqua-} ~~minut~~ brevissimis
petiolatis!
Authentis vere.

C. frabra *γ. laevigata* Ferdm.
foliis petiolis paucioribus
sparsis obtusis, foliis longiora.
Adriaticum Tefl Creek.

C. frabra *δ. c. var. minor* Schell.
4! In montis Kaiserstuhl vertice
Cedribusque. Fructus 5-6 pedalis.
Fructigera et. 15 Apr. 1848. Löffl. range
(In Darmstadt auct. Auth.
Eck river 2-3. hb. N. H. var. ^{maxi} *nuda*!)
Folia adalta (calvercutia planiuscula)
duplo longiora.
Folius vinctus ramosus plus minusve
rumpus humillimus ad 3. Corolla incarnata
ex/ceptione pallidius seu flavescens. Calyx rufus
Authentis Nov.

C. Behriana Schlechtendal
Calycotrix ericoides? (Lunningham)
 Tantum e diagnosi brevi elucet
 hb. f. 5. In fruticulis tractus are-
 nosi litoralis picumdem lacum
 Victoriae. Specimen defloratum
 Apr. 28 1875. Frut. 2 specialis?
 T. D. L! hb. St. sub. nom. *C. virgata* n.
C. villosa hb. St. 152. 122.

Adriam Fift Kiseck. Octob. 1878.
 A Cal. foebra dignoscitur aristis
 calycinis brevioribus, foliis tri-
 quetris sessilibus
 H. Stuartiana Gard Muller.

C. virgata hb. St. hb. St. 150. T. D. L.
 In nomen Hookerianum? Fift.
 Kiseck alibi.

Annus perices hinc notatae ad
 * *C. foebra* reducenda sunt!
 B minor Schult

C. laevigata Gard Mull.
 { *C. nuda* Gard Mull.
 { *C. Behriana* Schlechtendal.
 In mentibus
 laxo's lacum
 Thorns rufus.

G. Behriana Schldl.

In sylva Piniforest Nov.
flores perfirmae Behr.

In collis aruosis prope
Gawlu - town, flores albi
4-5' vel humilis, ascendens
ad fl. Outaparinga in aruosis
Variat foliis natis!

Torsapp nil nisi *G. eriotheca*
frabrai varietas
nuda fuit Mill.

^{& filamunda}
Calyx ruber, corolla rosea
vel alba ~~filosa~~, antherae
fuscae.

var laevigata etiam in parte australi
in insulae Van. Diemen occurrit. bl. 799.

Anthipis Nov. Jan.

G. ? halmaturosum fuit Mill.

In aruosis insulae Kan-
garoo etiam.

Solummodo ex habitus appi-
ritate huius refertur, ab altero
unde prius, frons discrimi-
natur foliis magis explanatis
globosis glauculis oleis
reberrius punctatis.

Flores & fructus desunt.

Trabecula natus humilis.

Calgroothrix Floweri! All. Cunn.

Isle of Freemantle Stora Hall
austro-occidentalis.

Stem folia nunc bracteolae con-
stantia retusa sed interdum acusi-
moola.

Anth. aefrate.

5. **Calycothrix Fraseri** *A. Cunningham.* glaberrima, foliis quadrifariis confertis recurvis patentibusque lineari-oblongis carinatis retusis petiolatis, bracteolis herbaceis distinctis contiguis lineari-oblongis retusis dorso callosis calycis tubo quater brevioribus, floribus icosandris pedicellatis axillaribus sparsis vel in corymbum pauciflorum collectis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 250. n. 10. tab. VI. B. fig. 1—5. Bot. Mag. 3323. n. 6.

In silvae caeduae arenosis illustribus supra oppidulum Perth; in regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis. Flor. Januario M. Herb. Preiss. No. 190 et 198.

„Fruticulus erectus spithamalis et ultra.“

6. **Calycothrix variabilis** *Lindl.* glaberrima, foliis imbricatis lineari-tetragonis calloso-apiculatis breviter petiolatis, bracteolis infra medium connatis membranaceis disco herbaceis in tubum amplum medio ventricosum convolutis ecarinatis apiculatis calycis tubum aequantibus, floribus icosandris axillaribus racemosis, aristis corolla paullo longioribus. Schauer l. c. pag. 252. n. 12. Lindl. Swan River, Bot. pag. V. n. 4.

In regionibus interioribus Australiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 197.

7. **Calycothrix simplex** *Lindl.* ramulis puberulis, foliis confertis lineari-triquetris obtusis glabris breviter petiolatis, bracteolis inferne connatis lanceolatis cuspidatis hirtellis tubo calycis duplo brevioribus, floribus icosandris axillaribus racemosis, aristis corolla paullo longioribus. Schauer l. c. pag. 253. n. 13. Lindl. l. c. n. 5.

In clivulo arenoso inter frutices densos prope oppidulum Albany. (Plantagenet.) Fl. Septembri. Herb. Preiss. No. 199.

8. **Calycothrix empetroides** *Schauer.* ramulis puberulis, foliis imbricatis oblongis carinatis obtusis scabridis margine carinaque rigidule ciliatis breviter petiolatis, bracteis bracteolisque hirsutis, his ultra medium connatis ecarinatis obtusis superne cucullato-inflatis marginibus contiguis calycis tubo triente brevioribus, floribus icosandris ternis-quinis capitatis, aristis corollam aequantibus. Schauer l. c. pag. 254. n. 14.

In calciosis lateris orientalis montis Bakewell. (York), Septembri florens. Herb. Preiss. No. 195.

„Fruticulus semipedalis“.

9. **Calycothrix sapphirina** *Lindl.* ramulis hirtis, foliis approximatis patentibus lineari-lanceolatis acute carinatis hispido-pilosis petiolatis, subfloralibus tenuioribus longe acutatis, bracteolis membranaceis usque ad medium connatis superne divergentibus lineari-lanceolatis carinatis cuspidula curvata terminatis hirtellis tubum calycis subaequantibus, floribus icosandris in capitula multiflora congestis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 255. n. 15. Lindl. l. c. n. 2.

In arenosis silvae ad fluvium Canning. Floret Novembri. Herb. Preiss. No. 189.

10. **Calycothrix angulata** Lindl. glaberrima, ramulis angulatis, foliis approximatis subrecurvo-patulis lineari-trigonis obtusis margine carinaque denticulato-scabris sessilibus, bracteolis membranaceis ultra medium connatis carinatis apiculatis tubo calycis triente brevioribus, floribus icosandris axillaribus comoso-racemosis, aristis corolla paullo longioribus. Schauer l. c. pag. 256. n. 16. Lindl. l. c. n. 7.

In arenosis silvae ad fluvii Canning egressum. Novembri. Herb. Preiss. No. 185.

11. **Calycothrix asperula** Schauer. foliis approximatis, subrecurvo-patulis, lineari-subtrigonis, muticis, petiolatis, bracteolisque asperulis; his herbaceis, ima basi connatis, oblongis, concavis, obtusis, hypanthium semiaequantibus, hiantibus; floribus icosandris, axillaribus sparsis; aristis corolla duplo longioribus.

In interioribus Australiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 194.

„Fruticulus sesquipedalis erectus,“ inferne simplex, superne ramis paucis tenuibus gracilibus. *Folia* 2-2½ lin. longa, carina obtusa, apice acutiusculo mutico. *Hypanthium* tubulosum 3 lin. longum *phyllaque calycis* obcordata purpurascentia. *Petala* 3 lin. longa, ovata, acuminata, flavescentia, primum et secundum dorso rubescentia.

Sequenti primo vultu valde similis, sed floribus sparsis bracteolis latioribus obtusis foliisque sub lente asperulis distinctu facilis.

12. **Calycothrix luteola** Schauer. glaberrima; foliis approximatis, patulis, lineari-trigonis, calloso-apiculatis, petiolatis; bracteolis herbaceis, ima basi connatis, lanceolatis, complicatis, ecarinatis, cuspidatis, hypanthium semiaequantibus, hiantibus; floribus icosandris, racemosis; aristis corolla duplo longioribus.

In solo subarenoso planitiei haud longe a monte Manypeak (aboriginibus „Tgilberup“) nec non in promontorio Cape-Riche. Novembri exeunte a. 1840. Herb. Preiss. No. 193.

„Fruticulus pedalis-sesquipedalis,“ erectus, gracilis, inferne simplex, superne paucirameus, ramis virgatis grisolis. *Folia* tres lin. longa, laete viridia, nitida. *Hypanthium* folium subtendens quadrante superans, cum *calyce corollaeque* luteolus; lobi suborbiculati in aristam acuminati. *Petala* ovato-elliptica, acuminata, 2½ lin. longa, externa dorso rubentia. *Bracteolae* 2 lin. circiter longae, herbaceae, in cuspidem herbaceam sensim acuminatae, patentes.

13. **Calycothrix flavescens** A. Cgh. glaberrima, foliis approximatis patentibus lineari-trigonis mucronato-apiculatis petiolatis, bracteolis herbaceis vix connatis ovato-oblongis concavis aristato-cuspidatis cuspidem laminam tubo calycis terquater brevioris subaequante, floribus icosandris racemosis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 257. n. 17. Bot. Mag. n. 3323. n. 7. G. Gardner Sertum II. tab. 38!

In arenosis collis Eliza prope oppidulum Perth, gregarie crescens; in arenosis silvae haud longe a fluvio Gordon (Hay.). Floret Januar., Februario. Herb. Preiss. No. 186 et 187.

Calgoothria luteola, Schauer

P. macrochaeta f. Mill.

aristis corollam triplo exsertentibus,
hypanthio folium sustinens bis
terre superante.

Prope oppidum Freemantle Novae
Hollandiae austra-occidentalis.

Forsterianae specifice distinguere possit.
Ipsi omnibus notis supra memo-
ratis exsurgendis coarctavit.
Anth: aest.

14. **Calycothrix aurea** *Lindl.* ramulis junioribus hirtellis, foliis imbricatis oblongis concavis obtusiusculis dorso hirtellis ciliatis petiolatis, bracteolis margine scariosis distinctis patentibus lanceolatis navicularibus ciliatis in cuspidem recurvam acuminatis tubum calycis subaequantibus, floribus icosandris capitatis, aristis corolla plus duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 258. n. 18. tab. VI. fig. 6. Lindl. l. c. pag. V. n. 1. tab. III. B.

In arenosis planitie silvae haud procul a praedio rustico Maddington ad fluvium Canning. Floret Decembri. Herb. Preiss. No. 184,

Tribus II. LEPTOSPERMEAE DC.

Germen pluriloculare. Capsula oligo-vel polysperma, loculicida. Schauer, Dissert. gratulat. de Regelia, Beaufortia et Calothamno, Act. Acad. Nat. Cur. XXI. 1. pag. 5.

Subtribus I. Baeckeeae. Folia opposita. Flores pedicellati, bracteolis binis stipati. Stamina definita vel indefinita, corolla breviora aut vix longiora, libera vel in phalanges *phyllis calycis oppositas* coalita. Schauer l. c.

TETRAPORA Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 238.

Flores axillares, solitarii, pedicellati, pedicello ad insertionem bracteolis fugacibus stipato. *Hypanthium* patelliforme, tubo germi omnino adnato. *Calycis phylla* 5, brevia, rotundata, marcescentia. *Petala* fauci hypanthii inter lobos calycis inserta, sessilia, subpersistencia. *Stamina* 5, cum petalis inserta, inclinata, caduca; filamenta brevia, subulata, apice attenuato deflexo connectivo continuo; connectivum dilatatum, carnosulum; anthera nutans, e loculis duobus bilocellaribus connectivo dorso adnatis poro exiguo dehiscentibus conferruminata. *Germen* plane immersum, vertice convexo, triloculare; gemmulae in loculo paucae. *Stylus* brevis; stigma capitatum. *Capsula* vertice loculicide-trivalvis; loculi oligospermi. *Semina* obovoidea, pendula, hilo citra basin laterali subexcavato.

1. **Tetrapora Preissiana** Schauer l. c.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Febuario a. 1840. Herb. Preiss. No. 345.

Frutex videtur depressus, ramis tortuosis squarrosis, ramulis lateralibus copiosis abbreviatis. *Folia* opposita, imbricata, subclavato-semiteretia, facie plana acutiuscula, dorso convexo, margine cartilagineo denticulato, glabra, laete viridia; utrinque punctis majusculis subseriatis notata, linea plerumque

breviora. *Pedicellis* folium subtendens duplo triplove excedens. *Calycis phylla* semiorbicularia, margine petaloideo denticulato, dorso calloso. *Petala* alba. *Anthera* filamentis concolor, rosea.

RINZIA Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 239.

Flores axillares, solitarii, pedicellati, pedicello ad basin bracteolis binis oppositis herbaceis stipato. *Hypanthium* breviter patelliforme, basi germinis adnatum, calycis limbo 5-partito continuum. *Calycis phylla* 5, herbacea, obtusa. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, phyllis calycinis alterna, orbicularia, marcescentia. *Stamina* 10, cum petalis inserta marcescentia; filamenta lingulata, phyllis calycis opposita minora, apice integro, antheram introrsum adnatum gerentia: petalis opposita majora, emarginato-bidentata, anthera infra emarginaturam interne adnata; anthera dorso adnata, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus; connectivum glandula terminatum. *Germen* semisuperum, triloculare; gemmulae in loculo binae. *Stylus* brevis; stigma capitatum. *Capsula* basi hypanthio tenui planiusculo adnata, ceterum libera, convexa, loculicide trivalvis, valvis usque ad basin discedentibus patentissimis. *Semina* in quolibet loculo gemina, reniformi-oblonga, hilo medio laterali.

1. *Rinzia Fumana* Schauer l. c.

In interioribus Sinus Regis-Georgii III., distr. Plantagenet, Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 164.

Frutex dodrantalis, glaberrimus, fere a basi dense ramosus, ramis gracilibus tortuosis, ramulis tenuibus densifoliis. *Folia* 1-2 lineas longa, opposita, imbricata facie lanceolato-lineari, plana cartilagineo-marginata obtusa dorsoque convexo obscure punctato semiteretia, brevipetiolata, laevia, laete viridia, opaca, juniora ad marginem apicis saepius minute denticulata. *Flores* infra apices ramulorum axillares; pedicellus folio bis longior; *bracteolae* foliiformes, concavae, persistentes. *Hypanthium* cum calyce continuo patellam herbaceam, 5-partitam, basi convexam, lineam altam exhibens. *Phylla calycis* subrotundo-ovata, obtusissima, margine membranaceo tenuiter ciliato cincta, saepius purpura fucata. *Petala* orbicularia, in unguem contracta, denticulata, calyce duplo longiora, alba. *Stamina* majora calycem aequantia minora illis fere duplo breviora et angustiora. *Semina* atrofusca, laevia.

BABINGTONIA Lindl. Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 240.

Pedunculi axillares, solitarii, cymigeri; flores pedicellati decidui. *Bracteolae* ad basin pedicelli minutae, caducae. *Hypanthium* subturbinato-hemisphaericum, in pedicellum attenuatum, germi omnino adnatum. *Calycis phylla* herbacea, rotundata, marginata, erecta. *Petala* 5, margini hypanthii inter phyllos calycis inserta, orbicularia, subpersistentia. *Stamina* 10, cum petalis inserta, caduca; filamenta breviora; anthera nutans, ob-



x Camphoromyrtus Behrii Schult.

Anni Harnagien sp.
 var. ~~H.~~ *densifolia* Schauer.
 (*Baccharis densifolia* Sm.)
 Sylvestris Murray hanc
 longe a monte Peenow
 in ^a terra sandrorum ^{inque humil.} (ad viam)
 oppidulum Lyndorff valley
 vixit

Nov - Lem
 x *P. submultica* Ford Mcl.
 foliis patulis omnino natis
 vel brevi mucron ~~app.~~ breviss.
 In montibus humilibus ca.
 pidatis a d portum Livoralis

Scholtzia obovata Schauer

Prope Freemanth, Moll. austr.
 occidentalis.
 In ramis juvenilibus proximis rari
 folia sunt oblongo-linearia; praeterea
 corolla & calycis foliola perianthia alba
 Anth: aepale.

cordiformis, basi in filamentum attenuata, bilocularis, loculis fere usque ad apicem connatis poro apicali dehiscen-
 tibus. *Germen* immersum, vertice plano, trilobulare gemmulae in loculo
 circiter 10, circa spermophorum crassum centrali-parietale in
 anulum verticalem collocatae. *Stylus* filiformis; stigma capi-
 tatum. *Capsula* hypanthio calyce emarcido toruloso coronato
 inclusa, apice loculicide trivalvis. *Semina*

1. **Babingtonia Camphorosmae** Lindl. Bot. Reg.
 1842. tab. 10. *Baeckea Camphorosmae* Endl. En. pl. Hügel.
 pag. 51.

In fruticetis solo arenoso sublimoso: ad fl. Vasse River, Decembri a. 1839 flor.,
 Herb. Preiss. No. 348; prope oppid. Guilford, Jan. 1840 flor., No. 347; haud pro-
 cul a catarracta fl. Cygnorum, Augusto 1839 fructif., No. 349. Hügel! Drummond!

Frutex quoad staturam variabilis, pedalis sesquipedalis nunc erectus,
 nunc depressus, nunc decumbens, ex omni parte glaberrimus. *Rami* firmi,
 fusi inferius ramulis oppositis abbreviatis rigidulis foliosisque aucti, apicem
 versus floriferi. *Folia* 2 lin. circiter longa, opposita, confertissima, filiformi-v.
 subclavato-semiteretia, facie plana argute marginata, dorso convexo sub
 lente raripunctato, apice breviter acuminato cartilagineo-apiculata mucro-
 nato, laevia, lacte viridia. *Corolla* conspicua; petala valde concava, alba
 roseo-fucata.

SCHOLTZIA Schauer, Linnaea XVII. pag. 241.

(**Pritzelia** Schauer in Flora 1843 (Julio) pag. 407, non
 Walpers.)

Inflorescentia axillaris, dichotome *cymosa*; *flores* subsessi-
 les, decidui, bracteolis binis fugacibus stipati. *Hypanthium* car-
 nosum, subcylindrico-turbinatum, germini fere omnino adnatum,
 basi attenuatum. *Calycis phylla* 5, membranacea, rotundata, pa-
 tula, excrescentia. *Petala* 5, in margine hypanthii sessilia,
 phyllis calycinis alterna, suborbicularia, conniventia, persistentia.
Stamina 20, cum petalis inserta, decidua; filamenta corolla bre-
 viora, subulata, apice attenuato inclinato; anthera nutans, ob-
 cordiformis, basi in filamentum attenuata, bilocularis, loculis
 usque ad apicem connatis poro apicali dehiscen-
 tibus. *Germen*
 hypanthio innatum, vertice brevissime emersum, bilobulare;
 gemmulae in loculo geminae, in spermophoro centrali-parietali
 horizontales, extrorsum anatropae. *Stylus* subulatus; stigma
 punctiforme. *Capsula*

1. **Scholtzia obovata** Schauer l. c. *Baeckea obovata* DC.
 Prodr. III. pag. 230. n. 15. *Baeckea involucrata* Endl. En.
 pl. Hügel pag. 170!

In arenosis illustribus silvae caeduae prope vicum Perth, Februario a. 1839
 flor. Herb. Preiss. No. 343. Hügel!

Frutex glaber, adscendens, pedalis, ramulis floriferis virgatis patentibus,
 habitu et imprimis florum specie *Thryptomenae saxicolae* haud dissimilis.
Folia opposita, approximata, patentia, coriacea, obovata l. obovato-oblonga,
 inflexa, subrecurva, obtusa, margine angusto pellucido scabriusculo praedita,

subsessilia, enervia, impunctata, laevia, nitida. *Flores* versus apices ramulorum inflorescentiam floridam, saepe elongatam, struentes; pedunculi nunc folio breviores biflori, nunc folium subaequantes breviter bifurcati l. dichotomi, cruribus 2-4 floris cum flore intermedio; flores articulado-decidiui. *Bractee* et *bracteolae* alabastrum stipantes membranaceae, lanceolatae acuminatissimae, praemature deciduae. *Calycis phylla* subtruncato-rotundata, cum petalis duplo majoribus pallide rosea, firmula. *Petala* exteriora erecto-conniventia, interiora depresso-inclinata.

HYPOCALYMMMA Endl. gen. n. 6306.

Schauer, *Linnaea* XVII. pag. 241.

Flores axillares, vel geminati aut sessiles aut pedunculati, vel in pedunculo brevi bini-terni-quaterni sessiles compacte cymulosi, articulado-inserti, singuli bractea bracteolisque binis oppositis consimilibus persistentibusque subtensi. *Hypanthium* cupulaeforme l. patellaeforme, germine adnatum. *Calycis phylla* 5, cutanea v. membranacea, marcescentia. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, phyllis calycis alterna, orbicularia, marcescentia. *Stamina* 20-50, cum petalis inserta, corollam subaequantia v. breviora, marcescentia; filamenta subulato-filiformia, libera vel basi confluentia; anthera dorso inserta, connectivo lineari eglanduloso, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscen- tibus. *Germen* semisuperum vel vertice tantum emersum, bi-triloculare; gemmulae in loculo 1-2-3, spermophoro ad angulum centralem affixo insertae. *Stylus* filiformis, superne attenuatus v. capillaris; stigma punctiforme. *Capsula* semisupera, hypanthio patellaeformi insidens, staminibus emarcidis cincta, aut bilocularis compressa argute marginata turgidula, aut trilocularis trigona v. tricarinata. *Semina* tot quot gemmulae, pendula, oblonga, reticulato-areolata, hilo prope basin laterali subexcavato conspicuo.

I. EUCALYMMMA. Flores in pedunculo brevi sessiles, geminati, ternati v. quaternati, bractea bracteolisque sub calyce patulis subcaducis. Germen biloculare, loculis trigemmulatis.

- 1. Hypocalymma robustum** Endl. ramis virgatis foliisque patentibus; his distantibus, sessilibus, subtriquetro-subulatis, dorso sulcatis, mucronatis, nitidis, punctatis, superius saepe recurvatis; cymulis axillaribus, 2-4-floris, compactis; staminibus numerosis, subliberis. Endl. En. pl. Hügel. pag. 50. n. 153. Lindl. Bot. Reg. 1843. tab. 8!

In arenosis ad vicum Perth, Julio 1839. Herb. Preiss. No. 342. Drummond! Hügel!

Frutex sesquipedalis, erectus, floribus copiosis speciosisque ornatissimus. *Flores* colore et fere magnitudine *Persicae*. *Germen* fere immersum.

Hypocalymma picta Schauer.

Prope Freemantle, N. Holl. austr.
occidentalis.

stath: appate.

Glibisus notabilis (conf p. 200)

cum var. albidiflora

In rivis exsiccatis infra prop. mont. Flinders
range a Rocky creek usq. ad montem Adam.

Stem 12' altus, pluvius. Lignum 5-8', ramis
longis patulis, corollis lilaceis (rara
alba) limbo fragrans, petalis basi vix
cuneatis apice subtruncatis vix laceratis
in angulum plus minusve acutum productis
Anther. luteae. Stigma dilute flavum. Re-
nata & styli albida
stath: var.

2. **Hypocalymma Cunninghami** Schauer. ramis ramulisque virgatis subfastigiatis; foliis remotiusculis, patentibus, acerosis, triquetro-subulatis, basi attenuata sessilibus, acuminatis, mucronatis, laevibus nitidisque; floribus axillaribus, in pedunculo brevissimo geminatis; staminibus basi coalitis. *Baeckea speciosa* A. Cunningham. Herb. n. 65!

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 334. Ad Sinum Regis Georgii III. A. Cgh.! a 1818.

Frutex pedalis, glaberrimus, ramulis fuscescentibus leviter marginatis. *Folia* 4-6 lin. longa, facie acutangula sulcata, carina obtusa, subrecurva viridia, punctis propter nitorem vix conspicuis inspersa. *Flores* 1½ lin. longi. *Calycis phylla* cutanea, rotundata, contigua. *Filamenta* basi irregulariter connata, saturate tincta, corollam aequantia. *Petala* concava, reflexa, subscariosa, sordide albida. *Germinis* locula 3-gemmulata. *Capsula* forma germini similis, magis tumida, loculis plerumque monospermis.

3. **Hypocalymma strictum** Schauer. ramis ramulisque virgatis strictisque; foliis remotiusculis, arrectis patulisve, acerosis, tetragonis, basi subattenuata sessilibus, acutis, breviter mucronatis, laevibus, opacis, punctatis; floribus axillaribus, in pedunculo brevissimo geminatis; staminibus basi connatis.

In solo turfoso-arenoso in fruticetis planitiei prope vicum Albany (distr. Plantagenet), Septembri et Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 331 et 335.

Frutex pedalis-bipedalis, glaberrimus, a basi ramosus, ramulis fuscescentibus. *Folia* rigidula, strictiuscula, in sicco facie et saepius etiam dorso sulcata, crassiora quam praecedentis minusque attenuata et acutata, conspicue punctata, tamen laevia, neque vero nitida, laete viridia, 4-6-8 lin. longa. *Flores* fere illius, fusco-testacei coloris.

4. **Hypocalymma asperum** Schauer: ramulis scabro-pubescentibus; foliis approximatis, arrectis imbricatisve, acerosis, subclavato-trigonis-tetragonisve, basi subattenuata sessilibus, acutis, muticis, tuberculato-punctatis asperisque; staminibus basi connatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 332.

Frutex vix pedalis, habitu floribusque prioribus binis similis, sed ramificatione magis contracta, foliisque imprimis ramulisque asperis distinctus. *Folia* 4-6 lin. longa.

II. **ASTROCALYMMMA.** Flores axillares geminati, sessiles, bractea bracteolisque consimilibus scariosis hypanthii basin stellato-involucrantibus, post floris lapsum residuis. Germen triloculare, loculis unigemmulatis.

5. **Hypocalymma scariosum** Schauer. ramis ramulisque flexibilibus patulis; foliis sessilibus, confertis, decussatis; acerosis, rigidulis, subclavato-trigonis, canaliculatis, cartilagineo-acuminatis, scabro-punctatis; floribus axillaribus, sessilibus; geminatis, dense spicatis, subscariosis.

In turfosis hieme inundatis, inter frutices prope praedium rusticum b. Spencer ad Sinum Regis Georgii III., Octobri a 1840. Herb. Preiss. No. 330.

„Frutex 1-2½ pedalis“, ramosus, ramulis aequaliter foliosis, albidis. *Folia* semipollicaria, punctis prominulis sub lente scabris conspersa, opaca, inferiora patula, subfloralia patentissima. *Flores* ad apices ramulorum in apicem fere pollicarem collecti. *Involucrum* scarioso-membranaceum. *Hypanthium* patellaeforme, punctatum. *Calycis phylla* adscendentia, late rotundata, contigua, cum petalis duplo longioribus rotundatis conniventibus membranacea, subscariosa, testacei coloris, in disco resinoso-punctata. *Stamina* inaequalia, longiora corolla paullo breviora. *Capsula* semisupera, argute tricarinata, loculis monospermis.

6. **Hypocalymma angustifolium** Endl. ramulis virgatis, tetragonis, patulis; foliis remotis, patentibus, decussatis, sessilibus, lineari-subulatis, canaliculatis dorso convexis, vel semitereti-subulatis facie canaliculata, acuminatis, mucronatis, punctatis, opacis; floribus axillaribus, sessilibus, geminatis, interrupte spicatis. Endl. En. pl. Hügel. pag. 50. n. 152.

Adest triplici forma, manifesto ex soli conditione pendente:

α **linophylla**: vegeta, virgata; foliis tenuioribus, lineari-subulatis, canaliculatis, laevibus, punctis immersis;

β **acerosa**: foliis carnosis, semitereti-subulatis, facie et saepius dorso quoque sulcatis, laevibus, punctis immersis;

γ **verrucosa**: macra, rigidula, squarrosa; foliis carnosis, semitereti-subulatis, corrugatis, dorso verrucoso-punctatis.

Forma α lecta est in depressis uliginosis silvae prope vicum Perth, Aug. a. 1839. Herb. Preiss. No. 339. et in reg. interioribus Austr. merid. occid., Octobri a 1840. No. 333; Hügel!; forma β in depressis arenosis silvae ad Hester's-point, Octobri a 1840. No. 338, in calculeosis limosis silvae terrae superioris Australiae occidentalis, Septembri a 1839. No. 340. et in sublimosis ad fl. Vasse, Decembri a 1840, sterilis No. 341.; Drummond!; forma γ in solo subarenoso prope vicum Albany, Octobri 1840. No. 336; Drummond!

Ramuli cinerei, laeves. *Folia* 6-8 lineas longa, superiora reliquis paullo majora cuspidato-mucronata subtus teretia vel (sicca saltem) sulcata ideoque tetragona. *Flores* involucre brevi saepe colorato stipati conspicui. *Calycis phylla* petaloidia, semiorbicularia, lilacina vel petalis concoloria. *Petala* erecta, pallide rosea. *Stamina* subaequalia, brevissime exserta. *Germen* semisuperum, trigonum, trigemmulum. *Capsula* trigona, trisperma.

III. **CARDIOMYRTUS.** Flores axillares gemini, pedunculati, pedunculo bractea, hypanthio bracteolis binis oppositis bractaeaeque alternis stipato. Germen triloculare, loculis bigemmulatis.

7. **Hypocalymma cordifolium** Lehm. Ms. ramis gracillimis, virgatis, tetragonis, marginatis; foliis decussatis, membranaceis, planis, cordatis, sessilibus, semiamplexicaulibus, acutiusculis, margine subrevoluto cartilagineo-

denticulatis, uninerviis, glaucis; perforato-punctatis; floribus axillaribus geminis, pedunculatis.

In solo turfoso inter fruticeta planitiei prope vicum Albany (Plantagenet), Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 154. *) Ferd. Bauer!

„Frutex 2-3-pedalis“, ramis subsimplicibus, fuscis, nitidis. *Folia* subdistantia, 4-5 lin. longa itemque ad basin lata. *Pedunculi* variae longitudinis, tamen folio semper plus duplo breviores, tenues. *Bractea* et *bracteolae* tenuiter membranaceae, lineari-lanceolatae, subpersistentes; hae hypanthium aequantes. *Hypanthium* subexplanatum, in *phylla calycis* rotundata herbacea margine membranaceo purpurata et integerrima continuo abiens et cum iis lineam fere radio metiens. *Petala* calyce vix longiora, cum filamentis quam ea ipsa brevioribus liberisque carnea.

ASTARTEA DC. Endl. gen. n. 6289.

Schauer, Linnaea XVII. pag. 241.

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori. *Flores* pedicellati; pedicellus in apice pedunculi articulatus eique continuus basi bracteolis binis oppositis, plerumque fugacissimis, stipatus. Bracteolae arcte sub alabastro juvene insertae, pedicello dein excrecente auferuntur. *Hypanthium* turbinatum, in pedicellum attenuatum vel contractum, germiini omnino adnatum. *Calycis phylla* breviter obtusa, inclinata, dorso saepe callosa vel corniculata, persistentia. *Petala* 5, margini interiori hypanthii inserta, lobis calycis alterna, orbicularia, subunguiculata, (alba,) decidua. *Stamina plurima*, cum petalis inserta, in phalanges 5 fasciculatas lobisque calycis oppositas coalita, inclinata, emarcida in fructu remanentia; anthera connectivo filamento continuo erecta, bilocularis, loculis oppositis rima longitudinali subporiformi hiantem dehiscens. *Germen* vertice convexo vix emersum, triloculare; *gemmae* in loculo multae, horizontales, superpositae. *Stylus* filiformis, brevis; stigma capitatum. *Capsula* hypanthio hemisphaerico calyce toruloso coronato inclusa, vertice loculicide trivalvis, loculis polyspermis. *Semina* triquetra, dorso arcuato et convexo, lateralibus planis, hilo ad angulum citra basin laterali.

1. **Astartea leptophylla** Schauer. ramis ramulisque gracilibus teretiusculis; ramulis lateralibus abbreviatis copiosis; foliis tenuissimis, semitereti-filiformibus, inferne attenuatis, muticis, glaucescentibus; pedunculo folio breviori infra medium articulo; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus 8-andris.

In umbrosis ad ripam fluvii Preston (prov. Wellington), solo limoso, Januario a. 1840. Herb. Preiss. No. 156.

*) Bracteolae arcte sub alabastro juvene insertae, pedicello dein excrecente auferuntur.

„Frutex 12-15 pedalis“, ramificatione gracillima vaga. *Folia* patula, 4-6 lin. longa, facie sulco exarata. *Flores* pro genere majusculi. *Hypanthium* pallidum. *Calycis phylla* ovata, obtusa, margine angustissimo membranaceo. *Petala* lata, orbiculata, breviter unguiculata, punctata.

2. **Astartea fascicularis** DC. ramis quadrangularibus marginatis; ramulis lateralibus abbreviatis copiosis, fasciculato-foliosis; foliis acerosis, subclavato-semiteretibus subtrigonisve, in petiolum brevem attenuatis, acutiusculis, muticis, punctatis, laevibus; pedunculo folio subaequali breviorive, infra medium articulado; calycis phyllis dorso gibbis; phalangibus 5-8-andris. DC. Prodr. III. pag. 210.

Melaleuca fascicularis Labill.! Nov. Holl. II. pag. 29. tab. 170 (v. sp. orig.)

In solo turfoso-arenoso ad ripam flum. Cygnorum pr. vicum Perth, Januario a. 1839. Herb. Preiss. No. 158. In terra Van-Leuwin: Lab.! sic enim certo legendum pro loco, lapsu memoriae allato: „Prom. Van-Diemen“; Ferd. Bauer!)

Frutex 4-8 pedalis, ramis ramulisque terminalibus elongatis laxis cinnamomeis. *Folia* 2-3½ lineas longa, rigidula, recta, incurva vel recurva, subtus convexa, a lateribus leniter compressa, facie plana sulcata v. canaliculata, laete viridia. *Calycis phylla* herbacea, ovata, obtusa, purpurata, pellucide marginata, dorso subtuberculato-callosa. *Petala* oblonga, in disco punctata. Planta Billardieriana macilentior est quam Preissiana, foliis majoribus et crassioribus; ceterum vero nullo discrimine diversa.

3. **Astartea scoparia** Schauer. ramis virgatis, strictis, subfastigiatis, ramulosis; foliis brevibus, subclavato-semiteretibus, in petiolum brevem attenuatis, acutiusculis, muticis, laevibus, ramulorum fasciculatis; pedunculo folium subaequante, ad medium articulado; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus subpentandris.

In solo arenoso secundum fl. Cygnorum supra vicum Perth, Febuario, Aprili. Herb. Preiss. No. 150 ex parte.

Frutex 4-8 pedalis, habitu scopario, ramulis lateralibus brevissimis copiosissimis floridisque insignis. *Folia* sesquilineam longa, facie plana, laete viridia, „recentia *Anthoxanthum* redolentia“. *Flores* mediocres.

4. **Astartea aspera** Schauer. ramis rigidis squarrosis; ramulis asperrimis; foliis quadrifariam imbricatis, brevibus subclavato-semiteretibus-subtrigonisve, in petiolum brevem contractis, acutiusculis, muticis, aspero-punctatis; floribus

*) **Astartea laricifolia** Schauer. ramis gracilibus, tetragonis, subalato-marginatis, ramulosis; foliis confertissimis, patentibus, filiformi-semiteretibus, in petiolum attenuatis, acutis, muticis, laevibus; pedunculo folium subaequanti, infra medium articulado; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus 3-4 andris. Walpers Repert. II. p. 922. *Leptospermum laricifolium* A. Cgh. Herb. No. 81! In paludosis ad Sinum Regis Georgii III.: A. Cgh. Frutex ramis laxis, ramulis copiosis patentifoliosis specie quadam laricina indutus. *Phyllopodia* in alam, praesertim sub folio conspicuam, utrinque decurrentia eaque internodium subjectum marginantia. *Folia* angustissima, 2½-4 lin. longa, facie argute marginata sulcata vel leviter canaliculata, dorso convexo, utrinque subfilitate punctata, viridia, nitidula. *Calycis phylla* ovato-subrotunda, margine membranaceo angusto.

Aspartea Endlicheriana, Schauer.

S polyandra f. v. m.

Chalangibus plerumque altitudine
prope Freemantle, N. Holl. austr-
occidentalis
anth: asparte.

vix exsertis; pedunculo supra basin articulato et bracteolato; calycis phyllis dorso gibbis; phalangibus triandris.

In rupestribus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 361.

„Frutex tripedalis.“ *Ramuli* laterales breves, foliis dense obsiti, inferne pulvinis residuis denticulati; terminales subvirgati, foliis remotis ex axillis fasciculum foliorum pullulantibus instructi, scabritie singulari, scilicet verrucis denticulatis singulis singulum punctum resinosum obvallantibus asperimi, quae scabrities eadem, sed minus conspicua, in foliis reperitur. *Folia* vix 2 lin. aequantia. *Hypanthium* cyathiforme, herbaceum. *Calycis phylla* lato-ovata, obtusissima, purpurata, membranaceo-marginata, gibbo dorsali crasso. *Petala* limbo calycis triplo longiora, alba, roseo fucata.

5. **Astartea glomerulosa** Schauer. ramis tenuibus angulatis breviramulosis; foliis brevibus crassis, subclavato-semiteretibus-subtrigonisve, in petiolum brevem contractis, muticis, laevibus, ramulorum axillarium compactis; pedunculo exserto, supra medium articulato; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus 3-4-andris.

In regionibus interioribus Sinus Regis Georgii III, Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 162.

Folia $1\frac{1}{2}$ -2 lineas longa, atroviridia, punctis vix conspicuis. *Pedunculi* longe exserti, tenuissimi, articulo semilineam a basi hypanthii distante. *Hypanthium* dimidia linea paullo longius, subito in pedicellum contractum. *Calycis phylla* rotundata, tenuiter membranaceo-marginata. *Petala* candida, calycem triplo excedentia.

6. **Astartea corniculata** Schauer. ramis tenuibus virgatis teretiusculis; foliis brevibus crassis, lineari-semiteretibus, in petiolum brevem contractis, acutiusculis, muticis, laevibus, ramulorum brevium axillarium imbricatis; pedunculo exserto, medio articulato et bracteolato; calycis phyllis dorso corniculatis, corniculis tenuibus margine brevi inflexo pluries longioribus, porrectis; phalangibus 3-4 andris.

In sub turfoso-arenosis plantitiei prope vicum Albany, Januario a. 1840. Herb. Preiss. No. 163.

„Frutex pedalis, gracillimus, erectus.“ *Ramuli* juniores purpurati. *Folia* sesquilineam longa, supra plana, subtus valde convexa, ideoque fere hemiellipsoidea, lacte viridia. *Flores* fere sequentis, sed pedunculi bracteolis herbaceis, foliis similibus tamen minoribus, diu stipati et cornicula calycis longiora, praesertim in alabastro conspicua.

7. **Astartea Endlicheriana** Schauer. ramis ramulisque gracilibus flaccidis; his quadrangulis submarginatis; ramulis lateralibus brevibus, fasciculato-foliosis; foliis patentibus, acerosis, semitereti-subfiliformibus, basi angustatis, muticis, laevibus; pedunculo folium subaequante, medio articulato; calycis phyllis dorso breviter corniculatis callosisve; phalangibus 3-5-andris.

Leptospermum dubium Spr. Syst. II. pag. 492. n. 16. (quo nomine plantam nostram in nonnullis herbariis reperi.) *Baeckea affinis* Endl.! Enum. pl. Hügel. pag. 51. n. 168. *Baeckea frutescens* Hort. et A. Dietr. in Allg. Gartztg. IX. pag. 258!; non L.

In depressis arenosis haud procul a praedio rustico cl. Andrews ad fl. Cygnorum, Decembri a 1839. Herb. Preiss. No. 165; J. Drummond! Ad Sinum Regis Georgii Ferd. Bauer! Hügel! (v. v. c.)

Frutex cultus 3-5 pedes altus, ramis pendulis floridis valde ornatus. *Folia* 3-4 lin. longa, atroviridia. *Bracteolae* fugacissimae. *Hypanthium* viride, saepius purpure tinctum. *Calycis phylla* subrotundo-ovata, margine pellucido subtiliter denticulato, dorso callo herbaceo compresso, saepius obsoleto, aucta. *Petala* subrotundo-oblonga, tenuissime denticulata, alba, venosa, perforato-punctata.

Subtribus II. Euleptospermeae. Folia alterna. Flores sessiles. Bracteolae saepe fugaces vel nullae. Stamina indefinita, corolla breviora, libera. Schauer dissert. grat. p. 5.

AGONIS DC. Prodr. III. (1828*) pag. 226.
(Sect. I. Leptospermi). BILLOTTIA G. Don
et R. Br. (1830.) Endl. gen. n. 6305.

Capitula pleiantha, compacta, vel in ramulis brevibus lateralibus inferne foliatis subapicalia, vel axillaria sessilia, post anthesin saepe ramulo innovante comata. *Flores* bractea et bracteolis binis squamaceis suffulti, sessiles. *Hypanthium* turbinatum, germi adnatum. *Calycis phylla* 5, marcescentia denique obsoleta. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, ejusdem lobis alterna, orbiculata, distincte unguiculata, (alba). *Stamina* cum petalis inserta iisque breviora di-pleiocycla; filamenta filiformi-subulata, libera; anthera incumbens, bilocularis, loculis longitudinaliter dehiscentibus. *Germen* hypanthio immersum, tri-rarius quinque-loculare, loculis paucigemmulatis. *Stylus* filiformis, brevis; stigma capitatum, subtrilobum. *Capsula* immersa, loculicide trivalvis; semina in loculo singula vel bina, basi affixa, adscendentia.

1. **Agonis (Leptospermum) flexuosa DC.** l. c. innovationibus vestitis; ramulis compressis, acutangulis subalatisve, pendulis; foliis alternis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, brevipetiolatis, subtus trinerviis venosisque nervis lateralibus margini proximis excurrentibus, adultis glabratibus; capitulis axillaribus, pleianthis, villosis.

Leptospermum resiniferum Bertol. amoen. ital. pag. 28.
L. glomeratum Wendl. fil. in Flora 1819. pag. 678, ex ipso Beitr. II. pag. 22. *Metrosideros flexuosa* Willd. Enum. pag. 514!
Leptospermum flexuosum Lk. En. II. pag. 26. Rehb. hort.

*) Nomen Candollei ex jure prioritatis servandum, ut jam optime monuit cl. Lindley (Swan-River Bot. pag. X. n. 33.), quam genus ab auctore praevisum tanquam propria Sectio Leptospermi satis distinctum sit.

Agonis²¹ hypericifoliae nomen
mutatur in:

A. thalictroides Schauer.
et delictus Synonymum L.
hypericifolium Otto & Dietr.,
quod ultimum L rubri-
caulis Lk formam exhibet

bot. II. tab. 115! (icon bona, sed capsulam perperum 5-locularem exhibens.) Colla, Act. Acad. Taur. XXXI. pag. 112. tab. 2.! (valde mediocris). *Billottia flexuosa* G. Don. Gen. Syst. Variat foliorum figura:

α **angustifolia**. foliis anguste lanceolatis, elongatis, utrinque acuminatis.

In arenosis secundum ripam dextram fl. Cygnorum, Decembri. Herb. Preiss. No. 136: frutex 10-20-pedalis; in arenosis silvae haud procul ab ora maris, Septembri flor., No. 137; in litore arenoso prope Busseltown (Sussex), Decembri seminifera, No. 138; in turfosis humidis umbrosisque ad radices montis Elphinstone (Plantagenet), No. 140; in rupestribus insulae Mistaken-Island, No. 139; in solo turfoso arenoso ad Stirling's Terrace (Plantagenet) alabastrigera, No. 147. King George's Sound: A. Cgh.! 1821. (v. v. c.)

β **latifolia**. foliis latioribus simulque brevioribus, basi ovatis.

In solo turfoso arenoso ad Stirling's-Terrace (Plantagenet), Septembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 144.

Frutex 5-8-pedalis. *Corolla* alba. *Lobi* calycini acuti, denique decidui. *Stamina* quina-sena ante singulum lobum calycinum. *Semina* in loculo subgenina.

2. **Agonis (Leptospermum) hypericifolia** Sch. innovationibus hirsutis; ramis confertis, rigidulis, angulatis, cum foliis denique glabratissimis; foliis alternis, subdistichis, ovatis ellipticis subrotundisve, uninerviis, venosis, inflexis undulatisque, apice complicato, acumine mucronato deflexo, margine scabro, petiolo brevissimo; capitulis axillaribus, pleianthis, sericeo-villosis.

Leptospermum hypericifolium Otto et Dietr., Allg. Gartztg. IX. pag. 243. (sine flor. descr.) *L. theaeforme* A. Cgh.! herb.

In arenosis subturfosis circa vicum Albany (Plantagenet), Novembri et Decembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 152 et 153. King George's Sound: A. Cgh.! 1822. (v. v. c.)

Frutex 4-8 pedalis, ramulis hornotinis vegetioribus virgatis. *Folia* perforata variant figura magis elongata et magis rotundata, pubesque diutius residua. *Phylla calycis* rotundata, a fructu decidua. *Petala* calycem longitudine aequantia, anguste unguiculata, perforata, alba. *Stamina* 20. *Capsula* breviter exserta, loculis dispermis.

3. **Agonis (Leptospermum) marginata** DC. l. c. innovationibus totis sericeis; ramis rigidulis, hirsutis; foliis alternis, obovato-oblongis, margine cartilagineo villosis, denique omnino glabratissimis, trinerviis; capitulis subapicalibus axillaribusque, pleianthis; hypanthio sericeo; calyce hirsuto.

Leptospermum marginatum Lab. N. Holl. II. pag. 10. tab. 148!

In rupestribus ad King George's Sound, Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 141; (v. v. c.)

„Frutex 5-pedalis“. *Folia* utrinque multipunctata. *Petala* alba. *Stamina* 10. *Capsula* immersa.

4. **Agonis spathulata** Schauer. ramulis squarrosis, teretibus, villosis; foliis confertissimis, alternis, subrotundo-spathulatis, obtusissimis, concavis, enerviis: junioribus basi

ciliato-hirsutis: adultis glabratis, nitidulis; capitulis subapicalibus, multifloris; hypanthio glabriusculo; lobis calycis citra apicem dorso barbatis.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 324.

„Frutex pedalis“, densirameus, squarrosus. *Folia* coriacea, parva, 2 lin. circiter longa, lamina, lineam fere longa, utrinque punctatâ. *Phylla calycis* ovata, obtusa, inferne confluentia. *Petala* alba, breviter unguiculata. *Capsula* trilocularis, loculis monospermis. *Semina* eburnea, umbilico fusco.

5. **Agonis (Leptospermum) linearifolia** DC. innovationibus sericeo-villosis mox glabratis; ramulis strictis; foliis alternis, lanceolatis, basi attenuata sessilibus, acumine brevissimo subpungentibus, uninerviis vel subenerviis; capitulis in ramulis brevibus apicalibus, pleianthis; hypanthio sericeo v. subvillosa; calyce villosa-hirsuto. DC. l. c. et Mém. Myrt. tab. 12!

„Spearwood“ Colonorum.

In turfosis umbrosis subhumidisque silvae ad vicum Perth, Junio 1839 florif. et fructif. Herb. Preiss. No. 142; in turfosis depressis ad fl. Cygnorum pr. Perth, Septembri 1840, No. 145; in clivulo arenoso pr. Albany, Septbr 1840, alabastrig., No. 151. King George's Sound, 1822: A. Cgh.!

„Frutex 8-14-pedalis, erectus“. *Folia* juniora in sicco saepe subtrinervia, adulta firma subnervia multipunctata. *Flores* parvi. *Petala* alba, in unguem angustum contracta. *Stamina* 10. *Capsula* immersa, 3-5 locularis, loculis dispermis.

6. **Agonis conspicua** Schauer. innovationibus sericeo-villosis; ramulis submarginatis erectis; foliis alternis, aversis, lanceolatis, basi attenuata sessilibus, acutis acuminatisve, subpungentibus, trinerviis, adultis glabratis, subnitidis; capitulis in ramulis brevibus subapicalibus axillaribusque, pleianthis; hypanthio calyceque villosis.

In rupestribus summitatis montis Wuljenup (Plantagenet), Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 150 ex parte.

„Frutex octopedalis“, ramulis laete fuscis. *Folia* perforato-punctata, flavo-virentia, pollicem circiter longa, superius 2-2½ lin. lata, marginibus imprimis apice inflexis. *Flores* corolla alba explanata 3 lin. diametro mediante conspicui; petalorum unguis calycis phylla ovata obtusa subaequant. *Stamina* 10. *Capsula* immersa, trilocularis, loculis dispermis.

7. **Agonis angustifolia** Schauer. innovationibus sericeis; ramulis marginatis, subvirgatis; foliis alternis, confertis, lanceolato-linearibus, acuminatis, subpungentibus, uninerviis, canaliculatis, adultis glabratis; capitulis axillaribus, pleianthis; hypanthio sericeo-pubescente; calyce subglabrato.

In rupestribus summitatis montis Wuljenup, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 149.

„Frutex octopedalis“. Variat foliis anguste lanceolatis et lineari-acerosis, 6-8 lin. circiter longis. *Flores* majusculi, albi. *Calycis phylla* ovata. *Stamina* 10. *Fructus* praecedentis.

8. **Agonis juniperina** Schauer. ramulis piloso-hirsutis, erectis; foliis alternis, fasciculato-confertis, lineari-lanceo-

latis, dorso convexis, sessilibus, mucronato-acuminatis, ciliatis, uninerviis, adultis glabratis; capitulis apicalibus, multifloris, densis; hypanthio sericeo-pubescente; calyce glabro.

In glareosis sterilibus promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 fructifera. Herb. Preiss. No. 314.

Frutex ramis erectis, ramulis lateralibus fasciculato-foliosis dense consitis. *Folia* 3-4 lin. longa. *Capitula* fructuum magna, oblonga. *Hypanthium* fructiferum turbinatum, helvolum. *Calycis phylla* membranacea, subtriangulari-ovata, acutiuscula, albida. *Capsula* trilocularis.

9. **Agonis parviceps** Schauer. ramulis subvirgatis, patulis, juvenilibus hirsutiusculis; foliis alternis, ramulos axillares brevissimos fasciculato-foliosos subtendentibus, linearilanceolatis subspathulatisque, sessilibus, acuminatis, muticis, cartilagineo-marginatis, canaliculatis, adultis glabratis; capitulis subapicalibus, exiguis, pleianthis; hypanthio subtilissime sericeo; calyce glabro.

In clivulo arenoso inter frutices densos prope vicum Albany, Septembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 160; in solo limoso-glareoso ad vicum Busselton (Sussex), Decembri a. 1839 delorata. No. 161. King George's Sound a. 1822: A. Cgh.!

„Frutex 2-3 pedalis.“ *Folia* 2-3 lineas longa, atroviridia, perforatopunctata, ramulorum florentium capitula obvallantia. *Flores* parvi; calycis phylla triangulari-ovata, obtusa; petala candida, impunctata. *Capsula* trilocularis, loculis dispermis.

HOMALOSPERMUM Schauer, Linnaea XVII.

2. pag. 242.

Flores axillares, solitarii, basi adnati, bracteolis binis oppositis squamaceis carinatis arctis sub anthesi deciduis stipati. *Hypanthium* cyathiformi-campanulatum, angulatum, germini totum adnatum. *Calycis phylla* hypanthio continua, cutanea, marcescentia, denique obsoleta. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, calycis phyllis alterna, orbicularia. *Stamina* plurima, cum petalis inserta inclinata, corolla breviora; filamenta subulata; anthera dorso inserta connectivo glandula terminato, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* (saepe abortivum), hypanthio arcte adnatum, vertice depresso, 3-4-5-loculare; gemmulae in spermophoro grosso compresso, angulo centrali basi affixo, biseriales, subdena. *Stylus* filiformis; stigma peltato-capitatum. *Capsula* innata, vertice ad suturas angulato breviter emersa, loculicide dehiscens; loculi arctissimi, 1-2-3-spermi; semina compressa, irregulariter disciformia, gemmularum tabescentium rudimenta plerumque ad verticem loculi evecta.

1. **Homalospermum firmum** Schauer.

In paludosis silvae haud longe a Bull's-Creek et in turfosis planitieci prope montem Wuljenup (Perth, Plantagenet), Octobri 1840 florif. Herb. Preiss. No. 143; in subarenosis circa Albany, Septembri 1840 alabastrigera. No. 148. Swan-River: J. Drummond! Vasse-River: Mrs. Molloy!

„Frutex 5-8-pedalis“, ramis strictis patulis, innovationibus pubescentibus. *Folia* coriacea, firma, alterna, approximata, lineari-lanceolata, sensim in basin angustata, acuta, mutica, plana, obliqua, adulta glaberrima, nitida, flavescenti-viridia, 6-8 lin. longa, lineam circiter lata. *Alabastra* et bracteolis pergamentaceis geminis oppositis arctissimis obovatis carinatis deciduis erumpentes. *Flores* conspicui. *Hypanthium* 2 lin. longum, germine totum adnatum et secundum ejus locula angulatum, glaberrimum, cum phyllis calycis cutaneis rotundatis corollaeque resinoso-punctatum. *Petala* flavescenti-albida, patentia, calyci aequalia. *Stamina* subtriginta, corolla duplo breviora; filamenta glanduloso-punctata. *Fructus* pro florum ubertate pauci, arcte adnati, subcubici vel trigoni; loculorum parietes nitidi, resinoso-punctati; semina inter spermophorum et parietem compressa, atra, opaca, margine tenuiter fimbriato-incisa.

PERICALYMMA Endl. gen. n. 6307.

Flores terminales vel axillares, solitarii, sessiles, bractea et bracteolis geminis oppositis consimilibus membranaceis concavis subpersistentibus obvelati. *Hypanthium* subturbيناتum, ultra germen productum eique adnatum. *Phylla calycis* 5, marcescentia. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, phyllis alterna, orbiculata, unguiculata. *Stamina* plurima, inclinata, cum petalis inserta iisque breviora; filamenta filiformi-subulata; anthera dorso inserta, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* hypanthio totum innatum, vertice planum, triloculare; gemmulae in singulo loculo 5. *Stylus* filiformis; stigma peltato-capitatum. *Capsula* hypanthio magis minusve elongato, subcylindrico, tota immersa, trilocularis, vertice loculicide dehiscens; semen in singulo loculo unicum, rarius et alterum, perfectum, cuneatum, carpidium cocciforme induratum inferne omnino explens; reliquarum gemmularum rudimenta ad apicem loculi repressa.

1. **Pericalymma crassipes** *Lehm. Msc.* caule inferne simplici fusiformi-incrassato, superne dichotomo; ramulis divaricatis, glabris, marginatis; foliis alternis, oblongo-lanceolatis oblongisve, basi euneatis, acuminatis, mucronatis, glabris, canaliculato-inflexis, apice uncinato, margine scabro; hypanthio cyathiformi, subtilissime sericeo; phyllis calycis cutaneis, ovatis, obtusiusculis, bracteolisque scariosis ciliatis glabris. *Leptospermum crassipes* *Lehm.* in *Ind. Sem. hort. Hamb.* a. 1842.

In solo turfoso in fruticetis densis planitiei haud longe a vico Albany (Plantagenet), Octobri a. 1840. *Herb. Preiss. No. 155.* Ferd. Bauer!

Fruticulus palmaris, valde singularis, micromerus. *Folia* sesquilineam longa, arrecta. *Flores* exigui, basi foliis ramulorum, quibus insident, obvallati; *hypanthium* linea vix longior; *phylla* roseo-fucata; *petala* hypanthium longitudine aequantia, orbiculata, in unguem breviter attenuata, pallide rosea, paucipunctata.

2. **Pericalymma ellipticum** *Endl.* ramulis subdichotomis submarginatis foliisque adultis glabris; foliis alternis,

7 Fabridia coniarica Guérin-Méneville.
~~F. laevigata Gaertn.~~
Fruticosa ^{plana}, erecta, foliis cori-
aceis lanceolatis, plus minus
spathuliformibus apiculo ex
acumine aculeo terminatis
in petiolum brevem latum
angustatis tenuissimis 3 raro
5 nerviis et venosis dense
punctatis glaberrimis, flori-
bus solitariis axillaribus
lateralibusque, calycis
campanulati glabri denti-
bus triangulatis ciliatis
rotundis caducis, capsula
4-7 loculata, seminibus
alatis et apteris.

In fruticulis locorum arida-
rum Murray foras versus
fluvium Optimum. Ad ped. montium
max. radices. 5' ramif. glab. ^{max.}
Siliamunda et petala alba
Antherae fulvae. Semina
spadicea alia angustiora
captra, alia explanata
alio sumbranaeas facide
fusetis crispata - dentata
rimata.

* Leptospermum grandifolium, Sm.

L. sericeum, hb. Theort. (nec Lax)
 Ad flumen South Esk river
 commune. L. grandifolium Don!
 Det. non Loddiges!

! P. compactum herm. in hb. St. 322
 foliis brevioribus, prostrata, ^{robusta}
 brevissima, ramis plus patentibus
 brevibus. In montib. 3-4000' altis
 L. puberulum Lamm. (Jan.!)
 L. grandifolium Sm. (Nov-
 Norfolk!)

! P. minus herm. in
 hb. St. II, 304.

In planis paludosis Ter-
 maniae.

Vix nisi omnibus portibus
 duplo minoribus foliis supra
 minus nitentibus ab pilis
 brevissimis longius remanentibus ab
 ostiis ostiis distare videtur.

Frutex 8-10'
 Anthesis: Jan.

* Specimina intermedia
 in nostra collectione occurrunt.

* Leptospermum lanigerum, Aiton

In vallibus ad rivellas fratu
 rigius, et ad rivozum marginis
 primo inde, locis semper agrestis
 Varietas prostrata (Chaen.)
 gregaria!

Frequenter occurrit.

Fitti calyces longius vel brevius
 villosi, folia saepe duplo
 angustiora.

Anthesis: aestate.

Cortex fovearum griseus pallidius maculatus fibrillis, fibris
 reticulatis, fore anastomozantibus, ^{fructibus} ^{prostratis} ^{et} ^{altis}

Sim; altissima & longiora
 quam L. pinnatifidum
 "capitula" interdum in ore
 "capitula" recumbentia

L. grandiflorum Lodd? non Don

L. nobile Jussm

L. myrsinifolium Gunn non Sieb.

In clivis scopulosis prope port.
cygnorum. frut 10'. Nov. 49,
hb. St. J. 643.

Leptoppermum flavescens Sm.

In parte australi Tasmaniae
prope Hobart-Town. hb. St. J. 808.

A Smithianae, cuius proxima
~~Tasmaniae~~ ^{in h. Kallangur} attamen frut. com-
peranda, vix discernere quimus
et illud insufficiente descriptum

Leptoppermum microcarpum Jussm

Nullo modo a seguente recedere
videtur, quantum ex exemplaribus

foliis fructiferis extrahendum, quam
fructu toto cum seminibus
duplo minore pericarpium evidenter
et magis compresso, sed hucusque
talis varietates in hoc genere
hanc observatae sunt itaque
interiorneam plantam ut novam
relinquo adponere.

Numerosissime in h. Kallangur / quae afa. in filicibus
et in h. Kallangur vixit. fr. 4. 5.

Leptoppermum ^{montanum} microcarpum Jussm

Ad fontis et rivulas
non rarum.

Frut. 3-6', folia sicca
apice canaliculata - cuneata
(hanc plana Walpers)

Sutulis var. - Jan.

Australis filix. hb. St. J. 729.
fr. cult.

2 *Fabricia laevigata* Gärtn.
Hb. St. n. 138. sine notat de loco
natali

* *Leptocarpum proparium* ~~Hooker~~
Boiss.
i. & fluvium Mersey-river Ta-
smaniae. Hb. St. n. 326.
Satis in pithos Donii & Schaueri
(quod Walp.) quadrat.

Crutes 8-10' Kobark-towa. Hb. St.
1848.

Anthesis: Jan.
Agnet. river prope Oyster Bay.
6-8' Nov 49. Hb. St. n. 789.

L. microphyllum ~~Hooker~~
Boiss.

Solummodo a *L. parvifolius*

in ex brevi huius designati
in Don gen. syst. novit foliis
ovatis (ovatis) 3-5 nervis. in var?

& viridis, foliis omnibus glabris
lunatis, cum melana punctata
inflans interioribus udis versus finem
Rivoli-way. Oct. 1848. 5-61.

L. myrsinoides Schleich. & Endl.

L. parvifolium ~~Hooker~~ *Boiss.* *Encounter Bay*
Boiss.

In desertis montis Bartoni

(Apr. 1848. specimina parva)

in montibus Lofy - Bayle &
Warappa-range, in fruticulis
altum ad rivulum Salt creek
ad montem Shank alibique

L. ericoides Lich. Jan. 1848 paper.

In tractu montium Lofy range.

22 Martii 1848. specimina parva.

Hb. St. 140. Hb. j. 21. Mount Gairdner!
Kangaroo-island.

Capitula 4-5 oculata

Anthesis Oct. Nov.

P. angustifolia. foliis linearibus ovatis dilatatis
P. latifolia. foliis parvis ovatis
P. angustifolia. foliis linearibus ovatis dilatatis
P. latifolia. foliis parvis ovatis

obovatis obovato-oblongis subellipticisve, basi angustata sessilibus, concavis, obscure trinerviis, acumine brevi complicato mucronato muticove; hypanthio turbinato, tenuiter sericeo; phyllis calycis cutaneis, ovatis, obtusis, ciliatis, bracteolisque scariosis glabris vel glabrescentibus. Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 51. n. 167.

In solo limoso ad ripam fl. Vasse-River, Decembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 132; in depressis turfosis hieme inundatis silvae haud procul ab oppido Perth, Septembri 1839 fructiferum No. 157. King George's Sound Hügel!

„Frutex 5-pedalis, erectus“. *Folia* turionum magna, semipollice saepe majora, conspicue trinervia, plerumque vero duplo triplove minora nervis obsoletis, novella pilosa, adulta glaberrima nitidula. *Flores* conspicui, foliis approximatis diminutis cincti, squamis 3-5 scariosis obovatis concavis fuscis pellucidis punctatis hypanthium velantibus involucrati. *Hypanthium* linea paullo brevius, *calyci* longitudine fere aequale. *Hujus phylla* lata, triangulari-ovata, basi trinervia, colorata, dense ciliata, post anthesin adscendentia, dein perfecte emarcida inflexa, denique fatiscentia. *Petala* sesquilinearia, dorso puberula, pallide rosea. *Hypanthium* fructiferum cylindricum, 2 lin. longum.

3. **Pericalymma floridum** Schauer. dichotome ramosum, ramulis tenuibus submarginatis foliisque adultis glabris; foliis alternis, aversis, oblongo-lanceolatis oblongisve, basi angustata sessilibus, inflexis; acumine complicato submucronato reverso; hypanthio obconico-cylindrico, calycisque phyllis bracteolisque sericeo-villosis.

In humidis silvae trans fl. Cygnorum haud procul a vico Guildford, Aug. a. 1839: Herb. Preiss. No. 131. J. Drummond!

„Frutex 7-pedalis“, habitu priori persimilis. *Folia* 2-5 lin. longa, laete virentia, remotiuscula, subfloralia magis congesta. *Flores* petalis dorso glabris, albis v. pallide roseis, ampliusculis speciosi. *Bracteolae*, *hypanthium* et *calyx* praeter indumentum insigne iis praecedentis speciei similes.

LEPTOSPERMUM Forst. Endl. gen. n. 6309.

1. **Leptospermum sericeum** Labill. foliis obovatis mucronatis 3-5 nerviis utrinque sericeis, calycibus totis sericeis, dentibus coriaceis subacutis persistentibus! Schauer, Linnaea XV. 4. pag. 412. Labill. Nov. Holl. II. pag. 9. tab. 147.

In planitie arenosa aboriginibus Quangen dicta (prov. Victoriae), Martio 1840, sine flor. Herb. Preiss. No. 135. (v. v. c.)

„Frutex 5-pedalis“. A Billardiero certo certius in Terra Van-Leuwin, nec in insula Van-Diemen lectum.

2. **Leptospermum erubescens** Schauer. patenti-ramosum; ramulis sericeo-subvillosis; foliis alternis, obovato-oblongis, in petiolum brevem contractis, obtusis retusisve cum acumine brevissimo complicato reverso, inflexis, trinerviis, glaucescentibus, sericeo-pubescentibus, denique glabrescentibus; floribus terminalibus, solitariis, bracteatis; hypanthio campanulato-turbinato, sericeo; calycis phyllis cutaneis, triangularibus, obtusiusculis, marcescentibus.

In glareosis sublimosis sterilibus silvae cis fl. Gordon-River (Hay), Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 133; in glareosis silvae haud longe a fonte St. Rozen's-well (York), Aprili sine flor: Herb. Preiss. No. 134. Vasse-River: Mrs. Molloy!

„Erntex 5-pedalis, procumbens“, ramulis paucifoliis gracilibus flexuosis. *Folia* $2\frac{1}{2}$ -5 lin. longa, subpellucide punctata. *Bracteae* pellucido-membranaceae, fuscae, glaberrimae, caducae, alabastrum obvelantes. *Hypanthium* 2 lin. longum. *Calyx* rubescens. *Petala* calycem duplo excedentia, unguiculata, candida v. erubescientia. *Fructus* depresso-globosus; *capsula* hypanthio cupulaeformi basi insidens, vertice emersa, 5-locularis, loculis polyspermis.

Subtribus III. Callistemoneae. Folia opposita vel alterna. Stamina indefinita, exserta, libera. Schauer, dissert. grat. pag. 5.

CALLISTEMON R.Br. Bot. Reg. n. 393.
DC. Prodr. III. 223. Callistemon a Eucallistemon Endl. gen. n. 6302.

Flores laterales, spicam innovatione axis comosam struentes, bracteae squamaceis singuli singula subtensi, gemmam floriferam imbricatim perulantibus, prae anthesi deciduis; bracteolae nullae. *Hypanthium* herbaceum, basi carnosa axi adnatum, campanulatum, ultra dimidium germini adnatum, fauce brevi. *Calycis phylla* 5, hypanthio continua, rotundata, tota vel apice scariosa, basi imbricata. *Petala* 5, margini hypanthii annuliformi inserta, phyllis calycis alterna, subherbacea vel membranacea, suborbicularia, concava, subsessilia. *Stamina* plurima, cum petalis inserta, decidua; filamenta filiformia, longissime exserta, libera, recta; anthera citra basin dorso inserta, incumbens, bilocularis, loculis rima longitudinali dehiscens. *Germen* hypanthio innatum, vertice breviter emerso villosa, triloculare; gemmulae numerosae, in spermophoro oblongo bipartito angulo centrali affixo obliquae. *Stylus* filiformis, rectus, stamina subaequans, marcescens; stigma truncatum, subcapitatum. *Fructus* hypanthiis valde incrassatis induratisque aliquandiu calyce aucto coronatis confertissimi, mutua pressione basi angulati, demum ramulo immersi; capsula cartilaginea, arete adnata, vertice loculicide dehiscens, semina per orificium hypanthii sero emittens; semina numerosa, tenuia, linearia v. clavata, angulata, aptera. *Folia* alterna, verticalia, lata vel elongata.

1. **Callistemon speciosus R.Br.** foliis lanceolatis mucronatis planis, nervo medio prominulo penninervio laterali-bus margini approximatis, calycibus glabris DC. Prodr. III. pag. 224. n. 12.

β **glaucus.** foliis glaucis DC. l. c.

Metrosideros glauca Bonpl. Nov. 1. pag. 86. tab. 34.

In turfoso-arenosis madidis ad Stirling's Terrace prope vicum Albany, Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 351.

„Frutex octopetalis“.

2. **Callistemon phoeniceus** Lindl. foliis lineari-lanceolatis coriaceis mucronatis basi angustatis marginatis aveniis costa obsoleta, calycibus glabris. Lindl. Swan-Riv. Bot. pag. X. n. 32.

In Australiae meridionali-occidentalis regionibus interioribus. Herb. Preiss. No. 352; in locis paludosis silvae ad fl. Canning m. Oct. 1839. No. 353. J. Drummond!

„Aboriginibus Tubādā.“

KUNZEA Rchb. Consp. Regni veget. (1828) pag. 175

Flores racemosi, spicati vel capitati, singuli bractea bracteolisque geminis oppositis stipati, sessiles v. pedicellati. *Hypanthium* campanulatum vel obconico-tubulosum, tubo inferius germini adnato ibidemque angulato, superius libero et in faucem ampliato. *Calycis phylla* 5, hypanthio continua, herbacea, plerumque acuta, sinibus interstincta, persistentia. *Petala* 5, margini hypanthii annuliformi pone sinus calycis inserta, colorata, suborbicularia, vix unguiculata. *Stamina* plurima, cum petalis inserta, decidua filamenta filiformia magis minusve exserta, libera; anthera citra basin dorso inserta, incumbens, bilocularis, loculis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* fundo hypanthii innatum, vertice planiusculum, 3-5-loculare; gemmulae plurimae, in spermophoro oblongo angulo centrali prope apicem affixo obliquae. *Stylus* filiformis vel teres, rectus; stamina subaequans, marcescens; stigma subpeltato-capitatum. *Fructus*: Hypanthium emarcidum (nec lignescens neque incrassatum) pergamentaceum, calycis phyllis coronatum capsulam fovens; haec adnata, apice loculicide dehiscens; semina plurima, aptera. *Folia* alterna parva.

Genus insigne a *Callistemone* et *Metrosidero* (*Agalmantho* Endl.) cum habitu tum characteribus omnino distinctum *).

*) 1. Floribus spicatis.

K. Baxteri Schauer: foliis confertissimis, patentibus, coriaceis, planis, lineari-cuneatis, acutis, uninerviis, glabris, margine villosulo; floribus sessilibus, infraapicalibus, spicatis; bracteis bracteolisque fugacibus, lineari-navicularibus, scariosis margine lanuginosis; hypanthio campanulato, colorato, pubescente; calycis phyllis foliaceis, lanceolatis, acutis; germine 5-loculari. *Calothamnus Baxteri* et *C. spathulata* Hort. Angl. *Pentagonaster Baxteri* Klotzsch in Otto et Dietr. Allg. Gartenztg. IV. pag. 113! *Callistemon microstachyum* Lindl. Bot. Reg. New-Ser. XI. I. 7. In Nova Hollandia (australi?). Ferd. Bauer! (v. v. c.) *Petala* tenuiter ciliata, calyce duplo breviora, cum filamentis 8-9 lin. longis styloque punicea. *Germen* suturis argenteo-sericeis in vertice stella 5-radiata insignitum.

* *Corolla et filamentis lilacinis (antheris luteis).*

1. **Kunzea pauciflora** Schauer. glabra; foliis confertissimis, imbricatis, semitereti-acerosis, obtusis, laevibus; floribus subapicalibus, singulis paucisve subcapitatis; bractea bracteolisque scariosis, ovatis, acuminatis, carinatis; illa hypanthio oboonico breviori; germine 5-loculari.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 259.

Fruticulus ramis ramulisque confertissimis subfastigiatis tortuosis, his superne foliosis. *Folia* 2-4 lin. longa, angustissima. *Flores* subsessiles, foliis obvallati. *Hypanthium* calyci aequale, 2 lin. longum. *Calycis phylla* a basi ovata acuminata, subherbacea, membranaceo-marginata, involuta: sinus truncati. *Petala* oblonga, calycem aequantia, lilacina.

2. Floribus axillari-v. subapicali-racemosis.

K. corifolia Rchb. l. c. glabriuscula v. puberula; ramulosa; foliis confertissimis, patentibus reflexisve, subobliquis, lineari-lanceolatis, enerviis, apice cartilagineo acuto recurvo; floribus vel axillari-vel subapicali-racemosis; bracteolis patentibus foliaceis persistentibus, vel squamaceis caducis; hypanthio oboonico campanulato; calycis phyllis lanceolatis; germine 3-loculari. *Metrosideros corifolia* Vent. Malm. t. 46! *Leptospermum ambiguum* Sm. exot. Bot. t. 59! *Stenospermum corifolium* Sweet. Hab. in Nova-Hollandia orientali: Sieber N. Holl. exs. n. 324! Ferd. Bauer! Hügel! (v. v. c.) Corolla alba.

3. Floribus capitatis.

K. praestans Schauer. glabra, foliis confertissimis, suberectis, coriaceis, cuneatis, brevissime apiculatis, subnerviis, apice recurvis, margine scabris; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata bracteolisque anguste lanceolatis scariosis, acutis, carina margineque sublanuginosis, hypanthio campanulato fero duplo brevioribus; germine 5-loculari. Hab. in Nova-Hollandia occidentali ad fl. Cygnorum: J. Drummond!; ad fl. Vasse-River: Mrs. Molloy! Frutex bipedalis, ramis virgatis suberectis. *Folia* 3 lin. circiter longa, nunc latiora nunc angustiora, viridia, nitidula, nervo medio valde obscuro. *Rhachis* capituli pubescens. *Hypanthium* ampliusculum, glabrum. *Calycis phylla* ovata, acutiuscula; sinus truncati. *Petala* calyce plus duplo longiora, patentia, in disco punctata, cum filamentis breviter exsertis roseo-lilacina. **K. Schaueri** Lehm. Msc. innovationibus villosulis; foliis confertissimis, patulis, coriaceis, obovato-oblongis cuneatisve, breviter apiculatis, 5-nerviis, denique glabratiss, margine scabris; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata, acuminata, bracteolisque lanceolatis angustissimis scariosis, cum hypanthio oboonico calyceque sericeo-villosis hypanthio triente brevioribus, germine 3-loculari. *Metrosideros capitata* Sm. Act. Soc. Linn. III. pag. 273. n. 13. *Callistemon capitatum* Rchb. hort. bot. I. pag. 59. tab. 84! *Melaleuca eriocephala* Sieb. N. Holl. exs. n. 322! *Stenospermum capitatum* Sweet. Hab. in Nova-Hollandia orientali: Ferd. Bauer! Sieber! Hügel! **K. parvifolia** Schauer. ramulis tenuibus confertis folisque pubescentibus; foliis parvis confertissimis, subimbricatis, recurvopatulis, lineari-oblongis, brevipetiolatis, obtusis, subtus punctatis, denique glabratiss; capitulis apicalibus, plurifloris, densis bractea bracteolisque scariosis, ovatis, acutis, sericeo pubescentibus, hypanthio campanulato glabriusculo duplo brevioribus; calycis phyllis subrotundo-ovatis, acuminatis, germine 3-loculari. In Novae-Hollandiae orientalis prov. Argyle leg. Hügel! Frutex ramis tortuosis cortice lacinioso indutis, ramulis brevibus confertissimis, saepe fasciculatis, intricatis, tenuibus, rigidulis, terminalibus virgatis floriferis. *Folia* lineae vix longiora, subtus convexa vel subcarinata. *Capitula* 6-8-flora. *Hypanthium* sublanuginosum, innox glabratum. *Calycis phylla* basi contigua. *Petala* orbicularia, subsessilia, calyce paullo excedentia, cum filamentis duplo longioribus persicina.

Petala-8 Stamina longe exserta-pallida.

Eucalyptus *W. & A.*

Sect. 3. Diplodialyptra *Forst. m.*
huc una cum *E. maculata*
Hooker: *E. largiflorus* *Forst. m.*
Cynula duplici, interiori co-
rollam mentiente cutanea

Sect. 1. Allomifoliae.

Eucalyptus *Quartiana* *Forst. m.*

Forst. Eadiu est ac *E. Camp-
carpa* nob. (*E. angulosa*
Schaer.?)

E. Gunnii plus quam *E.*
viminali cognata,
Frutex 8-10'. In *clivis* rupe-
stris adport. *regnum*.
Nov. 1849. hb. N. S. 667.

Eucalyptus *Silvicultrix* *Forst. m.*

Euc. ac oratam *eximie* *acumulat* *foliis*
Arbor (forte *memorificia*) 60-80'
"White gum" *Tasmanicorum*. In
Silva prope *Perth* adfl. *South*
Est. *hb. N. S. 763.* *Dec. 1849.*

2. **Kunzea micrantha** Schauer. glabra; foliis confertissimis, imbricatis, coriaceis, cuneatis, superne cartilagineo-marginatis, acutis, subuninerviis; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata, acuta, bracteolisque angustis spathulatis scaphiformibus, dorso infero sublanuginosis, hypanthium basi compressum aequantibus; germine 3-loculari, loculo uno alterove sterili.

In arenosis limosis ad vicum Guildford, Octobri 1839 alabastris adultis. Herb. Preiss. No. 277.

Frutex pedalis, graciliter ramosus. *Folia* 2-2½ lineas longa, plana, viridia, nitida. *Capitula* pisi majoris mole. *Hypanthium* adscendens, basi quatenus germine repletur irregulariter compressum, quo fit ut loculum unum alterumve tabescat. *Calyeis phylla* ovata, incurva, acutiuscula; sinus truncati.

3. **Kunzea Preissiana** Schauer. foliis confertissimis, subimbricatis, lineari-lanceolatis, obtusis, uninerviis, villosis, demum glabrescentibus; capitulis apicalibus, paucifloris; bractea subrotunda ovatave, acuminata, bracteolisque linearibus scariosis, hypanthio campanulato-turbinato subaequalibus et cum eo sericeis; calycis phyllis ovatis, obtusissimis; germine 5-loculari.

In plagis interioribus Australiae meridionali-occidentali, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 276.

Frutex ex nostro specimine dodrantalis, pluricaulis, ramis virgatis, ramulis lateralibus brevibus densifoliis. *Folia* 2-2½ lin. longa, subcanaliculata, leviter carinata, brevipetiolata, adulta glabrata nitida. *Petala* calycem duplo excedentia, persicina.

4. **Kunzea villiceptis** Schauer. foliis confertissimis, patulis, subimbricatis, obverse lanceolatis oblongisve, obtusis, mucronatis, cano-villosis; capitulis apicalibus, densis plurifloris, saepe congestis; bractea subrotunda ovatave, acuminata, bracteolisque lanceolatis scariosis, hypanthio obconico triente brevioribus et cum eo villosissimis; calycis phyllis ovatis acutis; germine 5-loculari.

In planitie arenosa inter frutices cis fl. Gordon, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 275.

„Frutex tripedalis“, villo denso undique incanus. *Folia* 2-3 lineas longa, in petiolum brevissimum latiusculum abeuntia. *Capitula* pisi majoris magnitudine, ramulis floriferis brevissimis in apicibus ramorum congestis saepe composita. *Flores* breviter pedicellati. *Petala* calycem duplo superantia, lilacina.

5. **Kunzea recurva** Schauer. innovationibus pubescentibus; foliis confertis, coriaceis, obovato-subrotundis, uninerviis, breviter apiculatis, adultis glabris recurvis; capitulis apicalibus, ovalibus, multifloris; bractea obovato-subrotunda, subacuminata, praeter basin glabra, bracteolisque cuneatis dorso lanatis scariosis, hypanthium campanulato-tubulosum sublanuginosum fere aequantibus; germine 5-loculari.

In calculosis ad radices montium Darling's-range, Octobri 1839. Herb. Preiss. No. 290. J. Drummond!

Frutex 4-5-pedalis, gracilis, ramis virgatis dense foliosis. *Folia* magnitudine varia, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. lata, viridia, nitida, laevia, perforato-punctata. Axis capituli villosus. *Flores* sessiles. *Hypanthium* primum lanuginosum, dein subglabratum. *Calycis* phylla ovata, acuta, marginata; sinus peran-gusti. *Petala* calycem aequantia, patentia, cum filamentis duplo longiori-bus lilacina.

** *Corolla et staminibus flavis.*

6. **K. propinqua** Schauer. innovationibus lanuginoso-vil-losis; foliis confertis, patulis, lineari-lanceolatis, basi at-tenuata sessilibus, acutiusculis, muticis, denique glabre-scentibus; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea bracteolisque subrotundis, scariosis, praeter basin glabris, hypanthio fere duplo brevioribus; germine 5-loculari.

Metrosideros propinqua Endl. En. pl. Hügel pag. 50. n. 160!

In arenosis silvae supra vicum Perth, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 271. Ad Sinum Regis Georgii: Hügel!

„Frutex 8-16-pedalis“, ramis gracilibus patentibus. *Folia* 2-6 lineas longa, angusta, firma, demum glabrata nitida. *Capitula* cerasi minoris mole, 12-20-flora; axis dense villosus. *Bracteolae* concavae, subcarinatae, obtuse acuminatae, sessiles, flavae; bractea bracteolis paullulo major et firmior, ciliolata. *Hypanthium* cum calyce 2 lin. longum, villo raro caduco adpersum; hujus phylla triangularia, sinus acutanguli. *Petala* orbicularia, erecta, cum staminibus sesquilinearibus flava.

7. **Kunzea vestita** Schauer. lanuginoso-villosa; foliis confertissimis, patentibus, lineari-subulatis subtrigonisve, basi attenuata sessilibus, acutiusculis, muticis, denique glabrescentibus; capitulis apicalibus, globosis, multiflo-ris; bractea obovata, acuminata, concava, bracteolisque cuneatis angustissimis scariosis, sericeo villosis, calycem glabrum subaequantibus; germine 5-loculari.

In turfosis hieme inundatis inter frutices densos prope praedium b. Spencer ad Sinum Regis Georgii, Septembri 1840. Herb. Preiss. No. 272.

Frutex 8-pedalis, ramis laxis dense ramulosis. *Folia* crassiuscula, subtus convexa vel subcarinata, 2 lineas circiter longa, plurifariam patentia, saepe recurva. *Capitula cerasi* magnitudine, rhachi villosa. *Flores* circiter 20, sessiles, bracteis magnis villosis fere obtecti. *Hypanthium* cum calyce 2 lin. longum, glabrum, nitidum, glanduloso-punctatum. *Calycis phylla* latiuscula, triangularia, acuta; sinus obtusanguli. *Petala* orbicularia, erecta, cum sta-minibus iis duplo longioribus pulcherrime flava. — Habitu praecedenti acce-dens, sed facilis distinctu.

SYMPHYOMYRTUS Schauer.

Flores complures hypanthiis totis arcissime conferruminatis in capitulum globosum, pedunculatum coadunati. *Calyx* opercu-lum clausum, corniforme, sub anthesi circumscisse deciduum exhibens. *Corolla* nulla. *Stamina* plurima, margini interiori

hypanthii truncati inserta; filamenta filiformia, elongata; anthera infra medium dorsi inserta, incumbens, linearis, bilocularis, loculis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* inferne hypanthio adnatum, vertice subpyramidali angulato in stylum abeunte terminatum triloculare; *gemmulae* plurimae, spermophoro bicostato angulo centrali affixo insertae. *Stylus* angulatus, rectus, stamina subaequans, deciduus; stigma obtusum. *Fructus* syncarpium lignosum, globosum, apicibus capsularum conicis exsertis quasi armatum, struantes. *Capsula* semisupera, apice libero loculicide-trivalvi; valvae lignescences conniventes vel apice cohaerentes, rimis interjectis hiantibus; locula arcta polysperma; semina ~~cuneata~~.

Planta habitu et ipso flore *Eucalypto* simillima, sed propter inflorescentiam sui generis. Ad *Eucalyptum* eodem, quo *Syncarpia* ad *Metrosiderum*, modo se habet.

1. ***Symphomyrtus Lehmanni*** Schauer. *Eucalyptus* Lehmanni L. Preiss. in Sched. Herb.

In glareosis sterilibus collium Konkoberup promontorii Cape Riche. Novembri a. 1840. cum floribus et fructibus maturis lecta. Herb. Preiss. No. 227.

„Frutex 6-8-pedalis“, ramulis teretibus, ex omni parte laevis. *Folia* alterna, elliptica vel oblonga, subinaequilatera, in petiolum contracta, obtusissima, brevissimeque apiculata, pallide viridia; nitida; firma, rigida, imperforata, 2-2½ poll. longa, unum poll. circiter lata. *Pedunculi* ad basin ramulorum annotinorum laterales, sesqui-bipollicares, validi, saepe incrassati, compressi, deflexi, continue in capitulum abeuntes. *Capitulum* globosum, nucis *Juglandis* majoris mole, e floribus 12-14 usque ad limbum hypanthiorum connatis constitutum, prae anthesi operculis coriaceis subuliformibus bipollicaribus porrectis horridum. *Stamina* numerosa, sesquipollicem et quod excedit longa; filamenta quadrangulati-filiformia, sordide alba. *Germen* vertice subpyramidali angulato in stylum tetragonum stamina subaequantem abeunti emersum, triloculare. *Capsulae* valvae lignosae, triangulares, acuminatae, pluricostatae, nitidae, in conum conniventes vel apice cohaerentes.

EUCALYPTUS Herit. Endl. gen. n. 6300.

* Alternifoliae.

1. ***Eucalyptus cornuta*** Labill. fruticosa; laevis; foliis firmis, alternis, lanceolatis, petiolatis, utrinque acuminatis, nitidis; pedunculis axillaribus lateralibusque, petiolum subaequantibus, teretiusculis compressisve; capitulis 8-12-floris; hypanthio sessili, cylindrico-cyathiformi; operculo e basi ampliata subuliformi, tereti hypanthio quadruplo-quin-duplo longiori. Labill. Voyage I. pag. 403. tab. 20!

In glareosis sterilibus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840, florens. Herb. Preiss. No. 238. (v. sp. Billard. in Herb. Willd. n. 9594!)

2. ***Eucalyptus redunca*** Schauer. fruticosa; foliis rigidulis, alternis, lanceolatis, inaequilateris, in petiolum atte-

nuatis, acuminatis, utrinque glaucis (costa margineque disco-
loribus); umbellis lateralibus axillaribusve, 6-12-floris; pe-
dunculo complanato-ancipiti, semipollicari; hypanthio cy-
lindrico; operculo subuliformi-conico, coriaceo, nitido, hy-
panthio duplo et quod excedit longiori, acumine (saltem in
alabastro subadulto) redunco vel cincinato.

In regionibus interioribus inter Sinum Regis Georgii et coloniam York interia-
centibus, Octobri M. cum alabastris subadultis Herb. Preiss. No. 234. Februar.
et Martio cum alabastris juvenilibus No. 245 et 247; in glareosis sterilibus col-
lium Konkoberup prom. Cape Riche, Novembri fructifera No. 232.

„Frutex orgyalis“, ramulis angulatis cum petiolo margineque costaque
foliorum vitellinis. *Foliorum* lamina 3-4 poll. longa, 6-12 lineas lata. *Hyp-
anthium* (alabastrum cum pedicello ei continuo et aequilongo unciam longi)
3 lin. circiter altitudine metiens. *Operculum* 6-7 lineas longum. *Germen*
trilobulare. *Fructus* umbellati, oblongo-clavati, cum pedicello 6-7 lineas
longi, superius $2\frac{1}{2}$ lineas crassi, truncati; *capsula* inclusa, valvis erectis os
hypanthii attingentibus. ? *apocidus mactilatis*?

3. **Eucalyptus floribunda** Hügel arbuscula; foliis co-
riaceis, alternis, lanceolatis, inaequilateris, in petiolum acu-
tatis, longe acuminatis, margine cartilagineo revoluta, facie
viridi nitido, dorso glaucescenti v. pallidiori; umbellis axil-
laribus, 5-12-floris; pedunculo ancipiti, petiolo subaequali;
pedicellis angulatis, hypanthio campanulato ore dein dilatato
subduplo longioribus; operculo amplo, subcampanulato-co-
nico, hypanthio triente longiori, coriaceo, ruguloso. Endl.
Enum. plant. Hügel pag. 49. n. 156!

In arenosis silvae ad fl. Swan-River, Junio exeunte a. 1839, florens Herb.
Preiss. No. 251.; in rupestribus subhumidis ad radices montis Baldhead ad Sinum
King George's Sound, Octobri a. 1840 florens et fructifera No. 242, in glareosis
limosis prope montem Wuljenup, distr. Plantagenet, Septembri M. a. 1840 florens
No. 229 et 244. (v. sp. auth. in Herb. Caes. Vindob.)

„Arbor 12-25 pedes alta“, ramulis angulatis gracilibus laxis. *Folia*
3-5 poll. longa. *Operculum* 3 lin. longum, maturum testaceum. „*Flores*
suaveolentes“. *Fructus* nucis moschatae fere mole, subgloboso-oblongus,
truncatus; *capsula* hypanthio incrassato lignoso inclusa, trifariam-loculicida,
valvis limbum hypanthii tangentibus.

4. **Eucalyptus occidentalis** Endl. fruticosa; laevis;
flavo-virens; foliis firmis, alternis, oblongo-lanceolatis lan-
ceolatisve, in petiolum attenuatis, acuminatis, nitidis; um-
bellis axillaribus, 5-8 floris; pedunculo ancipiti, petiolum
aequante vel superante; pedicellis angulatis, hypanthio cam-
panulato late marginato duplo brevioribus; operculo amplo
conico-tereti, medio vix contracto, obtuso, apiculato, coria-
ceo, hypanthio triente longiori. Endl. Enum. pl. Hügel
pag. 49. n. 154!

In glareosis sterilibus collium Wuljenup promontorii Cape Riche, Novembr
a. 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 240; in similibus locis cis fluvium Gordon, distr
Hay, Nov. fructifera No. 228. (v. sp. auth. in Herb. Caes. Vindob.)

Folia 4-6 poll. longa, 6-12 lin. et ultra lata, saepius inaequilatera
Hypanthium $3\frac{1}{2}$ -4 lin. longum, fauce brevissima, margine post anthesi

Filamentum luteo-albida; antherae fuscae.
Hypanthium viridi-luteum. Sili. viridi-glauc.
in luteo.

Eucalyptus haemaphysma Trin.

Hb. St. p. n. & tot. natal.

Eucalyptus intraspata? L. A. Sillardione.

Hypanthium maxima et viridiana. Sili. viridi-glauc.
Hypanthium viridiana. Sili. viridi-glauc.
Hypanthium viridiana. Sili. viridi-glauc.

Eucalyptus erythrostemon Forst. f.

Encounter Bay! 1847. Hb. 142.

Eucalyptus

foliis alternis coriaceis inaequaliter
in petiolum acutatis acuminatis
semisimiliter marginatis viridibus
glauces, umbellulis axillaribus
et floribus, pedicellis pedunculatis
que regulatis subangulatis
hypanthio obconico campanulato
siliis basi amplata in cornu
tubuliformi obtinuit, in flutu
fere rugulosa.

E. onodrifolia Candolle.

Hb. St. p. n. & tot. natal. Hb. St. 136!

E. odorata Mehr & Schlechtendal.

*(*E. laurina* Forst. f.) var.

foliis ovata lanceolatis petio
latis creberrime acuminatis
crasso-coriaceis paullo nitu
ribus, puniuntis axillaribus 3-5
floribus brevibus, hypanthio sub
obconico cum operculo hinc
vixi suboviformi.

Tam *E. pilulari* quam *E. obtusi*
foliis affinis, ab omnibus ceteris
foliis brevioribus abhorrans.

Hb. St. 149.

{ *E. odorata* (Sw.) Torr. & Guss., *Daubney* bay
E. *odorata* Behr & Schlechtm. var.

x *E. odorata*! *E. pertusa* Fendner Box tree mountain
fragrantatum, foliis oblique lancea-
tis perforatis minutis ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
quercis axillaribus ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
et ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
hypanthio hemisphaerico ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
depresso obliquo hemisphaerico obtuso
In monte ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
Folia ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
abundant. Arbor alta cortice
coriacea ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}

E. odorata Behr & Schlechtm. var.
Nyctandra x *E. perforata* Fendner

E. perforata Fendner ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
fragrantatum foliis oblique lancea-
tis perforatis minutis ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
axillaribus ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
3-4 floris, hypanthio ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
opaeo hinc breviori obliquo de-
presso ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
et ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
fragrantatum x *E. odorata* Torr.
diversa. In collibus calcariis prope
Malden little Swamp portus Lincol. Feb 5-6

x *E. arbutifolia* Behr & Muell.
fruticosa, foliis alternis
laevibus coriaceis obliquo can-
nulata ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
in apicem protractis, pedunculis
axillaribus & lateralibus ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
duplo brevioribus, nervellis 3-4 ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
lobis 4-7 floris, hypanthio
canynulata operculi semi-
globoso ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus} ^{arabibus}
hemisphaerico ex magnitudine arboris
mediocri. Trami reconditis afro-
rubri In pine-forest & trans
Sells - creek. Jan. 1849
Cy. M. D. Behr.

incrassato cicatrice lata insignito limbato, basin germinis vertice conico laevique exserti cingente. *Fructus* hypanthium mole paullo auctum et mutatum; *capsula* vertice emerso dentibus 4-5 dehiscens. — Sequenti habitu et flore proxima, operculo et deficiente eo germinis vertice exserto ecostato distincta.

5. ***Eucalyptus incrassata* Labill.** fruticosa; laevis; viridis; foliis crassiusculis, rigidis, alternis, oblongo-lanceolatis, in petiolum attenuatis, subacuminatis, incrassato-marginatis, nitidis, subtus pallidioribus; umbellis axillaribus, 5-8-floris; pedunculo ancipiti quam petiolo breviori; pedicellis angulatis, crassis, hypanthio campanulato angulato ore producto dilatatoque late marginato duplo brevioribus; operculo e basi depresso-hemisphaerica in apicem obtusum contracto, crasso, hypanthio subaequilongo. — Labill. Nov. Holl. II. pag. 12. tab. 150!

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 alabastrigera et fructifera. Herb. Preiss. No. 249. (v. sp. orig. in Herb. Willden. No. 9593!)

„Frutex sesquiorgyalis“, ramulis angulatis rigidulis. *Folia* 3 poll. circiter lata, 9-12 lin. lata. *Hypanthium* 3 lin. altum, tubo subangulato vel plurijugato; fauce producta ampliata post operculi lapsum cicatrice fasciari extrorsa marginata verticem germinis argute 4-costatum ambiente. *Fructus* hypanthium paullo mutatum, 6 lin. longum; *capsula* inclusa, quadrivalvis.

6. ***Eucalyptus concolor* Schauer.** arbuscula; laevis; tota pallidissime viridis; foliis rigidulis, alternis, oblongo-lanceolatis, in petiolum contractis, acuminatis, nitidulis; capitulis axillaribus, 5-8 floris; pedunculo teretiusculo vel compresso, petiolo breviori; hypanthio sessili, subcampanulato; inferne angulato, fauce brevi ampliata; operculo e basi breviter conica in acumen cornutum contracto, crassiusculum, hypanthio quadrante longius.

In colle calcareo prope coloniam Freemantle, Decembri M. a. 1838 florens. Herb. Preiss. No. 225; in glareosis porrectis regionum interiorum Australiae meridionali-occidentalis No. 243, sterilis.

„Arbuscula 8-12 pedalis“. *Folia* 4-5 poll. longa, 1-1½ poll. lata, inaequilatera. *Hypanthium* 3 lin., *operculum* 4 lin. longum. *Germen* vertice conico emersum, 4-loculare. — Proxime affinis *E. capitellatae* Sm., quae, habitu quidem valde similis, differt: operculo conico vix constricto, obtuso, hypanthium longitudine vix aequante.

7. ***Eucalyptus decipiens* Endl.** fruticosa; laevis; foliis coriaceis, alternis, subrotundis ellipticis oblongis lanceolatisve, in petiolum attenuatis, breviter acuminatis, pallide virentibus, opacis; capitulis axillaribus, 8-12 floris, confertis; pedunculo subtereti; pedicellis hypanthio continuis subnullis vel brevissimis; hypanthio turbinato, fauce brevi; operculo conico, in apicem subcornutum contracto, nitidulo, hypanthio triente circiter longiori. Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 49. n. 155!

Variat: *α latifolia*. foliis subrotundis ellipticis oblongisve. *E. decipiens* Endl! l. c. (v. in H. C. Vindb.)

angustifolia. foliis lanceolatis. Herb. Preiss. sine No.

In glareosis sterilibus collium Wuljenup promontorii Cape Riche. Novembri a. 1840 florens lecta. Herb. Preiss No. 241.

„Frutex 8-10-pedalis“. *Folia* quoad figuram maximopere variabilia. *Hypanthium* cum pedicello 2-2½ lin. longum, cum operculo fuscum, nitidumque. — Forma latifolia, a nob. L. B. de Hügel lecta, *E. ovatae* Lab. tantopere similis est, ut pro eadem habuerim, nisi operculi forma repugnaret.

8. ***Eucalyptus rudis* Endl.** arborea; foliis coriaceis, alternis, e basi ovata lanceolatis, longe acuminatis, longe petiolatis, utrinque subglaucescentibus, subopacis; umbellis axillaribus, 4-6 floris; pedunculo semipollicari, teretiusculo vel cum pedicellis hypanthio fere duplo longioribus angulato; hypanthio obconico-cupulaeformi; operculo arcato, conico, acutiusculo, hypanthio subaequali v. triente longiori, firmulo, nitido. — Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 49. n. 157!

In arenosis silvae ad fl. Swan-River, Octobri 1839 florens. Herb. Preiss. No. 252 (v. in H. C. Vindb.)

„Arbor circiter 45 pedes alta“, ramulis gracilibus laxis. *Folia* in nostra 3-5½ poll. longa, petiolo 8-12 lin. aequante. *Hypanthium* 2-2½ lin. altum. *Germen* 4-5-floculare. — Flores in planta Preissiana longius pedicellati pauloque majores quam in Hügeliana, quae foliis majoribus, 6-7 pollices longis, gaudet.

9. ***Eucalyptus amygdalina* Lab.** arborea; laevis; foliis firmis, alternis, anguste lanceolatis, in petiolum attenuatis, cuspidato-acuminatis, pallidis, nitidis; areolis retis magnis lanceolatis; umbellis axillaribus, 5-8-floris; pedunculo subancipiti, petiolum aequante; pedicellis brevibus; hypanthio obconico-cyathiformi; operculo subconico-hemisphaerico, obtuso, hypanthio multo breviori. — Lab. Nov. Holl. II. pag. 14. tab. 154?

In solo sublimoso arenoso districti York, Martio M. a. 1840 cum alabastris adultis Herb. Preiss. No. 246, et similibus in locis montis Mathilda distr. York, cum fructibus No. 248. (v. sp. orig. in Herb. Willd. n. 9598!)

„Arbor 45 pedes circiter alta, cortice per strata solubili“ ramulis gracilibus. — Pedicelli in nostra longiores, fructus minores quam in planta Billardierana, quae ceterum omni nota congruere videtur, quantum quidem ex speciminibus satis mancis judicare licet.

10. ***Eucalyptus foecunda* Schauer.** fruticosa; laevis; foliis coriaceis, alternis, anguste lanceolatis, sensim in petiolum attenuatis; in acumen tenue contractis, viridibus, nitidis; umbellis axillaribus terminalibusque, 5-8-floris, subpaniculatis; pedunculo compresso, petiolum subaequante; pedicellis hypanthio continuis et subaequalibus; hypanthio (fructus) turbinato; operculo (fructibus umbellatis 3½ lin. longis truncatis).

In clivulis calcareis haud procul ab colonia Freemantle, Aug. M. 1839 fructifera. Herb. Preiss. No. 231.

„Frutex 5-pedalis“ ramis virgatis. *Folia* cum petiolo 2½ poll. longa, 4-6 lin. lata, sicca tenuiter reticulata, imperforata. *Capsula* 3-rarius 4-lo-

E. odorata Link. & Schlecht.
* (*E. ovata* Labillardiere, hb. St. n. 155.)

Stene cum icone in Don. gener.
agst. of. dubl. pl. concinit,
Com. nasal ignovis. et ejus differ.
etiam resp. parit.

E. cadonata Behr. var.

~~Conversiana Ford Hill~~

capulis angustis lanceolatis ^{acuminatis} basi in vaginam
 latioribus latioribus corollae a
 bris hinc inde nervis
 pedunculatis axillaribus & terminalibus
 paniculatis, capitulis 3-6 per axillas
 cula hinc inde nervis
 pantholothus in hata per axillas
 to brevior, ~~rigidius~~ ~~paniculatis~~
 4-6 nervis, ~~paniculatis~~
 clarneta nix unguem utraque

Cargill for the firm of Jam

color guerdaji ad xxx, rostrum nigr. loboratae pinguet. etiam
 in ramis pinguet. prode. ^{nigrescent.} ramis hornotini rubri
 fructus nigr. et. ^{in 1833}
 dicitur pinguet. nigr. magni pedine acide rectoratus.

Murraya paniculata (Lamour.) Murray & Sargent
Murraya paniculata (Lamour.) Murray & Sargent
 1878. long - cauleolata

[illegible]

cularis, vertice valvis subulatis paulloque ultra marginem hypanthii exsertis dehiscens. — *E. radiatae* Sieb. affinis.

11. **Eucalyptus hypoleuca** Schauer. arborea; glabra; foliis coriaceis, alternis, ovato-oblongis, basi obliqua breviter in petiolum contractis, acuminatis, subtus glaucis, reticulato-venosis; floribus in pedunculo axillari compresso subancipiti subternis, brevissime pedicellatis; hypanthio...; Operculo...; (fructu majusculo subgloboso laevissimo, disco elevato capsulam trilocularem inclusam aequante).

In confragosis silvae prope montem Wuljenup distr. Plantagenet, Octobri fructifera. Herb. Preiss. No. 226. Vidi fragmentum.

„Arbor trigintipedalis“, ramis rigidulis. *Folia* 3-4 poll. longa, 16-20 lineas lata. *Fructus* 9 lin. diametro metiens, subglobosus, vertice depresso, e disco elevato formato ore circulari 4 lin. lato pertuso.

12. **Eucalyptus calophylla** Lindl. arborea; laevis; foliis coriaceis, alternis, ovato-lanceolatis oblongisve, inaequilateris, basi in petiolum contractis, acuminatis, vel obtusis cum acumine imposito, tenuiter penninerviis, subtus glaucis; umbellis axillaribus terminalibusque, sub-5-floris, paniculatis; pedunculo ancipiti pedicellisque angulatis elongatis; hypanthio turbinato-hemisphaerico, fauce amplissima; operculo depresso, planiusculo, orbiculari, breviter umbo-nato, sub anthesi margini hypanthii cardine quasi alligato, reflexo. — Lindl. Bot. Reg. new. Ser. XIV. pl. misc. 157. *E. calophylla* R.Br. Journ. geogr. Soc. Lond. 1830—31, pag. 19? *E. splachnicarpa* Hook. Bot. Mag. t. 4036! (operculi descriptione vitiosa).

In arenosis silvae circa oppidulum Perth et totius coloniae; floret Januario. Herb. Preiss. No. 250.

„Arbor 35-60 pedes alta“, ramificatione patente. *Folia* subundata, margine incrassato revoluta cincta, supra viridia nitida, subtus glauca deinceps pallidiora, penninervia nervis secundariis parallelis valde approximatis in venam submarginalem anastomosantibus, pellucide punctata, 3-5 pollices longa, citra basin sesquipollicem lata. *Flores* magnitudine speciosi; *alabastra* pyriformia; *hypanthium* ultra germen vertice planum 3-4-5-loculare in faucem amplissimam coriaceam semigloboso-cupulaeformem productum; *operculum* subtus resinoso-punctatum, vertici alabastris impositum, diametro 3 lineas metiens; *stamina* numerosissima, 5 lin. longa, alba. *Fructus* magnus (2 poll. longus, 15 lin. diametro latus,) lignosus, oblongo-urceolatus, limbo amplo patellaeformi interne laevissimo, ore valde constricto.

*** Oppositifoliae.

13. **Eucalyptus Preissiana** Schauer. fruticosa; ramulis quadrangularibus, rigidis; foliis firmis, oppositis subalternisve, ellipticis oblongis vel subparabolicis, petiolatis, basi rotundatis, obtusissimis, viridibus nitidis; pedunculo axillari

latissimo, alato-ancipiti, petiolum aequante, trifloro; hypanthio brevissime pedicellato, obconico-cyathiformi (9 lin. alto), fauce amplissima diametro oris longitudinem totius hypanthii aequante; operculo

In lateribus rupestribus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 deflorata. Herb. Preiss. No. 239.

„Frutex 8-pedalis“. *Folia* supra lucida, subtus nitida, in sicco utrinque subflavescenti-viridia, pellucide punctata; lamina $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ poll. lata; petiolus 9 lineas circiter longus, latus, complanatus, tortus. *Hypanthium* magnum, ecostatum, ore extrorsum cicatrice duplici late marginato. „*Stamina* sulphurea“. *Germen* in fundo faucis hypanthii vertice depresso 5-radiato et 5-angulato breviter emersum, 5-loculare. — Species inter omnes tam habitu quam characteribus maxime insignis.

14. **Eucalyptus pleurocarpa** Schauer. fruticosa; undique farinaceo-pulverulenta; ramis alato-tetragonis; foliis firmis, oppositis, petiolatis, obliquis, subrotundis ellipticis ovatisque, basi rotundatis, obtusis retusisve cum acumine brevissimo; petiolo plano, alato-decurrente; floribus ternis in pedunculo axillari semipollicari, cum pedicellis brevissimis alato-ancipiti; hypanthio (fructus) subgloboso, argute 4-costato, capsula paullo longiori; operculo

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 fructifera. Herb. Preiss. No. 253.

„Frutex 15-pedalis“, ramis rigidis. *Folia* 2-4 poll. longa, inferius $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, margine valde incrassato limbata, pulvere deterso punctis crebris perforata. *Fructus* nucis *Avellanae* magnitudine, alis pedicelli in hypanthium excurrentibus costis binis argutis satisque prominentibus nec non binis secundariis prioribus contrariisque minus elevatis quadrijugatis. *Capsula* 4-locularis. *Semina* 2" lg. r. v. m. bialata!

15. **Eucalyptus macrocarpa** Hook. fruticosa; undique farinaceo-pulverulenta; ramis quadrangularibus; foliis rigidis, oppositis, decussatis, cordato-ellipticis, sessilibus, breviter acuminatis; floribus (maximis) axillaribus, singulis, breviter pedunculatis; hypanthio cyathiformi, marginato, cum operculo hemisphaerico-conico acuminato et triente longiori crassissimo. — Hook Icon. plant. tab. 405—407!

In glareosis sterilibus planitie „Quangen“ ab autochthonis dicta, prov. Victoriae. Martio M. 1840, alabastris et fructibus onusta. Herb. Preiss. No. 235.

„Frutex octopedalis“, rigidus. *Folia* 4-5 poll. longa, $3\frac{1}{2}$ poll. lata, cartilagineo-marginata, sub pulvere crebripunctata. *Alabastra* subadulta sesquipollicaria. *Fructus* maximus, lignosus; *hypanthium* hemisphaericum, diametro ultra 2 pollices metiens, margine extrorsum declivi cicatrice duplici, ex area operculi et area staminum repetenda, 4 lin. lata insignito praeditum, superatum disco lignoso, 4 lin. alto, denique juxta valvulas pericarpium disrupto. *Capsula* 4-locularis, accreta, maturitate nihilominus loculicide dehiscens et ab axi centrali conico, spermophora ferente, secedens. *Semina* numerosa, cuneata, angulata.

Subtribus IV. Phalangideae. Folia opposita vel alterna. Stamina indefinita, exserta, in phalanges petalis oppositas coalita. Schauer, Dissert. gratul. pag. 5.

Sect. 1. MELALEUCEAE. Antherae dorso insertae, incumbentes.

GYMNAGATHIS Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 243.

Flores in capitula axillaria, sessilia, axi non amplius inno-vante terminalia, pleiantha, collecti, sessiles, singuli bractea bracteolisque geminis consimilibus stellatis basi involucrati. *Hypanthium* cyathiforme, inferne germini adnatum, superne margine interiori pentagono-toruloso praeditum. *Calycis phylla* hypanthio continua, brevia, marcescentia. *Stamina* plurima, in phalanges 5 coalita, torulo fauciali hypanthii ad angulos inter calycis phylla insertas, pinnatifidas, post anthesin deciduas; anthera dorso inserta, incumbens, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* hypanthio innatum, triloculare; gemmulae in loculo complures, in spermophoro subpeltato, angulo centrali affixo obliquae. *Stylus* filiformis, exsertus; stigma peltato-capitatum. *Hypanthium fructiferum vix incrassatum*, siccum; capsula immersa, vertice loculicide-trivalvis; semina numerosa, cuneata, aptera.

Genus a *Melaleuca* inflorescentiae et hypanthii indole distinctum.

1. *Gymnagathis teretifolia* Schauer. *Melaleuca teretifolia* Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 49. n. 153!

In arenosis silvae prope Woodman's-point, Decembri 1838. Herb. Preiss. No. 268; in paludosis inter frutices vix penetrabiles ad Hester's-point, Maio 1841, fructifera. Herb. Preiss. No. 269. — Hügel!

„*Frutex* 3-9-pedalis, erectus, subfastigiatus“, ramulis elongatis rigidulis teretibus cum reliquis partibus omnibus glaberrimis. *Folia* alterna, patentia, tereti-filiformia, rigida saepe subincurva sessilia, apice acuto rectiusculo breviter mucronata, punctata, in nostris speciminibus $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ pollices longa. *Capitula* densa, 8-12-flora. *Bractea et bracteolae* squamaceae, scariosae, late ovatae, obtusiusculae, concavae, illa hypanthium subaequans, hae breviores. *Hypanthium* cum calycè subherbaceum, viride, punctatum, lineam longum. *Petala* calyce duplo longiora, orbiculata, unguiculata, cum staminibus alba. *Phalanges* 9-andrae, pinnatifidae, unguibus corollam subaequantibus. *Fructus* glomerati, hypanthii tubo angulato, limbo patellari.

MELALEUCA L. Endl. Gen. n. 6298.

I. COSMOSTEMON. Flores in capitula, sub florescentia apicalia, confertissima, saepe composita, collati (minores). Hypanthium totum vel basi saltem lanatum, indumento denso lanato axis magis minusve immersum. Calyx membranaceus, cutaneus, v. subherbaceus, marcescens. Phalanges staminum rectae, 3-11-andrae, palmatifidae. Stylus filiformis, plerumque exsertus; stigma punctiforme. — Folia alterna Fructus laeves, ore edentato.

1. *Calycis phylla membranacea v. cutanea enervia.*

* *Floribus lilacinis.*

- 1 **Melaleuca spathulata** Schauer. ramulis brevibus, rigidulis; foliis alternis, coriaceis, obovato-spathulatis, brevissime acuminatis, obtusis, subinflexis, recurvo-patentibus, adultis glabratibus utrinque asperulis; capitulis sphaericis, parvis conglobatis, hypanthio campanulato, sericeo, basi immerso; calycis phyllis rotundatis, membranaceo-marginatis; phalangibus subtriandris, unguibus corollam aequantibus.

In glareosis sterilibus ad latera collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 301.

„Fruticulus pedalis, squarrosus“ Folia $3\frac{1}{2}$ lin. longa, superius 2 lin. circiter lata, vix conspicue trinervia. Capitula diametro 3 lin. metientia, multiflora. Bractee scariosae. Flores inter affines minimi. Petala calyce ter fere longiora, erecta, oblonga, concava. Stamina 2 lineas longa.

2. **Melaleuca Endlicheriana** Schauer. ramulis strictis, puberulis; foliis confertis, alternis, crassiusculis, cuneatis, apice rotundatis, vix apiculatis, subconcavis; arrectis v. subrecurvo-patulis, adultis glabratibus nitidulis; capitulis sphaericis, conglobatis; hypanthio cyathiformi, basi calyceque villosa; hujus phyllis membranaceis, ovatis obtusis (saepe cohaerentibus); phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus.

Metrosideros sororia Endl. En. pl. Hügel. pag. 49. n. 158!

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 302. Swan-River: Hügel!

Folia 4 lin. circiter longa, citra apicem vix lineam lata, sicca supra uninervia, subtus punctata stomatibusque crebris sub lente speciem asperulam exhibentia; novella lanuginosa. Capitula cerasi magnitudine. Bractee latae, scariosae, obovatae, in disco striatae. Petala cum staminibus 3 lineas longis amoene lilacina; antherae luteae.

E. Labroorum Muhl. var.
E. murrayi Fendl. n. sp.

Specimen fructiferum ab defertis
plenis haud jute determinandum
differt ab *E. ~~peruviana~~ proxima*
foliis fructibusque majoribus
illis - nervis et vasis plus pro-
minutibus porcupis, his pl.
inque lateralibus brevioribus
latis. Folia decidua, rami-
culam quasi relinquant.

Laffy - ranges, Nov. 1848.

Procurrit foliis angustioribus & tra-
ctibus brevibus jute cellatis.

~~Est *E. peruviana*~~ *E. Labroorum* varietas *pedunculata*

E. gracilis Fendl. n. sp. 1848.

arborescens gracilis ramulis re-
tibus apic. angulatis, foliis co-
riaceis creberrime punctatis line-
ari-lanceolatis uninerviatis - acu-
minatis vel apiculatis, umbellis
axillaribus aut lateralibus 3-6 fl.
hypanthio subinato, operculo
depresso hemisphaerico hypan-
thio 3 plo circiter brevioris apic-
ulato mutuo vel ^{ex parte!!}

E. perforata Kuhn hb. 1849 (non Fendl.
n. sp. 1847!) Simina minuta
Partem fructiferam extensorum
magnam nonnulla millearia
& fl. Murray remota in
Siftus Oct. graminum & fructus
suis. - Arborescens vel fru-
tex gracile ^{inj. vel *E. murrayi*} 5-8. florifera
Dec. ex hb. Vindob. Rami rubri
Murrayi prub. - Folia oleo volatili
fragrant.

E. amygdalina proxime cognata
differt foliis haud venosis (et patria)
ab *E. ambigua* apiculato vix apicu-
lato, petalis longioribus, rubeis plerum-
que 5 floris, ab *E. Cneorifolia* ex diagn.

E. peruviana Fendl. n. sp. 1847

E. oleosa (S)
x *E. leptophylla* Gard. Mel. ^{foliis angustis, ovatis, Alabastris fere oblongis}

E. perforata Bchr ex parte
fruticosa, ramis gracilibus, foliis lanceolatis linearibus in acumen tenui curvatum excurrentibus subique pellucide punctatis, umbellis axillaribus 3-7 floris, hypanthio conico-campulato operculo flavescente late conica mutico subulato aequilongo.

E. gracili propequa differt dispositione systematica artificialibus ex operculo constituta ab *E. oleosa* alabastris longioribus ~~et~~ tenuioribus haud ferdide viridibus habitu graciliore etc.

Rami juniores rubelli flaviscentes, huius ultra huminum ~~et~~ altitudinem prope parvo. cymathomorpha. lig. Mart 1849 et J. Bhr. sed locum specialium. Non adnotavit. Alabastra plus minus oblonga.

x *E. oleosa* Gard. Mel.
fruticosa, foliis angustis lanceolatis uncinatis acuminatis parvis oleosis frequenter perforatis, umbellis axillaribus 5-10 floris, hypanthio obconico breviter pedicellato operculo obtusa rugata cono-hemisphaerico aequilongo.

E. perforata Bchr in fruticulis ex parte! "Frutic hominum altus, come laccifine viriditente." ultimas notas minus *E. leptophyllae* attribuire potes. Alabastra ovata *E. odorata* accedit.

Murray frut. Rami frut. Anthr. arbores. ^{var. frutic. maj. & minor.}
Ad ripam altam calvariam fl. Murray in virgaltis ^{pepi. moruete. Arbores. medioris. Arbores. ferdide. & inopius} ^{frutic. purpure ramorum. ferdus. fol. palmate viridia ^{glaucesc.} ~~perforata~~} ^{Thamnia. ~~rebalbida~~}

3. **Melaleuca seriata** Lindl. ramulis brevibus foliisque novellis villosis; foliis confertis, alternis, crassiusculis, lineari-lanceolatis, inferne attenuatis, brevissime acuminatis, arrectis, subrecurvis, subtus biseriatim punctatis, glaucescentibus, adultis glabratis: capitulis globosis; bracteis subherbaceis; hypanthio cyathiformi, basi lanato; calycis phyllis membranaceis, ovatis, obtusis (saepe cohaerentibus): phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus. Lindl. Swan-River, pag. VIII. n. 18!

In arenosis prope vicum Perth, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 299. J. Drummond! (v. s. a. cl. Lindl. comm.)

„Frutex tripedalis“. *Folia* 4 lin. longa, in dorso grossè punctata. *Bracteae* cutaneae, latae, subrotundae, subito in basin angustam contractae, concavae, ciliatae, disco viridulo striato, marginibus tenuibus sphacelatis coloratis. *Flores* in capitulo circiter 15. *Stamina* 3 lin. longa, cum petalis subrotundis erectis amoene rosea. — Sequenti valde propinqua, sed foliis angustioribus longioribus, floribus majoribus roseis, bracteisque subherbaceis distincta.

4. **Melaleuca ornata** Schauer. ramulis brevibus foliisque junioribus pilosis; foliis confertis, alternis, crassiusculis, lineari-oblongis, in petiololum brevissimum attenuatis, obtusis vel brevissime acuminatis, arrectis, recurvo-patulis, subtus biseriatim punctatis, laete viridibus, adultis demum glabratis; capitulis globosis; bracteis scariosis; hypanthio cyathiformi, basi lanato; calycis phyllis membranaceis, ovatis, obtusis (saepe cohaerentibus); phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus.

In arenosis inter frutices silvae ad fl. Canning, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 298.

„Frutex bipedalis“, densirameus, floridus. *Folia* subopaca, 3 lineas circ. longa, laevia, sicca uninervia. *Bracteae* obovatae, latae, fuscae, striatae, cito deciduae. *Capitula* subvigintiflora, simplicia. *Petala* oblonga, erecta, cum staminibus $2\frac{1}{2}$ lin. longis vivide lilacina; antherae, ut in reliquis, luteae. *Fructus* solitarii vel pauci arcte conglomerati, pisi minoris mole, hypanthio laevi e basi adnata conico-attenuato orificio dentibus obsoletis repando, capsula profunde immersa. — *M. Endlicherianae* valde similis, sed foliis angustioribus pilis subpersistentibus conspersis statim recognoscenda.

5. **Melaleuca Manglesii** Schauer. ramulis subvirgatis foliisque novellis glabriusculis; foliis confertis, alternis, patulis subimbricatisve, clavato-linearibus, basi attenuata sessilibus, breviter acuminatis; muticis, dorso subconvexis, subrecurvis, glaucescentibus, subtus subbiseriatim-punctatis; capitulis globosis; hypanthio cyathiformi calyceque pubescentibus; hujus phyllis membranaceis rotundatis; phalangibus

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri 1840. deflorata. Herb. Preiss. No. 320.

Habitu *M. seriatae* similis, sed magis virgata et hypanthio pubescenti diversa. *Folia* $1\frac{1}{2}$ -5 lin. longa, sicca uninervia. *Fructus* helvoli, sesquilineam lati, globosi, basi mutua pressione angulati, ore amplo aequali.

6. **Melaleuca parviceps** Lindl. ramulis virgatis foliisque novellis piloso-hirsutis, foliis acerosis confertis, alternis, teretibus compressisve, sessilibus, acutis, arrectis, subrecurvis, adultis nitidis scabriusculis; capitulis sphaericis conglobatis; hypanthio ovato, sericeo; calycis phyllis membranaceis, subrotundato-ovatis, obtusis (saepe cohaerentibus), glabris; (petalis hyalinis caducis;) phalangibus 5-7-andris, unguibus corollam subaequantibus. — Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 19!

In arenosis et limoso-arenosis haud longe a praedio rustico Maddington ad fl. Canning, nec non supra vicum Guildford, Octobri et Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 297. — J. Drummond! (v. s. a cl. Lindl. comm.)

„Frutex tripedalis“, ramis fusco-cinereis ramulisque laete fuscis gracilibus patulis. *Folia* saepe magis minusve compressa, subangulata, apice cartilagineo munita, laete viridia, sub lente in angulis scabriuscula, 6-9 lin. longa. *Capitula* apicalia, Ceraso saepe majora, e capitulis compluribus axillaribus paucifloris, non raro folio subtensis, composita, *Hypanthium* sesquilineam longum, dense sericeum. *Petala* tenuissime membranacea, pellucida, concava, incipiente anthesi decidua. *Stamina* 3½ lin. longa, viride lilacina. *Stylus* longe exsertus. *Hypanthium* fructus subconicum truncatum.

Proxima *M. scabrae* R.Br., quae vero differt: innovationibus glabris, foliis undique asperis, hypanthio subconico basi acuto glabriusculo, petalis mollibus per anthesin persistentibus, stylo stamina aequante.*)

7. **Melaleuca pentagona** Labill. innovationibus pubescentibus; foliis confertis, patulis, alternis, aut subteretibus subulatis subtus ulnisulcis vel carnosulis linearibus, aut planis lanceolatis, basi attenuata sessilibus, pungentibus adultis glaberrimis nitidulis; capitulis globosis; hypanthio cyathiformi glabro; calycis phyllis brevissimis, membranaceis, truncatis; phalangibus 3-5-andris, unguibus corollam subaequantibus. — Labill. Nov. Holl. II. pag. 27. tab. 166!

α planifolia: foliis lanceolatis, in basin angustatis, crassiusculis, planis, enervibus. *M. pentagona* Lab. tab. 166! — Ferd. Bauer!

β subulifolia. foliis subtereti-subulatis dorso sulco exaratis.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 325; in calcareis inter frutices in monte Baldhead ad Sinum Regis Georgii. Octobri 1840. No. 309. — Ad Sinum Regis Georgii a. 1818: A. Cunningham!

Frutex jam demissior, rigidior, foliis carnosis subulatis 3-6 lineas longis, jam laetius vigens, ramulis vimineis, foliis mirabiliter ludens. Haec enim in uno eodemque ramulo, a b. *Ferd. Bauer* olim lecto, observare licuit in-

*) *M. trichophylla* Lindl. ramulis tomentosis foliisque junioribus pilosis, adultis glabratibus; foliis confertis, alternis, filiformi-acicularibus, arcuatis acuminatis, inermibus; capitulis globosis; hypanthio subcylindrico, lanato; calycis phyllis membranaceis, oblongis (saepe cohaerentibus), pubescentibus; phalangibus 3-9-andris, unguibus corolla plus quam duplo longioribus. — Lindl. Swan River Bot. pag. VIII. n. 20! In Australia occidentali: J. Drummond! *Folia* teretia vel subcompressa, 8-14 lin. longa. *Bractaeae* lineares, fugaces. *Capitula* multiflora, Cerasi majoris mole, pulcherrime roseo-lilacina, antheris flavis ornata. *Hypanthium* calycem aequante lineam longum. *Petala* praecta, oblouga. *Stamina* 4 lin. longa.

MacKay's tree E. longirostris f. from
in abundance in the mountains
of the Caucasus.

E. Leucorhylon ferd. mill

Tanunda. Truncus albus sab-
lucis passim striis li cortices
liberis siccis. White gum
abundant. "Behr. hb. J. n.
Tan - Hae hand effine videtur
a E. kristi Behr puma mem-
rata nro floribus ^{etiam} ~~jam~~ ^{auti}
multis majoribus ^{ex longioribus} ~~minutis~~ pra-

β rostellata ferd. mill ^{inap's}
^{parum}
gerculum in rostellata breve
protractum. E. rostellata
Tanunda. Arbor mediocris, cortex
pallida laevi, rami junioris
rubri Clar-village,

γ cariflora ferd. mill

~~umbellis plerumque 5-7-
pedicellis abbreviatis.~~

~~E. virgata? Behr. hb. Nov.~~

~~Arbor 30-40' Gauley town.~~

δ pruinosa, alab. apris ^{inap's}

E. regelosa ferd. mill

E. Leucorhylon f. E. regelosa ^{8m. hb.}
^{cliff.} ab antecedente floribus

^{var. 2} ~~majoribus~~ ^{ex} ~~hypnathia~~

Gamblyanple - abscissa, foliis

bay, longioribus. Nov. 1849.

Diads country ^{Sturt river}, Arbor elata

- In planitie prope

Adelaide, Austr. Dec. 47.

Eucalyptus firma ferd. miller.

In collibus calcariis prope

Guelph bay.

Arbor 20'. Species propter fructus

majorculas haud multo illis E. co-

smophyllae minoribus notabilis,

et his E. odoratae.

Siliculae nris exploratae

E. saccharifera *fructu* *Müller*
 (x) *E. crucivalvis* (*gerd Müller*.)
 excreta, foliis alternis char-
 actero-*coriariis* & *capitula-*
mentis *longis* *angustatis* *plan-*
gatis *lanceolatis* *angustis*
loribus *axillaribus* *lateralibus*
longis *terminalibus*, *primis* *longioribus*
secundis *brevis* *pedicellis*
longioribus, *hypanthia* *coriis*
campanulata *longis* *angustis*
perianthiis *muticis*
apice *concoloribus* *affluens* *max-*
agante *monstruosis*.

Strobili *gigantes* *portis* *gigantes*
longis *angustis* *plan-*
gatis *lanceolatis* *angustis*
loribus *axillaribus* *lateralibus*
longis *terminalibus*, *primis* *longioribus*
secundis *brevis* *pedicellis*
longioribus, *hypanthia* *coriis*
campanulata *longis* *angustis*
perianthiis *muticis*
apice *concoloribus* *affluens* *max-*
agante *monstruosis*.

Strobili *gigantes* *portis* *gigantes*
longis *angustis* *plan-*
gatis *lanceolatis* *angustis*
loribus *axillaribus* *lateralibus*
longis *terminalibus*, *primis* *longioribus*
secundis *brevis* *pedicellis*
longioribus, *hypanthia* *coriis*
campanulata *longis* *angustis*
perianthiis *muticis*
apice *concoloribus* *affluens* *max-*
agante *monstruosis*.

x Eucalyptus ant. alifolia Sm.

E. melliodora Sm. propinqua
arbutifolia, foliis altissimis
coriaceis glauco vix unopis
angustis laeviculis curv
in arum recurvatum excurvatis
juvenculis axillariis 3-5 floris
myanther brevis pedicellatis
radice ramis opercula bre-
vis ima depresso ramis laevis
apiculato

Cortex ramarum juniorum viridis
h. 18 h. 18 trans radic in h. 18
E. affiliflora h. 18 id plum brevis
pericellatis. Jan 1849.

Eucalyptus cosmophylla vid. aut.
Fructus hemisphaerici 6-8 longi
porid pori rugulosi plurimique 5 floris
varius 4 loci, valde deltoides ar ar ar
parum emarginatus. ramis furcata.

- x ell. squarrosa ! Sm. T. D. L. !
George town ell. angustifolia Thunb. h. 18 St. 24
h. 18 St. 24 sub pluvium Musey, T. D. L. Jan. 1849
8-10' h. 18 St. 24 h. 18 St. 24 8-10'
macul. gambier B. glabrata Forst. Mel.

ramulis glabris rigidis
haud prores puccinarius sed patet
glabrata. Fructus 5-6' densus
fructus patet extrinsecus cum
Leptoporus microcarpo amphibius
et rudicula vix penetranda si-
visus. In interioribus versus
in mare Keoli Bay Oct 48.
! Anth. Nov. - Jan.

Eucalyptus cladocalyx conf. p. 140.

Eucalyptus variosa, Forst. Mel.

From Dorsey Bay (Wilhelm) in are Offi
ab am id. h. 18 in colonia indigenis minus pro-
de equat ip in minoribus pro indigenis minus pro-
Fructus 5-8' densus glaucescens. h. 18 St. 24 h. 18 St. 24

feriora complanata lanceolata enervia, superiora ramulorumque minus vegetorum sensim crassiora, linearia, denique teretia. *Folia* omnia undique stomatiis creberrimis, sub lente micantibus, conspersa, atroviridia. *Capitula* parva, densissima, multiflora. *Bractee* flores aequantes, scariosae, fuscae, fugaces. *Flores* exigui, lilacini. *Petala* fugacia. *Stamina* $2\frac{1}{2}$ lin. longa. *Fructus* in globulum ramulo quasi perfilatum arcte connati, angulati, vertice emerso ore orbiculari subrependo perforato.

8. **Melaleuca Waeberi** *Rchb. Herb.* ramulis virgatis foliisque novellis sericeis, adultis glabratiss; foliis approximatis, coriaceis, alternis, patulis, lanceolatis, sessilibus, utrinque acutis, mucronatis, planis, nitidulis; capitulis subglobosis; hypanthio hemisphaerico, brevi, glabro; calycis phyllis brevissimis, membranaceis, truncatis rotundatisve; phalangibus 3-5-andris, unguibus brevissimis. Schauer in O. et D. Allg. Gartztg. III. pag. 167.

Ad hanc pertinere videtur specimen fructiferum *Herb. Preiss.* No. 317: in glaucosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840 lectum. (v. v. c.)

Specimen nostrum, e „frutice pedali squarroso“ decerptum, a cultis recedit ramificatione hac ipsa squarrosa brevi, foliisque crassioribus rigidioribus arcuato-ascendentibus. — *M. pentagona planifolia*, cui proxima, *M. Waeberi* differt: foliis basi minus attenuatis, unguibus phalangum brevissimis, saepius vix distinctis, fructibus minoribus, conglomeratis quidem, sed non concretis et vix angulatis, hypanthio truncato.*)

** *Floribus flavis.*

9. **Melaleuca acerosa** *Schauer.* foliis confertis, alternis, linearibus subteretibusve, brevipetiolatis, pungentibus, glabris, nitidis; capitulis paucifloris; hypanthio obconico, pubescente; calycis phyllis membranaceis, truncatis, ciliolatis, corolla quadruplo brevioribus; phalangibus oligandris, unguibus longioribus.

In clivulis arenosis l. calcareis ad oras maris pr. Freemantle, Junio 1839. *Herb. Preiss.* No. 263. — J. Drummond!

„Frutex 2-4-pedalis, erectus“, inferne simplex, superne ramosus, ramis erectis, ramulis foliisque novellis pilosis. *Folia* crassiuscula, acerosa, subtus biseriatim punctata, subrecurva, 4-6 lin. longa, semilineam lata, laete viridia. *Flores* parvi, flavi. *Fructus* pisiformes, 3-6 coacervati, fusco-cinerei, laeves, hypanthio ad orificium subcontracto.**)

*) *M. striata* Labill. ramulis brevibus foliisque novellis sericeis, adultis glabratiss; foliis approximatis, alternis, patentibus reflexisve rigidulis, lineari-subulatis, basi subattenuata sessilibus, verticalibus, acutis, pungentibus (siccis nervoso-striatis); capitulis oblongis densissimis; hypanthio hemisphaerico brevi, indumento axis omnino immerso calyceque brevissimo cutaneo lanatis; phalangibus 9-11-andris, unguibus corolla plus duplo longioribus. — Labill. N. Holl. II. pag. 26. tab. 165! *M. Fraseri* Hook. Bot. Mag. 3210! *M. hispida* et *M. ulicina* Hort. Hab. in Terra Van Leuwin: Labill! (v. sp. orig. in *Herb. Willd.* n. 14361! et v. c.)

**) *M. nodosa* Sm. Act. Soc. Linn. III. pag. 276. n. 6! innovationibus sericeis; foliis approximatis, alternis, linearibus, utrinque attenuatis, sessilibus, pungenti-mucro

10. **Melaleuca pungens** Schauer. ramulis subvirgatis, novellis puberulis; foliis approximatis, alternis, patulis, rigidis, tereti-acicularibus, subincurvis, sessilibus, acumina-
tis, pungenti-mucronatis, asperulis, subopacis; capitulis ovalibus densissimis; hypanthio cyathiformi, basi lanato; calycis phyllis membranaceis, brevibus, latis, rotundatis; phalangibus heptandris, unguibus corolla brevioribus.

In solo glareoso sterili inter frutices haud longe a monte Barrow (Plantagenet), Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 316.

„Frutex tripetalis“. *Folia* 8-14 lin. longa, sub lente undique scabritie subtilissima obducta, saepius compressa. *Hypanthium* fere omnino inter lanam axis absconditum, lineam fere altum, praeter basin glabrum. *Stamina* 2 lin. longa. — Huic *M. tenuifolia* DC. (Prodr. III. pag. 213. n. 15.) propinqua videtur. *)

11. **Melaleuca uncinata** R.Br. innovationibus sericeis; ramulis virgatis; foliis alternis, erectis, filiformibus, teretibus subangulatisve, sessilibus, mucrone tenui uncinato terminatis, adultis laevibus nitidis; capitulis ovalibus compactis; hypanthio cyathiformi, brevi, lanato; calycis phyllis brevibus, rotundatis, sphacelatis; phalangibus subpentandris, unguibus corollam excedentibus. — R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 414. n. 14!

In solo limoso planitie silvae ad fl. Vasse-River, Decembri 1839: Herb. Preiss. No. 270; in glareosis illustribus silvae inter praedia rustica cll. Barker et Lennardt, Aprili 1840 fructif. No. 278. — In Nova-Hollandia interiori ad fl. Lachlan a. 1817: A. Cgh.!

Frutex 6-7-pedalis. *Folia* 1-2 pollices et quod excedit longa, undique punctata. *Filamenta* cum antheris flava.

natis, planis uninerviis, rigidis, adultis glaberrimis nitidis punctatis; capitulis densissimis, conglobatis; hypanthio cyathiformi, sericeo; calycis phyllis membranaceis, truncatis rotundatisve; phalangibus subpentandris, unguibus corollam subaequantibus. Hab. in Nova-Hollandia orientali: Sieber pl. N. H. exs. n. 316! Ferd. Bauer! Hügel! (v. v. c.) *M. juniperina* Rehb. innovationibus hirsutis; foliis approximatis, alternis, tereti-acicularibus, brevi-petiolatis, acuminatis, pungenti-mucronatis, dorso sulcatis, tuberculato-punctatis, adultis laevibus opacis; capitulis globosis, conglobatis; hypanthio cyathiformi, lanato; calycis phyllis membranaceis, brevissimis, truncato-subrotundis; phalangibus pentandris, unguibus, corollam subaequantibus. — Reichenb. hort. bot. II. pag. 5. lab. 112! *M. juniperoides* DC. Prodr. III. pag. 213. n. 20. *Metrosideros juniperoides* Rehb. in Sieb. pl. N. H. exs. n. 317! Hab. in Nova-Hollandia orientali: Sieber! Hügel!

*) *M. Drummondii*. Schauer. ramulis tenuibus foliisque novellis sericeo-puberulis; foliis approximatis, alternis, patulis, rigidis, e tereti compressis, sessilibus, mucrone recurvo terminatis, adultis glabratissimis laevibus opacis utrinque punctis crebris seriatis exsculptis; capitulis ovalibus compactis; hypanthio cyathiformi, brevi, lanato; calycis phyllis subobsoletis truncatis; phalangibus pentandris, unguibus corolla duplo brevioribus. Hab. in Nova-Hollandia austro-occidentali: J. Drummond! Ramuli cinerei, punctati. *Folia* 8-12 lin. longa. *Hypanthium* cum calyce semilinea paullo altius, calyce valde brevissimo glabro. *Petala* hypanthio longitudine aequalia, erecta, oblonga, concava, cum staminibus linea vix majoribus flava. *Antherae* caesiae.

x Eucalyptus dealbata Willd. (Cunn.)
 Trunk free of lichen & moss. Sp. 1849. (Cunn.)
 Thicket in M. Remarkable & affinis.
 Tree 50-60' tall, bark grey, smooth.
 Leaves 5-6' long, 1-2' wide, serrated, glaucous.

Eucalyptus citrifolia, for M.C.
 Apud apudum Park, Tarnanville Greg.
 Tree 30-40' tall, bark grey, smooth.
 Leaves 5-6' long, 1-2' wide, serrated, glaucous.
 Flowers white, in clusters.

Eucalyptus uncinata, R. Br.
 In forest, near the river.
 Tree 30-40' tall, bark grey, smooth.
 Leaves 5-6' long, 1-2' wide, serrated, glaucous.

11. Eucalyptus holiba, or lacum Victoriae
 In forest, near the river.
 Tree 30-40' tall, bark grey, smooth.
 Leaves 5-6' long, 1-2' wide, serrated, glaucous.
 Flowers white, in clusters.

Eucalyptus pauciflora for M.C.
 In forest, near the river.
 Tree 30-40' tall, bark grey, smooth.
 Leaves 5-6' long, 1-2' wide, serrated, glaucous.
 Flowers white, in clusters.

Eucalyptus longirostris, for M.C.
 In forest, near the river.
 Tree 30-40' tall, bark grey, smooth.
 Leaves 5-6' long, 1-2' wide, serrated, glaucous.
 Flowers white, in clusters.

*** *Species incompletae.*

12. **Melaleuca leptospermoides** Schauer. squarrosa; ramulis foliisque novellis lanuginosis; foliis sparsis, laxe subimbricatis, coriaceis, ellipticis oblongisve, in petiolum brevissimum contractis, acutiusculis, muticis, concaviusculis, subtrinervibus, subtus punctatis, adultis glabris glaucescentibus; capitulis paucifloris; axi lanato; hypanthio subcylindrico adnato, inferne villosa; calycis phyllis membranaceis, rotundatis; phalangibus (brevibus) subdecandris, unguibus corolla brevioribus.

In planitie arenosa Quangen (pr. Victoria), Martio 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 312.

„Fratex pedalis“. *Folia* $2\frac{1}{2}$ lin. circiter longa. *Capitula* 3-6 flora, *Hypanthium* sesquilineam altum. *Phalanges* petalis paullo longiores, (cum petalis lilacinae?). *Fructus* subconicus, truncatus, laevis.

13. **Melaleuca tuberculata** Schauer. glabra; glauca; foliis alternis, approximatis, subimbricatis patulisve, brevibus, clavatis, supra planis, subtus convexis, in petiolum brevissimum attenuatis, breviter acuminatis, tuberculato-punctatis; capitulis plurifloris confertis; axi hypanthiisque subturbinate adnatis, villosulis; calycis phyllis membranaceis subrotundis; phalangibus

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis, in itinere a Sinu Regis Georgii ad oppidulum York, Februario 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 261 ex parte.

Ramuli breves, tenues. *Folia* carnosa, facie plana laevi, dorso convexo punctis prominentibus consito, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa. *Flores* lilacini?

14. **Melaleuca subtrigona** Schauer. ramulis tenuibus confertis foliisque juvenilibus facie subhirsutis; foliis alternis, laxe imbricatis, brevibus, clavatis, plano-convexis subtrigonisve, brevissime petiolatis, obtusis, elevato-punctatis, denique glabratis; capitulis paucifloris confertis; axi lanato; hypanthio cyathiformi, adnato, glabriusculo; calycis phyllis membranaceis, rotundatis; phalangibus

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis, in itinere a Sinu Regis Georgii ad oppidulum York, Febr. 1840, deflor. fructif. Herb. Preiss. No. 261 ex parte.

Fruticulus videtur exiguus, densus. *Folia* sesquilinearia, viridia, opaca, sub lente stomatiis undique conspersa, dorso punctis exstantibus instructa. *Fructus* conferti, glabri, helvoli. *Bracteae* membranaceae, pellucidae, disco striatae, fugaces. — *Flores* lilacini?

15. **Melaleuca holosericea** Schauer. villosa-tomentosa; foliis alternis, confertis, patulis, semiteretibus, acutis, muticis, punctatis; capitulis paucifloris, confertis; axi hypanthioque adnato subcylindrico villosa; calycis phyllis membranaceis, rotundatis; phalangibus 8-10-andris. (?)

In planitie arenosa Quangen (Prov. Victoriae). Martio 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 315.

„*Frutex bipedalis*“, ramis tenuibus strictis, indumento molli incano insignis. *Folia* e basi arcuata erecta, 5 lin. circiter longa, facie planiuscula.

2. *Calycis phylla cutanea, cum petalis nervoso-striata.*

16. **Melaleuca spinosa** Lindl. ramulis rigidis spinescentibus folisque junioribus lanuginosis; foliis alternis, patentibus, coriaceis, ovalibus, brevipetiolatis, acutis, trinerviis, adultioribus glabratissimis nitidis; capitulis oblongis, conglobatis; hypanthio brevi villosissimo; calycis phyllis ovatis acutis petalisque subrotundis erectis disco trinerviis; phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus. — Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 23!

In arenosis colliculosis silvae ad fl. Canning, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 282. J. Drummond!

„*Frutex 4-pedalis*“, gracilis, patenti-ramosus. *Folia* atroviridia. *Flores* parvi, pulchre flavi. *Petala* membranacea, subrotunda, concava, lata, contigua. *Stamina* 2 lin. longa. — Habitu *Acacias* quasdam aemulatur.

17. **Melaleuca thymoides** Lab. ramulis spinescentibus folisque junioribus lanuginosis; foliis alternis, patentibus, coriaceis, lanceolatis oblongisve, brevipetiolatis, trinerviis, adultis glabratissimis nitidis; capitulis oblongis; hypanthio brevi, tomentoso; phyllis calycis ovatis subrotundisve petalisque subrotundis erectis disco trinerviis; phalangibus 7-9 andris, unguibus corollam subaequantibus. — Labill. N. Holl. II. pag. 27. tab. 167!

In glareosis sterilibus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840: Herb. Preiss. No. 280; in clivulo arenoso ad portum Princess-Royal-Harbour prope Albany (Plantagenet), Septembri 1840: Herb. Preiss. No. 281; in arenosis prope Point-possession ad Sinum Regis Georgii, Octobri 1840: No. 283. — Ad S. R. Georgii: A. Cunningh. In Terra Van Leuwin: Lab.

„*Frutex 5-pedalis*“, gracilis, ramulosus, florum conformatione praecedenti proxime accedens, sed foliorum minorum figura facilis distinctu. *Folia* laete viridia, 3-4 lin. longa. *Flores* cum staminibus sulfureis (siccando saepius atrovirescentibus) $2\frac{1}{2}$ lineas longi. *Stylus* filiformis, exsertus; stigma obtusum, nec ampliatum concavum, quale describit cl. *Billardierus* l. c.

3. *Calycis phylla herbacea subulata.*

18. **Melaleuca aspalathoides** Schauer. ramulis folisque tomento sericeo candicantibus; foliis confertissimis, sparsis, subtereti-acicularibus, muticis, saepe curvatis, tuberculato-punctatis; capitulis paucifloris; hypanthio cylindrico, lanato; calycis phyllis herbaceis, subulatis, pubescentibus; phalangibus 7-9 andris, unguibus calycem aequantibus.

In glareosis inter frutices provinciae York, Aprili 1840, desolata. Herb. Preiss. No. 2426; in planitie arenosa Quangen pr. Victoriae: No. 2425.

„*Frutex bipedalis*“, rigidus. *Folia* in ramulis brevibus fere fasciculata, 6-9 lineas longa, angusta, subcompressa, tomento denso candido micanti

x *M. paludosa*! R. Br

Folia juniora ciliolata dyctis
reticulis, subtriangularibus demum
laevia. Rachis & calyces adpressi
passim glabris. Foliorum nervi
laterales cum venis folium
in foliis exsertatis prominent.
In ripam fissuris ad rivulum Tanunda-
 Creek, capsula 3 & 4 loculata. Prim. fructum.
Apr. 1848. — Floreva Nov. 1847 ad l. Tanu-
dag ab. H. n. 447. Et ab antiquis ad
riparum populeam utitur. — In ripas
aquarum stuentium Hb. H. n. 69. —
Chapmanica Hb. H. — et ad l. Tanunda
Nov. 1849. Proxima a Calafingera
Frutex erectiusculus robustus
caepe ad 10', truncus viridis
1/2' diametro, cortice nigrescente
rimoso. In rivulos montium
costis rari.

Intra populi. rivi Tanundae.
Frutex ad 20' e basi in ramos plures
validos fruticiformes (ad juniperum
crassos) divisus. Cortex antiquus rari-
poridique nigrescit rugosus et trans-
versim rimosus.

appresso vel subvillosa induta, denique magis minusve calvescentia. *Hypanthium* cum calyce fere 2 lin. longum; hujus dentes valde acuminati. *Stamina* 4 lin. longa, lilacina.

II. CAJUPUTI. Flores (variae magnitudinis) in spicas axi jam sub anthesi innovante comosas, densas, laxas, immo interruptas collecti. *Hypanthium* axi adnatum v. sessile, continue in calycem abiens. Calycis dentes herbacei v. cutanei. Phalanges staminum rectae, 3-polyandreae, palmatifidae v. pinnatifidae. Stylus filiformis; stigma punctiforme v. subcapitatum. Folia alterna, verticillata, opposita. Fructus dentibus calycis induratis, saepe auctis, coronati vel obsoletis ore inaequales.

19. **Melaleuca lateritia** Otto. tota glaberrima: foliis confertis, alternis, patulis, lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, subpetiolatis, acutiusculis, muticis; spicis lateralibus cylindricis, multifloris, laxis; hypanthio adnato; calycis phyllis subrotundis; phalangibus 7-11 andris, unguibus brevissimis. — Otto et Dietr. Allg. Gartztg. II. p. 257!

M. callistemonæa Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 21!

In sublimosis depressis umbrosis hieme inundatis silvae prope oppidum Perth. Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 354. — J. Drummond! (v. v. c.)

Frutex tripedalis, ramis virgatis. Folia 5-7 lineas longa, dimidiam lineam lata, laete viridia, opaca. Rhachis spicae nonnunquam villosula, plerumque tamen glabra. Petala orbiculata, concava, limbo calycis duplo longiora. Stamina distincte fasciculata, sed fere usque ad basin libera, 8 lineas longa, scarlatina.

20. **Melaleuca brachyphylla** Schauer. glabra; laete virens; ramulis tenuibus pendulis; foliis confertissimis, sparsis, patulis, subclavato-teretiusculis semiteretibusve, brevibus, recurvis, in petiolum attenuatis, obtusissimis, enerviis, impunctatis; spicis subapicalibus, ovalibus oblongisve, densis, hypanthio adnato; calycis phyllis rotundatis; phalangibus 5-9-andris, palmatifidis, unguibus corollam aequantibus v. nonnihil excedentibus. Schauer in O. et D. Allg. Gartenztg. III. (1835) pag. 162.

M. tenuissima Tausch, Flora XIX. (1836) II. pag. 411.

In litore rupestri portus Princess-Royal-Harbour, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 255.

„Frutex 4-pedalis“. Flores albi. *Hypanthium* fructus angulatum, limbo e calyce indurato repetendo subpatellari patenti coronatum; capsula vertice e fauce angusta emergente villosa.

21. **Melaleuca incana** R.Br. ramulis flaccidis villosis; foliis confertis, verticillatis ternis, patentibus reflexisve, lineare-lanceolatis, planis, subpetiolatis, acutis, muticis, trinerviis,

cano-tomentosis, aetate glabrescentibus; spicis subapicalibus, ovalibus oblongisve, axi villosis; hypanthio hemisphaerico, sessili, glabro l. puberulo; calycis dentibus herbaceis, lato-ovatis, acutis; phalangibus 3-9-andris palmatifidis, unguibus corolla brevioribus. R.Br. Bot. Reg. 410! *M. canescens* Otto, in Horis phys. Berol. pag. 37! Link et Otto pl. sel. hort. Berol. tab. 37! *M. hypochondriaca* Dehnhardt Revista Napol. I. 3. pag. 177!

In locis hieme inundatis terrae inferioris Australiae occidentalis, Decembri 1839, fructifera. Herb. Preiss. No. 262; in paludosis silvae ad fl. Canning, Junio 1841, florens: No. 266; in glareosis sterilibus ad radices collum Konkoberup prom. Cape Riche, Novembri 1840; No. 329; (v. v. c.)

„Frutex 8-pedalis“. *Folia* annotina in planta silvestri glabrata, *hypanthium* saepius violaceo tinctum. *Filamenta* subflavescenti-albida; antherae luteae. *Fructus* conferti, calyce indurato patente coronati.

22. **Melaleuca polygaloides** Schauer. glabra; ramulis virgatis; foliis coriaceis, alternis; subimbricatis, oblongo-lanceolatis, basi subattenuata sessilibus, inflexis, acuminatis, pungentibus, glaucescentibus; spicis laxis, axi pubescente; hypanthio adnato; calycis phyllis herbaceis, ovatis, breviter acuminatis, subcarinatis; phalangibus decandris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri 1840, alabastrigera. Herb. Preiss. No. 327.

„Frutex pedalis“. *Folia* 3-4 lin. longa. *Spicae* circiter 20-florae. *Bractae* squamaceae, acuminatae, hypanthium aequantes, caducae. *Flores* rosei aut albi? Petala ciliata.

23. **Melaleuca viminea** Lindl. glaberrima; ramulis virgatis; foliis confertis, alternis, patulis, lineari-lanceolatis, in petiolum attenuatis, acutis, muticis; apice recurvis; spicis lateralibus subapicalibusque, cylindricis, laxis, multifloris; hypanthio subcylindrico, adnato; calycis phyllis brevibus, herbaceis, subrotundo-ovatis; phalangibus 7-andris apice radiatis, unguibus petalis convolutis reflexis sublongioribus; stylo filiformi exserto. — Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 22!

In uliginosis ad fl. Cynorum supra oppidum Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 291. — J. Drummond! King-George's Sound: Hügel! (v. s. a. cl. Lindl. comm.)

„Frutex 10-15-pedalis“. *Folia* 4-6 lin. longa, dimidiam lineam lata, viridia, novella puberula. *Spicae* pollicem circiter longae, semipollicem latae. *Stamina* $2\frac{1}{2}$ lineas longa, alba. *Stigma* truncatum. — Habitus omnino *M. armillaris* Sm., a qua fere non differt, nisi omnibus partibus duplo minoribus styloque conspicue exserto.

24. **Melaleuca Lehmanni** Schauer. glaberrima; gracilis; stricta; foliis confertis, alternis, erectis, lineari-lanceolatis semiteretibusve, petiolatis, apice recurvo pungentibus, nerviis, impunctatis; spicis subapicalibus cylindricis; multifloris, confertiusculis; hypanthio cyathiformi adnato; calycis

x c. U. Gunniana ? Schauer. W. 5, 928. Ad oras bo.
 c. U. Stuartiana fernal. Y. D. L. reals. Tasm.
 hls. St. n. 32. U. viminea var. h. St. 937.
 15-20. proxima distinguenda foliis an 20-30
 48. recurvis lamina protuberantibus, spicis
 54. cymosis brevioribus etc.
 Proxima specimina ratiuncula ad hanc speciem
 ratiuncula ratiuncula habet lenticula parva
 ratiuncula angustata. Porro pariat:
 ratiuncula fernal. Corolla apicalibus in
 capitulum ratiuncula (c. ratiuncula, fernal. in
 litt. ad ratiuncula Stuart) I n. 49. ratiuncula ratiuncula
 ad portum ratiuncula h. St. 735. 5-6
 x c. U. halmakerorum ? fernal.

xell. *hamaxeromus* ¹ *prospingua*, ² *seuile* ³ *salies* ⁴ *alibasi*
⁵ *describis*, ⁶ *ultus* ⁷ *nigro* ⁸ *gruicatus*, ⁹ *uabris*
¹⁰ *athelis*, ¹¹ *circ* ¹² *propia*, ¹³ *incubus* ¹⁴ *minus* ¹⁵ *apire* ¹⁶ *contra*
¹⁷ *tor* ¹⁸ *hu* ¹⁹ *os* ²⁰ *campanulata* ²¹ *hemi* ²² *phanc* ²³ *es*! ²⁴ *digna*
²⁵ *miles* ²⁶ *ut* ²⁷ *serius*. ²⁸ *et* ²⁹ *claxibus* ³⁰ *placis* ³¹ *aque* ³² *diffitis* ³³ *la* ³⁴ *ri*
³⁵ *box* ³⁶ *on* ³⁷ *eris* ³⁸ *vel* ³⁹ *pro* ⁴⁰ *non* ⁴¹ *raut* ⁴² *thos* ⁴³ *an* ⁴⁴ *h* ⁴⁵ *h* ⁴⁶ *h* ⁴⁷ *h* ⁴⁸ *h* ⁴⁹ *h* ⁵⁰ *h* ⁵¹ *h* ⁵² *h* ⁵³ *h* ⁵⁴ *h* ⁵⁵ *h* ⁵⁶ *h* ⁵⁷ *h* ⁵⁸ *h* ⁵⁹ *h* ⁶⁰ *h* ⁶¹ *h* ⁶² *h* ⁶³ *h* ⁶⁴ *h* ⁶⁵ *h* ⁶⁶ *h* ⁶⁷ *h* ⁶⁸ *h* ⁶⁹ *h* ⁷⁰ *h* ⁷¹ *h* ⁷² *h* ⁷³ *h* ⁷⁴ *h* ⁷⁵ *h* ⁷⁶ *h* ⁷⁷ *h* ⁷⁸ *h* ⁷⁹ *h* ⁸⁰ *h* ⁸¹ *h* ⁸² *h* ⁸³ *h* ⁸⁴ *h* ⁸⁵ *h* ⁸⁶ *h* ⁸⁷ *h* ⁸⁸ *h* ⁸⁹ *h* ⁹⁰ *h* ⁹¹ *h* ⁹² *h* ⁹³ *h* ⁹⁴ *h* ⁹⁵ *h* ⁹⁶ *h* ⁹⁷ *h* ⁹⁸ *h* ⁹⁹ *h* ¹⁰⁰ *h* ¹⁰¹ *h* ¹⁰² *h* ¹⁰³ *h* ¹⁰⁴ *h* ¹⁰⁵ *h* ¹⁰⁶ *h* ¹⁰⁷ *h* ¹⁰⁸ *h* ¹⁰⁹ *h* ¹¹⁰ *h* ¹¹¹ *h* ¹¹² *h* ¹¹³ *h* ¹¹⁴ *h* ¹¹⁵ *h* ¹¹⁶ *h* ¹¹⁷ *h* ¹¹⁸ *h* ¹¹⁹ *h* ¹²⁰ *h* ¹²¹ *h* ¹²² *h* ¹²³ *h* ¹²⁴ *h* ¹²⁵ *h* ¹²⁶ *h* ¹²⁷ *h* ¹²⁸ *h* ¹²⁹ *h* ¹³⁰ *h* ¹³¹ *h* ¹³² *h* ¹³³ *h* ¹³⁴ *h* ¹³⁵ *h* ¹³⁶ *h* ¹³⁷ *h* ¹³⁸ *h* ¹³⁹ *h* ¹⁴⁰ *h* ¹⁴¹ *h* ¹⁴² *h* ¹⁴³ *h* ¹⁴⁴ *h* ¹⁴⁵ *h* ¹⁴⁶ *h* ¹⁴⁷ *h* ¹⁴⁸ *h* ¹⁴⁹ *h* ¹⁵⁰ *h* ¹⁵¹ *h* ¹⁵² *h* ¹⁵³ *h* ¹⁵⁴ *h* ¹⁵⁵ *h* ¹⁵⁶ *h* ¹⁵⁷ *h* ¹⁵⁸ *h* ¹⁵⁹ *h* ¹⁶⁰ *h* ¹⁶¹ *h* ¹⁶² *h* ¹⁶³ *h* ¹⁶⁴ *h* ¹⁶⁵ *h* ¹⁶⁶ *h* ¹⁶⁷ *h* ¹⁶⁸ *h* ¹⁶⁹ *h* ¹⁷⁰ *h* ¹⁷¹ *h* ¹⁷² *h* ¹⁷³ *h* ¹⁷⁴ *h* ¹⁷⁵ *h* ¹⁷⁶ *h* ¹⁷⁷ *h* ¹⁷⁸ *h* ¹⁷⁹ *h* ¹⁸⁰ *h* ¹⁸¹ *h* ¹⁸² *h* ¹⁸³ *h* ¹⁸⁴ *h* ¹⁸⁵ *h* ¹⁸⁶ *h* ¹⁸⁷ *h* ¹⁸⁸ *h* ¹⁸⁹ *h* ¹⁹⁰ *h* ¹⁹¹ *h* ¹⁹² *h* ¹⁹³ *h* ¹⁹⁴ *h* ¹⁹⁵ *h* ¹⁹⁶ *h* ¹⁹⁷ *h* ¹⁹⁸ *h* ¹⁹⁹ *h* ²⁰⁰ *h* ²⁰¹ *h* ²⁰² *h* ²⁰³ *h* ²⁰⁴ *h* ²⁰⁵ *h* ²⁰⁶ *h* ²⁰⁷ *h* ²⁰⁸ *h* ²⁰⁹ *h* ²¹⁰ *h* ²¹¹ *h* ²¹² *h* ²¹³ *h* ²¹⁴ *h* ²¹⁵ *h* ²¹⁶ *h* ²¹⁷ *h* ²¹⁸ *h* ²¹⁹ *h* ²²⁰ *h* ²²¹ *h* ²²² *h* ²²³ *h* ²²⁴ *h* ²²⁵ *h* ²²⁶ *h* ²²⁷ *h* ²²⁸ *h* ²²⁹ *h* ²³⁰ *h* ²³¹ *h* ²³² *h* ²³³ *h* ²³⁴ *h* ²³⁵ *h* ²³⁶ *h* ²³⁷ *h* ²³⁸ *h* ²³⁹ *h* ²⁴⁰ *h* ²⁴¹ *h* ²⁴² *h* ²⁴³ *h* ²⁴⁴ *h* ²⁴⁵ *h* ²⁴⁶ *h* ²⁴⁷ *h* ²⁴⁸ *h* ²⁴⁹ *h* ²⁵⁰ *h* ²⁵¹ *h* ²⁵² *h* ²⁵³ *h* ²⁵⁴ *h* ²⁵⁵ *h* ²⁵⁶ *h* ²⁵⁷ *h* ²⁵⁸ *h* <

[illegible]

11. *virginicae* accedit. *Leptoglossa*
virginica quadrat. *Leptoglossa*
virginica novum, *flamina*, *aque*, *racemosa*
folia plerumque 1" *alt.* *viracimundum*
 2". *viracimundum* *globosus* *grani* *piperis*
magnitudine *apertum* *apertum* *attenuatus* *et*
intra *dentis* *induratus* *globosus* *globosus* *contractus*
racemosa *angulatus* *angulatus* *angulatus* *angulatus*
curvus. *Folia* *virgata* *aque* *racemosa* *virgata*
 11. *virgata* *virgata* *virgata* - *virgata* *virgata* *virgata*
 4-5" *virgata* *virgata* *virgata* *virgata* *virgata* *virgata*
 - *virgata* *virgata* *virgata* *virgata* *virgata* *virgata*
 - *virgata* *virgata* *virgata* *virgata* *virgata* *virgata*

x Melaleuca virnifolia. Lindl. Muir

In Nova Hall. (austro-orient.?)
no. 2.834.

A. M. insana, quorum compari-
are debet, eximie differt glabritate
perpetua et foliis angustioribus.

dentibus ovatis; phalangibus polyandris apice radiatis, unguibus corollam aequantibus.

In depressis paludosis silvae prope vicum Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 292.

„Frutex 6-8-pedalis“. *Folia* 4 lin. circiter longa, laete viridia, opaca, facie planiuscula. *Spicae* 6-9 lineas longae, angustae, nudae. *Flores* parvi; hypanthium fere lineam aequans; petala subrotunda, laevia, cum staminibus lineae vix longiora, uti videtur alba.

25. **Melaleuca Preissiana** Schauer. arborea; foliis confertis, rigidulis, alternis, obliquis, patentibus, lineari-lanceolatis, planis, brevi-petiolatis, obtusiusculis, trinerviis, glabris; spicis compluribus subapicalibus, fastigiatis, elongatis, laxis, foliatis, axi tomentoso; hypanthio subcylindrico pubescente; calycis phyllis herbaceis, lanceolatis, obtusis; phalangibus polyandris fasciculatis, unguibus manifestis corollam subaequantibus; stylo exserto glaberrimo.

In uliginosis silvae circa vicum Perth, Maio 1840 alabastrigera. Herb. Preiss. No. 265. — J. Drummond!

„Arbor 20-25-pedalis“, trunco valido, cortice libroso solubili induto, ramis tortuosis confertis rigidis, ramulis cinereis. *Folia* 4-6 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, firma, novella pubescentia, adulta glaberrima, viridia, opaca, impunctata. *Spicae* ad apicem ramuli 3-5, 2-3 uncias longae, apice nudae vel comosae, foliis quam reliquis latioribus brevioribusque interstinctae. *Flores* in axilla singulae bractee singuli-terni. *Hypanthium* cum calyce herbaceum, viride, sesquilineam altum; *phylla calycis* concava, glabra. *Petala* convoluta, reflexa, hypanthium adaequantia, cum staminibus alba. *Phalanges* 3 lineas longae, erectae, ungue angusto. *Antherae* apiculatae. *Stigma* truncatum. *Fructus* diametro sesquilineam metientes, semiglobosi, aliquandiu calyce indurato coronati, deinceps truncati. — *M. genistifoliae* Sm. affinis.

26. **Melaleuca raphiophylla** Schauer. glabra; glaucescens; ramulis tenuibus patentibus; foliis alternis, patulis, acicularibus, teretiusculis vel compressis, in petiolum attenuatis, subincurvis-recurvisve, acumine obliquo v. subrecurvo inermi; spicis oblongis, confertiusculis, axi villosis; hypanthio sessili, subcylindrico; calycis dentibus triangulari-ovatis; phalangibus polyandris pinnatifidis, unguibus corollam subaequantibus.

In arenosis plantitiei ad fl. Cygnorum supra Perth, Septembri 1839: Herb. Preiss. No. 264; in solo humoso ad ripam fl. Avon prope vicum York, Martio 1840: No. 267, fructif.

„Frutex 6-15-pedalis“. *Folia* 5-10 lin. longa, impunctata, saepe secunda. *Spicae* albae. *Hypanthium* cum calyce sesquilinea paullo brevius. *Petala* orbiculata, sessilia, patentia, calyce duplo longiora, glabra, disco punctata. *Stylus* filiformis, stamina aequans; stigma subcapitatum. *Fructus* pisi minoris mole, subconici, truncati, cum ramis ramulisque helvoli. *)

*) *M. semiteres* Schauer. glaberrima; glaucescens; ramulis virgatis; foliis alternis semitereti-filiformibus compressisve, basi attenuata sessilibus, apice acutato inermi; spicis axillaribus, ovalibus, confertis; hypanthio cyathiformi, sessili; calycis dentibus ovatis, acutiusculis, marginatis; phalangibus 7-9-andris pinnatifidis, unguibus co-

27. **Melaleuca Hügelii** Endl. ramulis pubescentibus; foliis alternis, appressis, subimbricatis, apice patulis, ovatis vel ovato-lanceolatis, sessilibus, acuminatis, multinerviis, glabris; spicis elongatis, densis, axi villosis; hypanthio glabro; calycis phyllis rotundatis, marginatis, nervoso-striatis; phalangibus subenneandris apice pinnatifidis; unguibus corolla plus duplo longioribus. — Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 48. n. 152!

In arena maritima haud procul ab urbe Freemantle, Novembri 1838. Herb. Preiss. No. 293. — Swan-River: Car. Fraser! *Melaleuca adpressa* A. Cgh. Herb.!

„Frutex orgyalis“, ramosissimus, spicis 2-4-pollicaribus lilacinis ornatis. *Petala* oblonga, colorata, laevia. *Stylus* stamina aequans, filiformis; stigma punctiforme, obtusum.

28. **Melaleuca densa** R.Br. ramis deflexis, squarrosis; ramulis tomentosis; foliis confertis, verticillatis ternis sparsisque, patentibus recurvisque, ellipticis subrotundo-ovatis obovatisque, subsessilibus, abrupto acuminatis, inflexis, trinerviis, punctatis, glabris; spicis subcylindricis, densis; axi hypanthioque subcylindrico adnato sericeo-tomentosis; calycis dentibus subrotundis, marginatis; phalangibus (brevibus) 5-7-andris; palmatifidis; unguibus corollae aequalibus brevioribusve; stylo stamina aequante. — R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 416. n. 24!

In solo turfoso pr. oppidulum Albany (Plantagenet), Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 288. (v. v. c.)

„Frutex 6-pedalis“, ramis suberosis, rigidis, tortuosis. *Folia* laete viridia, 3-5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. lata. *Spicae* pollice plerumque breviores, bracteatae. *Hypanthium* cum calyce sesquilineam altum. *Stamina* flavescentia, 2 lin. circiter longa.

29. **Melaleuca propinqua** Schauer. ramis pendulis; ramulis tomentellis; foliis confertissimis, patulis, verticillatis ternis, sexfariam imbricatis, ovatis oblongisve, subsessilibus, breviter acuminatis, inflexis, trinerviis, glabris, nitidis; spicis oblongis densis; axi hypanthioque cyathiformi adnatis sericeis; calycis dentibus subrotundis, breviter acuminatis; phalangibus (brevibus) 3-5-andris, unguibus corollae subaequalibus brevioribusve; stylo exserto. Schauer in O. et D. Allg. Gartenztg. III. pag. 166!

In solo turfoso-arenoso planitie, 13 mill. ab urbe Albany, Novembri 1840: Herb. Preiss. No. 285; et ibidem Octobri 1840 (fragm. fructif.): No. 286. (v. v. c.)

„Frutex bipedalis“. *M. densae* admodum propinqua, ut fere ejus forma omnibus partibus aequaliter diminuta haberetur, sed ramulis subflaccidis

rollam subaequantibus. Hab. in Nova-Hollandia austro-occidentali: J. Drummond! *Folia* $\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ uncias longa, nunc semiteretia facie plana, dorso semicylindrico, nunc facie dorsoque fere aequaliter convexis compressa, vix conspicue punctata. *Flores* bractea squamacea cuspidato-acuminata cum bracteolis minoribus caduca subtensi. *Petala* orbiculata, unguiculata, minute denticulata, calyce duplo longiora. *Stamina* late-ritia, fere 4 lin. longa, marcescentia. *Stylus* filiformis, exsertus; stigma peltatum.

x E raniis junioribus et Salis
Europaei, ^{aestote (m. g. sal. Feb.)} latharizae materia
saccharina efficitur, quae ex
suntas ⁵⁵⁰ decessunt et fit pu-
gula ^{magis magis} refert albida ^{magis} rutiler
humidiorcula ²⁰⁰ faciem max-
expirantia et penitus indurata
plurimae pisi magnitudinis
minuta sunt plures
maiores porosa, sapore suavi
dulcorato. In alcoholata-
tius quam maxima omni
dissolvitur.

Ex observatione A. Bynoe, ⁷ medici
nav. Beagle, manu huius memo-
rata, ab cicadis ortum ducit;
^{refertur, quia} haec animalia „per annum“ Symplicium
max indurantem ^{revertuntur}. Mihi
probabiliter apparet, cicadas
per annum primo i foliis Eucalypti
patentiflorae trahere et
post ^{plurimum} processum nutritionis
^{quasi perparum} ^{carbonea} ^{hanc} ^{in operta} ^{etiam} ^{reperi.}
7 long. Stokes ^{discedentes} in Au-
stralia vol II, pag. 482-483.

Allegit Erol 6

Melalura (Phenotomaea) fusc. Muller

Trimantha! Insuper Australia
flamini phalangibus flavo-rutilis
Anth: rufis
Phenotomus habitus.



pendulis, foliis sexfariam imbricatis dense tectis et habitu tota peculiari insignis. Immutata insuper e seminibus redit. *Folia* $1\frac{1}{2}$ lin. longa. *Hypanthium* cum calyce lineam, *stamina* flavescentia sesquilineam metientia.

30. **Melaleuca cuticularis** Labill. glabra; glaucescens; foliis oppositis, subimbricatis patulisve, crassiusculis, lanceolatis, dorso convexis, obtusis, brevipetiolatis, opacis; floribus citra apicem ramulorum axillaribus solitariis paucisve, bracteis scariosis quadrifariam imbricatis obvallatis; hypanthio campanulato; calycis phyllis herbaceis, acutis, erectis; phalangibus polyandris a basi ramosis, unguibus calycem aequantibus; stylo subexserto. — Labill. N. Holl. II. pag. 30. tab. 171! *M. imbricata* Link, Enum. pl. hort. Berol. II. pag. 272. n. 3240!

In arenosis planitiei ad fluvium Cygnorum supra oppidulum Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 303; in littore rupestri portus Princess Royal Harbour, Septembri 1840: No. 304, (v. v. c.)

Frutex vel „arbor 10-15-pedalis“, ramis confertis tortuosis foliosis, cortice albedo fissili indutis. *Folia* 4 lin. circiter longa, saepius subrecurva, subtus punctata, siccando non raro aeruginoso-virescentia. *Bractae* scariosae, ovatae, acuminatae, carinatae, fuscae margine albedo, quaternis-senis paribus arcte imbricatis hypanthio subjectae, deciduae. *Calyces phylla* foliacea, marginibus membranaceis involuta, interna pagina cum vertice germinis albo-tomentosa. *Petala* membranacea, pellucida, fimbriolata, involuta, reflexa, calyce paullo longiora, cum staminibus sordide alba. *Stamina* calycem duplo superantia, 4 lineas longa. *Stigma* punctiforme. *Fructus* maturus pisi majoris mole, hypanthio cyathiformi suberoso, calycis phyllis induratis divaricatis, capsula triloculari hypanthium aequante.

III. **LAMPROMYRTUS.** Flores axillares subsinguli, gemini vel spicati, (majusculi), glabri. Hypanthium adnatum v. sessile, continue in calycem abiens. Calycis dentes herbacei. Phalanges staminum polyandreae, expansae v. incurvo-adscendentes, e staminibus valde inaequalibus conflatae, rhachi petaloidea margine facieque filamentosa. Stylus columnaris, inclusus; stigma truncatum, latiusculum. — Folia plerumque opposita. Fructus dentibus calycis induratis coronati.

31. **Melaleuca Radula** Lindl. glaberrima; glaucescens; foliis oppositis, linearibus, elongatis, tereti-involutis canaliculatisve, sessilibus, pungenti-acuminatis, dorso tuberculato-punctatis, strictis arcuatisve; spicis axillaribus, interruptis, rarifloris; hypanthio subhemisphaerico adnato; calycis phyllis brevissimis, latis, truncatis, membranaceo-marginatis; phalangibus polyandris, margine facieque a basi inde filamentosis, rhachi petaloidea dorso distincta; stylo

staminibus breviori; stigmate peltato. — Lindl. Swan River Bot. pag. VIII. n. 24!

In limoso-calciosis ad amniculum planitiei haud longe a praedio rustico Mad dington (ad fl. Canning), Novembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 306; in glareosis inter frutices terrae superioris Australiae occidentalis, Aprili 1840 fructifera: No. 307. J. Drummond!

„Frutex 4-7-pedalis“, ramis patentibus, angulatis, strictis, virgatis, innovationibus glabris. *Folia* internodiis magis minusve manifestis distincta, 6-10 lin. longa, saepe secunda. *Flores* oppositi, majusculi, lilacini, petalis orbiculatis reflexis hypanthio longioribus et staminibus copiosis speciosi. *Petala* 3 lin. fere longa, in disco resinoso-punctata. *Stamina* permulta in fasciculo, valde inaequalia, longissima circiter semuncialia. *Fructus* magnus, depresso-globosus, laevis, fuscus, ore in vertice orbiculari aequali, capsula immersa apice tomentosa. — *M. fulgenti* R.Br. proxime affinis.

32. **Melaleuca violacea** Schauer. glabra; glaucescens; ramis patentibus suberosis; foliis oppositis, decussatis, patentissimis reflexisve, oblongo-ovatis, basi cordata semi-amplexicaulibus, acutis, 3-5-nerviis, capitulis axillaribus, paucifloris, comosis; hypanthio cyathiformi sessili; calycis phyllis ovatis, obtusis; phalangibus polyandris, incurvis, a basi inde pinnatifidis; rhachi integra facie filamentosa; stylo incluso uncinato.

In solo turfoso-arenoso planitiei 18 mill. ab oppidulo Albany (Plantagenet); Herb. Preiss. No. 273; in confragosis haud longe a monte Manypeak l. Tjilberup, Novembri 1840: No. 274.

„Frutex 1½-4-pedalis“, ramis intricatis, cuticula laciniosa supertextis, vetulis totis, junioribus basi saltem suberoso cortice tectis, ramulis novellis glabris vimineis. *Folia* internodiis ipsis aequalibus brevioribusve interstincta, 4-5 lin. longa, coriacea, planiuscula facie conspicue 3-5 nervi crebripunctata. *Flores* ad basin innovationum tam axillarium quam terminalium pauci, immo singuli geminive, pulcherrime violacei. *Petala* orbiculata, patentia, colorata. *Phalanges* corolla triente longiora, staminibus valde inaequalibus. *Stigma* truncatum. *Fructus* ramis arcte adnati, suberosi, dentibus calycis induratis divaricatisque muniti; capsula trilocularis.

Hujus syntypicae sunt: *M. thymifolia* Sm. (cujus formam majorem exhibet *M. discolor* Rehb.! — *M. elegans* Hornsch.!) et *M. pulchella* R.Br.


IV. MICROMYRTUS. Flores (parvi) ad apice ramulorum in capitula pauciflora congesti (abortu unisexuales.) Hypanthium cum calyce membranaceum. Phalanges breviter exsertae, palmatae, breviunguiculatae. — An genus proprium?

33. **Melaleuca micromera** Schauer. ramosissima; ramulis tenuibus, intricatis, albo-lanatis; foliis (minutissimis) contiguis, arcte appressis, verticillatis ternis, ovoideis apice depresso marginato cum acumine brevissimo dorsali, glaucescentibus, glabris, raripunctatis; floribus citra apicem ramuli ternis-quinis, glabris; calycis dentibus triangularibus; phalangibus pentandris, palmatis, corolla duplo longioribus, unguibus brevissimis; (germine abortivo!)

comp. M. Guineana V. Thunberg.

Mel. capitata frut. M. L.

T. & L. h. b. St. 49. floribus ter-
minalibus capitatis, foliis oppo-
sitis parvis basi apicisque et
sinuatis obtusis acuminis glabris
palmatis.



In glareosis sterilissimis collium Wariuphills (distr. Gooderich) rarissima, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 183^a.

„Frutex 12-16-pedalis, pyramidalis“, ramulis totis foliis minutis tectis, habitum *Haloenemidis* quodammodo referens. *Folia* triente lineae vix majora, punctis nonnullis, in sicco fuscis, conspersa. *Flores* axillares, sessiles, bibracteolati, lineam circiter longi, glaberrimi, flavescentes. *Hypanthium* membranaceum, subpellucide punctatum. *Calycis* phylla uninervia, margine subpellucida. *Petala* suborbicularia, basi attenuata sessilia, concava, minute et inaequaliter denticulata, semilineam longa, patentia, e sinibus calycis semiemergentia, aureo micantia. *Stamina* corolla duplo longiora; antherae subrotundae, incumbentes, biloculares, loculis distinctis parallelis rima longitudinali dehiscentibus; phalangum unguis quartam partem petalorum tantum aequantes, tamen manifesti. *Germinis* in omnibus floribus nostri speciminis ne minimum quidem vestigium!

Planta valde singularis quidem, sed ex quacunque parte ad *Melaleucam* pertinens, nisi fructus differat. *Flores* germine abortivo etiam in aliis speciebus non raro occurrunt.

CONOTHAMNUS Lindl. Swan River Bot. pag. IX. Endl. Gen. n. 6297.

Flores in spicam infraapicalem collecti, sessiles, bracteis magnis ovatis scariosis ante anthesin (ut in *Callistemonis*) dense imbricatis caducis singuli singula subtensi. *Hypanthium* campanulato-cyathiforme, germen ambiens, calycis dentibus 5 coronatum. *Corollae* petala 5, margini hypanthii inserta, calycis dentibus alterna, membranacea. *Stamina* plurima, inferne in laminam perigynam conflata, a margine hypanthii inde in phalanges 5, petalis oppositas, polyandras, palmatifidas distincta; filamenta filiformia, apice attenuata; antherae subglobosae, biloculares, juxta basin dorso insertae, incumbentes: connectivum angustum, lineare: loculi distincti, paralleli, rima longitudinali valvisque late hiantibus dehiscentes. *Germen* fundo hypanthii immersum, liberum nec nisi basi adnatum, vertice villosum, triloculare; loculi unigemmulati. *Stylus* subulatus; stigma acutum. *Capsula* hypanthio marcescenti pergamentaceo inclusa, libera, chariacea, apice loculicide dehiscens. *Semen* in singulo loculo solitarium, peltatum.

Genus perinsigne. Habitus et inflorescentia exacte *Callistemonis*; stamina *Melaleucae*; fructus et semen *Beaufortiae*. — Quom nuperius tandem mihi contigit, ut plantum examinarem, cognovi genus inter *Melaleuceas*, neque inter *Calothamneas* (conf. Dissert. nostr. gratul. pag. 10) esse collocandum.

1. *Conothamnus trinervis* Lindl. l. c. n. 26!

In Nova-Hollandia austro-occidentali coll. L. Preiss et J. Drummond!

Frutex ramis declinatis, cortice griseo fissili indutis, ramulisque subverticillatis rigidulis. *Folia* coriacea, opposita, aversa, lanceolata, basi in petiolum brevem attenuata, acuminata apice saepius sphacelato, trinervia nervis lateralibus submarginalibus, venosa, margine scabra, novella pilosa, adulta glaberrima utrinque lucida, pollice paullo longiora aut breviora, 2-3 lineas

lata. Spicae unciam circiter aequantes, confertissimae, ovatae, rhachii hypanthioque cum calyce villosissimis. *Bractee* scariosae, ovatae, acuminatae, concavae, tergo pubescentes, ambitu margineque villosae, 3-4 lineas longae. *Calycis* dentes triangulares, acuti. *Petala* membranacea, margine scarioso. *Phalanges* staminum flavae, inaequaliter fissae, 9-13-andrae, 4 lin. longae, unguibus petala aequantibus. *Fructus* in spicam cylindraceam congesti.

Sect. 2. **CALOTHAMNEAE.** Antherae basi insertae,
erectae.

REGELIA Schauer. Dissert. gratul. (Acta Acad. N. C. XXI. Pars I. pag. 7. tab. I. fig. 1—3.)

1. **Regelia ciliata** Schauer l. c. *Melaleuca sprengilioides* DC. Mém. Myrt. tab. 3.

In arenosis illustribus porrectis silvae ad fl. Vasse River, Decembri 1839: Herb. Preiss. No. 287. — J. Drummond!

„Frutex 5-pedalis, ramosissimus“, ramulis villosis. *Folia* conferta, opposita, decussata, obovato-oblonga v. subrotunda, sessilia, obtusa, 5-nervia, subinflexa, superne recurva, facie tenuiter puberula, dorso glabra, marginibus costaque piloso-ciliata, laete-viridia. *Capitula* 10-20-flora, lilacina.

BEAUFORTIA R.Br.; Schauer l. c. pag. 8.
tab. I. fig. 4-11.

1. **EUBEAUFORTIA.** Antherae valvulae extensoriiformes, patentissimae; interiores planae, orbiculares, marginatae, verticales. Schauer l. c.

1. **Beaufortia decussata** R.B. ramulis villosis; foliis confertissimis, decussatis, ovatis ovalibusve, subsessilibus, acutis, carinatis, recurvis, 7-9-nerviis, marginatis, glabris; spicis infraapicalibus, multifloris; axi villosis; hypanthio villosulo; calycis phyllis e basi ovata subulatis, carinatis, nervosis, margine villosis; phalangibus aequalibus, subpollicaribus, 7-andris, apice subfasciculato-pinnatifidis: filamentis patentibus fastigiatis: unguibus linearibus, rectis, infima basi interne villosis-barbatis. R. Brown in Hort. Kew. IV. pag. 418.

In silvaticis arenosis baud procul ab oppidulo Albany (Plantagenet.) rara, Octobri 1840 alabastrigera. Herb. Preiss. No. 356. — Ferd. Bauer! (v. v. c.)

„Frutex 6-7-pedalis, erectus“.

Beaufortia parva, R. Br.

In vicinia oppidis Fremantli,
Vivae Hollandiae austro-occiden-
talis.

Anth: asperae

II. SCHIZOPLEURA. (Lindl. Swan River Bot. pag. IX.)
 Antherae divaricato-bilobae valvulae convexae; exteriores
 (inferiores) margine involutae; interiores (superiores)
 minores. Schauer l. c.

2. **Beaufortia sparsa** R.Br. glabra; foliis confertis, patulis, sparsis subverticillatisve, lanceolatis ovalibusve, sessilibus, inflexis, apice complicato acutiusculis, 5-9-nerviis, glabris; spicis infraapicalibus, multifloris; axi lanato; hypanthio basi pubescente; calycis phyllis ovato-subrotundis enerviis glabris; phalangibus aequalibus, pollicaribus, 7-andris; filamentis infimis alternis remotiusculis, reliquis ad apicem subfasciculatis fastigiatis; unguibus rectis, glabris. Schauer l. c.

B. splendens Baxter. Otto et Dietr. Allg. Gartenztg. II. pag. 274!

In turfosis uliginosis ad oppidulum Albany (Plantagenet), Januario 1841. Herb. Preiss. No. 319 et No. 355. (v. v. c.)

3. **Beaufortia squarrosa** Schauer. ramulis pubescentibus; foliis confertis, oppositis, patulis, ovalibus, sessilibus, obtusis, inflexis, recurvis, trinerviis, marginatis, glabris; capitulis subapicalibus, plurifloris; axi hypanthioque pubescentibus; calycis phyllis foliaceis, ovatis, acuminatis apice obtuso, trinerviis, glabris; phalangibus 3-andris; unguibus elongatis, tenuissimis, glabris. Schauer l. c. pag. 11.
 „*Buno*“ aboriginum: Preiss. Mss.

In solo subarenoso planitie inter frutices ad fl. Canning, Junio 1831. Herb. Preiss. No. 358.

„Frutex 4-pedalis, squarrosus“. *Phalanges coccineae*.

4. **Beaufortia macrostemon** Lindl. ramulis pubescentibus; foliis confertis, patulis, oppositis, lineari-lanceolatis, sessilibus, obtusiusculis, trinerviis, marginatis, pubescentibus, margine pilosis, denique glabratibus; capitulis apicalibus, densifloris; axi hypanthioque sericeo-lanatis; calycis phyllis subulatis, pubescentibus, piloso-ciliatis, corollam aequantibus; phalangibus triandris, inaequalibus, leviter declinatis; unguibus longiorum semipollicaribus, inferne barbatis. — Lindl. Swan River Bot. pag. X. n. 31!

In limosis calculeosis silvaticis terrae superioris, haud procul a cataracta ad caput fl. Swan River, Januario 1840. Herb. Preiss. No. 357. — J. Drummond!

„Frutex vix pedalis, ramosissimus, confertus“. *Capitula* 15-20-flora, *phalangibus* bicoloribus, superne scarlatinis, inferne sordide albicantibus.

5. **Beaufortia anisandra** Schauer. ramulis puberulis, denique glabrescentibus; foliis confertis, patulis, oppositis, ovalibus oblongisve, sessilibus, obtusis, inflexis, subrecurvis, 3-5-nerviis, glabris, margine scabris; capitulis apicalibus, densifloris; axi hypanthioque basi lanato; calycis

phyllis ovatis, obtuse acuminatis, glabris, corolla duplo brevioribus; phalangibus apice 5-7 andris, valde inaequalibus; unguibus longis, rectis, inferne barbatis. Schauer l. c. pag. 13 tab. I. A. fig. 6—11.

In solo arenoso inter frutices densos silvae ad planitiem prope oppidulum Albany (Plantagenet), rara, Januario 1841. Herb. Preiss. No. 362. — Ad Sinum Regis Georgii 1818: A. Cgh.!

Frutex gracilis, capitulis globosis atrovioleaceis. „Flores nauseosi.“

6. **Beaufortia purpurea** Lindl. ramulis puberulis, denique glabrescentibus; foliis oppositis, sessilibus, quadrifariam imbricatis, lineari-lanceolatis, carinato-inflexis, obtusis, trinerviis, glabris; capitulis subapicalibus, densifloris, bracteatis; axi hypanthioque sericeo-lanatis; calycis phyllis e basi ovata aristato-subulatis, piloso-ciliatis, corolla duplo longioribus. — Lindl. Swan River Bot. pag. X. n. 30. tab. III. A!

In rupestribus illustribus Australiae occidentalis, Jannario 1841. Herb. Preiss. No. 258.

„Frutex pedalis-sesquipedalis, erectus, divaricatus“. *Capitula* Cerasi mole, kermesiana.

7. **Beaufortia Schaueri** L. Preiss. ramulis pubescentibus; foliis oppositis, sessilibus, confertissimis, patulis, quadrifariam imbricatis, lineari-trigonis, canaliculatis, obtusis, glabris; spicis subapicalibus, oblongis, densifloris; axi hypanthioque lanatis; calycis phyllis foliaceis, ovatis, acuminatis, carinatis, glabris, basi ciliatis, corolla duplo brevioribus; phalangibus 3-5-andris, aequalibus, adscendentibus, apice radiantibus: unguibus corolla ter longioribus, interne barbatis. Schauer l. c. pag. 14.

In colliculosis confragosis prope montem Manypeak (l. Tjilberup) et in glareosis ad radices clivium Konkoberup promontorii Cape Riche, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 305.

„Frutex 4-5-pedalis, ramosissimus“, ramulis brevibus rigidis foliosis. *Capitula* roseo-lilacina.

8. **Beaufortia elegans** Schauer. ramulis lanuginosis; foliis oppositis, approximatis, decussatis sessilibus, obovatis, obtusis, subcarinatis, apice recurvis, subtus trinerviis, marginatis, pubescentibus, denique glabrescentibus; spicis infraapicalibus, cylindricis, densifloris, bracteatis; axi hypanthioque sublanatis; calycis phyllis foliaceis, ovatis, obtusiusculis, trinerviis, pubescentibus, corolla duplo brevioribus; phalangibus 3-5 andris, aequalibus, adscendentibus: unguibus corolla fere duplo longioribus, glabris. Schauer l. c. pag. 16.

In planitie arenosa Quangen (Victoria), Martio 1840, desolata. Herb. Preiss. No. 284.

„Frutex bipedalis“. *Spicae* lilacinae.

9. **Beaufortia inops** Schauer. ramulis tomentosis glabrisve; foliis abbreviatis, carnosulis, oppositis, quadrifariam imbricatis.

Haloragis muricata frut. Mill.

S. asperma frut. Mill.

robusta, ^{medio, trachelosperma} stricta, foliis etiam floralibus
propinque serratis incisive, serraturis nunc
denticulatis incisionem. Saute inscripta car-
nosa, punctibus saepius laevigatis.

In glacia rivorum exsiccante prope
Germacha a Libique montes Flindus-rang
+ locum 5000m vultus.
Uti unus aliar species valde poly-
morpha.

eatis, subrhombeis, utrinque obtusis, basi solutis, facie tomentosa concava adpressis, apice subpatulis, dorso carinato glabris, margine breviter ciliatis; capitulis subapicalibus, exiguis, bracteatis; axi lanato; hypanthio pubescente; calycis phyllis foliaceis, ovatis, obtusis; subcarinatis, glabris, corolla duplo brevioribus; phalangibus 5-andris, aequalibus, adscendentibus; unguibus corollam subaequantibus, glabris. Schauer l. c. pag. 17.

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis; in itinere a Sinu Regis Georgii ad oppidulum Perth, Febuario 1840. Herb. Preiss. No. 257.

Frutex ramis ramulisque rigidulis subtortuosis copiosis, his foliis plane obtectis. *Capitula* Piso vix majora, subdecemflora, lilacina.

10. **Beaufortia micrantha** Schauer. ramulis tenellis, tomentosis; foliis abbreviatis, carnosulis, oppositis, sessilibus, quadrifariam imbricatis, arcu adpressis, ovatis, obtusis, facie concava pubescentibus, dorso carinato glabris; capitulis subapicalibus oblongis densifloris, bracteatis; axi hypanthioque lanatis; calycis phyllis ovatis, obtuse acuminatis, carinatis, glabris; phalangibus triandris; unguibus corollam aequantibus, glabris. Schauer l. c. pag. 18.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 256.

„Frutex pedalis“, conferte ramosus, ramulis foliis penitus obtectis ideoque quadrangularibus, tomento inter folia pullulante albo. *Capitula* diametro 3-4 lin. metientia, lilacina.

CALOTHAMNUS Labill. Schauer l. c. pag. 19. tab. I. B. fig. 12—17.

I. **CALLITHAMNUS**. Gemmae floriferae ramulo adnatae, sub-unilaterales, nudae vel perula cucullata apiculata, dein alabastro adolescente sublata vel bivalvi-dehiscente obtectae. Phalanges polyandrae. Schauer l. c.

1. **Calothamnus sanguinea** Labill. ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, saepe implexis, acerosis, terebibus l. planiusculis, acutis, inermibus, incurvis apice recurvis vel ascendentibus, pilosis, denique glabrescentibus; floribus tetrameris, axillaribus, paucis subspicatisve; hypanthio cyathiformi, cum calyce albo-lanato; phalangibus duobus polyandris, radiantibus, inferne connatis; (antheris biseriatim punctatis); staminodiis duobus sejunctis. — Labill.

N. Holl. II. pag. 25. tab. 164! *C. eriocarpa* Lindl. Swan River Bot. pag. IX. n. 28!

In arenosis silvae cis oppidulum Guildford gregatim crescens Julio 1839. Herb. Preiss. No. 214; in planitie arenosa Quangen, Martio 1840, alabastrigera: No. 216; in regionibus interioribus Sinum Regis Georgii et vicum York interjacentibus, Febuario 1840, alabastr.: No. 219, 220 et 221. — In Terra Van-Leuwin: Labill. !; ad Sinum Regis Georgii: Hügel! — J. Drummond!

2. ***Calothamnus torulosa* Schauer.** caule rigido, toruloso; foliis confertissimis, erectis, compactis, tereti-subfiliformibus, pungentibus, incurvis, glaucescentibus: novellis inferius pilosis: adultis glabris, asperis; floribus tetrameris, axillaribus, subsolitariis, torulo fungoso insidentibus; hypanthio hemisphaerico, sericeo; phalangibus polyandris, duabus latissimis erectis, duabus angustioribus flexuosis: unguibus fasciariis: filamentis fastigiatis: (antheris virgineis longe ciliatis). Schauer l. c. pag. 21.

In calcuosis ad radices montium Darling's-range, haud procul a villa Mad-dington, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 212. — J. Drummond!

„Frutex dodrantalis-bipedalis“, rigidus. Flores speciosi; *phalanges* coccineae pollicares, majores 2-4 lineas latae, minores triplo-quadruplo angustiores.

3. ***Calothamnus rupestris* Schauer.** ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, compactis, acerosis, e tereti compressis, pungentibus, incurvis, glauco-iridibus: adultis glabris, laevibus; floribus tetrameris, ramealibus, paucis; hypanthio subcylindrico, incano-villoso; phalangibus sub-15-andris, aequalibus, inaequaliter ramosis. Schauer l. c. pag. 22.

Inter rupes quarzinas ad latera montium Darling's-range, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 211.

„Frutex octopedalis, squarrosus“. *Phalanges* coccineae, pollicem circiter longae, unguibus lineam latis.

4. ***Calothamnus robusta* Schauer.** ramulis tomentosis; foliis sparsis, confertissimis, rigidis, recurvo-patentibus, teretibus, oblique acuminatis, pungenti-mucronatis: junioribus pilosis: adultis glabris, laevibus; floribus tetrameris, ramealibus, paucis; hypanthio cyathiformi, villoso-incano; phalangibus 20-andris, subaequalibus, superne pinnatifidis, apice radiantibus. Schauer l. c. *C. robusta* et *C. Knightii* Hort.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 213.

„Frutex bipedalis“. *Phalanges* coccineae, 14 lineas longa. *Antherae* lorso viscoso-punctatae.

5. ***Calothamnus clavata* Mackay.** ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, patentibus, subclavatis, e tereti compressis, acutis, inermibus, rectiusculis v. incurvis, piloso-hirsutis, denique glabrescentibus, punctatis; floribus tetrameris, ramealibus, unilateralibus vel aequaliter spica-

^{zygophylli}
Carmenis latoribus, ligamentis 4 carnosae carumpresso
claviculatae appropae, apice truncatae papilloso
pennellatae. Stamina 8 cupula separatae.
Capsulae in brevibus petiolo horizontalis
aut curvatae 4-5^{lin} longae 2^{lin} et acutangulae lobis
per lineam ^{interiore} laevis terminata. Semina oblonga
carnosa & laevissima nitida sublaevia.
1^o parva longiora 4^{lin} et quatuor lora
1^o 1^o vix priore parte
Flos angulos papillis glauco albis obsitos

Zygophyllum glaucum f. v. Mill.

Rosera zygophylloides, f. v. Mill.

^{zygophylli}
Stemba ^{zygophylli} annua. radice longa perennante
resistente. tenui. Folia glauca carnulenta
nec valde serrata

In plegis pinnatis inter montes Flinders range
& pinnis pinnatis pinnatis.

Stemba ovato-oblonga non compressa nitida
intra 2^{lin} longa fere laevia, pinnis ^{longitudinis} fore
aequante pinnatis. Locus hypogaeus pinnato brevi
in quadrilobus.

Zygophyllum Willardieri D. C.

Rosera Willardieri f. v.

Euconut Bay.

Zygophyllum 4 lobis 4 pinnis orbiculatis.

Stemba ovata compressa

A pinnate haec vix nisi habitus robusta

& lobis multo majoribus receptis latioribus
amphiphilum ^{Euconut Bay}

Zygophyllum gracilentum f. v. Mill.

Rosera gracilenta f. v. Mill. in hb. v.

Stemba crystallinae vixus.

Stemba minbra and nullis ovata pinnis

pinnis vixus latiora. Zygophyllum in f. v.

lobis 4 pinnis orbiculatis fol. longos pa-

pilloso & marginatos pinnatis ^{gracilentum} habitus

Stemba 2 amphiphili var. parviflorum

Rath 1^o primo var. pinnatis latioribus

Zygophyllum amphiphilum f. v. Mill.

Rosera amphiphila f. v. Mill. hb. v.

Ex indagatum & procerum Zygophylli foliis

orto indagatum procerum, Rosera nota

Stemba minbra & floris pinnatis partibus
quatuor discerni poss. qual signa etli in

Mecionoceros Sonderi fide Mueller.

In humosis madidis ad rotaraitam
Antiam montium Loffy-ranges.

Intu M. Brownii & Preisii medius
Caulis angulatus. Fructus compressus
subcarnosus viridis. Nam 3. (an semper?)
I

Calothamnus quadrifida, N. Brown.

Fourmanti.

Anth. aestate

* Botheria (n.g. tam Myriophylla quam
Mecionoceros et Halimoloma affine) fide Mueller.

B. myriophylla fide Mueller.

Occurrit copiose in praeco alio
quodam subalfo dum Potamogeton
merino & Ruppia rostellata inter
Portum Adelaide & finem Ad-
fastbury!

Viv. aestate.

Caulis teretinosculus. Flores brevissimi.

Macro: Calycis phylla 2 orbiculata

peristylis nigro terminata refracta,

petala 5 subulata eructo minime, altura pro-

speciosa? maximo Caloetariae

labium circumlansse nunc viridi

nunc nupercum horizontali!

Flos femineus tetragynus triplocephalus

Speciebus raphantia non magis ramentosa re-
dentur, quam floris & partibus divisis in dabo.
nata aliorumque generum speciebus. Synopsis
rum enim in Boepris observari integrum, pri-
mum pro in lobos partitum, stamina sperantis
antherae connatis et eis quod prodeuntia, stigma
laudem saepissimum in lobis plura bene etiam
evoluta. — Ad Troiro Nostrum, quam sub-
genus Lygophylla connitum, libet.

tis; hypanthio subcylindrico, pubescente; calycis phyllis subaequalibus, ovatis, obtusis; phalangibus subicosandris, aequalibus, superne pinnatifidis; unguibus elongatis. Schauer l. c. Lodd. Bot. Cab. 1447.

„*Queitjät*“ aboriginum.

In solo sublimoso ad ripam fl. Avon, prope praedium rusticum cl. Whitfield, Martio 1840, fructifera. Herb. Preiss. No. 210. — J. Drummond! (v. v. c.)

„Frutex 10-pedalis“, habitu *C. quadrifida* R.Br. valde similis, sed ab omni parte major, foliis latioribus hirsutis, hypanthio pubescente (superius quidem cito calvescente), calyce profundius fissio discriminandus.

6. **Calothamnus quadrifida** R.Br. ramulis glabris villosisve; foliis sparsis, confertissimis, patentibus, acerosis, e tereti compressis, acutis, inermibus, subnervis: junioribus pilosis: adultis glabris, punctis prominentibus conspersis; floribus tetrameris, ramealibus, unilateralibus vel aequaliter spicatis; hypanthio subcylindrico, glabro, verrucoso-punctato; calycis phyllis rotundatis, externis gibbosis; phalangibus subicosandris, aequalibus, superne pinnatifidis; unguibus elongatis. R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 418! Schauer l. c. pag. 25.

C. purpurea Endl. En. pl. Hügel. pag. 48. n. 151!

In elevatis valde arenosis prope Freemantle ad fl. Swan River, Decembri 1838. Herb. Preiss. No. 207; in calciosis ad radices montium Darling's-range, Octobri 1839, No. 217. — Hügel! J. Drummond!

7. **Calothamnus laevigata** Schauer. ramulis et innovationibus glabris; foliis sparsis, confertissimis, patulis, subclavato-teretibus, obtusis, brevissime apiculatis, laevibus, nitidis, punctatis; floribus tetrameris, ramealibus, unilateralibus; hypanthio cylindrico, glabro, punctato; phalangibus 15-20-andris, aequalibus, superne pinnatifidis. Schauer l. c. pag. 26.

In Australia meridionali-occidentali, inter Sinum Regis Georgii et vicum Perth, Febuario 1840. Herb. Preiss. No. 215.

Frutex gracilis, foliis acerosis, 6-12 lin. longis, obtusis, laete virentibus, nitidis, floribusque conspicuis coccineis insignis.

II. **STROMNOTHAMNUS.** Gemmae floriferae in tumescentia ramuli nidulantes, stragulo corticali fungoso obtectae; alabastra adolescentia erumpentia, adulta immersa vel magis minusve emersa. (Hypanthium hemisphaericum cum calyce glabrum.) Phalanges 3-7-andrae. Schauer l. c. pag. 27.

* Flores submersi, axi paullo tumescenti circumpositi, conferte spicati.

8. **Calothamnus Lehmanni** Schauer. ramulis hirsutis; foliis sparsis, confertissimis, acicularibus, teretibus, acutis,

inermibus glaucescentibus; junioribus pilosis: adultis glabratis; floribus tetrameris, conferte spicatis; hypanthiis semiimmersis; phalangibus duabus, pentandris; staminibus duobus simplicibus. Schauer l. c. pag. 27.

In Australia meridionali-occidentali interiori, inter Sinum Regis Georgii et oppidulum York, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 218.

„Frutex ramosus“. *Folia* pollicaria. *Spicae* multiflorae foliis interstinctae. *Phalanges* 4 lineas longae, *stamina* distincta triente breviora, utraque atropurpurea.

9. **Calothamnus Preissii** Schauer. ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, patulis, tereti-filiformibus, apice redunco-cuspidatis, glaucescentibus: hornotinis appresse pilosis: annotinis glabratis; floribus tetrameris, glomerato-spicatis; hypanthiis immersis; phalangibus superioribus paullo longioribus, pentandris: inferioribus triandris. Schauer l. c. pag. 27.

In solo glareoso silvae cis fl. Gordon, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 209.

„Frutex sesquipedalis“, ramis suberosis. *Folia* 2-4 pollices longa, tenuia, saepe flexa. *Phalanges* sanguineae, erectae, majores 9, minores 7 lineas longae.

10. **Calothamnus Schaueri** Lehm. innovationibus villosis; foliis subverticillatis ternis-quaternis, strictis, elongatis, tenuiter filiformibus, teretibus, oblique cuspidatis, pallide virentibus: hornotinis appresse pilosis: annotinis glabratis; floribus tetrameris, dense spicatis; hypanthiis basi immersis; phalangibus brevibus, aequalibus, 2-3-andris. Lehm. Delect. Sem. hort. Hamb. 1842. pag. 7! Schauer l. c. pag. 28.

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis, Sinum Regis Georgii et oppidulum York interiacentibus, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 202.

Frutex pede vix major, simpliciusculus. *Folia* stricta, 4-6 pollices longa. *Phalanges* adscendentes, 2 lineas longae, atropurpureae.

11. **Calothamnus schoenophylla** Schauer. glabra; foliis oppositis vel subverticillatis ternis-quaternis, subfasciculatis, patentibus, elongatis, semiteretibus, cuspidatis, viridibus; floribus tetrameris, conferte spicatis; hypanthiis semiimmersis; phalangibus Schauer l. c. pag. 29.

In solo subturfoso-arenoso inter frutices silvae ad planitiem prope oppidulum Albany (Plantagenet), Decembri 1840, fructifera. Herb. Preiss. No. 201.

Frutex pedalis-sesquipedalis, gracilis, ramis paucis tortuosis adscendentibus patentissimis. *Folia* 6-8 pollices longa, rigida, opaca, saepe secunda).

*) **C. Hügelii** Schauer. glabra; foliis in verticillis remotis confertis, patulis, filiformibus, rigidis, teretibus, incurvis, acutis, inermibus, pallide viridibus; floribus tetrameris, unilateralibus; hypanthiis usque ad apices calycis immersis; phalangibus subaequalibus, rectis, 5-7 andris, superne pinnatifidis (antheris seriatim punctatis). Schauer l. c. pag. 30. *C. quadrifida* Endl. En. pl. Hügel. pag. 48. n. 150! Ad Sinum Regis Georgii: Hügel. Frutex validus. *Folia* 2½-3 poll. longa. *Flores* conferte spicati. *Calycis phylla* subrotunda, acutiuscula, interne glabra, tenuiter ciliata, aestivatione valvata. *Phalanges* 10 lin. longae, purpureae.

** *Flores tumescentiae corticali spongiosae pulvinariformi immersi, unilaterales.*

12. **Calothamnus gracilis** R.Br. glabra; foliis sparsis, confertis, patulis, tereti-filiformibus, rigidis, incurvis, pungenti-mucronatis, pallide viridibus; floribus pentameris, unilateralibus; hypanthiis immersis; phalangibus aequalibus, rectis; 5-7-andris, superne pinnatifidis (antheris impunctatis). — R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 418!

In subarenoso-glareosis clivuli inter montem Manypeak (l. Tjilberup) et promontorium Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 208. — Ferd. Bauer!

Frutex humilis. *Folia* 2-2½ poll. longa. *Flores* speciosi, spicam unilaterallem interruptam struentes. *Calycis phylla* rotundata, interna pagina sericeo-tomentosa, inaequalia, aestivatione imbricata. *Phalanges* coccineae, pollice vix breviores.

13. **Calothamnus longifolia** Lehm. glabra, foliis suboppositis vel subverticillatis ternis-quaternis, strictis, longissimis, tereti-filiformibus, pungenti-mucronatis; floribus tetrameris, unilateralibus; hypanthiis usque ad apices calycis immersis; phalangibus subaequalibus, declinatis, 5-7-andris, fere a basi inde pinnatifidis. Lehm. Delect. Sem. hort. Hamburg, 1842. pag. 7! Schauer l. c. pag. 30.

C. lateralis Lindl. Swan River Bot. pag. IX. n. 27?

In depressis turfosis hieme inundatis: in silva supra Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 200; in planitie prope Albany, Januario 1840. No. 203; ad Sinum Regis Georgii, Novembri 1840, fructif. No. 204. — J. Drummond!

„Frutex sesqui-quadrupedalis“, strictus, gracilis, cortice ad inflorescentiam in pulvinar tumescente. *Folia* 6-15 pollices longa, pallide vel subglaucoviridia. *Flores* nauseosi, atropurpurei. *Phalanges* graciles 6-7 lin. longi.

14. **Calothamnus planifolia** Lehm. ramulis villosis; foliis alternis, confertis, patulis, cuneato-linearibus, planis, firmis, obtusis cum apiculo brevissimo inermi, glabris (siccis bisulcis); floribus tetrameris, unilateralibus; hypanthiis usque ad apices calycis immersis; phalangibus subinaequalibus, declinatis, 5-7-andris, a medio inde pinnatifidis. Lehm. Delect. Sem. hort. Hamb. 1842. pag. 7! Schauer l. c. pag. 31.

α angustifolia. gracilior; foliis angustioribus, laevioribus, Schauer l. c. tab. I. B. fig. 12—17.

In solo glareoso planitie prope lacum Mathilda (distr. Hay), Novembri 1840 florens. Herb. Preiss. No. 205.

β latifolia. robustior; foliis latioribus, punctis prominulis asperis costaque crassiori.

In interioribus plagis Sinum Regis Georgii et oppidulum York interjacentibus, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 206.

„Frutex bipedalis.“ *Folia* 2-2½ poll. et quod excedit longa, viridia, opaca. *Phalanges* 10 lin. circiter longae, superne purpureae, unguibus perangustis pallidis.

*** Incompleta.

15. **Calothamnus (?) suberosa Schauer.** ramis suberosis, rimosis; foliis subverticillatis ternis, subimbricatis, brevibus, semiteretibus, brevipetiolatis, obtusiusculis, glabris, subglaucescentibus, dorso convexo punctatis; floribus remotiusculis, sparsis, ramo circumpositis, pentameris; hypanthio immerso; phalangibus

In depressis arenosis inter montem Manypeak (Tjilberup) et promontorium Cape Riche, Novembri 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 206^b.

„Frutex vix pedalis“, ramosus. *Rami* cortice molli, inter flores denique suberéo et rimoso amicti, cum ramulis brevibus patentibus rigiduli. *Folia* $1\frac{1}{2}$ -3 lineas longa, semilineam fere lata, facie lanceolata vel lineari planiuscula argute marginata laevi, dorso convexo punctis biseriatis saepe prominentibus praedito, apice obtuso v. acutiusculo mutico, petiolo brevissimo laminae continuo. *Flores* cortici suberoso immersi, singulati-geminati, spicam interruptam $1-1\frac{1}{2}$ poll. longam struentes. *Hypanthium* ima basi duplici ordine squamularum imbricarum involucreto, campanulatum, breve. *Calycis* dentes 5, ovati, acutiusculi, patentes. (*Petala* et *stamina* desunt.) *Germen* hypanthio immersum, basi innatum, vertice villosum, triloculare; *gemmae* in singulo loculo plurimae, in spermophoro ad angulum internum basifixo obliquae. *Capsula* hypanthio cum calyce exarido corticata, subemersa, loculicide trivalvis; semina numerosa, minuta, cuneata, angulata, aptera.

EREMAEA Lindl. Swan River Bot. pag. XI.
Endl. gen. n. 6304.

Flores terminales, singuli vel pauci aggregati, foliis rameis supremis obvallati, bracteis nonnullis squamaceis involucreto, sessiles, bibracteolati. *Hypanthium* campanulatum, germi adnatum, continue in calycem abiens. *Calycis* phylla 5, cutanea, acuminata, persistentia. *Petala* 5, margini interiori hypanthii annuliformi inserta, calycis phyllis alterna, suborbicularia, unguiculata, concava, colorata. *Stamina* plurima, cum petalis inserta, basi connata, irregulariter polyadelpha, exserta, recta; filamenta filiformia; *anthera* connectivo filamento continuo erecta, obovata vel oblonga, bilocularis, loculis connatis prope apicem rima laterali angusta vel poriformi hiantibus dehiscentibus. *Germen* semisuperum, vertice dense villosum, bi-triloculare; *gemmae* in singulo loculo plurimae, spermophoro bicostato ad angulum internum basifixo insertae. *Stylus* filiformis, *stamina* subaequans vel superans; stigma punctiforme. *Capsula* hypanthio valde aucto, basi adnato, accreta, bi-trilocularis, loculicide dehiscens; semina plurima, adscendentia, cuneata, angulata, infima pluralata.

1. **Eremaea fimbriata Lindl.** ramulis pubescentibus pilosisque, foliis approximatis, alternis patulis, coriaceis, oblongo-lanceolatis, obtusis, inflexis, apice recurvis, 3-5-7-nerviis, supra glabris, subtus pilosis, margine villosis,

Ammannia Houston.

A. Behriana Griseb.

caule erecto tetragono ramosa basi
fascius coccumbule, ramis simplicibus,
foliis oppositis sessilibus caulum
fere amplexantibus lanceolato-line-
aribus, cymis axillaribus paucifloris.
folio baccoribus, floribus tubularis
apertis, calyce quicquidato.

In locis inundatis ad fluvium Murray
Aug. 18. Octobr. 1849. Spille. Habitus & odor
Solanum propriam calore & imballo
distinctam fuisse videtur vix novum
genus. Si tamen novum genus sit
nomen *Eadeia* *Behriana* propono!

82 (Cymbria est Labiatarum genus quoddam
a South America!)

9 Genus tribui & viro aestimando Roberto Eades,
M.D., materiae medicae in collegio Luciniensi Profes-
sori emendo.

Eadeia *Australica* Griseb.

Haloragis *Haloragis*
Murrayi *Haloragis*
prole. *Haloragis*

Murphyella varietatem Hook.

Murphyella *Murphyella* Griseb.

caulem foliis minimis prostratis
circumscissis lanceolatis, calice
superiorum amplioribus.

In irriguosis ad fl. Murray Apr.

11 *Haloragis* *Haloragis* Griseb.
e. *Haloragis* *Haloragis* Griseb.
m. *Haloragis* *Haloragis* Griseb.

Epilobium *Epilobium* Endl.

In graminosis humidis

stavae Hall. austr. et Tasson.

caulem pubescentem et velutinum

foliis alternis et oppositis.

glaberrimis & c.

Stem. levis

Maranthum

Maranthum Hook.

Hooker Bay, ex. v. 182.

In udis ad pl. Murphy Tasm. hb. St. 49
pterisipetalis, affinis
Crys. ovata. N. H. Sp. 49.

Liban. specie ex diagnosi velle
affine cognata nisi aequalia punct
E. cinereum Kirk. E. indianum
Cum 2 E. confertum Cunn. ex Nov.
Zeelandia.

Anthopsis vire, affinis

x Epilobium Haumi Endl.

In udis Tasmaniae. hb. St. 174.
Ciguensis forsan varietas
etiam habita praecedenti
aeris.

Anthopsis ut priore

Haloragis (Goniocarpus) rotundifolia fide Mue. Clav.

In paludibus maritimis ad rotundif. Lurkian montibus
Loph. - alysi. Pa. pterisipetalis virentorum praecedenti.

x Epilobium Willardii Crummi ^{affinis!} ~~Crummi~~

P. lanceolatum. In

foliis lanceolatis basi aequi-
latis. Mue. range Hobart.

Anthopsis vire, affinis nonnulla

Ro. hoi. rarissime plus solummodo
Loph. - alysi. Pa. pterisipetalis virentorum praecedenti.

x Epilobium rotundifolium fide Mue.

racens, glabra, foliis oppositis ovato vel
cordato - rotundatis apiculis

in undulato pinnatis, ora serratis, pinnatis

terminalis, floribus parvis, calice

cordato, corollae lobis pinnatis, calice

in undulato pinnatis, ora serratis, pinnatis

terminalis, floribus parvis, calice

cordato, corollae lobis pinnatis, calice

in undulato pinnatis, ora serratis, pinnatis

terminalis, floribus parvis, calice

cordato, corollae lobis pinnatis, calice

in undulato pinnatis, ora serratis, pinnatis

terminalis, floribus parvis, calice

cordato, corollae lobis pinnatis, calice

in undulato pinnatis, ora serratis, pinnatis

denique glabratiss; floribus subgeminatis; bracteis hypanthio calyceque sericeo-tomentosis; staminibus corolla triplo longioribus, conspicue polyadelphis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XI. n. 38!

In arenosis silvae prope lacum Monger's-lake, Octobri 1839. Herb. Preiss. No. 254. — J. Drummond!

Frutex semipedalis, squarrosus, quam sequentes omnibus partibus major. *Folia* 4 lin. longa. *Flores* grandiusculi, filamentis coccineis antheris luteis conspicui. *Bractaeae* coriaceae, ciliatae, striatae, hypanthium fere omnino velantes. *Calycis* *phylla* subulato-acuminata. *Stamina* irregulariter polyadelphe, unguibus latissimis, petalis haud longioribus; antherae rimae angustae. *Stylus* stamina aequans. *Fructus* magni, singuli, gemini, ramulo arcuato adnati; hypanthium furfuraceum, albidum, calyce indurato patenti coronatum; capsula vertice densissime villosa. *Semina* numerosa; plurima cuneata, angulata; infima, parietis loculi oppressa, pluralata, ala nempe majori dorsum seminis quasi ambiente, duabusque tribusve ad angulos faciales instructa; alis omnibus latis, hyalino-membranaceis, transverse interruptis, ex integumentis gemmulae evolutione progrediente inter vicinas gemmulas partim compressis repetendis.

2. **Eremaea pilosa** Lindl. ramulis lanuginosis; foliis approximatis, alternis, patulis acerosis, lineari-lanceolatis, muticis, apice subrecurvis, trinerviis, pilosis, adultioribus glabratiss; floribus solitariis; bracteis glabriusculis vel subpubescentibus, ciliatis; hypanthio intra bracteas puberulo, ceterum cum calyce vernicoso-nitente; staminibus corolla duplo longioribus; unguibus phalangum brevissimis. — Lindl. l. c. n. 37.

In glareosis silvae ad radices montium Darling's-range. Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 296; in arenosis illustribus silvae haud longe ab oppidulo Freemantle Decembri 1838. No. 295; in regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis. No. 300.

„*Frutex bipedalis*“ gracilis, inferne simplex, superne laxè ramosus. Innovationes subvillosae. *Folia* 3 lin. circiter longa. *Hypanthium* subcylindricum, viride. *Calycis* dentes cutanei, subrotundo-ovati, acuminati. *Petalae* tenuiter membranaceae, subrotunda, reflexae, viridi-purpureae. *Stamina* 3 lin. longa, lateritia, antheris luteis poris ampliusculis dehiscentibus. *Stylus* exsertus. *Germen* vertice emerso albo-sericeum.

3. **Eremaea ericifolia** Lindl. ramulis pubescentibus; foliis approximatis, alternis, patulis, acerosis, lineari-semiteretibus, obtusis, brevipetiolatis, pilosis, adultioribus glabratiss; floribus solitariis; bracteis pubescentibus; hypanthio intra bracteas pubescente, ceterum cum calyce vernicoso-nitente; staminibus corolla vix longioribus; unguibus phalangum brevissimis. — Lindl. l. c. n. 36.

Metrosideros pauciflora Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 50. n. 159!

In arenosis colliculosis silvae prope Pine Apple (Perth), Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 294. — Hügel!

„*Frutex tripedalis*“, praecedenti valde affinis, sed habitu peculiari, e ramificatione confertiori tortuosa folisque angustioribus brevioribus crassioribus pendente, floribus paullo minoribus staminibusque brevioribus satis di-

stincta. *Petala* patentia viridula. *Filamenta* lateritia, 2 lin. longa; antherae ut in priore. *Fructus* pisi majoris mole, hypanthio fusco laevi ore truncato edentulo, capsula immersa. *Semina* etiam in hac reperi nonnulla simili modo ut supra descripti pluralata, sed alis perangustis praedita.

HALORAGEAE RBr.

Endl. gen. pag. 1195. Onagrariae
Subordo Halorageae Meisn. gen. pag. 124.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

GONIOCARPUS Koen. Ann. of Bot. I. pag. 546.
DC. Prodr. III. pag. 66. Haloragis specc.
Endl. l. c.

Sect. II. PTEROGYNUS DC. l. c.

1. **Goniocarpus tetragynus** Labill. foliis ovatis acutis sessilibus nitidis marginatis grosse serratis supra hispidis, ramulis junioribus pilosis demum glabrescentibus, spicis axillaribus laxis paucifloris longe pedunculatis gracilibus in apice ramorum subcorymbosis, floribus sessilibus erectis, terminali ad speciem saepe pedicellato, fructu ovali octocostato costis scabris, petalis pilosis. — Labill. Nov. Holl. tab. 53. DC. Prodr. III. pag. 66.

In solo turfoso ad portum Princess Royal Harbour et in turfoso-arenosis scaturiginosis ad Stirling's - Terrace (Plantagenet) m. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 2087 et 2390.

Bractee parvae, lanceolatae, integerrimae. *Caulis* diffusus. ☉

2. **Goniocarpus nodulosus** N. ab E. foliis inferioribus oppositis obovato-cuneiformibus apicem versus serrulatis glabris, superioribus floralibusque hispidis alternis, his lanceolatis integerrimis minoribus, floribus in axillis foliorum sessilibus solitariis spicam dissitifloram foliaceam constituentibus, fructu urceolato quadrangulari octocostato ventre in medio constricto, petalis brevibus apice hispidis.

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 2378.

Planta parva, annua, erecta, a basi ramosa, ramis oppositis habitu *G. serpyllifolii* Hook, sed foliis floralibus alternis et fructus sculptura singulari distinctissima; ob ventrem fructus medio constrictum cinguli duo nodulorum octonorum alternatim minorum, quorum alter prope basin alter infra collum situs est, oriuntur. *Flos* tetrandrus.

a lone yis ~~si-ga-na-spa~~ fur mll. *naux* p. 150.

Hypocistis Plum Vail.

Falco verticillatus 4 - common nonmigrates
annularis oval elongate, submarginated, immatures
~~attracted~~ ^{to} ~~the~~ ^{the} ~~lucines~~ ^{lucines} ~~lucines~~ ^{lucines}, ~~clarks~~ ^{clarks} ~~vires~~ ^{vires}.
ciliated axillary. In Washington D.C. Murray 16 miles
at 2000 ft. Oct. 1898. (Det. Lac.)
P. annularis ^{var.} *pallidus*

Enallagma cyathigerum Linn.
Enallagma cyathigerum Linn. *Enallagma cyathigerum* Linn. *Enallagma cyathigerum* Linn.
Enallagma cyathigerum Linn. *Enallagma cyathigerum* Linn. *Enallagma cyathigerum* Linn.

11. *Utricularia* ~~variegata~~ *variegata* ^{! variegata} *Hook*

[illegible][illegible]

U. stansfordii H. Chambrayes Furber
~~U. stansfordii~~ H. Chambrayes Furber

folia interdum acetate ferebilitata.

In mont. Lapidgeo calva tractus.
Lapidge-range. Dec. 28. 1874. Port Lincoln.
Alarida subnudation.

Scilla ovata var. *puberula* - *Scilla ovata* *puberula*
Scilla ovata *puberula* - *Scilla ovata* *puberula*
Scilla ovata *puberula* - *Scilla ovata* *puberula*

[illegible]

S. J. 123 / *papilion*, *tubif. grum.*, *tubif. a rugulis integris. lund.*

14 *herpessus fird melle* *herpessus aspera*

[illegible]

16. *Polioptila caerulea* } 2100. 1 # 1895
snowflake } 2000. 1 # 1895

in plantis arida vasis montis
Löffl. range. D. S. Mts. 1848. fruct. 1/4, 1/2.

G. maculatus ^{var.} *glaberrimus*

[illegible][illegible]

F. Montivivaxi postparanda!

2. Planta valde memorabilis; prima species
hujus generis Australasia cognita, ab
aboriginibus ad aucupium in usum
tracta. 6-10

Tephrosium album patens; fol. $1\frac{1}{2}$ -2" long
oppositus plerumque semipalmati. Petala re-
ctina calycis laciniarum j' tot 3-4" long
gynous. ^{stipulae} bracteae feminosculae vel
claviformes apice membranaceae cum
inactis oviculis apiculatis supra ora-
ni) tubi bafim alternatim insertis
~~obtusius~~ viridibus glandulosis fru-
sculis.

Murray and McDuff station April. 1849

Penothura *vide* p. 161.
Lagodon vitrina *eximie* *roux* p. 187.

L. lanceolata (Pursh) Nutt. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.* 1846, p. 101.
L. lanceolata Benth! *Schl.* *Fl. Paris* 1845, p. 101.
L. fruticetis obtusis *Nov. Bull. accepta* C.
et *S. Benth.*, *diff.* 1848/49 *et* *fruticosa*
in humidis *Nov. 1847* *diff.* *et* *fruticosa*
(ex parte f. m. 2) *L. fruticosa* *diff.* *et* *fruticosa*
L. fruticosa *diff.* *et* *fruticosa*

var. glaberrima *L. Salicaria* L. var. pubescens Pursh
-X *L. Salicaria* L. var. pubescens Pursh

Si fluvii Tonnensis ripas in vi-
cina pagi Nordadlaide. Tan 18.

1. *Emmannia* (~~Cyanoptera~~) ^{Trichoptera} *Helvicornis* Jm sp. n.

Justicia chlorodora ^{*subtropical*} *Just. Me.*

*fluitans, caule villosa-pilosa,
foliis ovato-lanceolatis obtusis, sub-
spatulatis in petiolum decurrenti-
bus, junioribus praesertim in novis
vitisque pilosis, virentibus glabris
junioribus axillaribus peltatis pe-
tiolos ^{super} superantibus, glaucis puncta-
tis, tubo calycino cylindrico can-
nibus lanceolatis attenuatis, pilatis
obtusis, calycis bracteis stipulisque
prostratis, fere calicatis. **

3. **Goniocarpus trifidus** *N. ab E.* foliis omnibus trifidis filiformibus inferioribus verticillato-ternis, floralibus conformibus oppositis, floribus dioicis quadripartitis, axillari-bus solitariis ternisve oppositis masculis tetrandris.

In turfosis humidis ad lacum haud procul ab oppidulo Albany (Plantagenet) m. Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 2401.

„Herba humifusa, radicans“. Antherae lineares.

LAUDONIA Lindl. Swan Riv. XLII, XLIII. Endl. gen. n. 6139. Meisn. gen. pag. 356. Glichrocaryon Endl. in Ann. Mus. Wien. 2. pag. 209.

1. **Laudonia aurea** Lindl. glaberrima, caule erecto tereti sesquipedali simplici glauco discolore basi foliato apice nunc aphylo, folia linearia alterna coriacea integerrima, panicula terminalis corymbosa, bracteae superiores petaloidae obovatae floribus aureis aequales, primariae foliaceae aut deficientes. — Lindl. l. c. pag. XLII. n. 194 cum ic. Walp. Repert. 2. pag. 12. 100.

In calculosis ad latus orientale montis Bakewell (York) m. Septembri Herb. Preiss. No. 2067. et in solo limoso prope urbiculam Guildford et ad fluvium Can-ning (Perth) m. Octobri a. 1839. No. 2068.

β **angustifolia.** foliis linearibus caule infirmo.

In glareosis sterilibus districtus Hay m. Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 2079.

Unum tantum vidimus specimen, praeter folia multo minora (3-4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata,) in inferiore caulis parte crebriora, magis patentia, et cymam terminalem minorem subsimplicem, haud diversum, de quo, an speciei propriae sit, aliis iudicium relinquimus.

OENOTHEREAE Endl.

Endl. gen. pag. 1188. Onagrarum Sect. II. et III. Juss.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

Tribus II. EPILOBIAE Endl. l. c. pag. 1189.

EPILOBIUM Linn. Endl. gen. n. 6121. Meisn. gen. pag. 120. (86.)

1. **Epilobium canescens** *Hügel.* incano-tomentosum, foliis alternis sessilibus oblongis serratis basi subintegerrimis.

mis, junioribus subfasciculatis, pedicellis floriferis cernuis fructiferis strictis folio longioribus. Endl. in Enum. plant. Hügel austr. occ. pag. 44. Walp. Repert. 2. pag. 93.

Ad fluvium Cygnorum (Hügel). In arenosis umbrosis et in rupestribus vallis Tood-yay-vally m. Martio a. 1839 et 1840. Herb. Preiss. No. 1946 et 1948.

„Suffrutex bipedalis“ stricte erectus, in umbrosis laxior.

β **glabrescens.** foliis glabris, caule subtilissime pubescenti-exasperato.

In humidis umbrosis ad flumen Cygnorum m. Majo a. 1839. Herb. Preiss. No. 1947.

OXALIDEAE DC.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

OXALIS Linn. Endl. gen. n. 6058. Meisn.
gen. 57. (42.)

1. **Oxalis Preissiana** Steud. caule tenero simplici sursum folioso, foliis omnibus petiolatis, petiolis basi cum stipulis adnatis (uti caulis-patenti) hirsutis; foliolis omnibus sessilibus subprofunde bifidis ciliatis glaucescentibus puncticulatis; pedunculis rectis folia superantibus supra medium bibracteolatis, stylis longissimis.

In calcareis umbrosis prope Pointwater ditionis Perth, 18. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1915.

Radix tenuis longe descendens parum fibrosa; *caulis* abbreviatus infra petiolorum ortum vix pollicaris; *petioli* pedunculo solitario duplo breviores ad basin caulis plus minus conferti, apice infra foliola dense pilosi; *foliola* a basi ad excisuram 2-2½ lin. longa 3 lin. circiter lata profunde emarginata fere bifida sordide glaucescentia, juniora etiam in utraque pagina sparsim pilosa, impresso punctulata; *flores* solitarii; *calycis* laciniae oblongae obtusae corolla alba plus duplo breviores pilosae; *capsulae* conicae dense pilosae. ☉?

2. **Oxalis cognata** Steud. tenera parvula; caule procumbente ramoso petiolisque pilosis, foliolis sessilibus obcordatis sparse pilosis ciliatis; pedunculis axillaribus petiolos superantibus medio bibracteatis refractis; stylis intermediis.

In arenoso-conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest 22. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1916.

Radix tenuis fibrosa emittens caulem maxime ramosum; *rami* procumbentes teneres 1-2 pollicares vix et raro longiores; *petioli* subbipollicares erecto-patentes subflexuosi basi stipulis adnatis obtusis muniti; *foliola* parva a basi ad excisuram lineam vix excedentia 2 lineas lata, tenuissime

Billardiera *virianum* Seringe Gaudet - river
In vallibus grassantibus *Sanctus* *Bayle* *ramp.*
 Dec. 20. 1848. Flores reflexi - liliarii vixit saturati
 oribus purpureis. Stigma & antherae liliaceae - *Saturati*
 nudi ad fl. m. p. p. *Satur.* n. 435 hb. St. & *humile* *Flu* in
rubellum *canescens* *Kügel* *montis* *altioribus*
hb. St. Sarm. n. 434
et plun. suprema *reperi* *altior*! *caul. affund*

figura clavatum, petala liliaria vel alba pro
 funde cordata, rhizoma caespum repens.
In gl. fabili ad flum. Torrens-river Dec. 26. 1847.
 V. & L. ! hb. St. Sarmannii n. 99!
B. glabrescens Nees ad eundem montis
 D. & L. Dec. 28. 1847. *Kingsington* Jan. 20.
 1848. *Third Creek* Jan. 10. 1848. Ad
flum. Torrens Dec. 26. 1848.
Specia cetna *per eum* *Gremm* *partem* *Nova* *Holl.*
 E. *Sarm* *portum* *videtur*.

var. *inapiflora*,
corollae *longe* *superior*
prolongata - *hoff*
San *D.* *in* *monte*
est *montis* *inter*

C. microphylla ! *Poirer* . V. & L. !
 var. *puberula* *fl.* *foliol.* *inter* *rim*
 hb. St. Sarm. St. *Ullique* *Sarmannia*,
per totum *annum* - hb. St. S. n. 157.

C. cognata *Stuebel*
 2. *Specimina* *ad riv. Torrens* *colle* *ta*
accidunt *flore* *flava*, *masculinis*
& foeminae *separatis* *charact.*
octavae *line* *conveniant*. *Petala*
late *ovata* *anthera* *emarginata*.
Jan. 14. 1848. *Ullique* *obscuro* *ad* *C.*
cognatam *accidit* *planta* *et* *ante*
pro eadem *identata*, *nisi* *C. Stuebel*.
videtur *tenem* *descriptis* *quae* *in*
specimenibus *inter* *C. cognata* *et* *fla*
cones *sub* *longis* *emittent* *invi*
nitus. *An* *spec. nova*, *an* *descriptio*
iusta *specimina* *manu* *a* *Stuebel*
facta? *In* *gracili* *spis* *ferris* *progru*
arbu *et* *lucido*. *Jan. 23. 1848* *flor.*
hermaphroditi *lucis*.

Dec. Stuart *eadem* *sp. nasens* *in*
caespit *bonae* *spis* *in* *tura* *Van* *Diemen*.
In *regno* *ultrino* *C. microphylla*
reperitur (*Error* *C. Stuebelii*)

puncticulata, obscure viridia; *pedunculi* $1\frac{1}{2}$ -2 pollicares, solitarii ex axillis uniflori; calycis laciniae oblongae, striatae, adpresse pilosae; capsula conica, junior stylis persistentibus in adultis evanidis rostrata, dense pilosa.

Proxime accedit ad speciem: *O. procumbentem* Steud. a cl. *Schimpero* (Herb. un. it. No. 1165) in Abyssinia lectam.

LINEAE DC.

(Auctore F. T. BARTLING.)

LINUM L. Endl. gen. 6056. Meisn. gen. 57. (41.)

1. **Linum angustifolium** Huds. sepalis ovatis acuminatis eglandulosis capsulam subaequantibus, interioribus obsolete ciliatis; foliis lineari-lanceolatis glabris; caulibus numerosis. — Huds. angl. pag. 134. Engl. bot. tab. 381.

In arenosis inter frutices prope Woodman'spoint d. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1913. — Ad portum Princess Royal Harbour Nov. 1840. No. 1914.

„Herba 1-2-pedalis, stricta. Flores cyanei“. Stirps Novae Hollandiae, quam etiam prope Port. Jackson lectam coram habemus, ab Europaea caulibus erectis strictis paulisper recedit, vix tamen species diversa videtur.

GERANIACEAE DC.

Fl. Franc. ed. 5. Vol. 4. pag. 1838. Endl. gen. pag. 1166.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

ERODIUM Herit. Endl. gen. n. 6045. Meisn. gen. pag. 57. (41.)

1. **Erodium cicutarium** Leman. caule prostrato aut diffuso hirtio, foliis pinnatisectis segmentis sessilibus pinnatifidis incisus acutis obtusisve, pedunculis multifloris, petalis inaequalibus, staminum basi dilatata integerrima. — DC. Prodr. pag. 646. n. 21. Koch. Synops. Fl. Germ. et Helv. pag. 172. Reichenb. Fl. excurs. pag. 776.

Var. γ **Chaerophyllum** (DC. l. c.), „floribus albis“ (Preiss.), ad formam β caule suberecto accedens.

In solo limoso arenoso ad fluvium Avon River, 19 Mill. ab oppidulo York (York), Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1899; aliis in partibus districtus York No. 1905 (an et haec specimina albidiora?)

Ab Europaeis hujus varietatis et var. *δ pilosae* Thuill. non differt, nisi pubescentia carpellorum alba, quae in nostratibus est ferruginea. *Petala* desunt. ☉

2. **Erodium cygnorum** *N. ab E.* caule „prostrato“ petiolisque retrorsum pilosis, foliis oppositis incumbenti-pilosis trisectis, segmentis lateralibus divaricatis bifido-dentatis, medio majore trifido inciso-dentato, pedunculis submultifloris, calycibus nervosis sericeo-incanis breviaristatis.

In depressis arenosis umbrosis ad flumen Cygnorum supra oppidulum Perth, Augusto a. 1839. Herb. Preiss. No. 1902.

Summopere affine est *Erodio gruino*, a quo differt foliis obtusis neque acutis, lobo medio basi cuneato et integro nec inferne subpinnatifido-inciso, et imprimis sepalis laud candato-acuminatis, crassinerviis interstitiis nervorum membranaceis fereque glabris, sed ex apice obtuso mucronem aristiformem sepalo quadruplo et amplius brevioribus exserentibus, tota superficie pilis brevissimis incumbentibus tectis nervisque 5 multo minus conspicuis praeditis. Iisdem characteribus etiam ab *E. scrotino* discernitur, cui quod ad foliorum formam maxime est simile, et insuper differt umbella pauciflora nec multiflora. — *Caulis* articuli novelli dense albo-hirsuti. *Pedunculi* in nostro triflori. *Involuti* foliola ovata, setaceo-acuminata. „*Flores* cyanei“ (Preiss.), petalis ovalibus integris calyce longioribus. *Ovaria* strigosa. *Stamina* glabra. *Fructus* deficit. ☉

An *Erodii gruini* var.? Unum tantum specimen vidi.

GERANIUM Herit. Geran. t. 36—40. Endl. gen. n. 6046. Meisn. gen. pag. 57. (41.)

1. **Geranium pilosum** *Forst.* caule diffuse ramoso, petiolis (foliis) pedunculisque patenti-pilosis, foliis palmatim quinquepartitis laciniis sublinearibus obtusis, trifidis, pedunculis bifloris, pedicellis demum reflexis calycibus ovarisque hirsutissimis, petalis calycem aequantibus subemarginatis „coeruleis“, filamentis glabris. *Forst. Prodr.* pag. 91. n. 531. (absque diagnosi.) *Willd. sp. pl.* 3. pag. 706. (ad specimen incompletum descriptum.) *Spr. s. v.* 3. pag. 74. *DC. Prodr.* 1. pag. 642. n. 46. *Endlich. in Enumerat. pl.* Hugel. pag. 14. n. 43.

In Nova Zeelandia (Forster).

β Caule erecto, foliis pilosis.

In limoso-arenosis porrectis laud longo itinere a praedio rustico cl. Wittenoom (York), Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1900.

Sepala ovata, brevimucronata. 24

2. **Geranium australe** *N. ab E.* pilis brevibus reversis canescens, caule procumbente, foliis palmatim quinquepartitis laciniis sublinearibus obtusis trifidis, pedunculis

Oelargonium australe Willdenow.

F.D.L! hb. Musc. Tassinarii. 94.
Diagnosi brevissima. exord. Perfora-
tionibus. Latius descriptio amplior
vel specimen authentica sunt
comparanda. — Communis. ad fl.
South Est. riv. Oct. - Nov. 1848
hb. N. Y. II n. 159. — Nunc formis
intermediis utriusque speciei filices
autorum confluer. videtur.

P. oviformis V. al. E. Specim. nostra
P. ovata, an varietas an n. propria?

1. In valle montium l'offij-range novu

For Longo a domiciliis Glen - Osmond
Lincast. servis ad rivales Lamm 1848.

Quae maximum proximam sub
num. 120 e hb. St. Taron. II in
cupibus, fidei aliisque collata
sed vix proprie diversa a plantis
sub num. 422 (S. eradioides ?) mihi
Ad hanc rem absolendum peragimus
authenticam peragimus! An ad P. affera
reponendum?

0⁹. *litorale*! Endlicher.

Sine dubio hujus sori, etiam si
solum e nota brevi data exhi-
cendum, ^{plantis} ambabus ^{centur} erudendis quasi
In aruosis maritimis praecipue
Leuore. Dec. 16. 1847. ly. Dr. M.
+ intermedia!

Ptilogonium erodioides M. F. Hook.

var. *pinnatum* Jord. m. l. pinnatifidum
 pedunculis puberulis gracillibus, foliis vix
 aequantibus longis, glaucis, bifloris.
 In ripibus ad Hippury - r. v. 1849. n. 422.
 ? 2. In insula V. D. Land. hb. St. Turin 1849.
 Ad. Pl. Murzig. Jan. 1849. hb. St.
 J. n. 422.

P. erodictus Hooker?

Sperminia pumila hujus descriptioni
congruant mi elatiora. Species videtur
polymorpha. Ad stat. li. Davenport
in *Antileas* p. 100 versus finem Rivoli
Wey. Oct. 1848.

bifloris, ovariis hirsutissimis, staminibus glabris; petalis calyce longioribus subemarginatis (coeruleis).

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 1907.

A *Geranio piloso*, cui quod ad foliorum figuram et flores simillimum, differt statura minore, caule procumbente probabiliter diffuso, et inprimis pubescentia brevior, densior, reversa, qua efficitur, ut tota planta canescat. Sepala etiam pilis, sed iis antrorsum incumbentibus canescunt. 24? — An forma sive varietas *Geranii pilosi*?

PELARGONIUM Herit. Endl. gen. n. 6048.

Meisn. gen. pag. 57. (41.)

1. **Pelargonium (Peristera) crinitum** N. ab E. caule angulato diffuso petiolisque pilis mollibus patentissimis villosis, foliis cordato-subrotundis lobatis crenatis glabriusculis basi cuneiformibus subcucullatis, pedunculis multifloris, petalis lineari-cuneiformibus, carpellorum aristis in medio longe barbatis basi apiceque glabris.

α Pedicellis longiusculis.

In arenosis apertis prope oppidulum Freemantle, Decembri a. 1838, et in solo sublimoso districtus Sussex, Decembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1905 et 1906.

β **Congestum.** floribus propter pedunculos breviores magis congestis pallidioribus, caule firmiore brevior.

In solo arenoso exsiccatum ad marginem lacus Mathilde (Hay), Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 1903.

Species notis indicatis distinctu haud difficilis. *Rhizoma* articulatum, repens, fuscum. *Caules* pedales, angulosi, laxi et debiles, inter villos longos patentes pube brevi subglandulosa densiori vestiti. *Folia* pollicaria, fere quinqueloba, lobis obtusis dense crenatis in nostris saepe crispulis, basi late cordata et e sinu evidenter cuneata ac conniventia, ad costas subtus plus minus scabra hirtave; floralia multo minor, sessilia, trifida. *Pedunculi* firmi, multi, circa apicem caulis subcorymbosi, villosi, 6-7-flori. *Pedicelli* in forma *α* tubo calycis longiores, in *β* hunc aequantes eove breviores, cum calycibus pubescentia brevissima viscidula pilisque raris patentibus vestiti. *Calycis* lacinae oblongo-ovales, acutae, margine albo-membranaceo undato cinctae, quatuor reflexae, suprema recta. Tubus nectariferus longitudine tubi calycinii. *Petala* calyce parum longiora, oblongo-linearia, basin versus cuneatim angustata, „laete purpurea“ (Preiss), superiora paulo majora et basin versus macula saturatiori ramosa notata. *Stamina* 10, basi in urceolum connata, 5 longiora, quorum 4 antherifera, 5 reliqua dentiformia. *Columna centralis* et *carpella* pubescentia. *Rostrum* $\frac{3}{4}$ poll. longum, in medio introrsum (ut in *Pel. humifuso* Willd.) pilis longis erecto-patentibus rigidulis barbatum. 24.

A *Pelargonio littorali* Endlich. (pl. Hugel pag. 14.) differt caulibus procumbentibus diffusis nec erectis, valde angulosis nec teretibus.

2. **Pelargonium (Peristera) erodioides** Hook. (?), subacaule patenti-hirsutum, foliis cordato-rotundatis (sinu lato) subseptemlobatis serratis (crenatis), pedunculis radicalibus (digitalibus) subaphyllis, umbellis tri-7-floris, calycibus villosissimis, tubulo nectarifero subnullo. Journ. of Bot. I. pag. 252. Walp. Rep. II. pag. 459.

Inter rupium rimas summi montis Wuljenup (Plantagenet), Octobri a. 1840.
Herb. Preiss. No. 1901. Specimen sterile.

Species propter flores et fructus deficientes dubia. *Caudex* pollicaris, crassus, residuis petiolorum destructorum exasperatus. *Folia* terminalia, conferta, petiolata. *Petoli* 2-2½ poll. longi, purpurei. *Pubescentia* densa, patens, breviuscula ut in *P. australi*; sed folia breviora sunt et sinus baseos haud angustus lobis conniventibus, sed subulnatus, lenis et parum profundus, quibus commotus ad *P. erodioides* referendum esse censebam nostrum specimen. 24.

ZYGOPHYLLEAE Juss. Endl. gen. pag. 1161.,

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

ROEPERA Adr. Juss. Endl. gen. n. 6035. Meisn. gen. pag. 59. (43.)

1. **Roepera fabagifolia** A. Juss. foliolis oblongis carnosiss planis, pedicellis brevissimis, caule fruticuloso. A. Juss. Mém. sur les Rutacées pag. 71. tab. 15. n. 18. De Less. Icon. Select. III. tab. 42! pag. 25. *Zygophyllum fruticulosum* DC. Prodr. I. pag. 705. (quare *Roepera fruticulosa* apud quosdam auctores perperam legi videtur.)

Crescit in arenosis clivuli Arthur's-head, regionis Perth, 23. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1953.

„Frutex subscandens. *Corolla* aurea“.

Specimina nostra bene cum iconibus citatis quadrant, praesertim quoad florum et fructus analyses. *Foliola* in nostris paullo latiora, acutiuscula, parumper divergentia, an icone cit. operis Lessertiani recte paullo obtusiuscula depicta?

Observ. *Sarcozygium* Bunge (Linnaea XVII. pag. 7) genus mongholicum, nimis fortasse *Roeperae* affine, characteribus bene ponderatis, unice squamulis filamenta intus stipantibus differre videtur.

ZYGOPHYLLUM Linn. Endl. gen. n. 6036. Meisn. gen. pag. 59. (43.)

Sectio Carinaria Miq. Squamula cum filamentis basi in unum conjuncta. *Petala* naviculari-concavata. *Flores* subracemose conferti.

1. **Zygophyllum australasicum** Miq. ramulis, foliis praesertim subtus, sepalisque minute hirtello-pubescentibus, sensim glabratis, foliis sessilibus, foliolis binis carnosiss

Noting the flowers are large
- and the fruit is large
- vally in the grassy
- hills. 49. 49. 49.

Pelargonium Behrianum!
Juss. Müller. ^{erectum} natantibus
subaequaliter, pulis (magnum in
pedunculo) brevissimis acutis
longioribus sparsis obtusis
foliis ovato-rhombicis lobatis
^{obtusis} serratis basi vix truncatis
induratis glaberrimis
pedunculo ^{sub}triaculati subnudo
umbellulis paucifloris, sepalis
lineari oblongis obtusis bre-
vi-mucronulatis ciliatis pe-
talis duplo brevioribus ^{jam} majoribus
stipulis plurimissimis corollae colori-
bus saturatis ab aliis Novae Hol-
landiae speciebus differt maxime
et ^{totum} character. pondus. ^{Pelargonium}
genuum rade circumscripta est
ex unico specimenis magno a cl.
colleto ad definitionem
norum communicato. Sectionem
genuis distinguere mihi (obsp.
incomplet.) non licuit.
Rar. tota Fol. 2-3" lg 1-2"
lt.
Raro in vallibus prope Lindok.
vally. Sept. 1848-49. legit
H. D. W. H.
Pelargonio Rodneyana accedit.

x Eranium pygmaeum Nees.
Corolla ^{pygmaea} et caerulea
(colore Monarda Chamaeops)
caulis plurimique erectus
et magnitudo totius plantae mire
veriat.
Rarum in graminosis coloniae
Nov. Holl. austr. Sept. 1848.

Geranium Dieffenbachii F. M.
vix differt a G. brevicaule
x W. Hooker.

anguste lanceolato-spathulatis, inferioribus plerumque obtusis, superioribus acutis, floribus subracemosis, sepalis ovatis brevi-acuminatis, pistillo albo-piloso.

Crescit in clivulis arenosis insulae Cornac, 8. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2397.

Zygophyllis plurimis capsibus e *Sect. foliis sessilibus bifoliolatis* affine, petalorum tamen forma et squama fere obsoleta tota coalita (quantum in speciminibus exsiccatis distinguere licet) a congeneribus longius recedens, ob fructum autem adhuc incognitum, tutius huic generi hodie adscribendum. „*Frutex tripedalis*“. *Rami* vetustiores lignosi, teretes, laeves. *Ramuli* juniores angulati, herbacei, appresse pubescentes. *Foliola* $1\frac{1}{2}$ -3 cent. longa, 3-8 mm. versus apicem lata, subtus praesertim hirtello-puberula sensim glabrata, succulenta. *Stipulae* membranaceae, e lata basi lanceolatae, versus apicem hirtellae. *Flores* in ramulorum apicibus racemoso-conferti, breviter pedicellati, in siccis lutei, plures quidem semiaperti, an tamen jam omnino explicati. *Sepala* 5 succulenta, basi cohaerentia, magnitudine parumper inaequalia, ovata, breviter acuminata vel acuta, concava, extus pubescentia, $1\frac{1}{2}$ -vix 2 mm. longa. *Petala* duplo vel plus longiora, obovato-elliptica, concavo-navicularia marginibus apiceque inflexis, extus glabra, intus versus basin puberula? *Stamina* 10, petalis inclusa, *antheris* oblongis, bilocularibus, rimis amplis hiantibus, *filamentis* basi e squamula concreta incrassatis. *Ovarium* in *stylum* pentagonum continuatum, utrumque albo-pilosum, *stigmatibus* 5-lobulatis lobulis connatis.

DIOSMEAE A. Juss.

(Auctore F. T. BARTLING.)

BORONIA Smith in Transact. Linn. soc. VII. 285.

Adr. Juss. in Mem. Mus. XII. pag. 482. tab. 22.

Endl. gen. n. 6004. Meisn. gen. 60. (44.)

* *foliis simplicibus.*

1. **Boronia laniflora** Bartl. caule dichotome ramoso demum subaphyllo glabro; foliis linearibus canaliculatis, superioribus abbreviatis; cymis terminalibus 3-5-floris pedunculatis; sepalis lanceolatis acuminatis pedicellisque lanatis; filamentis glabriusculis.

α **micrantha**. caule a basi dichotome ramosissimo adulto aphylo, floribus minoribus.

In turfoso-uliginosis inter frutices planitie inter montes Melville et Elphinstone (Plantaguet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2030.

β **macrantha**. caule minus ramoso, foliis diutius persistentibus, floribus majoribus.

In sublimosis hieme inundatis districtus Sussex Decbr. 1839. Herb. Preiss. No. 2037.

Suffrutex 1-2-pedalis, erectus, sordide glaucescens, caule tereti, glabro, a basi vel superne dichotome ramoso. *Rami* ultimi subcompressi, glabri vel villo mollissimo fugaci initio obtecti. *Folia* remota, erecta, crassa, obtusa, integerrima, dorso convexa, caulina inferiora sesquipollicaria, superiora, sensim minora, ramulorum perparva, lineari-lanceolata, supra villosa-lanata, dein glabrescentia, in var. α submembranacea, omnia plus minus caduca. *Cymae* erectae, bracteis duabus lanceolatis caducis suffultae. *Flores* pedicellati. *Pedicelli* albo-lanati, centrales longiores florem aequantes. *Sepala* $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, lanceolata vel (in var. β) oblongo-lanceolata, longe acuminata, extus albo-lanata, acumine recurvo subtus glabrescente, supra lanato. *Petala* sepalis duplo fere longiora, ovalia, breviter acuminata vel cuspidata, rosea, stria dorsali obscuriore obsolete pubescente, facie villo fugaci tenui adspersa. *Stamina* 8. calyce parum breviora, omnino Boroniae. *Carpidia* calycem aequantia, valde compressa, acutissime carinata, apice truncata, punctata, obsolete pubescentia.

Species valde paradoxa et habitu et florum indumento. Varietates α et β forsán species diversae, at specimina, quae perscrutari licuit, notas essentiales haud suppetunt.

2. **Boronia juncea** Bartl. glaberrima, caule erecto dichotome ramoso subaphyllo; foliis linearibus semiteretibus canaliculatis; cymis terminalibus pedunculatis multifloris; sepalis e lanceolata basi acuminato-subulatis, apicem versus sublanatis; filamentis glabriusculis.

In subarenosis exsiccatis districtus Wellington 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2036.

Simillima *B. laniflorae* var. β ultra bipedalis, superne dichotome ramosissima, ramis strictis. *Folia* inferiora desunt, superiora remotissima appressa, crassa, obtusa, 3-4 lin. longa, summa adhuc minora, lineari-subulata. *Cymae* parvae, subcompositae, circ. 7-florae. *Pedicelli* glabri, compressi, florem subaequantes. *Flores* parvi. *Sepala* extus glabra, acumine supra sublanata. *Petala* calyce paulo longiora, oblonga acuminata, glabriuscula.

A. B. laniflorae var. α nonnisi floribus minoribus extus pedicellisque glabris recedit, indeque forsán pro ejusdem speciei varietate habenda.

3. **Boronia flexuosa** Bartl. suffruticosa, trichotome ramosa, glauca, ramis ancipitibus; foliis remotis oblongo-spathulatis, summis linearibus; cymis dichotomis multifloris terminalibus axillaribusque longe pedunculatis; pedunculis hispidulo-scabris; sepalis lanceolatis acuminatis; filamentis ciliatis.

In arenosis sylvae ad fluvium Canning (Perth) et in districtu Sussex 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2024.

Radix crassa, lignosa, multiceps. *Caules* pedales et ultra, erecti, lignescentes, teretes, glabri, superne trichotome ramosi. *Rami* erecti, subfastigiati. *Folia* pauca, erecto-patula, crassa, glaberrima, obtusa, integerrima, inferiora basi longe attenuata, $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, superiora lineari-oblonga, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. longa. *Cymae* laxae bis terve dichotomae 5-9-florae, erectae, pedunculo communi teretiusculo vel compresso, erecto, scabriusculo, 2-3 poll. longo, ramis compressis, hispidulo-scabris, flexuosis. *Bractae* ovato-lanceolatae, submembranaceae, breves. *Pedicelli* semipollicares, teretiusculi, scaberrimi, purpurascetes. *Sepala* glabra, lineam longa. *Petala* calyce triplo longiora, oblonga apiculata, glabra, rubra. *Stamina* 8. subaequalia. *Antherae* pallide flavae, ellipticae, appendicula minuta obtusa.

4. **Boronia teretifolia** Lindl. suffruticosa glabra, foliis anguste linearibus convoluto-teretibus strictis; cymis termi-

* *Boronia terrathuroides*! (Andrieux, prodr.
Terrathua oppositifolia, Persoon f. n.
Ennumerationis piceae Tasm. ad pl. Musc.
Jan. 10. 1848. hb. St. H. n. 362.

Paranubius. — Specimen humile sed
erectum legit ad portum regium
et Car. Stuart. Nov. 362 hb. St.
York-towa hb. St. H. n.

* *Correa* (*Sidymeria*) *magnifica* fruct. M. L. v. 1.
Carpidia 2 pinnata, quo ligna ex Corrae differt &
pallida circit 4^m 1^m 1^m crassa fructuosa verrucosa nigr.
portulacata, ad apicem lobi glabris obtusa. *Correa* 2 pinnata
ligna rugulosa dorso convexa venter concava ad apicem lobi
Boronia pilonema Billardiere.

Sepala corollam albam! aequantia.
Fruticulus erectus vel decumbens
Spitameus vel paucipal. et. aris
plus minus ramosus

En humilis ad portum regi-
um, hb. St. H. n. 666

George-town, hb. St. H. n.

* *Sidymeria magnifica* fruct. M. L. v. 1.

Floris breviter imbelli vel univertis.
In propolis rivali Tasmant. Fructus, sili-
amplius paucipedalis.

* *B. rhomboides* Hooker!

In montibus 7-8000' altis Tasmant.
niam rare! Jan. 1849. hb. St. H. n. 365.

* *Correa Stuartiana* fruct. M. L. v. 1.

In (rostratus) nuperrimis prope Port. Vorell.
hb. St. 970. Differt a C. viride foliis ovato-
minutis fere caesecolatis indumento nullo
mucrone aduato.

Tasmanii

* *Boronia Stuartii* fruct. M. L. v. 1.

In masas copiosas lapidum
arinoformum prope montem Ta-
smant. peak juxta oram orientalem
insulae Tasmantiae Nov. 49. G. 2-3'
corolla carnea pellosius hb. St. 662.

nalibus compositis multifloris longe pedunculatis, sepalis lato-ovatis cuspidatis; filamentis hispidis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XVII.

In solo limoso lapidoso vallis Cataractae ad Caput fl. Cygnorum 26. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2023. — In limoso-calculosis (?) ad radices montis Greenmountain (Perth) 13. Sept. 1839. No. 2029.

„Suffrutex strictus. Flores rosei“.

5. **Boronia macra** Bartl. suffruticosa, glabra, caulibus simpliciusculis erectis; foliis remotis lineari-oblongis linearibusque integerrimis planis; cymis terminalibus pedunculatis: sepalis oblongo-lanceolatis acuminatis; filamentis ciliatis.

In limoso-calculosis (?) sylvae prope Mahoganycreek (Darling's-range) 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2026.

Planta sublignescens, annua fere. *Caules* e radice solitarii vel pauci, erecti, spithamaei-pedales, graciles, filiformes, teretes, apicem versus subcompressi, simplices vel superne ramis aliquot oppositis compressis erectis instructi. *Folia* internodiis breviora, erecto-patula, crassiuscula, uninervia: infima minora lineari-spathulata vel lineari-oblonga, obtusa, basi valde attenuata, superiora sensim majora, remotiora, angustiora et acutiora, summa remotissima, subpollicaria. *Cymae* solitariae, subcompositae 5-7-florae, erectae, pedunculo communi bipollicari, compressiusculo. *Flores* „rosei“ mediae magnitudinis, praeter stamina glabri. *Sepala* sesquialina. fere longa. *Petala* sepalis triplo longiora, oblonga, acutiuscula. *Stamina* 8. calycem paulo superantia. *Antherae* oblongae, pallidae, appendicula minuta.

6. **Boronia spathulata** Lindl. suffruticosa, glauca, glaberrima, ramis strictis ancipitibus; foliis remotis obovato-spathulatis, summis linearibus: cymis terminalibus trifloris pedunculatis; sepalis ovalis obtusis: filamentis basi pilosis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XVII.

In arenosis sylvae ad fl. Canning (Perth) Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 2025.

7. **Boronia chironiifolia** Bartl. fruticosa, glaberrima, foliis lineari-oblongis vel lineari-lanceolatis acutis basi attenuatis subintegerrimis; cymis terminalibus sessilibus; sepalis triangulari-ovatis; filamentis glabriusculis.

In uliginosis sylvae 17 mill. ab urbicula Albany (Plantagenet) 9. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2027.

„Frutex tripedalis“ erectus, ramosus, subglauescens. *Rami* erecti vel erecto-patuli, plerumque oppositi vel subcognesti, teretes: ramuli ultimi subangulati, ad nodos compressi. *Folia* crassa, coriacea, erecta vel erecto-patula, internodiis plerumque longiora, plana, integerrima vel majora remotissime et obsolete denticulata, uninervia, avenia, utrinque obsolete glanduloso-punctata, rugulosa, circiter pollic. longa, summa paulo minora. *Cymae* 5-7-florae. *Pedicelli* semipollicares, erecti, angulati, superne crassiores, ebracteolati, purpurascens. *Flores* praeter stamina glaberrimi, mediae magnitudinis, „pallide rosei“. *Sepala* lin. longa, acutiuscula, plana. *Petala* sepalis quadruplo longiora, ovalia. *Stamina* 8. calyce parum longiora. *Filamenta* obsolete pubescenti-ciliolata. *Antherae* pallidae, appendicula minutissima.

8. **Boronia fastigiata** Bartl. glaberrima, glauca, caule stricto superne fastigiato-ramoso; foliis obovatis denticu-

latis; cymis terminalibus compositis multifloris; sepalis ovatis acutis; filamentis ciliatis.

In locis hieme inundatis districtus Plantagenet Novembr. 1840. Herb. Preiss. No. 2028.

Caulis sesquipedalis, lignescens, erectus, teres, inferne simplex, aphyllus, superne in ramos digitales vel sesquidigitales oppositos erectos fastigiatos teretes foliatis deliquescent. *Folia* sessilia, crassiuscula, erecto patula, plana, obovata vel obovato-subrotunda, acutiuscula vel obtusa, basi brevissime attenuata, praecipue apicem versus denticulata, utrinque rugulosa, avenia, nervo glandulisque vix conspicuis, 3-4 lin. longa. *Cymae* fastigiatæ, sessiles vel breviter pedunculatae. *Rhachis* pedunculi partiales compressi. *Cymulae* pedunculatae, oppositæ, fastigiatæ trifloræ, terminalis nonnunquam 5-flora. *Bracteae* caducae. *Flores* mediae magnitudinis, pedicellati. *Pedicelli* semipollicares, subangulati, superne incrassati, ebracteolati. *Sepala* plana, purpurea, $1\frac{1}{2}$ lin. longa. *Petala* calyce duplo longiora, glaberrima, ovato-oblonga, obtusiuscula, rosea, stria dorsali purpurea. *Stamina* 8. *Filamenta* calycem aequantia. *Antherae* flavae, ovales, appendicula vix manifesta. *Carpidia* calycem aequantia valde compressa, truncata, elevato-punctata.

9. **Boronia crassipes** Bartl. fruticosa, virgato-ramosa, glabra, foliis linearibus planis serrulatis; pedunculis axillaribus binis infra medium bracteolatis, superne incrassatis angulatis; sepalis lanceolato-subulatis.

In uliginosis planitiei haud longe a monte Wuljenup (Plantagenet) 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2040.

„*Frutex* 10-12-pedalis, gracilis“ ramosissimus, ramis erectis, gracilibus virgatis, teretibus, purpureis, a basi foliatis, ramulis subtetragonis, ad nodos subcompressis. *Folia* internodio longiora, erecta, acuta, basi attenuata, minute sed regulariter serrulata, uninervia, avenia, utrinque glanduloso-punctata, 6-10 lin. longa, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata. *Pedunculi* (raro solitarii) folio duplo vel parum breviores, paulo infra medium bracteolis duabus oppositis subulatis patulo-recurvis $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longis instructi, ultra bracteolas sensim incrassati, angulati, angulis in nervos sepalorum excurrentibus. *Flores* subnutantes, mediae magnitudinis, in racemos foliatis dispositi. *Sepala* bracteolis similima 2 lin. longa, cum pedunculis purpurea. „*Petala* rosea“ calyce vix duplo longiora, elliptico-oblonga, acuta. *Stamina* 8. subaequalia, calyce parum breviora. *Filamenta* tenuia, basi subciliata. *Antherae* pallide flavae, ovales, appendicula minutissima. *Carpidia* calycem aequantia, glabra, obsolete punctata.

10. **Boronia tenuifolia** Bartl. fruticosa, glaberrima, foliis lineari-oblongis obtusis mucronulatis planis pellucido-punctatis, glandulis pellucidis crenulatis; pedunculis terminalibus unifloris solitariis ternisve; sepalis ovatis acuminatis; filamentis villosissimis.

In solo ericetorum inter frutices densos sylvae ad fluvium Canning (Perth) raro Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 2022.

„*Suffrutex* $1\frac{1}{2}$ pedalis“, potius frutex parvus. *Rami* inaequales, erectiusculi, teretes, a basi foliati; ramuli oppositi, graciles, subangulati, patuli. *Folia* internodio longiora vel rarius aequalia, patentia, membranacea, basin versus attenuata, uninervia, glandulis sparsis pellucido-punctata, serie densa glandularum pellucidarum secus marginem crenulata, 5-8 lin. longa, $1-1\frac{1}{2}$ lin. lata. *Pedunculi* folio paulo breviores, subangulati, erecti, purpurei, circa medium bracteolis duabus oppositis oblongo-lanceolatis patentibus instructi vel nudi. *Flores* erecti. *Sepala* vix lin. longa, purpurea. *Petala* quater longiora, ovalia, acutiuscula, rosea, stria lata dorsali obscuriore. *Stamina* 8.

in fl. bracteos. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845

Didymeria aculeata
Walt. non f. pub.

(1) *cordifolia* Guss. Muller in 1844, non
(1) *correa* virens Smith? L. L.
In larvis embryon. digitatus
Purpurea Ray! Oct. 1847 hb. St.
Sim. num. ~~non hanc aut Didymeria~~
Laeta retusa d. 14. Apr 1848. Simi-
lidu rufum pigras a rivulis in
madibus ad nectis Raip. stabl
petum collata fruticosa valde pro-
nolens ob folia appressa aculea
Horonias aut Correas trahenda,
nisi non generis typus = *D. magnificum*
C. virens Sm. From Lamorison. Fruit 24
Sept 15. 1848. hb. St. J. T. n. 23. -

B. rufacea Ford Muller. V. D. L! hb. St.
B. variabilis Hooker.
Vasmann. n. 38. (in simi),
caule striato ^{pub.} pubescenti, in lafo
foliis impari pinnatis ^{foliis} ~~trijugis~~
spectulata. ^{marginibus angustis} ~~marginibus~~ ^{angustis} ~~marginibus~~
apiculatis, ^{marginibus angustis} ~~marginibus~~ ^{angustis} ~~marginibus~~
dellorid folio triplo brevioribus
ad pedicellis basi brevioribus, fe-
polid triangulati ovalis ~~obtusis~~ ^{acutis}
Rauisagnum in promptu est
folia internodis longiora 8-10 6-8"
longa 2.5" lata, 9 lobata, pinnatis
pinnatis ^{pinnatis} ~~pinnatis~~ ^{pinnatis} ~~pinnatis~~
alae flavas, pinnatis 3" longi
bracteae minime pubescentes; Sepal-
vix lineares petales triplo brevior.
ovis. - 1 fl. May, 2-3! hb. St. n.
382. Jan. 1849. Puffin bay ad regnum.
non hb. St. 641. - 2! Nov 49.

B. praeox Ford Muller.
1 Sept. South Isk river, Tarn. hb. St.
II n. 1. Oct 20. 1848. fr. 5-6!
B. Hartii Ford Muller. (*B. variabilis* Hooker)
In montibus occidentales Tarn. hb.
II n. 337. fr. 1-2 Jan 21. 1849. ^{grasses}

calyce paulo longiora. *Filamenta* villosissima, lanata fere. *Carpidia* calycem vix superantia, glabra.

Maxime affinis *Bor. vimineae* Lindl.

11. ***Boronia crenulata* Smith.** fruticosa, glabra, foliis obovatis mucronulatis crenulatis; pedunculis axillaribus terminalibusque subsolitariis unifloris; sepalis ovatis acuminatis; filamentis villosis ciliatis apice glandulosis. — Smith. in Transact. Linn. soc. VIII. pag. 284. DC. prodr. I. pag. 721.

Ad Stirling's-Terrace solo turfoso-arenoso (Plantagenet) 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2010.

**** *foliis impari-pinnatis.***

12. ***Boronia crassifolia* Bartl.** foliis subsessilibus glaberrimis; foliolis bi- trijugis lineari-spathulatis integerrimis obtusis crassis; pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus medio bracteolatis; sepalis subrotundo-ovatis; filamentis alternis sterilibus.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2033.

Fruticulus spithamaeus, gracilis, ramosus, flexuosus, ramis teretiusculis, filiformibus, tenuissime pubescentibus, purpureis. *Folia* internodiis paulo breviora vel eadem aequantia, patentia, brevissime petiolata, foliolis parum distantibus, planis, enervibus, punctato-rugosis, inferioribus paulo longioribus, semipoll. longis, terminali sessili, costae articulis submarginatis, 1-1½ lin. longis. *Pedunculi* 2-4 lin. longi, filiformes, subangulati, purpurei, medio bracteolis duabus oppositis oblongis glabris instructi, ultra bracteolas incrassati. *Sepala* glaberrima, obtusissima, lineam longa. *Petala* calyce triplo longiora, ovalia, obtusa, rubra, ad lentem tenuissime ciliata, quatuor fertilia, apice subulata, antheris cordato-ovatis, pallide flavis, minute appendiculatis, quatuor sepalis opposita sterilia, fertilibus paulo breviora, apice glanduloso-capitata. *Germen* glabrum.

13. ***Boronia alata* Smith.** foliorum rhachi nervisque subtus pilosiusculis; foliolis subquinquejugis crenatis margine revolutis; pedunculis axillaribus dichotomis; bracteolis ciliatis. — Smith. in Transact. Linn. soc. VIII. pag. 283. DC. prodr. I. pag. 721. Sweet. fl. australas. tab. 48.

In rupibus calcareis ad Rocky Bay (Perth) et in insula Rotenest 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2012.

„Frutex tripedalis. Flores rosei, nauseosi“.

14. ***Boronia stricta* Bartl.** caule simplici piloso; foliis sessilibus pilosiusculis, foliolis 3-4-jugis angustissime lineari-bus subtus convexis; pedunculis axillaribus solitariis geminisque folio multiplo brevioribus basi bracteolatis; sepalis lanceolato-subulatis.

In solo turfoso inter frutices densos planitie inter montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2031.

Radix verticalis, parce ramosa. *Caulis* erectus, strictus, simplicissimus vel ramo uno alterove superne instructus, 1-2-pedalis, lignosus, teres, in-

ferne nudus ac glaber, superne pilis mollibus albidis patentibus dense obsitus denseque foliatus. *Folia* internodiis longiora, erecta vel patulo-incurva, demum glabrescentia, foliolis approximatis, incurvis, acutiusculis vel obtusis, integerrimis, inferne attenuatis, concavo-canaliculatis, inferioribus longioribus 6-8 lin. longis, costae articulis submarginatis, circiter lin. longis. *Pedunculi* pilosissimi, 1-1½ lin. longi, ima basi bracteolis duabus lanceolato-subulatis margine inferne membranaceis muniti. *Calyx* pilosus, sepalis alabastrum ovatum supereminentibus, 2 lin. longis. *Petala* 2½ lin. longa, ovalia, breviter cuspidata, velutino-puberula, „rosea“ stria dorsali lata purpurea pilosiuscula. *Stamina* 8, omnia fertilia, calyce breviora. *Filamenta* glabra, apice glanduloso-incrassata. *Antherae* denticulo sub apice insertae cordato-ovatae, pallide flavae, appendicula satis manifesta albida. *Carpidia* calycem subaequantia, lato-elliptica, rotundato-obtusissima, glabra.

15. **Boronia elatior** Bartl. ramosa, foliis ramisque pilosis; foliolis 2-5-jugis linearibus acutis planis; pedunculis axillaribus solitariis medio bracteolatis; sepalis subrotundo-ovatis acuminato-cuspidatis; filamentis alternis sterilibus.

In humoso-arenosis humidis inter frutices densos vallis jugi montium Darling's range (Perth) Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 2013.

„*Frutex* 4-6-pedalis, erectus“ ramosissimus, ramis gracilibus, teretibus, ex adscendente basi erecto-patulis, molliter albedo-pilosis, a basi foliatis. *Folia* brevissime petiolata, internodiis longiora, erecto-patula, ¾-1½ poll. longa, pilis mollibus undique adspersa, pleraque 4-5-juga, summa 2-3-juga, jugis parum distantibus: foliola uninervia, integerrima, glanduloso-rugulosa, terminale reliquis longius, 6-8 lin. longum: costae articuli 1-1½ lin. longi, submarginati. *Pedunculi* uniflori, graciles, laxi, folio vix duplo breviores, piloso-villosi, medio bracteolis duabus oppositis lanceolatis subrecurvis instructi. *Calyx* glaber, glanduloso-punctatus, sepalis tenuissime pubescenti-ciliatis, saepissime purpureis, vix 1½ lin. longis. *Petala* ovata, sub apice cuspidato-mucronata, glabra, purpurea; calyce duplo fere longiora. *Filamenta* brevissima glabra, quatuor fertilia sepalis (nec petalis) opposita, antheris cordato-ovatis, appendicula acutiuscula, quatuor petalis opposita sterilia, antherae rudimento parvo glanduliformi.

Species pulcherrima filamentorum sterilium situ valde singularis.

CYANOTHAMNUS Lindl. Swan-River Bot.

pag. XVIII. Endlich. gen. n. 6005.

1. **Cyanothamnus anethifolius** Bartl. caule lignescente a basi ramoso; foliis ternatis biternatisque; foliolis filiformibus; floribus solitariis axillaribus; filamentis basi ciliatis, superne glandulosis; antherarum appendice erecto plana ipsis pluries breviora.

In solo arenoso prope Spitesbrook ad fluvium Canning 14. Jul. 1841. Herb. Preiss. No. 2035.

„*Fruticulus* pedalis“ glaberrimus. *Radix* lignosa, verticalis, flexuosa, parce ramosa. *Caulis* erectus: rami oppositi, graciles, adscendenti-erecti, subfastigiati, inferne teretes, superne quadranguli vel compressiusculi, a basi foliati, ramulosi. *Folia* opposita, internodiis longiora, patula, ternata vel biternata, pleraque ternata, foliolis lateralibus simplicibus, intermedio ternato, foliolis 4-8 lin. longis, obtusiusculis, integerrimis, glanduloso-punctatis, supra canaliculatis. *Petioles* 2-3 lin. longi, filiformes, canaliculati. *Pedunculi* sparsi, solitarii, uniflori, petiolo breviores, bracteolis duabus minutis suboppositis

obtusis instructi. *Calyx* semilin. longus, glanduloso-punctatus, 4-partitus, lacinii ovatis, obtusis. *Petala* calyce triplo fere longiora „cyanea“ glabra glanduloso-punctata, ovata, obtusa, apice demum recurva, per aestivationem imbricata. *Stamina* 8. calycem vix superantia, subaequalia, erecta: *antherae* parvae, fuscae, erectae, basifixae, ovales, appendice minuta albida. *Germen* glabrum. *Stylus* cylindraceus, stamina aequans. *Stigma* breviter quadrifidum, lobis subcylindraceis, obtusis. *Carpidia* 4 petalis persistentibus duplo longiora, divergentia, glanduloso-punctata, transversim venulosa, lenticulari-compressa, oblique lato-elliptica, margine exteriori recto, interiori arcuato, apice rotundato-obtusissima.

Adn. Cyanothamni a *Boronis* proximis praeter foliorum indolem et florum colorem diversum praecipue differunt: antheris erectis, basifixis, filamentis in processum[subulatum] antheriferum haud angustatis, stylo tenui cylindraceo et stigmate quadrifido. Antherarum appendicula notam, qua a *Boronis* distinguantur, certam non praebet.

ERIOSTEMON Smith. in Transact. Linn. soc. IV. pag. 221. Adr. Juss. in Mem. Mus. XII. pag. 481. tab. 21. Meisn. gen. 60. (44.) Endl. gen. n. 6006.

1. **Eriostemon spicatum** A. Rich. foliis sparsis linearibus glanduloso-punctatis glabris; racemis terminalibus villosis-subtomentosis; pedicellis bracteatis. — A. Rich. sert. Astrolab. pag. 76, tab. 27. Walpers rept. I. pag. 504.

In arenosis prope oppidulum Perth. d. 22. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 2021. „Frutex pedalis, erectus“. *Bracteae* caducae. *Petala* coerulea (in specimin. exsic. expallentia) basi cuneato-attenuata, subunguiculata.

2. **Eriostemon nodiflorum** Lindl. ramulis pubescentibus; foliis linearibus obtusiusculis glandulosis glabris erectis; floribus lateralibus (terminalibusque) capitatis; bracteis linearibus margine villosis; calycibus pilosis; filamentis villosis; ovarii lobis inaequalibus cornutis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XVII. Walpers rept. pag. 504.

In subarenosis haud longe ab Eleven Miles Bridge (Plantagenet) m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2049.

„Frutex $1\frac{1}{2}$ -pedalis“. *Petala* coerulea basi albida, cuneato-attenuata, subunguiculata. Haec species cum antecedente affinisque *E. racemoso* Endl. et *E. ebracteato* Endl. propriam generis sectionem petalis coeruleis subunguiculatis insignem, vel, si mavis, proprium genus *Cyanochlamys* dicendum exhibere videtur.

PHEBALIUM Vent. Malin. 102. Adr. Juss. Mem. Mus. XII. 479. Mem. soc. h. n. II. pag. 130. Endl. gen. n. 6009. Meisn. gen. pag. 60. (44.)

1. **Phebalium anceps** DC. foliis lineari-vel oblongo-lanceolatis obtusis, junioribus utrinque lepidotis, adultis

subundis; corymbis terminalibus; staminibus corolla brevioribus. — DC. prodr. I. pag. 719. Adr. Juss. Mem. soc. hist. nat. II. pag. 9. tab. 12. f. 2.

In rupestribus scaturiginosis ad Princess Royal Harbour et ad portum Leschenault Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2011.

„Frutex 12-15-pedalis“.

2. **Phebalium rude** Bartl. foliis obovatis retusis basi in petiolum cuneato-attenuatis subtus pedunculis axillaribus unifloris alabastrisque lepidotis.

In calcareis tergi montis Baldhead 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. Nr. 2038.

„Frutex sesquipedalis“. *Rami* adsunt spithamaei, crassi, rigidi, a basi ramosissimi, cortice inaequali rimuloso. *Ramuli* adscendenti-erecti, sparsi, e petiolorum basi decurrente, tuberculato-angulati; secundarii breves, acute angulati, angulis valde prominulis, albido-lepidoti. *Folia* sparsa, densa, erecta, coriacea, plana vel concaviuscula, integerrima, apice retusa vel late emarginata vel truncata fere, angulis rotundatis, basi in petiolum canaliculatum lepidotum 1-3 lin. longum cuneato-attenuata, supra sparse lepidota, demum calva, glanduloso-punctata, subtus densius albido-lepidota, serius calvescentia, cum petiolo 4-8 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -4 lin. lata. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, petiolo paulo longiores, angulati, superne bracteolis 2 vel 3 minutis obtusis deciduis instructi. *Calyx* parvus, acute 5-dentatus, patens. „Flores albi“. *Alabastrum* globosum, suturis subtomentosis. *Petala* sesquilineam longa ovato-oblonga, obtusa, supra glabra. *Filamenta* glaberrima, lanceolato-linearia, apice subulata, petalis duplo fere breviora. *Antherae* ovals. *Germen* argenteo-lepidotum. *Carpidia* juniora e dorso cornuta.

3. **Phebalium bilobum** Bartl. foliis obcordato-bilobis basi cuneatis subtus pedunculis axillaribus unifloris alabastrisque lepidotis.

In rupestribus plantae collium Konkoberuphills (Kent) 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2039.

„Frutex bipedalis“ *Ph. rudi* simillimus sed omnibus partibus minor. *Rami* sesquidigitales, teretes, dense cicatrisati indeque exasperati. *Ramuli* breves, patuli, superne conferti, irregulariter angulati, lepidoto-canescens. *Folia* densa, obcordato-biloba, sinu acuto, lobis rotundatis, uninervia, avenia, supra parce subtus densius albido-lepidota, demum calvescentia, 3-6 lin. longa et aequae lata. *Pedunculi* folio duplo triploque breviores, angulati, bracteolis duabus denticuliformibus prope florem. *Calyx* parvus, sinuato-5-dentatus. *Petala* lin. longa, ovato-oblonga, obtusa, supra glabra, per aestivationem valvata. *Carpidia* valde compressa, oblique truncata, angulo dorsali protracto.

CHORILAENA Endl. gen. n. 6010.

1. **Chorilaena quercifolia** Endl. in Hügel. Enumerat. pag. 17.

In colliculo arenoso inter frutices vix penetrabiles prope Baldhead Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2043.

„Frutex 8-pedalis“.

P. Billardieri & *Sin. juncum*,
In insula V.L.D. hb St. Tamm.
n. 35. Diffingo a planta nova-
Hollandiensi *P. quiniflorum*
pne. Willd. peragrabat. folio 8 l.
Prope Lamerton, Oct. 20. 1848.
hb. St. t n. 2. — 7-10'. Spuriissima
inter n. 35 & 119, callutionis priores
intermedia, itaque aculeas fereas
P. montanum. *f. h. d. r. p. m. c. s. o.*
In insula V.L.D. and hb St. i. 119.
Folia opposita videtur *P. elacagni*
folio, tamen nigrescit.

[illegible]

Boronia coerulescens Forst. Muller.

Cyanothamnus boroniaceus

Forst. Mull. — Petala extus corollae
limbo. in planta viva vidi et intus emissa
stamina & stylo longiora alba
velata & granulata breviora. An-
therae latius infiriori exteriori fila-
menti infirioris nervae cum apice
albo. Oculi & folia noduoso glan-
dulosa. Odor graveolens!
Frutex 2-3' in fruticulis Muri-
ci struit vapus Mellingian.
1848 videtur a C. tenui di-

ffinita Lindley.

Boronia (Cyanothamnus) pubescens Forst. Mull. in prodr. spec. ^{Guadalup. bag.}

x *C. unguiculata* Forst. ^{Guadalup. bag.}

^{Impus globosus tot. oblongatus pinnatus & 9 unguiculatus}
filicea ^{pl. N. S. II n. 65 & 379} In filici-
lata ^{prope Lammington, F.D.L. Oct. Nov.}
anguiculata 848. Fr. 1-2'
harce ^{descriptioem desidero} Loris arenosis
pilosa ^{Guadalup. brevifolia} ^{appropinquata} ^{pl. N. 694.}

Eriophorum Stuartii Forst. Mull.

^{virgata} ^{prodr. Hobart-town, ab St. 794}
^{filicibus} ^{pl. N. 694.} ^{appropinquata} ^{pl. N. 694.}

Croton ^{pl. N. 694.}

In nemore Pine forest humum
cavari vapus. Jan 49. hb. Muri-
Forst. E. granuliferi var. laevius
in hac duae species ad E. gravi-
tem vel brevifolium revocandas
sunt? — Filicibus pilosa prope affi-
nata.

Hillebrandia conf. pag. 178.

Correa (Didymia) aemula Forst. Mull.

Guadalup. bag, conf. pag. 169.

Hic traho pl. Martianana nec
Schriberiana ab pinnatis & filicibus
nec aff. filicibus non lictari
lanceolatis et calycibus trian-
gularibus definitione Edg. diffundit
Forst. (Didym.) magnifica pag. 16 &
facile foliis majoribus rep. dentatis
floribus rebus hinc brevius prodr.
latis, pinnatis namq. parvis facile
dignoscitur.

conf. p. 141.

mayis diffundit

DIPLOLAENA R. Brown in Flinders voy. II. pag. 546. Desf. Mem. Mus. III. pag. 449. Adr. Juss. Mem. Mus. XII. pag. 479. Meisn. gen. pag. 60. (44.) Endl. gen. n. 6011.

1. **Diplolaena Dampieri** Desf. foliis obovato-oblongis ellipticisve apice subemarginatis supra viridibus, subtus incanis; involucri foliolis exterioribus lanceolatis herbaceis. — Desf. Mem. Mus. III. pag. 450. tab. 20. Bot. reg. 1841. n. 64.

In confragosis jugi montium Darling's range 27. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2042.

Specimen iconi in Bot. reg. editae simillimum. — *Folia* supra haud glabra, sed punctis elevatis pilos minutissimos stellatos gerentibus scabriuscula, apice emarginata vel rotundato-obtusissima.

2. **Diplolaena salicifolia** Bartl. foliis lineari-oblongis vel anguste oblongo-obovatis obtusissimis basi longe attenuatis, supra glabriusculis, subtus albido-tomentosis; involucri foliolis exterioribus subovatis brevioribus.

α revoluta. foliis lineari-oblongis margine revolutis; foliolis involucri exterioribus lato-ovatis subherbaceis.

β cuneata. foliis anguste oblongo-obovatis margine planis; foliolis involucri exterioribus ovato-lanceolatis subcoloratis.

In calcareo arenosis ad fluvium Cygnorum prope Freemantle, Woodman's point et in insula Rotenest 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2020.

„*Frutex* 5-pedalis, pulcherrimus“. *Ramuli* sparsi, patuli, tomento stellato incani, demum glabrescentes. *Folia* erecto-patula, 1-2 poll. longa, lineari-oblonga, lineari-vel oblongo-lanceolata, anguste oblonga vel anguste oblongo-obovata, rotundato-obtusissima vel refusa, basi longe attenuata in petiolum 2-3 lin. longum incano-tomentosum, margine revoluta vel in var. *β* plana, supra glabra et glandulis minutis impresso-punctata, juniora interdum pilis nonnullis stellatis vage adspersa, subtus dense albido- (novella rufo) tomentosa, tomento e fasciculis pilorum stellatis composito. *Capitula* majora quam *D. Dampieri*, *D. grandiflorae* (ex ic. Desf.) fere, nutantia, pedunculo semipollicari rufescenti-tomentoso insidentia. *Involucri* foliola exteriora 5 basi in discum diam. 4 lin. connata, explanata, ovalia vel ovato-oblonga, obtusiuscula, sordide rubescentia (ex sic.) basin versus obscure virentia vel tota colorata, interiora duplo fere longiora, oblongo-linearia, rubella: omnia tomentosa. *Carpidia* 2 lin. longa, glabra, transverse venoso-rugosa, subtruncata, angulo apicis dorsali rotundato.

3. **Diplolaena microcephala** Bartl. foliis obovatis vel oblongo-obovatis obtusissimis basi cuneatis, supra tenuiter, subtus dense tomentosis; involucri foliolis exterioribus lanceolatis interiora subaequantibus.

In littore rupestri arenoso inter frutices densos promontorii Cape Riche 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2019, nec non in montosis glareosis sterilibus districtus Grantham m. Mart. 1841. No. 2018.

„*Frutex* 1½ pedalis, (No. 2018.) vel 3-pedalis (No. 2019.)“ ramosissimus, ramis ramulisque sparsis, patentibus, teretibus, junioribus dense rufo-tomentosis. *Folia* circiter semipollicem longa, patentia, saepe complicata, margine plana, in petiolum 1-1½ lin. longum cuneato-attenuata, subtus cum petiolo tomento denso albido-rufo vestita, supra parcius tomentosa, obscure viridia. *Capitula* in ramulis terminalia, solitaria, breviter pedunculata, subnutantia, multo minora quam congenerum, virginea globosa, pisum minus magnitudine vix aequantia. *Foliola* involucri aequilonga, 5 exteriora lanceolata, acuta, subherbacea, subtus fulvescenti-tomentosa, interiora lineari-lanceolata, obtusa, colorata, rosea (ex sicc.).

EUPHORBIACEAE Juss.

(Auctore J. F. KLOTZSCH.)

Tribus EUPHORBIEAE Bartling. Endlicher gen. pl.
pag. 1108.

EUPHORBIA Linn. Endl. gen. pl. n. 5766.

1. **Euphorbia paucifolia** Kl. suffruticosa, erecta, caule tereti, glabro, leviter sulcato; ramis inferioribus verticillatis, quaternis aut senis apice foliiferis, superioribus oppositis, floriferis; foliis oppositis, exstipulatis, linearibus, integerrimis, glabris, basi attenuatis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus; capsula subglobosa, glabra, calyce sexfido, persistente instructa.

In depressis madidis umbrosisque ad fluvium Canning prope praedium rusticum Maddington (Perth) 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1208.

„*Frutex* 12-16-pedalis, gracilis, lactescens, ramis pendulis“. *Caulis* cylindricus, glaber, inferne lignosus, pallide-fuscus, nitidus, superne ramisque herbaceus, leviter sulcatus. Internodia ad caulem 3-4 unc., ad ramos 2-3 unc. longa. *Folia* opposita, exstipulata, linearia, glabra, obtusa, versus basin attenuata, integerrima, 1-1½ lin. lata, 10-14 lin. longa. *Flores*, axillares solitarii, subsessiles. *Involucrum* semiglobosum, glabrum antherisque purpureum, tridentatum, glandulis tribus sessilibus, patelliformibus instructum, basi bracteis squamiformibus, scariosis, atrofuscis, brevibus, imbricatis vestitum. *Ovarium* subglobosum, trigonum, pedicellatum, nutans, glabrum, calyce persistente, obtuso, sexfido, margine scarioso instructum. *Styli* tres, breves, erecti, bifidi, atro-purpurei.

2. **Euphorbia Peplus** L. Sp. pl. pag. 653. Roeper Enum. Euphorb. pag. 67. n. 25.

In cultis insulae Rotenest. Probabiliter advecta. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1207.

Tribus CROTONEAE Blume. Endl. gen. pl. pag. 1113.

TRACHYCARYON*) Kl. (Crotonis species Lab. Adrianae species Endl.)

Flores dioici. *Masc. Calyx* quadripartitus: laciniis aequalibus, aestivatione valvatis. *Corolla* et glandula nulla. *Stamina* creberrima, receptaculo conico nudo inserta; *filamentis* brevibus, aestivatione erectis, liberis; *antherarum* loculis longis, linearibus, connectivo apice in ligulam viscoso-subpellucidam producto, utrinque adnatis. *Fem. Calyx* quadripartitus, subregularis. *Corollae* petala 4, lanceolata, calycina, inaequilonga. *Germen* sessile, trioculare. *Ovula* in loculis solitaria, pendula. *Styli* 3, profunde bifidi, verrucosi. *Capsula* verrucosa, tricoeca: coccis bivalvibus, monospermis. *Semina* carunculata.

Frutex Novae Hollandiae, ramis glabris, teretibus, apicem versus digonis, angulis sub nervo medio foliorum enatis, foliis oppositis, sessilibus, trinerviis, subtrapeziformibus, coriaceis, grosse dentato-serratis, utrinque glabris, basi biglandulosis: floribus masculis interrupte spicatis: spicis axillaribus terminalibusque, bracteatis: bracteis magnis, sessilibus, distantibus, multifloris: floribus femineis in apice ramulorum axillaribus, subracemosis, bractea oblonga stipatis.

1. **Trachycaryon Labillardierei** Kl. *Croton* quadripartitum Labillard. Nov. Holland. II. pag. 73. t. 233.

In arenosis inter frutices densos secundum fluvium Cygnorum haud longe ab urbicula Freemantle Dec. Herb. Preiss. No. 1206.

CALYPTROSTIGMA**) Kl. (Crotonis spec. Labill. Adrianae spec. Endl.)

Flores dioici. *Masc. Calyx* profunde quinquefidus: laciniis inaequalibus, aestivatione imbricatis. *Corolla* et glandula nulla. *Stamina* creberrima, receptaculo convexo nudo inserta; *filamentis* brevibus, aestivatione erectis, liberis, *antheris* brevibus, lateralibus. *Fem. Calyx* profunde quinquefidus: laciniis inaequalibus, aestivatione imbricatis. *Corolla* nulla. *Germen* tri-quadriloculare, sessile. *Ovula* in loculis solitaria, pendula. *Stigma* calyptraeforme, subintegrum, sessile. *Capsula* tricoeca, laevis: coccis monospermis, bivalvibus. *Semina* castanea, carunculata.

Frutices Novae Hollandiae, ramulis triquetris: angulis sub petiolis foliorum enatis; foliis alternis, oblongis aut linearibus, eglandulosis; racemis axillaribus paucifloris; floribus ebracteatis.

*) Nomen e vocibus *τραχὺς* et *κάρυον* compositum.

**) Nomen e vocibus *καλύπτρα* et *στόμα* compositum.

Beyeria viroja Muquíl.

1. **Calyptrostigma viscosum** Kl. ramulis triquetris, glabris, viscosis; foliis oblongo-spathulatis, utrinque glabris, supra nitidis, viscosis, subtus ferrugineis, basi attenuatis; capsulis nitidis, viscosis, trigonis; pedicellis longis, sursum incrassatis.

Croton viscosum Labillard. Nov. Holl. II. pag. 72, t. 222.
Hb. Willd. n. 17848 fol. 2.

Creseit in colliculosis arenosis insulae Rotenest 19. August 1839, Herb. Preiss. No. 2387 *).

AMPEREA ADR. JUSS. ENDL. GEN. PL. N. 5813.

1. **Amperea rosmarinifolia** Kl. decumbens, ramosissima, glabra; ramulis longissimis, compresso-triangularibus, striatis, glabris; foliis alternis, linearibus, acuminatis, glabris, margine revolutis; floribus monoicis, axillaribus, fasciculatis: masculis quadrifidis.

In solo turfoso-arenoso inter frutices clivuli prope urbiculam Albany (Plantagenet) 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1225.

Frutex decumbens 3-4-pedalis, ramosissimus. *Rami* teretiusculi, fusco-cinerei. *Ramuli* confertissimi, pedem longi, virgati, subcompresso-trigoni, leviter striati, glabri, lineam fere crassi. *Folia* alterna, linearia, acuminata, distantia, erecta, margine reflexa, subtus longitudinaliter sulcata, basi bistipulata, glauco-viridia, 6-8 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Petioti* glabri, compressi, lineam longi, deorsum attenuati. *Stipulae* lanceolato-lineares, acutae, remote-dentatae, fusco-purpureae, $1\frac{1}{2}$ lin. longae. *Flores* monoici, axillares, fasciculati, brevipedicellati, bracteis ovatis, carinatis suffulti, masculi et feminei intermixti. *Masc.* *Calyx* quadrifidus, campanulatus, tubo brevi, luteo, laciniis recurvis, ovatis, azureis, aestivatione valvatis. *Corolla* nulla. *Stamina* 8, lutea; filamentis filiformibus, ima basi coalitis, quatuor exterioribus brevioribus; antherarum loculis ovatis, distinctis, ex apice connectivi granuliformis, pendulis. *Fem.* *Calyx* profunde quinquefidus, laciniis lanceolatis, acutis, carinatis, erectis, aestivatione valvatis. *Ovarium* oblongum, triangulare, glabrum, triloculare: loculis uniovulatis: ovulis pendulis. *Stylus* brevissimus; stigmata 3, erecta, bifida, patentia: laciniis puberulis subulatis.

MONOTAXIS BRONG. ENDL. GEN. PL. N. 5833.

occidentalis Endl.

1. **Monotaxis cuneifolia** Kl. suffruticosa, ramis filiformibus, glabris, leviter sulcatis; foliis oblongis, acutis, versus basin attenuatis, glabris, integerrimis, lacte-viridibus, aut

*) Species duas sequentes in Herbariis Lindley et Willdenovii observavimus. **Calyptrostigma ledifolium** Kl. ramulis incano-subtomentosis; foliis anguste-linearibus, apice truncatis, margine revolutis, supra pallide-viridibus, subtus incanis; capsulis subglobosis; pedicellis brevibus. Hab. in Nova Hollandia. Drummond. **Calyptrostigma oblongifolium** Kl. ramulis triquetris, flavo-virescentibus, subtomentosis, foliis oblongis, obtusis aut brevissime acutis, supra saturate viridibus, nitidis, subtus incanis; pedicellis brevibus. *Croton viscosum* Hb. Willd. n. 17848 fol. 1 et 17849 fol. 1 et 2. Hab. in Nova Hollandia Labillardier. R. Cunningham.

Canocletum Ford Mill.
oblongatum Klotzsch!

In insula Van Diemens Land. Hb. L. 149
May 1843. Turt. Communicatum Jan.
nom. Croton virgatum. Laxis adis umbrosis
commune. Nov. 48. Hb. St. J. n. 41, 42.
10-12' alt.

Cedrolium Klotzsch! Hb. L. n. 91.

^{Aninus}
In insula Van Diemens Land. Hb. L. n. 149
May 1843. Turt. Communicatum Jan.
nom. Croton virgatum. Laxis adis umbrosis
commune. Nov. 48. Hb. St. J. n. 41, 42.
10-12' alt.

Calyptrologium Klotzsch! Hb. L. n. 91.
In insula Van Diemens Land. Hb. L. n. 149
May 1843. Turt. Communicatum Jan.
nom. Croton virgatum. Laxis adis umbrosis
commune. Nov. 48. Hb. St. J. n. 41, 42.
10-12' alt.

Enfytibus arcuosis Fries
Trivoli - Bay. Capsula viridi
in folia. fruticulus pro
cumbens ramis ad 1-2' altitudi
nem adformantibus
auth. a. d. l. a. d.

Imperea! runcifolia Ford Mill.

Thesium australe & Antho-
liotes tricuspidatus Hb. Mart!
In Nova Holl. austr. orientali
prope stat. vt. Van Sittart
et Tarnanai in fivis silva.
Laxis iuxta plurimum Murog.
Hb. St. J. 68, II, 339, 360.

Romneya speciosa ad insulam
clivum domus diagenes suspensi
veridici quae, quae fortasse jam
hinc, copiam praebent Klotzsch!
acutulae, runcifolia, habitus
erecti, floribus dicinis nec
runciformibus ab r. novae hollae discri-

Tribulus Myrtis R. Br. t. 1. 69.
lanatus, foliis 8-10-jugis, frutic. internodis
hilis spinis pubulatis longitudine inaequalibus.
Rebus: majoribus sparsis corvi longitudine
purgantibus

In collinis aruensis latit. 26°

{ non *Calothamnus* Gaub. & Nath = *Calothamnus* R. Br.
Calothamnus! (n. 9.) fide Mueller

Genus virginale novum *Monotaxis*
proximum sed antheris vilamentosis
in columnam ^{longitudinis} ~~longitudinis~~ distinguendum
ab *Calothamnus* ^{longitudinis} ~~longitudinis~~ ^{longitudinis} ~~longitudinis~~ ^{longitudinis} ~~longitudinis~~
novum clare exponendum.

Al. microphylla fide Mueller.

In linguis orariis inter finem
Guethian Bay & lacum Alberti.

Nath. v. 1. Facie fere *Eurychorda*

Psychophylla seu *Psychichia brevifolia*
ad apicem pinus *peniculi* prope Portum Virie cor-
salis & ad Portum Gault hinc St. Murat. In
his signis diffusus

Eriophorum salicifolium Smith.

x *Crocea angustifolia* fide M.

foliis lanceolato-linearibus,
canaliculis calycibusque puberulis

In insula Van Diemens Land
parti australi, prope Hobart
hb. St. 807.

x *Phabalium capitatum* fide M.

In Wall. (Portus australis
orientalis) hb. St. 826.

P. phylloidi cognatum
jam caulebus raris puberulis
serutibus non hirsutis discre-
minandum.

x *Eriophorum microphyllum*, R. Br. t. 1. 69.

ramulis stellatis puberulis, ramis asperis, foliis imbricatis
obtusis, peltatis, ovatis, vel. pinnatis. orbiculatis asperis
ramis roratis glandulosis, pinnatis, brevibus, petiolis
max. glaberrimis, floribus & bracteis glandulosis, calycibus
lobis imbricatis glaberrimis, bracteis glandulosis, filamentis
glabris corollam aequantibus sensim attenuatis, style glabro
in sinum st. praesenti hilum supra. Lat. brev. fl. glab.

obovatis, acutis; floribus aggregatis, in apice ramulorum axillaribus: masc. pedicellatis, fem. sessilibus; stigmatis lobis subulatis, integerrimis, apice incurvis.

In arenosis umbrosis inter frutices silvae cis urbiculum Guildford (Perth) 14. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1222.

Caulis suffruticosus, basi pennae anatinae crassitie, statim supra radicem subsimplicem fusiformem cinereo-fuscam solutus in ramos plurimos, 5-6 pollices longos, graciles, flaccidiusculos, simplicissimos vel interdum ramulo auctos, e basi procumbente adscendentes, subfastigiatos, leviter sulcatos, glaberrimos, pallide-virescentes. *Folia* alterna, oblonga, acuta, integerrima, glabra, pallide-viridia, brevi-pedicellata, margine subrecurva, 4-5 lin. longa, infra apicem $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, versus basin attenuata, superiora densa, inferiora remota; nervo medio subtus prominulo; basi utrinque stipula subulata minima aucta. *Flores* in apice ramulorum axillares, dense aggregati, bracteis minimis suffulti. *Masc.* confertissimi, pedicellati; *Calyx* campanulatus, quadrifidus, albidus, laciniis ovato-lanceolatis, acutis, in aestivatione imbricatis. *Petala* 4, ovata, acuta, basi brevi-unguiculata, albidia, laciniis calycis alterna. *Stamina* 8; quatuor petalis opposita, iisdem paullo longiora, praecociora, patentia; antherarum connectivo dilatato, hippocrepiformibicuri, deorsum arcuato; utroque crure antherae loculum introrsum longitudinaliter apertum gerente; cruribus connectivi in alabastro filamento adpressis antherisque ejusdem latera spectantibus. *Stamina* 4, petalis alterna, serius evoluta, primum brevissima, tandem reliqua aequantia, erecto-conniventia, antherarum connectivo parum dilatato, loculis discretis, utrinque e connectivi apice pendulis. *Flos femineus* centralis, solitarius, sessilis. *Calyx* quinquefidus: laciniis lanceolatis, erectis. *Ovarium* oblongum, obtuse-trigonum, glabrum, calyce duplo fere longius, triloculare: loculis uniovulatis, ovulis angulo interiori loculorum prope apicem appensis. *Stigmata* 3, bifida: lobis subulatis, apice incurvis, purpureis.

grandiflora Endl.

2. **Monotaxis** ~~*ericoides*~~ *kl.* fruticosa, ramis tenuibus, glabris, versus apicem divisis; foliis subulatis, mucronatis, margine revolutis, glaucis; floribus pedicellatis, aggregatis, in apice ramulorum axillaribus, masculis pentameris, femineis hexameris; stigmatis lobis eleganter fimbriatis, patentibus.

In colliculosis arenosis inter frutices prope urbiculum Perth 19. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1218.

Frutex dodrantalis, facie *Ericae carnea*. *Caulis* cinereo-fuscus, pennae anserinae crassitie, supra basin solutus in ramos plurimos, graciles, apice divisos, glabros, fusco-cinereos. *Folia* sparsa, erecto-incurva, lineari-filiformia, mucronata, margine revoluta, glauca, 5-8 lin. longa, basi utrinque stipula setacea fusca aucta. *Umbella* 8-12 flora, in summitate ramorum ad florem centalem femineum redacta, axillaris, basi stipulis setaceis, purpureis cincta. *Masc.* *Calyx* campanulatus, quinquefidus, amoene purpureus: laciniis lanceolatis, acuminatis. *Petala* quinque, ovato-oblonga, obtusa, albidia, calyce dimidio longiora, basi hastata. *Squamae* 5, breves, crassiusculae, truncatae, calycis laciniis oppositae. *Stamina* 10, omnia fertilia; filamenta filiformia, exserta; antherarum connectivo ut in congeneribus hippocrepiformi, loculis globosis crura terminantibus. *Pedicelli* filiformes, glabri, 2 lin. longi. *Fem.* *Calyx* hexaphyllus, brevi-pedicellatus, foliolis albidis, ovatis, acutis, carinatis, glabris, aestivatione imbricatis. *Petala* 6, oblonga, obtusa, basi attenuata, sed non appendiculata, calyce dimidio longiora, albidia. *Discus* hypogynus, sexradiatus: radiis crassiusculis, brevibus, spatulatis, apice purpureis, truncatis, sepalis oppositis. *Ovarium* globosum, glabrum, obtuse-trigonum, triloculare: loculis uniovulatis: ovulis pendulis. *Stigmata* 3, profunde bifida, fimbriata, patentia, purpurascencia.

Tribus PSEUDO-ANDROGYNI. Ovarii loculi uniovulati. Stamina sub ovarii rudimento sessili inserta. Flores axillares, solitarii.

.LOPADOCALYX*) Kl. = *Olaux* Br.

Flores monoici. *Masc.* Calyx parvus, patelliformis, integerrimus. *Corolla* profunde quinquepartita, erecta, aestivatione valvata, laciniis intus ad basin appendice filamentosa instructis. *Stamina* 3; filamentis subulatis, erectis, basi corollae insertis; *antheris* lateralibus, brevibus, ovatis, introrsis. *Ovarii* rudimentum lageniformi-trigonum, apice brevissime trifidum. *Fem.* Calyx parvus, patelliformis, integerrimus. *Corolla* nulla. *Ovarium* disco carnosio orbiculari impositum, triloculare: loculis uniovulatis. *Stylus* brevis, ovarii continuus; *stigmata* 3, brevissima, obtusa. *Fructus*

Frutices Novae Hollandiae ramosi, foliis alternis, sessilibus, subcoriaceis, glabris; floribus axillaribus, solitariis, ebracteatis, masculis cum femineis mixtis. *Olaux Phyllanthi* R. Br.

1. **Lopadocalyx phyllanthoides** Kl. ramis distichis, glaberrimis; foliis late oblongis, subcordatis, sessilibus, integerrimis, apice emarginato-apiculatis; pedicellis sursum incrassatis, glabris, brevibus calycibusque pallide-luteis; corollae appendicibus subulatis, staminum longitudine.

In rupestribus circa urbem Albany (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1211.

Caulis 4-5 pedalis, fruticosus, livido-fuscus, leviter striatus, ramosus. *Rami* teretiusculi, graciles, distichi, versus apicem ramulosi. *Folia* alterna, erecta, sessilia, lato-elliptica, subcoriacea, glabra, opaca, sordide-glaucoviridia, basi subcordata, apice emarginato-apiculata, 1-6 lin. longa, 3-4 lin. lata, stipulis destituta. *Flores* in apice ramulorum axillares, solitarii, ebracteati, masculi aut feminei, brevi-pedicellati. *Masc.* Calyx patelliformis, integerrimus, patens, brevissimus, viridi-luteus, persistens. *Corolla* profunde quinquepartita, erecta, lutea: laciniis oblongis, acutis, 1½ lin. longis, basi appendice filamentosa, erecta instructis, aestivatione valvatis. *Stamina* 3, corolla duplo breviora; filamenta subulata, erecta, basi corollae inserta; *antherae* breves, obtusae, biloculares, laterales, introrsae, longitudinaliter dehiscentes. *Ovarii* rudimentum lageniforme, trigonum, apice brevissime trilobum. *Fem.* Calyx cupularis, integerrimus, luteus, brevissimus, persistens. *Corolla* nulla. *Ovarium* lageniforme, acute-trigonum, disco carnosio orbiculari impositum, triloculare: loculis uniovulatis: ovulis pendulis oblongis, utrinque attenuatis. *Stylus* brevis, ovario continuus. *Stigma* brevissime trilobum. *Olaux uliginosa* Kl.

2. **Lopadocalyx uliginosus** Kl. suffruticosus, ramis filiformibus, simplicibus, erectis; foliis alternis, sessilibus, oblongis, acutis, basi rotundatis, saturate viridibus, glabris, opacis, subtus nervo magis prominente subcarinatis.

*) Nomen e vocibus *λοπας* et *καλὺξ* compositum.

In solo turfoso-uliginoso inter frutices densos planitie inter montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1210.

Caulis suffruticosus, brevissimus, incrassatus; statim supra radicem solutus in ramos plurimos 8-11 pollices longos, graciles, simplicissimos aut interdum ramulo auctos, laeves, glaberrimos, flavido-virescentes. *Folia* alterna, erecta, oblonga, acuta, basi rotundata, sessilia, saturate-viridia, 3-4 lin. longa, 1-2 lin. lata. *Flores* in apice ramorum axillares solitarii. *Pedicelli* glabri, flavescentes, $1\frac{1}{2}$ lin. longi, deorsum attenuati. *Flores masculi* non observavi. *Flores feminei* ut in specie praecedenti.

Tribus PHYLLANTHEAE Endl. gen. pl. pag. 1119.

PHYLLANTHUS Schwartz Endl. l. c. n. 5847.

1. **Phyllanthus calycinus** Labillard. fruticosus, ramosus, foliis obovatis, apice rotundato-apiculatis, dense imbricatis; floribus in apice ramulorum axillaribus, brevi pedicellatis; calycibus maximis. — Labillard. Nov. Hollandiae plant. spec. II. pag. 75. t. 225. Hb. Willd. n. 17993.

In clivulis arenosis insulae Carnac 8. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1213.

2. **Phyllanthus Preissianus** Kl. fruticosus, ramosus, ramis sanguineis ramulisque teretibus, glabris; foliis subsessilibus oblongo-subspathulatis, brevissime acutis, erectis. membranaceis, subtus glaucescentibus; floribus axillaribus, solitariis, geminis aut rarissime trifloris, 5-6 fidis, pedicellatis: femineis majoribus, folio longioribus: masculis minoribus, in fundo calycis squamis sex, peltatis, castaneis.

Phyllanthus pulchellus Preiss. Mss. nec Endlicher.

In arenosis subumbrosis sylvae ad fluvium Cygnorum. 15. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1212.

Caulis fruticosus, ramosus, erectus, 1-2 pedalis. *Rami* teretiusculi, glabri, sanguinei, lineam crassi. *Ramuli* tenues, subcompressi-angulati, glauco-fuscescentes, subflexuosi. *Folia* subsessilia, oblongo-spathulata, brevissime-acuta, erecta, membranacea, glaberrima, supra laete-viridia, subtus glaucescentia, 6-9 lin. longa, infra apicem 2-3 lin. lata, basi utrinque stipula parva, lanceolata, acuminata, fuscescente aucta. *Flores* monoici, in apice ramulorum axillares, solitarii, bini aut terni, pedicellati, basi bracteis 2-6 lanceolatis, acuminatis, albidis cincti. *Masc. Pedicelli* filiformes, glabri, albi, 4-5 lineares. *Calyx* profunde-sexfidus, campanulatus, albidus: laciniis concavis, obtusis; stamina 3, inclusa, squamis sex, fuscis, peltatis cincta. *Fem. Pedicelli* albi, sursum incrassati, glabri, 6-8 lin. longi. *Calyx* profunde 5-6 fidus, viridi-sulfureus: laciniis oblongis, obtusis, concavis, margine albedo-diaphanis. *Ovarium* globoso-trigonum, glabrum, triloculare: loculis biovulatis: ovulis pendulis; squamis 5-6 sessilibus, carnosius cinctum. *Stigmata* 3, profunde bifida, glabra: lobis filiformibus, recurvis.

3. **Phyllanthus scaber** Kl. fruticosus, caule ramisque scabris, subangulatis; foliis subspathulatis, brevissime acutis, subcoriaceis, supra scabris, subtus opacis; floribus in apice

ramulorum axillaribus, solitariis, brevissime pedicellatis, basi bracteis 2 sessilibus, lanceolatis, fuscis, margine dentatis cinctis; calyce 6 partito, intus sexsquamoso: laciniis late linearibus, subobtusis; stigmatibus tribus, brevibus, filiformibus, recurvis, integerrimis; capsulis depresso-globosis.

In litore rupestri promontorii Cape Riche 18. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1200.

Frutex ramosus bi-pedalis. *Caule* ramisque subangulati, scabri. *Folia* alterna, spathulata, brevi acuta, dense imbricata, erecta, glaucescentia, supra scabra, subtus pallidiora, opaca, membranaceo-coriacea, 6-8 lin. longa, infra apicem 3-3½ lin. lata, margine recurva, basi utrinque stipula brevissima, subfusca aucta. *Flores* feminei in apice ramulorum axillares, solitarii, brevissime pedicellati. *Capsula* depresso-globosa, glabra; trilocularis, trilocca: coccis bivalvibus, dispermis. *Semina* reniformi-trigona, fusca, glabra. *Stigmata* 3, brevissima, filiformia, recurvata, integerrima.

STACKHOUSIACEAE R.Br.

(Auctore A. BUNGE.)

STACKHOUSIA Smith. Endl. gen. n. 5763.

Meisn. gen. pag. 336. (249.)

1. **Stackhousia pubescens** A. Rich. tota pubescens, foliis linearibus angustissimis acutis, floribus in spicam triuncialem dispositis, laciniis calycis margine dissecto-ciliatis. A. Rich. Voy. de l'Astrolabe pag. 89. t. 33.

„In calciosis ad latus occidentale montis Bakewell 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1972.

Iconem citatam non vidi, neque descriptionem novi; speciem vero nostram huc retuli ob affinitatem cum *St. Hügelii* Endl., tum vero quia nulli specierum, quae, vel e speciminibus exsiccatis, vel e descriptionibus mihi innotuere (*St. monogyna*, *spathulata*, *obtusa*, *muricata*, *nuda*, *Hügelii*, *flava*.) adnumerari potest. Ab omnibus distinguitur pubescentia, a plerisque insuper bracteis elongatis. — *Rami* praesto sunt pedales, teretes, striati, pube densa, brevi, patente, uti folia et racemus, vestiti. *Folia* sparsa, pollicem longa, linearia, acuta, carnosula (?) erecta. *Racemi* abbreviati, pollice parum longiores, ovato-oblongi, dense multiflori. *Flores* sessiles. *Bractee* lineari-subulatae, 4“ longae, ciliatae. *Bracteolae* tenuiores 2“ longae. *Calycis* tubus subglobosus, 0,5“ longus; lacinae limbi lanceolatae, ciliatae, linea paulo longiores. *Corollae* aequalis tubus 2,5“ longus, limbi lacinae oblongo-lanceolatae, 2“ longae, acutiusculae. *Stamina* longiora e fauce vix prominula. *Antherae* fere croceae. *Styli* 3 cohaerentes staminibus brevioribus. *Cocci* ?

Stachys monogyna Lab.
 Ad riv. Masen, Tasm. Jan. 1849. H.
 N. n. 346 1-2! - South Esk
 riv. h. N. J. H. n. 88. Character
 minus cl. Schlichtendal in Linnaea
 1847. In Junii frum & S. obtusum
 Lindley Pignorum vult circa
 plantis fuit! Ad urbem Adelaide
 Sept. 1848 - Wm. Gordon Kaiser
 Publ! cad. temp. spem. memorabile
 palis ex parte orasis. - Betha
 nou, Lindor-vallij itq. -

Callitriche verucalis Kleeberg
 Ad cl. South Esk riv. Tasm.
 h. N. 755.
 vult. i. T. v. Dec.

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Stachys (Linifolia) monogyna Lab.
 sub hoc nomine a Stuartio communis
 sed cl. Kunze olim ignota. ^{var. nov.} *Fl. odorati!*
 T. D. L! h. N. 113. Nov. h. N. aust. Hind
 Creek! h. N. 34. Port Philippi! h.
 Joys. sin. num. et h. N. 8. h. 7. sine aduol
 are Cori natalis. Hind Creek spem.
 Explorata Jan. 10. 1848 Dr. M.! Planta
 determinata ab nova Hallandica revere
 videtur recte brevior. Ultima exakte
 quadrat St. monogyna Lab, sed non
 Smithii ex h. N. 8. h. 7. h. 10. h. 11. h. 12. h. 13. h. 14. h. 15. h. 16. h. 17. h. 18. h. 19. h. 20. h. 21. h. 22. h. 23. h. 24. h. 25. h. 26. h. 27. h. 28. h. 29. h. 30. h. 31. h. 32. h. 33. h. 34. h. 35. h. 36. h. 37. h. 38. h. 39. h. 40. h. 41. h. 42. h. 43. h. 44. h. 45. h. 46. h. 47. h. 48. h. 49. h. 50. h. 51. h. 52. h. 53. h. 54. h. 55. h. 56. h. 57. h. 58. h. 59. h. 60. h. 61. h. 62. h. 63. h. 64. h. 65. h. 66. h. 67. h. 68. h. 69. h. 70. h. 71. h. 72. h. 73. h. 74. h. 75. h. 76. h. 77. h. 78. h. 79. h. 80. h. 81. h. 82. h. 83. h. 84. h. 85. h. 86. h. 87. h. 88. h. 89. h. 90. h. 91. h. 92. h. 93. h. 94. h. 95. h. 96. h. 97. h. 98. h. 99. h. 100. h. 101. h. 102. h. 103. h. 104. h. 105. h. 106. h. 107. h. 108. h. 109. h. 110. h. 111. h. 112. h. 113. h. 114. h. 115. h. 116. h. 117. h. 118. h. 119. h. 120. h. 121. h. 122. h. 123. h. 124. h. 125. h. 126. h. 127. h. 128. h. 129. h. 130. h. 131. h. 132. h. 133. h. 134. h. 135. h. 136. h. 137. h. 138. h. 139. h. 140. h. 141. h. 142. h. 143. h. 144. h. 145. h. 146. h. 147. h. 148. h. 149. h. 150. h. 151. h. 152. h. 153. h. 154. h. 155. h. 156. h. 157. h. 158. h. 159. h. 160. h. 161. h. 162. h. 163. h. 164. h. 165. h. 166. h. 167. h. 168. h. 169. h. 170. h. 171. h. 172. h. 173. h. 174. h. 175. h. 176. h. 177. h. 178. h. 179. h. 180. h. 181. h. 182. h. 183. h. 184. h. 185. h. 186. h. 187. h. 188. h. 189. h. 190. h. 191. h. 192. h. 193. h. 194. h. 195. h. 196. h. 197. h. 198. h. 199. h. 200. h. 201. h. 202. h. 203. h. 204. h. 205. h. 206. h. 207. h. 208. h. 209. h. 210. h. 211. h. 212. h. 213. h. 214. h. 215. h. 216. h. 217. h. 218. h. 219. h. 220. h. 221. h. 222. h. 223. h. 224. h. 225. h. 226. h. 227. h. 228. h. 229. h. 230. h. 231. h. 232. h. 233. h. 234. h. 235. h. 236. h. 237. h. 238. h. 239. h. 240. h. 241. h. 242. h. 243. h. 244. h. 245. h. 246. h. 247. h. 248. h. 249. h. 250. h. 251. h. 252. h. 253. h. 254. h. 255. h. 256. h. 257. h. 258. h. 259. h. 260. h. 261. h. 262. h. 263. h. 264. h. 265. h. 266. h. 267. h. 268. h. 269. h. 270. h. 271. h. 272. h. 273. h. 274. h. 275. h. 276. h. 277. h. 278. h. 279. h. 280. h. 281. h. 282. h. 283. h. 284. h. 285. h. 286. h. 287. h. 288. h. 289. h. 290. h. 291. h. 292. h. 293. h. 294. h. 295. h. 296. h. 297. h. 298. h. 299. h. 300. h. 301. h. 302. h. 303. h. 304. h. 305. h. 306. h. 307. h. 308. h. 309. h. 310. h. 311. h. 312. h. 313. h. 314. h. 315. h. 316. h. 317. h. 318. h. 319. h. 320. h. 321. h. 322. h. 323. h. 324. h. 325. h. 326. h. 327. h. 328. h. 329. h. 330. h. 331. h. 332. h. 333. h. 334. h. 335. h. 336. h. 337. h. 338. h. 339. h. 340. h. 341. h. 342. h. 343. h. 344. h. 345. h. 346. h. 347. h. 348. h. 349. h. 350. h. 351. h. 352. h. 353. h. 354. h. 355. h. 356. h. 357. h. 358. h. 359. h. 360. h. 361. h. 362. h. 363. h. 364. h. 365. h. 366. h. 367. h. 368. h. 369. h. 370. h. 371. h. 372. h. 373. h. 374. h. 375. h. 376. h. 377. h. 378. h. 379. h. 380. h. 381. h. 382. h. 383. h. 384. h. 385. h. 386. h. 387. h. 388. h. 389. h. 390. h. 391. h. 392. h. 393. h. 394. h. 395. h. 396. h. 397. h. 398. h. 399. h. 400. h. 401. h. 402. h. 403. h. 404. h. 405. h. 406. h. 407. h. 408. h. 409. h. 410. h. 411. h. 412. h. 413. h. 414. h. 415. h. 416. h. 417. h. 418. h. 419. h. 420. h. 421. h. 422. h. 423. h. 424. h. 425. h. 426. h. 427. h. 428. h. 429. h. 430. h. 431. h. 432. h. 433. h. 434. h. 435. h. 436. h. 437. h. 438. h. 439. h. 440. h. 441. h. 442. h. 443. h. 444. h. 445. h. 446. h. 447. h. 448. h. 449. h. 450. h. 451. h. 452. h. 453. h. 454. h. 455. h. 456. h. 457. h. 458. h. 459. h. 460. h. 461. h. 462. h. 463. h. 464. h. 465. h. 466. h. 467. h. 468. h. 469. h. 470. h. 471. h. 472. h. 473. h. 474. h. 475. h. 476. h. 477. h. 478. h. 479. h. 480. h. 481. h. 482. h. 483. h. 484. h. 485. h. 486. h. 487. h. 488. h. 489. h. 490. h. 491. h. 492. h. 493. h. 494. h. 495. h. 496. h. 497. h. 498. h. 499. h. 500. h. 501. h. 502. h. 503. h. 504. h. 505. h. 506. h. 507. h. 508. h. 509. h. 510. h. 511. h. 512. h. 513. h. 514. h. 515. h. 516. h. 517. h. 518. h. 519. h. 520. h. 521. h. 522. h. 523. h. 524. h. 525. h. 526. h. 527. h. 528. h. 529. h. 530. h. 531. h. 532. h. 533. h. 534. h. 535. h. 536. h. 537. h. 538. h. 539. h. 540. h. 541. h. 542. h. 543. h. 544. h. 545. h. 546. h. 547. h. 548. h. 549. h. 550. h. 551. h. 552. h. 553. h. 554. h. 555. h. 556. h. 557. h. 558. h. 559. h. 560. h. 561. h. 562. h. 563. h. 564. h. 565. h. 566. h. 567. h. 568. h. 569. h. 570. h. 571. h. 572. h. 573. h. 574. h. 575. h. 576. h. 577. h. 578. h. 579. h. 580. h. 581. h. 582. h. 583. h. 584. h. 585. h. 586. h. 587. h. 588. h. 589. h. 590. h. 591. h. 592. h. 593. h. 594. h. 595. h. 596. h. 597. h. 598. h. 599. h. 600. h. 601. h. 602. h. 603. h. 604. h. 605. h. 606. h. 607. h. 608. h. 609. h. 610. h. 611. h. 612. h. 613. h. 614. h. 615. h. 616. h. 617. h. 618. h. 619. h. 620. h. 621. h. 622. h. 623. h. 624. h. 625. h. 626. h. 627. h. 628. h. 629. h. 630. h. 631. h. 632. h. 633. h. 634. h. 635. h. 636. h. 637. h. 638. h. 639. h. 640. h. 641. h. 642. h. 643. h. 644. h. 645. h. 646. h. 647. h. 648. h. 649. h. 650. h. 651. h. 652. h. 653. h. 654. h. 655. h. 656. h. 657. h. 658. h. 659. h. 660. h. 661. h. 662. h. 663. h. 664. h. 665. h. 666. h. 667. h. 668. h. 669. h. 670. h. 671. h. 672. h. 673. h. 674. h. 675. h. 676. h. 677. h. 678. h. 679. h. 680. h. 681. h. 682. h. 683. h. 684. h. 685. h. 686. h. 687. h. 688. h. 689. h. 690. h. 691. h. 692. h. 693. h. 694. h. 695. h. 696. h. 697. h. 698. h. 699. h. 700. h. 701. h. 702. h. 703. h. 704. h. 705. h. 706. h. 707. h. 708. h. 709. h. 710. h. 711. h. 712. h. 713. h. 714. h. 715. h. 716. h. 717. h. 718. h. 719. h. 720. h. 721. h. 722. h. 723. h. 724. h. 725. h. 726. h. 727. h. 728. h. 729. h. 730. h. 731. h. 732. h. 733. h. 734. h. 735. h. 736. h. 737. h. 738. h. 739. h. 740. h. 741. h. 742. h. 743. h. 744. h. 745. h. 746. h. 747. h. 748. h. 749. h. 750. h. 751. h. 752. h. 753. h. 754. h. 755. h. 756. h. 757. h. 758. h. 759. h. 760. h. 761. h. 762. h. 763. h. 764. h. 765. h. 766. h. 767. h. 768. h. 769. h. 770. h. 771. h. 772. h. 773. h. 774. h. 775. h. 776. h. 777. h. 778. h. 779. h. 780. h. 781. h. 782. h. 783. h. 784. h. 785. h. 786. h. 787. h. 788. h. 789. h. 790. h. 791. h. 792. h. 793. h. 794. h. 795. h. 796. h. 797. h. 798. h. 799. h. 800. h. 801. h. 802. h. 803. h. 804. h. 805. h. 806. h. 807. h. 808. h. 809. h. 810. h. 811. h. 812. h. 813. h. 814. h. 815. h. 816. h. 817. h. 818. h. 819. h. 820. h. 821. h. 822. h. 823. h. 824. h. 825. h. 826. h. 827. h. 828. h. 829. h. 830. h. 831. h. 832. h. 833. h. 834. h. 835. h. 836. h. 837. h. 838. h. 839. h. 840. h. 841. h. 842. h. 843. h. 844. h. 845. h. 846. h. 847. h. 848. h. 849. h. 850. h. 851. h. 852. h. 853. h. 854. h. 855. h. 856. h. 857. h. 858. h. 859. h. 860. h. 861. h. 862. h. 863. h. 864. h. 865. h. 866. h. 867. h. 868. h. 869. h. 870. h. 871. h. 872. h. 873. h. 874. h. 875. h. 876. h. 877. h. 878. h. 879. h. 880. h. 881. h. 882. h. 883. h. 884. h. 885. h. 886. h. 887. h. 888. h. 889. h. 890. h. 891. h. 892. h. 893. h. 894. h. 895. h. 896. h. 897. h. 898. h. 899. h. 900. h. 901. h. 902. h. 903. h. 904. h. 905. h. 906. h. 907. h. 908. h. 909. h. 910. h. 911. h. 912. h. 913. h. 914. h. 915. h. 916. h. 917. h. 918. h. 919. h. 920. h. 921. h. 922. h. 923. h. 924. h. 925. h. 926. h. 927. h. 928. h. 929. h. 930. h. 931. h. 932. h. 933. h. 934. h. 935. h. 936. h. 937. h. 938. h. 939. h. 940. h. 941. h. 942. h. 943. h. 944. h. 945. h. 946. h. 947. h. 948. h. 949. h. 950. h. 951. h. 952. h. 953. h. 954. h. 955. h. 956. h. 957. h. 958. h. 959. h. 960. h. 961. h. 962. h. 963. h. 964. h. 965. h. 966. h. 967. h. 968. h. 969. h. 970. h. 971. h. 972. h. 973. h. 974. h. 975. h. 976. h. 977. h. 978. h. 979. h. 980. h. 981. h. 982. h. 983. h. 984. h. 985. h. 986. h. 987. h. 988. h. 989. h. 990. h. 991. h. 992. h. 993. h. 994. h. 995. h. 996. h. 997. h. 998. h. 999. 1000.

TRIPTEROCOCCUS Endl. Endl. gen. n. 5764.

Meisn. gen. l. c.

1. **Tripterococcus simplex** Bge. caulibus simplicissimis teretibus striatis basi foliosis, foliis linearibus, bractea media pedicellum superante lateralibus brevioribus, calycis laciniis tubo suo duplo longioribus, petalorum ungue laminam superante, ala coccorum dorsali lateralibus paulo angustiore.

In glareosis apertis montium continuorum Darling's-range (Perth) 8. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1971.

Radix simplex, alte descendens, lignosa, multiceps. *Caules* plurimi ex una radice, erecti, stricti, simplicissimi, pedales et ultra, lineam dimidiam in diametro crassi, vel paulo crassiores. *Folia* anguste linearia, sparsa, inferiora 10-12 approximata, pollicem longa, superiora remota breviora, summa 2^{'''} longa. *Racemi* pauciflori. *Flores* brevissime pedicellati, pedicello 0,5^{'''} longo, tribracteolati. *Bractea* media pedicellum calycisque tubum aequans, bracteolae laterales tubum attingentes. *Calycis* tubus hemisphaericus, 0,7^{'''} longus, striatus, lacinae duplo longiores, lineari-subulatae. *Petalorum* unguis in tubum 5 lineas longum incurvum conniventes. *Laminae* 3^{'''}-lineares incurvo-patulae. *Stamina* 3 longiora tubum vix aequantia, duo alterna tubo dimidio paulo longiora. *Filamenta* filiformia. *Antherae* oblongae. Pollinis grana sicca oblonga, triplicata, triporosa, extus celluloso-reticulata, fere *Statices*. *Stylus* simplex calycis laciniis brevior, apice trifidus, ramis intus stigmatosis. *Cocci* indehiscetes cum styli parte persistente 3,5^{'''} longi, 2,7^{'''} lati; alae laterales lineam latae, dorsalis angustior brevior, omnes radiatim nervosae, fragillimae. *Semen* trigonum, hinc impresso rugulosum, linea paulo longius, 0,3^{'''} latum, integumento membranaceo pallido. *Embryo* in axi albuminis parci oleosi rectus, radícula infera, cotyledones plano-convexae, carnoso-oleosae.

2. **Tripterococcus juncus** Bge. caulibus ramosis teretibus profunde sulcatis paucifoliis, bracteis pedicellum superantibus, calycis laciniis tubo suo plus duplo longioribus, corollae laminis unguem aequantibus, ala cocci dorsali angustissima.

In arenosis inter frutices prope Woodman'spoint, Perth. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1973.

Radix multiceps. *Caules* 1½-2 pedales, lineam in diametro crassi, teretes, sulcato-striati, ramosi, ramis elongatis, erectis, simplicibus. *Folia* sparsa remota, facile decidua, inferiora pollicaria et paulo longiora, anguste linearia, acuta. *Racemi* terminales in caule et ramis sub 10-15-flori, laxi, florentes 2-3 pollicares. *Flores* ex sicco livido-flavescentes, minores quam praecedentis. *Bracteolae* subulatae pedicello longiores. *Calycis* tubus hemisphaericus 0,5^{'''} longus, lacinae subulatae fere 1,5^{'''} longae. *Petalorum* unguis in tubum curvatum 3^{'''} longum conniventes, laminae totidem longae, in sicco contortae, subulatae. *Stamina* pistillumque praecedentis. *Cocci* omnino ut in *Tr. Brunonis* describuntur, majores quam in praecedente et ala dorsali angustissima fere nulla.

Tripterococcus Brunonis Endl. in Enum. Hügel. pag. 18. e descriptione talibus definiendus: *Tr. caulibus ramosis*

tetragonis profunde sulcatis paucifoliis, bractea media pedicellum aequante lateralibus brevioribus, calycis laciniis tubo suo triente longioribus, corollae laminis unguem aequantibus, ala cocci dorsali angustissima.

RHAMNEAE Brown.

(Auctore E. T. STEUDEL.)*

POMADERRIS Labill. Endl. gen. n. 5743.

Meisn. gen. pag. 70. (50.)

§. 1. Foliis ovatis.

Stemmatium glaberrimum ^{α supra glabris.} ~~Steud.~~ ! ex Reisch.

1. **Pomaderris polyantha** Steud. caule erecto breviteramoso tereti cinerascente cortice subrimuloso; foliis (1-1½ uncialibus) elliptico-ovatis obtusis basi attenuatis margine reflexis supra albo-viridibus glabris subimpresso venulosis, subtus adpresse molliter niveo-tomentosis; stipulis ovatis acutis scariosis subtus medio herbaceis pilosis caducis; cymis axillaribus paniculatis in apice ramulorum aggregato confertis. †

In arenosis ad fluvium cygnorum et ad oras maritimas ditionis Perth. Jun. Dec. Herb. Preiss. No. 1677 et 1679.

Caulis pube brevissima densissima intricata rimulosa vestitus, inferiores, superne angulatus; *rami* breves, foliati, cinereo-pubescentes, apice cymoso-floriferi; *folia* alterna, magnitudine varia ¾ - 1½ pollicaria; *petioli* folio 3-4-ve breviores, pubescentes; *cymae* ramosae, ramulis subreflexis multifloris; *sepala* extus velutino pilosa; *petala* nulla; capsulae ovato-subrotundae pube secedente vestitae.

2. **Pomaderris aemula** Steud. caule erecto parce ramoso tomentosulo anguloso-striato; foliis (1-2 uncialibus) ovatis integerrimis supra fusco-viridibus glaberrimis reticulato-pellucide-venosis, subtus adpresse albo-cinereo-tomentosis; stipulis lanceolatis acuminatis scariosis subtus medio herbaceis pubescentibus; cymis axillaribus panicula-

*) Synopsis Rhamnearum a clbmo. Reisseck elaboratam (cfr. Endlicher Genera pag. 1094 vel Walper Repertorium I. pag. 542) in componendis speciebus Novae Hollandiae occidentalis aut expectare aut species cum illo monographo communicare in animo erat. Cum vero iste opusculum adhuc desideratur et in eo erat, ut „Plantae Preissianae“ typographo essent tradendae, longioris morae causa esse nolui; itaque hujus familiae species investigationi mihi (saepo, quod maxime doleo, in speciminibus non satis evolutis) traditas, pro virili elaboratas lectoribus trado.

Tymalium / Pomadouris / prostratum Forst Müller.

fruticosum, prostratum ramis foliolis tomentoso-pubulis mox glabrescentibus, foliis ^{paucis} linearibus, ad medium revolutis mucronatis breviter petiolatis pappi glabris subtus piloso-tomentosis, ^{paucis} stipulis ovatis acutis glabris corollis, bracteis triangulari rotundis ciliatis. Fimbricatis confusis, cymis ^{paucis} glomeratis.
Vixit eriochloa Fomni anni tempore florens
W. H. South Est river Tanniana. hb. St. I n. 83. habitu huius ordinis alieni sequenti simillima sed habitu ^{valde} minus compacto foliis paullo longioribus et notis diagnosticiis facile distinguendum!

comp. Pomadouris St. I. 1848. 5 p. 11
Apetala Labillardiere V. D. L. hb. St. I. 11.

Tymalium (Pomadouris?) uncinatum Forst Müller.

fruticosum diffusum ramosum, ramis tomentoso-pubulis denique glabrescentibus, foliis patenter reflexive deciduis linearibus ^{paucis} ad medium prope revolutis apice recurvatis mucronatis pappi ^{paucis} ovatis orbiculatis minutis glabris brevissime petiolatis ingentibus cymis confusis, ^{paucis} stipulis ovatis acutis ^{paucis} ciliatis, bracteis rotundo-triangularibus acutis ciliatis, cymis parvis axillariis glomeratis.
O. Murray forst. coll. 1848. 5 p. 11
P. uncinatum Forst. Müller. ex. St. I. 1848.

Tymalium / Pomadouris / uncinatum Forst Müller.
fruticosum, caule ramoso, foliis ovatis orbiculatis emarginatis, cymis glabris ^{paucis} subaequalibus, stipulis ^{paucis} lobulatis, petalis, cymis terminalibus paucifloris, fructu ^{paucis} 1-2 pediculis, radice fibril-
lo horizontalibus. For 3-4" long 1/2-2" lat.

In monte Kaitiaki 1848.
ad rivulum saxosum Tanniana
Lauriulus 1/2' 5' Onkapon,
ad ripas fl. Tannar. hb. St. I. 1848. 866
Lauriulus Victoriae vixit,
P. pedunculatum Forst Müller.
cymis confusis pedunculata saepe elongato infundibulata. Pitt creek
V. uncinatum Forst Müller. Ennaunt. 1848.
foliis majoribus (2 p. latum)
In instrumento Lennai.
Tanniana creek.

Symalium ~~*pathulatum*~~ *pathulatum* *pers. m.*

[illegible]

1060 Feb - 1898. Specimina vix florantia cum:
arvoj. inf. hdt 4 s. n.; collect. in Calatibus montium
notus! ac vicorum lapidosis apud Thier-
^{comis}
^{vires} piseck. Decr. 1898. Anthys: aethale!
Frut. protabilis 2-3' ^{stipulis} caespites erectus. Rami
privi actale nigrescentes. frust. matur. vid. No. 2.

Tymmatium (*Pomatorrus*?) *Chalcid* ^{conspicua} ^{ex}
lenticuliformi, ramuloso, foliis ex-
acte ovatis acutis nervo medio ^{ovatis, nervo} ^{medio} ^{prolongato} ^{et}
minam superante apiculatis brev-
iter petiolatis margine integerrimis aeth-
ere paullo brevissime reflexo murex -ve.
nasis pupa fovea viridibus glabris
lis rugulosis pubes cum raris ^{cymarum} ^{glome-}
nulis axillaribus et terminalibus
insuffilibus foliis paucis suffultis to-
mento viscerarum initio paullo
porrigineo obtusis, bracteis rotundatis
super apiculatis lodiis parvis capitula acutis

Z. Encaenia Day, 'Hb. It. s. n. involucribus
Agulis obtuso-pubulatis villosis
Folia vix 1/2" Capitula, nisi magnitudine,
simplex majora

Sept. 1844. Vahr 1844. 16. 11. 44
Prunella latifolia ~~xx~~ *perfoliata* Lami
intra ~~intra~~ *subaequaliter*. *Prunella*

St. utroque glandulosa prothelae
caule erecto ramosa, foliis subrotun-
dis emarginatis, supra glabris, subtus
hirsutis, nervis
venosis
caulibus
ramis
foliis

Diablis foliatus
In paucis fides inter montium, altum
fragil-range & lacum Victorice
Apr. 28. 1840.

Apr. 28. 1890
D. umbellata, cyms. sub-umbellatis
for figura, in arceuthis. Ford mss
no 45. figs correct.

tis multifloris; cymularum capitulis basi bracteis ovatis obtusis semiscariosis involucriatis, apice uno alterove folio munitis: petalis ovatis subplanis luteo-albis. ♀

In arenosis ditionis Plantagenet 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1690.

3. **Pomaderris phyllaefolia** ~~Fenzl~~ ^{Fenzl} foliis lincialibus et brevioribus oblongis ellipticis ovalibusque integerrimis, supra glabris vel pulvere viridi-flavo magis minusve adspersis eveniis, supra ramulisque tomento brevi subadpresso holostericis, floribus in cymis corymbosis parvis confertis; calycibus villo incano patente tomentosis anthesi vix 1-1½" longioribus, petalorum lamina subcordato-ovata vel subrotunda integerrima concava. Fenzl in Hügel Enumerat. pag. 22. n. 15.

In clivulis arenosis prope oppidulum Freemantle 15. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1678.

Omnino convenit, nec differt nisi foliis superne vepulosis.

4. **Pomaderris pyrophylla** Steud. caule erecto ramoso fusco-cinereo-pubescente tereti vix striato; foliis suboblique ovatis integerrimis supra glaberrimis pellucide-lineatis rufo-virescentibus, subtus adpresse albo-tomentosis; stipulis ferrugineis lanceolatis caducis foliisque junioribus pilosis; cymis axillaribus terminalibusque; floribus in capitulis bracteatis aggregatis; petalis inter calycis laciniis (saepe) exsertis ovatis concavis. ♀

In arenosis insulae Rotenest 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1681.

Caulis plus minus ramosus; *rami* adulti glabri lignosi, juniores cinereo-pubescentes; *folia* petiolata, — petiolis folia 3-4-plo brevioribus - ½-2 pollicaria, margine subrevoluta, supra tenue venosa, venis lucem versus pellucidis sparsim reticulatis; *sepala* dense villosa.

β ramosior a praecedente non differt, nisi caule magis lignoso, ramosiore; foliis distinctius revolutis. Herb. Preiss. No. 1676.

5. **Pomaderris subretusa** Steud. caule diffuse-ramoso; ramis cinereis, cortice demum secedente, pubescentibus; foliis ovatis vel junioribus suborbiculatis apice retusis basi levissime cordatis supra fusco-viridibus glabris (vel novellis pubescentibus) subtus adpresse albo-tomentosis pilisque patentibus (in summis plus minus rufescentibus) instructis; stipulis ovato-lanceolatis acuminatis membranaceis ferrugineis pilosis; cymis axillaribus in pedunculis folia aequantibus, basi foliatis. ♀

In calcareis summitatis montis Baldhead ditionis Plantagenet 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1687.

Rami teretes; *folia* brevi petiolulata, parva, juniora minora vix 1-1½ lineas excedentia, subrotunda, adultiora 1 ad summum 6 lineas longa, ovata, apice obtusissimo subretusa, supra glabra, venis tenuibus versus lucem vix pellucidis percursa; *cymae* axillares in pedunculis 2-4 lineas longis subcapitato confertae; *flores* 10-12 parvi; *calyces* extus dense pubescentes, intus glabri, ferruginei, limbi patentes medio nervo conspicuo percursi; *petala* inter calycis laciniis minima, unguiculata.

β. *Foliis ovatis utrinque pubentibus.*

6. **Pomaderris albicans** Steud. caule erecto brevi ramoso angulato-striato pubescente; foliis ovatis integerrimis margine subrevolutis supra mollissime cinereo-velutinis subtus dense albo-tomentosis; stipulis ferrugineis scariosis lanceolatis pilosis; cymis axillaribus paucifloris demum elongatis subracemosis. ♀

In calcareis ad latus montis Elizamontagne. 19. Mai 1839. Herb. Preiss. No. 1689.

7. **Pomaderris hirsuta** Steud. caule diffuse-ramoso cinerascens; ramis patenti-pilosis; foliis oblongo-vel lanceolato-ovatis (parvis semi-uncialibus) supra fusco-viridibus mollissime brevi-velutino-pubescentibus, subtus adpresse albo-tomentosis villisque patentibus hirsutis; stipulis late-ovatis membranaceis acuminatis sparsim hirsutis; cymis axillaribus terminalibusque laxiuscule capitulatis. ♀

In rupestribus ad tergum montis Clarence 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1673^a.

Frutex 1-2 pedalis, ramosus; *rami* adulti teretes, cicatricosi, glabri, rufescentes, juniores pubescentes intermixtis pilis longioribus hirsuti; *folia* brevi-petiolata, 2-6 ad summum 8 lineas longa, supra late viridia, venosa, — venae primariae opacae, secundariae versus lucem sub lente pellucidae — margine parum revoluta, supra pube adpressa partim evanescente sub-velutina, subtus inter tomentum album pilis longis vestita; *cymae* ramosae, floribus in ramulis capitulo congesti; *calycis* laciniae extus tenue pubescentes, intus glabrae, pallide ferrugineae.

8. **Pomaderris commixta** Steud. caule ramoso diffuso, ramis pilosulis; foliis ovatis (parvis 4-6-lineas longis) supra cinereo-velutinis, subtus albo-tomentosis pilis raris patentibus (ad nervos et margines) intermixtis; stipulis minutis ovatis obtusis semiscariosis; cymis axillaribus paucifloris laxè capitatis. ♀

Cum priore lecta. Herb. Preiss. No. 1673^b.

Frutex 1-2-pedalis, ramosus; *rami* adulti teretes pube demum secedente hinc pubescentes hinc glabriusculi; *ramuli* foliorum delapsorum cicatricibus stipulisque persistentibus notati, sursum foliosi, dense pubescentes; *petioli* 1½-2 lin. longi; *folia* magnitudine varia, minora vix lineam excedentia, plus minus rotundata, majora ovata, obtusa nervo medio supra depresso subtus elevato; *cymulae* parvae, axillares, pauciflorae; *calycis* laciniae extus dense pubescentes, glabrae, ferrugineae.

§. 2. *Foliis angustis linearibus.*

9. **Pomaderris rosmarinifolia** Steud. caule ramoso laxè puberulo; foliis angustis linearibus (1½ lineas latis, 8-12 longis) obtusis margine revolutis, supra laete viridibus glabris, subtus dense villososericeis; stipulis minutis setaceis acutis; cymis axillaribus diffusis subracemosis. ♀

In calcareis fruticosis ad tergum montis Baldhead 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1674.

x *Haloragis Goniorarpus* tri-
fida *fr. m.*
vel apertius signanda.

Hal. (Gon.) dimorpha *fr. m.*
glaberrima *fr. m.*
caule et basi heretico decumbente
resistente erecto simpliciori vel
ramoso striato quadrangulo,
foliis oppositis summis alter-
nantibus immo floralibusque
lanceolato-linearibus integris
cristis aut trifidis segmentis
linearibus acutis lateralibus
patulis aut lanceolato li-
nearibus supra medium incisuris
paucis serratis, floribus in fo-
liculorum superiorum axillis
plurimigenis limbo terminae primo
scapulis postea anthemum inter-
rupte spiratis. breviter pedi-
cellatis tetrandris, calycis seg-
mentis 5 petalis striatis
longioribus pilosulis - petalis
bracteis minutis subulatis

α. & trifida *fr. m.*

β. trifida *fr. m.* New
Zealand - range.

γ. incis - serrata *fr. m.*

δ. (*Goniorarpus*) *repens*
fr. m. in hb. *Stuart.*

ε. ripas floras Tasma-
niae frequens. hb. *N. T. M.*

(*Intithis* vni et apparet.

+ *Pyrrhulium bifidum*, *fr. m.*

In montibus siccis prope et opposita
bifidato acutis diffusum laevem foliis
marginem revolutis, floribus glomeratis
in involucrio calicis. *fr. m.*
foliis utrinque alba tomentosis involucrio
calicis vni, alba

Pomadouris apicalata! Labill.

α *vinosa* Genyl.

Tasmaniae, hb. St. J. I n. 11.

ad fl. South Esk river, 15-20'

Nov. 1849. hb. St. J. n. 82

ad fl. Tasmaniae (e.g. George Ham)
fructibus 5-6', caespit. florus.

Pomadouris elliptica! Labill.

ad fl. South Esk river Ta-

maniae. Anthesis Nov.

hb. St. J. n. 133 & 584⁵⁹² 5-6'

Viburni speciem refert.

Pomadouris (*Trymaliu*?) *obovata* f. *ma-*

locis *allis* *gracilis* *in* *folm.* *fructu* *4'* *alt.* *Charact.*
Procarpalocum *fol. form.* *P. bilobata* *accidit.*

× *Pomadouris bilobata* *Gerdt* & *Me*

foliis *cuneatis* *apice* *dilatato*

bilobis *infer* *ex* *curvam* *apicu-*

latis, *lobes* *antice* *extus* *denti-*

culis *paucis* *serreatis*, *figuris*

serreatis *pubulatis* *reticatis*, *bra-*

cteis *membranaceis* *ovatis* *acutis*

rostra *rudia* *valida* *puberula*

carinatis *regaribus*, *fructibus*

umbellatis, *ra* *axillaribus*

et *apicalibus*, *capula* *bracte-*

apice *dehiscente*

specimina *deflorata* *legi* *in*

parte *orientali* *coloniae* *angus-*

sinum *Kimberley* *Bay* *in* *collibus*

prope *stat.* *et* *Morris* *Oct.* *1848*

In *fructus* *eos* *P. ellipticae*

acculant.

Pomad. (*Trymaliu*?) *obovata* *AK*

ad fl. St. Pauli Tasmaniae, hb.

St. 598. 10' alt. Nov. 1849.

Trymalium (Torn.?) *diversifolium*
H. & A. - Same as 1892? Mill

by mail -
to A.C. East -

Baron St. 797 Ave. C Mill.

C. dioxyphylla ~~And. Meis~~

Amis aprica ferruginea. Tornentopsis

Sancti rursus ex illis tales minime veniatis
iniquitatisque ex his tales minime veniatis.

vel ovato. lanceolato

albo, inopla munda Pubus pinnigines
e. Pinnigines, ne res.

et lanceolata
lanceolata

Capitulum apice lanugine ciliatum
Alba, hirsuta, lanuginea

obtusiusculus
cruciat

marginibus revolutis, "

piles brevifrons *Oregano*

var. obtusifolia (L.) DC. *var. obtusifolia* (L.) DC.

quoniam perfectiores sunt civitates mar-

~~one merchant named as [illegible]~~

Hand specimen, Cal. var.

h. h. brevicaulis, aciculatus, etc.

Superline near, Town of Mont # 48.

apicalibus & marginalibus
asilloribus & marginalibus

Glaucocystis sp. 1st river below Dept. Works.

16. St. S. n. Kier inde in montibus altissimis

urbis sed. proximus. stat. p. natus.

Quercus panamensis

Worms Bay. Nov. 1877. hbsty.

Lib. T. n. 54 *Spet. rarius, petiolis*

calisy cinereo vel ferruginea - tomentosa

Folius orbiculato - vel lance

alato, ovatis apiculatis laev.

retusis integerrimis vel mar

gine undulatis supra glabr

uiculis impresso-venosis sub

Leucites tomentosa, Floribunda

Apertalis
1868 *negrosensis* vel *subumbellatis*

in paniculam foliatam

gracilis Vahl. in litt.
gracilis Vahl. in litt. *Entic. vium*

Encounter-Bay, Nov. 1847 Stuart

Novae Alb. Z. n. 54 - *Adfinium litorale*

Nov 22. Pinali Bay in furtibus Dec 1846

alibique ad oras urinozas.

Sp. In Cylos Piniforis? prae haw

Port
Lisbon Bk. Nov 1848

Lincoln, Dorset, Eng. *Folia* 43-1"

Couza 1/4 - 1/2" Casa-Peyna nitentia

July 11/2 - 1894

Fruticulus 2-3 pedalis; *rami* debiles, teretes, pilis subdistantibus brevissimis substellatis asperuli; *folia* sparsa, in petiolum brevem attenuata; *stipulae* minutae, vix lineares, acutissimae, deciduae; *flores* parvi; *calyces* basi dense limbi extus vix pilosi, intus glabri; *corolla* nulla.

10. **Pomaderris westringiaefolia** Steud. caule ramoso laxo puberulo vel glabriusculo; foliis angustis subovato-linearibus ($1\frac{1}{2}$ -2 lineas latis, 8-10 longis) obtusis margine revolutis supra fusco-viridibus glabris, subtus dense piloso-sericeis; stipulis minutis setaceis deciduis; cymis axillaribus foliis brevioribus confertis. 3

In planitie clivuli calcarei Arthur'shead 23. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1686.

Fruticulus parvus, ramosus; *rami* adulti glabri, fusco-rubri, juniores pilis brevissimis fasciculatis vix stellatis asperuli, in summitate piloso-pubescentes; *folia* obovato-linearia, 5-7 lin. longa, raro abbreviata, ovata, in petiolum brevem lineam longum attenuata, sub apices ramulorum subconferta; *flores* (evoluti desunt) in cymis axillaribus laxiusculis.

TRYMALIUM Fenzl. Endl. gen. n. 5744.

1. **Trymalium expansum** Steud. caule fruticuloso ramoso tereti pubescente; ramis divaricato-patentibus infra nudis superne foliatis et floriferis pilosis; foliis in ramulis alternis supra fusco-viridibus pubescentibus, subtus albotomentosis; floribus subracemosis tandem in ramis elongatis diffuse ramoso-paniculatis; capsula ovata basi calyce persistente circumscissa et superne setoso-villosa. 3

In rupestribus ad clivulum vallis Todyayvalley ditionis Victoria. 7. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1683.

Frutex ramis teretibus rufescentibus; *rami* elongati, ultra medium nudi, sursum ramulosi; ramuli dense albo-pubescentes, abbreviati, foliati; *folia* breviter petiolata, magnitudine varia, 2-8 lin. longa, ovata vel ovato-oblonga; *stipulae* setaceae, marcescentes, pilosae; *flores* ante florescentiam (evoluti desunt) subracemoso-aggregati, tandem in ramis fructiferis elongatis amplo racemoso-paniculati.

2. **Trymalium floribundum** Steud. caule erecto ramoso tereti patentipiloso; foliis ovatis integris vel obscure repando-dentatis supra sparsim simpliciter pilosis vel glabratis, subtus dense substellato-cinerascenti tomentoso pilosis; stipulis angustissimis lanceolato-acuminatis deciduis; floribus in summis foliis axillaribus terminalibusque paniculatis; calycis tubo villosa limbo 5-fido glabro; capsula circumscissa setoso-pilosa. 3

In sublimosis saxosis ad latus praeruptum vallis Cataractae ad caput fluvii Cygnorum 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1680.

Caulis teres, rubicundus, pilis patentibus longis aliisque brevissimis adpressis substellatis tectus; *folia* brevi-petiolata, 1-1½ pollices longa, venis versus lucem pellucidis percursa; *stipulae* subscariosae, valde fugaces petiolum subaequant, pilosae; *flores* in racemis axillaribus terminalibusque ramosis paniculam amplam semipedalem formantes; pedicelli pilosi, calycis basi dense villosi, lacinae utrinque glabrae, ferrugineo-rufae, fructus.

CRYPTANDRA Smith. Endl. gen. n. 5742.
Meisn. gen. pag. 70. (50.)

§. 1. Inermes.

α. calycibus villosis.
Lomandra Lindl.

1. **Cryptandra nutans** Steud. caule ramoso pumilo (1-1½ pedali) basi glabro, apice ramisque pubescentibus; foliis fasciculatis margine revolutis subacerosis, supra puberulis subtus albo-pilosis floribus terminalibus fasciculato-spicatis subnutantibus; calycis tubo campanulato limbo connivente albo-sericeo; bracteis ovatis ferrugineis calycis tubum aequantibus. ♂

In arenosis sylvae prope ora maritima ditionis Perth. Herb. Preiss. No. 2424.

Fruticulus ramosus; *rami* cinereo-fuscescentes, infra glabri sursum pilis albidis vestiti; *stipulae* in ramulis novellis tantum conspicuae fugaces, ovato-lanceolatae, subscariosae, pallide ferrugineae; *folia* fasciculatim aggregata 1-1½ raro 2 lin. longa, marginibus revolutis sese attingentibus, subteretia vel marginibus adhuc distantibus subtus canaliculata; *flores* in apice ramulorum axillares et terminales subracemosi, nutantes; *calycis* limbus intus glaber ferrugineus.

2. **Cryptandra tridentata** Steud. caule ramosissimo glabrescente cicatricibus foliorum emortuorum noduloso; foliis obovato-cuneatis apice truncatis tridentatis subfasciculatis glabris; stipulis membranaceis ovatis acutis. ♂

In N. Holl. occ. austr. Herb. Preiss. No. 2421.

Fruticulus parvus pedalis, ramosissimus, cortice rimuloso fuscescente; *ramuli* teretes, pubescentes; *folia* alterna, brevi-petioluta 1-1½ lin. longa, solitaria vel subfasciculata, viridia plana, margine vix revoluta, apice plerumque 3-raro 5-dentata, dentibus plus minus exsertis quandoque vix conspicuis; *flores* et fructus desunt.

β. calycibus glabris.
Erythraea Lindl.

3. **Cryptandra floribunda** Steud. caule erecto angulato striata rubicundo glabro, ramis brevibus; foliis oblongo-vel lanceolato-linearibus (1-2 pollices longis), supra fusco-glaucis viridibus glabris (junioribus pubescentibus), subtus cinereo-albo-sericeis; stipulis lanceolatis scariosis elongatis; racemis pluribus apices ramorum terminantibus interrupte subverticillatis fasciculatis; pedicellis flore longioribus pilosis; calyce glaberrimo tubo abbreviato limbo patente vel reflexo; staminibus petalis reflexis non inclusis, germine glabro; fructibus ♂

In limosis ad fluvium Cygnorum Juli 1839. Herb. Preiss. No. 1675.

Pomad (*Trymalium* ^{nap. visfolium} *parvifolia* ^{in v. m.} *Hook.*
Art. St. Pauli, hb. St. J. 623. p. 2-3
Nov. 1849. —

Ham. & *Sti.* ^{lyst. veg.} 4. p. XXVIII
C. propinqua ? *Stl. Cunningham.*
Procumbens *Wag.* ! Nov. 1849. hb. St. J. 44.

fruticulosus, caulis internodiis
humillimus. Conf. de hac specie
notae Schlechtendalii in plan-
tis Berlin.

Pomaderris ericifolia ! *Hook.*
~~*C. prostrata* *Forster.*~~

caule ramuloso nudo, pubescente,
foliis in ramulis aggregatis li-
neari oblongis revolutis ^{foliis} ^{apice} ^{pubescentibus} ^{obtusis} ^{pubescentibus}
petalis ^{longis} ^{linearibus}, floribus axil-
laribus paucifloris congestis
calycis tubo campanulato limbo
connato sericeo pubescente,
bracteis lanceolatis ^{sericeis} ^{pubescentibus},
stipulis ^{linearibus} ^{sericeis} ^{pubescentibus} ^{sericeis}
pilosis.

folia ramorum 5-6" longa, na-
mulum 2-3" longa, pedicellis ^{sericeis} ^{pubescentibus}
linearibus brevioribus.

P. D. L. ! *Hub.* *St. Terman.* n. 44.

Pomaderris *sp.* ? *Hook.*

C. ericifolia *degen.* *is* *est* *ram.*
paradoxa, *ex* *hanc* *partem*
net. *Novum* *pad.* *Clid.*

si *rectam* *unam* *speciem*
habeo *signans.* *Art. St. Pauli*
3' *flor.* *lutea* *ex* *inventore* *Nov. 49.*
hb. St. J. 603.

Pomad *crisibrondata* *Forster.*

P. leucophyllae ^{varietas} *maxima* *Forster.*

Ad *portum* *lygnorum*, *hb. St. J. 617.*
procreabit

Michx.

Tymalinum (*Pomaderris*?) *Forst.*

~~obtusum~~ *Forst. M.*
^{acutiusculis, ut longiusculis - linearibus}
 foliis linearibus ^{marginibus} ~~marginibus~~ ^{revolutis} ~~revolutis~~ ^{pinnatis}
^{subtus cum vasis et, calyribus cinctis - tomentosis}
 densissime puberulis ^{trivittis} ~~puberulis~~, ^{trivittis} ~~puberulis~~
 latis ovatis ~~subtus~~ ^{aratis}, bracteis suborbiculatis
 bus, cymis glomeratis in ramorum
 apice congestis

Falce raginata apparet.
 ipadicea ^{Forst.} (*P. hirsuta*?)
 Cune. ledifolia ^{Forst.} quaeque
 novum illis characteribus con
 venit.

S. H. Murray, vere primus
Michx. Dr.

+ *Tymalinum* *Leucopogon*, *Forst. M.*

In montib. firidis humilibus ad Napier
 point. Fruticulus 2-3' altus, habitu erecto
 foliis subsessilibus utrinq. alba-tomentosis
 foliis calicibus multis diffusis, prostratis. ^{Michx.}

Tymalinum *biforme* *Forst. M.*

Pomaderris? *biformis* *Forst. M.*
 foliis oblongis v. linearibus ^{longiusculis} ~~oblongis~~ ^{pinnatis} ~~pinnatis~~
 bris puberulis ^{marginibus} ~~marginibus~~ ^{revolutis} ~~revolutis~~
 utrinque ^{marginibus} ~~marginibus~~ ^{revolutis} ~~revolutis~~
 margine reflexis ^{marginibus} ~~marginibus~~ ^{revolutis} ~~revolutis~~
 bracteis orbiculatis, cymis glomeratis ^{pinnatis} ~~pinnatis~~
 nativis et ^{marginibus} ~~marginibus~~ ^{revolutis} ~~revolutis~~
 ipadicea accurre videtur v. ^{pinnatis} ~~pinnatis~~

oblongifolium *Forst. M.*

foliis oblongis, 3-5 linearibus
^{marginibus} ~~marginibus ^{revolutis} ~~revolutis~~
 frutic 1-2' altus ramosus
 in vallium fruticorum fruti
 cetis occurrens juxta praedium?
 H. Morris vasis *Guinea Bay*.
 Oct. 1848.~~

longifolium *Forst. M.*

foliis linearibus oblongis univittis
 marginibus ^{marginibus} ~~marginibus ^{revolutis} ~~revolutis~~
 cratibus diffusus saepe decumbens~~

In lictibus circa *Rivoli Bay*

Michx. Dr. *diversifolia*!

Cune. Pomaderris diversifolia
 confusit! *S. H. Murray*!

Caulis nitide rubens, sub lente punctulis minutis subalbescens sparsim notatus; *ramuli* foliati; folia plana, margine revoluta, in petiolum brevem attenuata; *stipulae* lanceolatae, acuminatae, semiscariosae; flores ex axillis foliorum superiorum, vel immediate ramulos terminantes, in racemis 1-3-poliaribus interrupte verticillatis; *pedicelli* pilosi, flore plerumque longiores; *calycis* laciniae utrinque glaberrimae, rufo-ferrugineae; *petala* parva, unguiculata, cucullata sed stamina demum non tegentia; *stylus* brevissimus; *stigma* 3-fidum, fructus ignotus. Ad Trymalii genus accedens species.

4. *Cryptandra glaucophylla* Steud. caule erecto ramoso rufescente subtereti basi glabro sursum ramisque pubescentibus; foliis alternis approximatis vix fasciculatis marginibus reflexis linearibus angustissimis; supra glabris, (sub lente valida) tenuissime punctato-impressis, subtus sericeo-pilosis, racemis axillaribus et in ramis terminalibus subdissiti-floris; calycis tubo brevissimo pubescente vel glabro, lacinii glabris patulis vel reflexis, staminibus vix inclusis. ‡

In asperis montis Greenmountain 27. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1684.

Frutex ramosissimus; *caulis* basi rufescente glabrescens sursum uti rami pilis brevissimis adpressis substellatis in summo apice ramulorum solutis longioribus pubescens; *folia* 5-8 lin. longa, ob margines reflexos vix lineam lata, subalterna, summa approximata, non fasciculata, breviter petiolulata, apice fasciculo pilorum (ex inferiore pagina praementium) apiculata; racemi in ramulis ex summis foliis axillares et terminales, *floribus* in interstitiis racemosis; *calyx* basi pilosus, parvus, lacinii glabris, flavo-ferrugineis; *petala* minima, cucullata demum calycem versus reflexa *stamina* nondum includentia; fructus

5. *Cryptandra anomala* Steud. fruticulosa ramosa, ramis glabris sursum pubescentibus; foliis petiolo saepe flexuoso lineari-vel ovato-oblongis irregulariter alternis supra viridibus glabris subtus albo-piloso sericeis; stipulis parvis ovato-lanceolatis scariosis; racemis axillaribus, calycis tubo pyramidato-campanulato glabro, lacinii patentibus; capsula ovata apice truncato-plana calycis dejecti marginibus cineta 5-punctata 3-locularis. ‡

In N. Holl. occ.-austr. Herb. Preiss. No. 1685.

Fruticulus pedalis; *rami* teretes, inferne glabri, rufescentes, epidermide demum secedente sursum pilis minutis adpressis substellatis vel simplicibus in summis ramulis confertioribus adpersi; petioli breves, erecti, quandoque curvati; folia 3-7 lin. longa, apice vix conspicue mucronulata; flores in racemis brevibus, paucifloris, axillaribus, in pedicellis brevibus basi bracteola parva ovato-lanceolata acuta munitis; *calycis* laciniae luteo-ferrugineae glabrae; *petala* minima paulo pallidiora, unguiculata, cucullata; *stamina* demum non tegentia; *fructus* capsularis glaber subconicus. Habitus omnino praecedentium.

§. 2. Spinosae.

α. calycibus villosis.

6. *Cryptandra pungens* Steud. caule ramoso cortice secedente; ramis spinoscentibus puberulis; foliis fascicula-

tis linearibus subteretibus utrinque glabris; stipulis setaceis marcescentibus; floribus in ramis terminalibus racemoso-spicatis vel in ramulis spinescentibus lateralibus erectis vel subnutantibus; calycis tubo campanulato sericeo piloso limbo subpatente minutissime pubescente; bracteis minutis ovatis scariosis acutis: †

In arenosis sylvae prope ora maritima ditionis Perth. Herb. Preiss. No. 2422.

Caulis ramisque cinerei pubescentes; *rami* plures in spinam terminati vel mutati; *folia* subfasciculata, brevissime petiolulata, 1-3 lineas longa, subteretia, apice minutissime apiculata; *stipulae* mox caducae, in ramis novellis conspicuae, lanceolato-setaceae; *flores* vel in ramulis spinescentibus racemoso-aggregati vel in inermibus longius racemoso-spicati; *petala* stamina tegentia.

7. **Cryptandra holostyla** Steud. caule erecto stricto, ramisque erectis cinereis pubescentibus apice (invalide) spinescentibus; foliis fasciculatis revolutis subteretibus (sub lente) muricato-asperis demum glabris; floribus versus apices ramulorum axillaribus solitariis vel binis pedunculis filiformibus flores longitudine aequantibus; calycibus longe-campanulatis sericeo-pubescentibus limbo abbreviato patente; stylo apice integro. †

In clivulis calcareis prope ora maritima ditionis Perth Herb. Preiss. No. 2423.

Rami erecti pilis patentibus sursum vestiti, semiunciales, spinescentes, foliati, ramuli abbreviati; *folia* subfasciculata, 3-4 lineas longa, subteretia, rigidiuscula, sub lente pilis brevibus puncticulis minutis insidentibus rigidiusculis asperula, demum glabrata; *stipulae* scariosae, setaceae, caducae; *flores* parvi; *calyx* conicus, limbi 5-fidi lacinae brevissimae germen dense pilosum non tegentes; *petala* inter calycis lacinas brevissima stamina tegentia; *stylus* apice capitatus, integer, mox deciduus.

8. **Cryptandra glabrata** Steud. caule erecto ramoso glabro, ramis ramulisque pubescentibus floriferis spinescentibus; foliis (parvis 3-5 lineas longis) subfasciculatis in ramis sterilibus sursum alternis, oblongis revolutis acutiusculis glabris; floribus in ramulis spinescentibus racemoso-aggregatis arcte (ante florum evolutione) scarioso-bractea-tis, calycibus omnino glabris. †

In arenosis sylvae prope Pointwater ditionis Perth. Herb. Preiss. No. 2420*.

Rami post delapsam epidermidem secedentem rufescentes, erecti, demum plerumque spinescentes; *ramuli* brevissimi in floriferis 3-4 in sterilibus summis 5-6 lineas non excedentes; *folia* parva, subfasciculata, brevissime petiolulata; *flores* in ramulis pauci, 4-6 subracemosi; *bractee* scariosae ovatae calycem glabrum involucentes.

9. **Cryptandra lasiophylla** Steud. caule erecto ramoso ramis pubescentibus, ramulis floriferis spinescentibus; foliis

* Tres sequentes species nullos praebuerunt flores evolutos nec fructus, hinc magis habitus quam florum investigationis fide huc relatae. Cryptandrae ulicinae et reutiliferae Hook diagnoses comparare non licuit.

fasciculatis oblongo-lanceolatis (parvis 2-5 lineas longis) utrinque hirsutis; floribus in ramulis spinescentibus racemoso-aggregatis (ante florum evolutionem) arcte bracteolatis calycibus glabris. ♂

Cum praecedente. Herb. Preiss. Nq. 2420^b.

Caulis teres, post epidermidis secessum rubicundus, glaber; *rami* erecti pube patenti vestiti, steriles longiores 3-4 pollicares, inermes, floriferi breviores $\frac{1}{2}$ - 1 pollicares, spinescentes; *folia* subfasciculata, 2-4-na, plana, brevissime petiolata, supra praesertim hirsuta, subtus demum glabriuscula: *stipulae* e basi latiore lanceolatae, acutae; *flores* nondum evoluti omnino uti in praecedente.

10. **Cryptandra tenuiramea** Steud. caule ramosissimo, ramis tenuissimis ramulisque spinescentibus pubescentibus; foliis subfasciculatis binis ternisque vel solitariis sparsis (parvis 2-4 lineas longis) linearibus utrinque hirsutis; floribus in ramulis solitariis sparsis, bracteolis involucrantibus lanceolatis acutissimis. ♂

In N. Holl. occ.-austr. Herb. Preiss. No. 2419.

Fruticulus tener pedalis; *rami* flores et folia gerentes semiunciales spinescentes; *folia* solitaria et fasciculata plana, margine revoluta; *stipulae* scariosae, folio triplo breviores, setaceae, acuminatae; *flores* (evoluti desunt) parvi in ramulis sparsi. Iterum ex habitu huc relata.

PITTOSPOREAE.

R. Brown in Flinder's voy. II. 542.

Endl. gen. pag. 1081.

(Auctore ALOYSIO PUTTERLICK.)

PITTOSPORUM Solander Putterlick Synops.

Pittosp. p. 5. Endl. gen. n. 5661. Meisn. gen.

pag. 66. (48.)

Sectio I. EUPITTOSPORUM. Inflorescentia terminalis, simplex vel composita. Fructus plus minusve subglobosi vel ovoidei, angulati vel compressiusculi.

** *Pedunculi* terminales, simplices, solitarii rarius bini ternive, singuli e gemma prodeuntes. *Folia* integerrima.

1. **Pittosporum parviflorum** Putterlick. glabrum, foliis obovatis. 4-5 linealibus, vix ultra 3 lin. latis, apice rotundatis, basi in petiolum vix semilinealem angustatis,

margine integerrimis obtusis, e luteo laete viridescens, sempervirentibus; in utraque pagina concoloribus, opacis, coriaceis; pedunculis solitariis binisve, rarius ternis, tenuibus, linealibus, simplicibus, apicem versus paulo crassioribus; floribus ovatis, vix linealibus, petalis pallide e luteo viridescens, oblongis, obtusis; fructu (immature) ovato-compressiusculo, obscure flavescente, styli basi coronato.

In glareosis sterilibus districtum: York et Wicklow, Australasiae austro-occidentalis, die 20. Martii 1840. Herb. Preiss. No. 1290.

Fruticuli bipedalis *truncus* cylindricus, pennae anserinae crassitie, erectus, cortice cinereo-fusco, longitudinaliter rugoso vestitus, ligno sat duro, denso, flavescente; a basi ramosus. *Rami* teretes, superne sensim attenuati, erecto-patentes, vetustiores trunco conformes, annotini fuscescentes, glaberrimi, nitiduli, punctis minimis resinosis conspersi, ceterum dichotome ramosi. *Folia* obovata, 4-5 linealia, vix ultra 3 lin. lata, apice rotundata, rarissime in junioribus obsolete emarginata, basin versus in petiolum brevissimum vix semilinealem, subtus convexiusculum, supra leviter canaliculatum angustata, plana, e luteo laete viridescens, in utraque pagina concolora, sempervirentia, opaca glaberrima, margine obtusiusculo integerrima, nervo mediano perenni vix infra paululum prominente perducta, lateralibus obsoletis, erecto-patentia. *Pedunculi* in apice ramulorum annotinorum solitarii binive, rarius terni, teretes, vix lineales, filiformes, apicem versus paulo crassiores, et pilis brevibus appressis obsessi, simplices, basi bracteolis, ante evolutionem in gemmam imbricatam conniventibus, minimis, ovatis, acutis, glabris, citissime caducis stipati, sub anthesi mutantes. *Flores* ovati, vix lineam longi, semilineam lati, obtusi. *Calycis foliola* omnia jam delapsa. *Corollae petala* 5, lineari-lanceolata, $\frac{2}{3}$ lin. longa, vix $\frac{1}{3}$ lin. lata, obtusiuscula, glandula punctiformi terminata, extus convexiuscula, intus cava, e luteo laete viridescens, carnosula, succo resinoso ab ovarii glandulis basilariis secreto et inspissato ipso ovario adglutinata. *Stamina* omnia jam delapsa. *Ovarium* ovoideum, lineale, $\frac{2}{3}$ lin. latum, obtuse triquetrum, verruculis minimis scabrum, succo resinoso obductum, basi paulum dilatata glandulis quinque prominentibus, cum staminibus alternantibus et succum resinosum secernentibus stipatum; superne stylo tereti, obtuse subtriquetro, ovarium longitudine aequante, filiformi, basi articulatum tumida ovario affixo, in medio paulo ampliore, in apice *stigmatibus* simplici truncato, medio impresso et obsolete trilobis, subtilissime papillato terminato, post anthesin caduco coronatum; intus triloculare, semiseptis tribus medio juxta axim contiguis et utrinque margine ovuliferis septatum. *Ovula* marginibus duorum semiseptorum conniventium alternatim affixa, parallele biserialia, obovata, mutua pressione sub ulteriore evolutione angulata, stipite brevissimo affixa, horizontalia, anathropa 6-10 in quovis loculo. *Fructus* immaturus ovario duplo major, ceterum cum hoc congruens conformatus.

Sectio II. PLAGIANTHERON. Pedunculi ex axillis foliorum laterales vel terminales, simplices vel divisi.

* *Pedunculi simplices, solitarii, rarius bini. Folia integerrima, subevernia.*

2. **Pittosporum ligustrifolium** All. *Cunningh.* ramis virgatis, dichotome divisis, junioribus tomentoso-incanis; foliis anguste lanceolatis, 2-4 uncialibus, sesquilineam la-

P. litorale. Hooker
P. mutabile Gerdt Müller
P. revolutum hb. N. T. # n 3.

A. *P. revoluta* Wilson diffini
videtur pedunculis axillarib.
& terminalibus perinque
foliariis! An var?

Prope Lannoyton ad fl. South
Isk river. Oct 20. 1848.

Planta minus quam *P. acarioides*
amara. gemmi ^{subulato} ~~expudat~~ conspissuati
fere sebi, coloris ~~flavo~~ ^{rubello} flavescens.
Floris parum odori. Fructus *P. acari-*
oide minores.

Bursera spinosa Cavanilles
In plagis ^{20-30'} siccioribus lapidosis
arbor, cortice gravi fere aro-
matico.

Mount Gambier, ubi, "Box Tree"
vocatur, Port Lincoln, Port Mac-
quary

Grevia Coris diversis temporibus florat

Didymoria acumata Lill. in Mch.
Herc exp. II, 198

undique pilis pellucidis ciliatissimis
purpureo. Rami stricti.
Folia subterrena coriata obtusa
opposita breviter petiolata pellu-
cisco punctata. Pedunculi
axillares filiformes uniflori
supra medium bractealis &
pubescentia acuti. Calyx con-
tus. submembranaceus 4-partitus
lobis acuminatis. Petala
4 longissima distincta lineari
convoluta circa staminum
paria ex his sordidiora intus
glabra. etiam 8 hypogyna
filamentis. Ciliis lineari
baccatis. submembranaceis
albis brevioribus, antho-
dis sagittatis in appressione
capite filiformis glabris. Discus
nullus. Capsula 4-loba, villosa
longissima, ovario diffusus?
(in loc. 1 pp.) et ovario folio
cili, punctatus nec supra al-
ternu propolis

Flowers green
not far from glaucous - river

Detached in Cornacis geminis saepe
Diffusus (Flu)

tis, basi sensim in petiolum circiter semipollicarem attenuatis, apice iterum sensim in mucronulum linealem falcato-recurvum attenuatis, planis, utrinque concoloribus, tenue coriaceis, nervo mediano tenui percursis, lateralibus obsoletis, margine integerrimis, junioribus pilis brevibus mollibus pubescenti-imo tomentoso-incanis; pedunculis axillaribus terminalibusque, solitariis, simplicibus, petiolos aequantibus, junioribus tomentoso-incanis; floribus campanulatis, trilinalibus, badiis; capsulis ovoideo-vel obovato-compressiusculis, bivalvibus, pleiospermis, sordide luteis. — All. Cunningham Mss. in sched. 1822, et in Annals of Nat. Hist. IV. 110. Putterlick Synops. Pittosp. 16. Walpers Repert. I. 250.

P. longifolium Putterlick Syn. Pittosp. 15. Walp. Repert. I. 250.

P. Roëanum Putterlick Syn. Pittosp. 16. Walp. Repert. I. 250.

Habitat in littoribus aridis insulae Rotenest, adversus ostium amnis Cygnorum Australiae orae occidentalis, 1822. (All. Cunningham); ibidem in interioribus coloniae Swan River Dec. 1836 (J. S. Roe) et 1837 (J. Drummond); in arenosis sylvae orae occidentalis insulae Rotenest 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1297.

Arbuseula 20-30 pedalis, ramis divaricatis, gracilibus, flexuosis; ramulis flexuoso-patentibus, propensis, foliatis: adultis glabris, cortice e rufo-purpurascente vestitis, ligno denso, duro, albido; junioribus purpurascentibus, tomento incano tectis. *Folia* solitaria, alternatim dissita, versus ramulorum apicem confertiora, anguste lanceolata, 2-4 uncialia, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basin versus sensim attenuata in petiolum semipollicarem infra convexum, supra canaliculatum, apice iterum in mucronulum linealem falcato-recurvum cuspidato-attenuata, plana, e luteo laete viridescencia, utrinque concolora, sempervirentia, tenue coriacea, nervo mediano tenui vix infra prominente perducta, lateralibus obsoletis, margine obtusiusculo integerrima; juniora pilis brevibus, mollibus pubescenti-imo tomentoso-incana, adulta glaberrima, supra nitida, subtus opaca, sempervirentia. *Pedunculi* e gemma axillari vel terminali solitarii, simplices, teretiusculi, filiformes, petiolos aequantes vel superantes, ima basi bracteolis 2-3, ovatis, acutis minimis, margine ciliolatis, dorso pubescentibus, caducissimis suffulti, tomentoso-incani, adultiores calvescentes, sub anthesi nutantes. *Flores* campanulati, trilineales. *Calycis foliola* 5, ovata, acuta, linealia, aequalia, aestivatione imbricata, sub anthesi patentia, superne recurvata, extus pubescentia, badia, margine pallidiora et brevissime ciliolata. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, aequalia, aestivatione imbricata, subspathulata, ad tres lineas longa, vix lineam lata, unguibus angustioribus in tubulum comiventibus, pallidioribus, laminis sub anthesi patentibus reflexis, in sicco profunde luteis, venis tribus longitudinalibus parallelis et venulis horizontalibus anastomosantibus profundius tinctis perductis, glabris, margine brevissime ciliolatis. *Stamina* 5, hypogyna, petalis alterna et breviora, aequalia: filamentis linearibus, vix sesquilinealibus, superne paululum amplioribus, planiusculis, intus sulco longitudinali exaratis, albidis: antheris terminalibus, ovatis, obtusis, semilineam metientibus, basi emarginata filamento affixis, erectis, post anthesin retrorsis, obscure luteis, biloculatis, loculis oppositis, connectivo adnatis, longitudinaliter introrsum dehiscenibus. *Pollinis* granula lutea, globoso-triedra. *Ovarium* ovoideo-vel ellipsoideo-compressiusculum, lineale, semilineam latum, pilis canis villosum, basi glandulis 5 cum staminibus alternantibus stipatum, superne in stylum teretem, filiformem, ovario

ipso dimidio breviorum et *stigmatibus* hemisphaerico, medio impresso, obsolete quadrilobis et subtilissime papilloso terminatum continue transiens; intus semiseptis duobus parietalibus in axi contiguis biloculatum, septis in margine utrinque loculum spectante alternatim ovuliferis, *ovulis* filo brevissimo annexis, subglobosis, horizontalibus, anatropis, parallele biserialibus, circiter 8-12 in quovis loculo, plurimis abortivis. *Capsula* ovoideo-vel obovato-compressiuscula, stylo brevi terminata, sordide flava, glabra, rugosa, opaca, intus biloculata, in valvas duas deliscens; valvis crassis, coriaceis, reflexo-patentibus, intus citrinis, verniceo-nitidis, medio semisepto incompleto in margine utrinque seminiferis. *Semina* in quovis loculo 4-6, uniseriata, subglobosa, angulato-compressa, diametro lineali, testa purpurascens, nitida, albumine carnosum albo, embryo in fundo albuminis juxta umbilicum posito, ovato, minimo, basi attenuata micropylum vix conspicuum spectante, mere celluloso.

Differt a *Pittosporo acacioides* All. Cunningham Mss. 1817, et in Ann. of Nat. Hist. IV. 109. (*P. angustifolium* Loddig. Bot. Cab. t. 1859 [1832]) quod habitu illo simillimum, ramulis in hoc, foliis et pedunculis jam in statu juniore glaberrimis, foliis magis lanceolatis, utrinque concoloribus, longius petiolatis, pedunculis petiolo duplo brevioribus, floribus paulo majoribus et capsulis aurantiacis, lato-ellipticis; a *Pittosporo phillyraeoides* Dec. vero, cum in hoc folia lanceolata, breviora, duplo latiora, crassioraque, pedunculi petiolo duplo longiores, crassiores, capsulae majores aurantiacae.

3. ***Pittosporum phillyraeoides* DC.** ramis junioribus tomentoso-incanis; foliis ellipticis lanceolatisve, 1-1½ uncialibus, ad 4 lin. latis, basi in petiolum 2-3 linealem angustatis, apice cuspidato breviter mucronatis, mucronulo falcato-reflexo, planis, glaberrimis, pallide luteo-viridescentibus, utrinque concoloribus, coriaceis, nervo mediano tenui perductis, lateralibus obsolete, margine obtusiusculo integerrimo angustissime subrevoluto, erecto-patentibus; pedunculis axillaribus, solitariis binisve, petiolo duplo longioribus; capsulis elliptico-vel ovoideo-compressiusculis, aurantiacis, opacis, rugulosis, bi-trivalvibus pleiospermis. — DC. Prodr. I. 347. Don Gen. Syst. I. 347. All. Cunningham in Ann. of Nat. Hist. IV. 109. Putterlick Syn. Pittosp. 16. Walp. Repert. I. 254.

P. oleifolium All. Cunningham Mss. in sched. 1822.

Habitat in Australiae ora occidentali in arenosis aridis insulae Dirk Hartog 1802 (Lechenault); Hartoge Bay 1804 (Ferd. Bauer) 1822. (All. Cunningham); in arenosis insulae: Horstman's Abrolhos ubi a Cl. G. Moore Jan. 1840 lectum, communicatum accepit cl. Preiss. Herb. Preiss. No. 1294.

„*Frutex* robustus, erectus; ramosus, sexpedalis, habitu fere facie *Oleae*.“ All. Cunningham l. c. *Ramuli* juniores tomentoso-incani. *Folia* alternatim dissita, in ramulorum apicibus confertiora, in petiolum subtus convexiusculum, supra canaliculatum angustata, juxta nervum medianum vix infra parum prominente, superne parum impressa, recentiora utrinque concolora, adulta superne brunnescentia ideoque in pagina inferiore pallidiora apparent. *Flores* hucusque ignoti. *Fructus* capsularis, elliptico-vel ovoideo-vel obovato-compressiusculus, ad 8 lineas longus, 5 lin. latus, ultra 3 lin. diametro transversali, aurantiacus, rugulosus, opacus, in valvas 2-3 dehiscens, valvis fere ultra lineam crassis, coriaceo-lignosis, patentibus-reflexis, intus aurantiacis, verniceo-nitidis, semisepto margine utrinque alternatim seminifero. *Semina* ovata vel subglobosa, angulato-compressa, diametro lineali, testa purpurascens, nitida, glaberrima. *Embryo* in fundo albuminis solidi durioris albidus prope umbilicum situs, minimus, orthotropus, incompletus, mere cellulosis.

Eremothaerus hermanni.

C. n. pinum / salitatio in genu
pinigulare Pittoporo proximum
acide in hb. Stuart Pittopp.

melanopsepinum appellari
lutea in hb. Dehr Myoporum
obtusum novavi, phuturum
Acid non videtur!

In clivis glareosa - arenosis
St. Murray Monnede vulgar
Stuart, Miller, Mueller!

Frutx rarius elongatis clivis
Folia vix nitentia carneola

S.E. myoporsidis frut. Mueller

in the South Australia 1852, n.

In portinchi depr in frut
Spum Gulf apicem v mutis frut
Arborea humilis vel frutx altiss.
Folia narrow - amara,
Anth. prima un.

ONCOSPORUM Putterlick. Endl. gen. n. 5663.

Meisn. gen. pag. 348.

Calyx pentaphyllus, imo margini receptaculi floris adnatus hypogynus, foliolis subaequalibus, distinctis. *Corollae petala* 5, distincta, hypogyna, calycis foliolis alterna, spathulata, in corollam campanulatam conniventia, patentia, apice reflexa, subaequalia. *Stamina* quinque, distincta, hypogyna, petalis alterna, subaequalia, in tubum conniventia; *filamentis* e basi latiore planiuscula intus canaliculata subulato-filiformibus, apice antheriferis; *antheris* ovatis, apice obtusis, baseos emarginatae dorso affixis, biloculatis, loculis appositis, superne contiguas, connectivo adnatis, inferne divergentibus, longitudinaliter introrsum dehiscentibus, pollinis granulis globoso-triedris fartis, erectis, tandem reflexis. *Ovarium* stipite brevi basi glandulis 5 cum staminibus alternantibus instructo et receptaculi conici floris apice insidente liberum, elongato-ellipsoideum, cylindraceo-compressiusculum, anceps, glaberrimum, basi in stipitem angustatum, lateribus planiusculis medio juxta axim sulco longitudinali impressum, apice attenuato in *stylum* teretem, filiformem, glabrum, *stigmatibus* simplicibus, convexiusculo, medio paulo impresso, subtilissime papilloso terminatum continue transiens, intus e semiseptis in axi contiguas biloculatum, septis in marginibus utrinque loculum spectantibus, parallele juxta axim decurrentibus et parum prominulis alternatim ovuliferis. *Ovula* brevissimo funiculo introrsum curvato suspensa, juxta axim dissepimenti utrinque biseriata, subglobosa, horizontalia, anatropa, 4-6 in quovis loculo, plurima abortiva. *Fructus* e receptaculo floris superstitibus stipite brevi suffultus, capsularis; *capsula* late ovoidea vel subglobosa, utrinque compressiuscula, basi in stipitem attenuata, lateribus planiusculis utrinque medio juxta axim sulco longitudinali impressa, marginibus obtusiusculis subanceps, apice attenuata styli basi persistente coronata, fulva, venulis fuscis reticulatim anastomosantibus elevatis obducta, glabra, opaca, tenuiter membranacea, intus biloculata, pleiosperma, maturitate loculicide ab apice ad medium semibivalvata, loculis adhuc clausis e semiseptis in axi cohaerentibus, mox septifrage, semiseptis nunc medio hiantibus, complete bivalvis, semiseptis nunc margine liberis paulo incrassatis et loculos spectantibus seminiferis. *Semina* funiculo vix $\frac{1}{2}$ lineae longo, tenui, corrugato, fusco suspensa, globosa, diametro lineali, purpurascens, glabra, nitida, libera, 2-6 in quovis loculo; *raphe* brevi ab umbilico ad chalazam horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, toruloso-tumida, discolor, intra testam adnata. *Embryo* in fundo albuminis solidi et duri prope umbilicum propria cavitate inclusus, minimus, ovalis, basi attenuata hilum spectans, mere cellulosus.

Suffrutices Australasiae austro-occidentalis, trunco erecto, a basi ramoso; ramis erecto-patentibus, filiformibus, volubilibus; foliis alternis, indivisis, inferioribus spathulatis, argute serrato-dentatis, imo fere pinnatifide dentatis, dentibus iterum denticulatis, superioribus ellipticis, plerumque integerrimis, membranaceis, pubescentibus; pedunculis terminalibus vel rarius axillaribus, simplicibus vel bifidis; floribus speciosis, laete violaceis vel caerulescentibus.

Oncosporum Putterlick in Nov. stirp. mus. Vind. decad. II. pag. 9. Synops. Pittosp. 21. (exclusis characteribus praeter fructus.)

1. ***Oncosporum Drummondianum*** Putterl. ramis filiformibus, longissimis, volubilibus, patentissimo-pubescentibus, adultioribus calvis; foliis brevipetiolatis, pilis longis canescentibus patentissimis utrinque villosis, inferioribus minoribus, semiuncialibus, ad 2 lin. latis, spathulatis, apicem versus grosse serrato-dentatis, imo fere pinnatifido-dentatis, dentibus iterum denticulatis, superioribus ovalibus vel ellipticis, acutis, fere pollicaribus, ad 3 lin. latis, dente uno alterove arguto instructis, supremis lanceolatis vel oblongo-ellipticis, acutis, 1-1½ uncialibus, plerumque integerrimis, omnibus membranaceis, erecto-patentibus; pedunculis ramulos terminantibus, rarius axillaribus, simplicibus vel bifidis, patentissimo-villosis, erectis, sub anthesi nutantibus; floribus speciosis, campanulatis, subirregularibus, pallide violaceis; calycis foliolis subulatis, patentissimo-villosis, capsulis late-ovoideo-compressiusculis, utrinque sulcatis, membranaceis, pleiospermis.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (1839 J. Drummond); in solo glareoso sterili coloniae Swan-River, 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1288); in interioribus continentis inter promontorium Leschenault et King George's Sound, 1843 (J. S. Roe).

Frutex bipedalis et altior, radice tereti, deorsum sensim attenuata, recta, helvola, ramulis fibrillisque paucis, longis aucta. *Truncus* cylindricus, pennae anserinae tenuioris crassitie, semipedalis, superne sensim attenuatus, cortice ferrugineo, rugoso, glabro, nitido vestitus, ligno solido duro, albedo instructus, erectus, hinc inde flexuosus, a basi ramosus. *Rami* teretes, pennae corvinae crassitie, superne sensim attenuati, filiformes, cortice rufo, nitido, spiraliter rugoso-striato vestiti; juniores pilis tenuissimis, diametro eorum duplo longioribus, incanis, horizontaliter patentibus, praecipue apicem versus sat dense villosi, adultiores calvescentes, erecto-patentes, primum recti, tandem flexuosi et volubiles, longitudinem bipedalem et ulteriorem attingentes, alternatim foliati, e foliorum axillis ramulos annotinos foliatis apice floriferos prominentes. *Folia* brevissime petiolata, in serie spirali juxta truncum, ramos ramulosque alternatim dissita; truncus *inferiora* minora, spathulata, uncialia, ad 2 lin. lata, basin versus sensim in petiolum angustata, apicem obtusiusculum vel brevissime acutum versus margine grosse serrato-dentata, imo fere pinnatifido-dentata, dentibus iterum denticulatis, plana, laete viridescens, in pagina superiore intensiora, hinc inde purpura suffuso, sempervirentia, tenuiter coriacea, annotina pilosa, adultiora calvescentia, erecto patentia; *superiora* ovalia vel elliptica, fere uncialia, ad 3 lin. lata, acuta, margine hinc inde dente uno alterove arguto instructa, plana, laete-viridescens, subtus pallidiora, utrinque pilis tenuissimis, longis, canescentibus, tandem evanescentibus villosa, membranacea, nervo mediano pallidiora tenui vix infra paululum prominente perducta, lateralibus saturatioribus anastomosantibus in pagina inferiore magis conspicuis, fere patentia; *suprema*

Pittospor. a st. (etiam procerius, mol.; aut
exaltat.
Characterus generis & specificus nimis
long., enim nullum spatium ad
inferendas species & varietates re-
linquunt. Stirps hinc memoranda
quasi medium inter genera Pit-
tosporum et Bursariae sunt
feminibus et femina nuda
nulla culpa rosacea involuta
ad Onocarpum trahenda
^{X Bursaria (Willd. & Gaudich.)}
Onocarpum prostratum ^{Patersonii}
^{curatius}
Gard. Miller. Pittosporum
prostratum hb. N. T. II n. 135.

diffusum-procumbens, foliis ^{sub} ob-
longo-lanceolatis acutis ^{marginibus involutis}
suboppositis glabris integerrimis
v. apice paucidentatis, pedunculis
axillaribus foliis ^{terminalibus} (foliis nullis
brevioribus, petalis lanceolatis
sepala pubescentia duplo superantibus,
capsulis (vix maturis) orbicu-
latis emarginatis revolvendis pleo-
pennis

Rami 1/2 - 1' longi. Fol. riv. 4-8"
lg 1-2" et; adpressa illorum Le-
ptospori proparii.

South Esk river, Tasman. Nov. 20. 1848.
Certissime frons Bursariae generis
genere combinandum ab ea
tamen praeterquam abunde
diffinita est. Distinctissima.

Species generis alia est species
^{Wuronia (Willd. & Gaudich.) angustifolia}
Onocarpum angustifolium ^{Castro}
procedenti quod flores annua
congruum, repis rursus athen in
vix proximis impetito a i.
Stuar. arripita delicta.
Nov. Wall. paupero (orientalis?) l. b. 4
N. 824.

8. *Murphya* *diocoroides* (Rutted)
(sic). *Oncopporum* *diocoroides* (Rutted)
quorum ~~apertius~~ ^{notis} ~~notis~~ ^{notis}
diagnosi ~~explebris~~ ^{explebris} ~~convenit~~
differe videtur foliis duplo
brevioribus. Et non hujus
laci etiam *Pronaya* *er-*
coides Ldl? An his libri-
obatos comparare licet?

Oncopporum (*Pronaya*?) *Shuarti-*
anum fuit in lib. 2. 960.

Hillebrandia (*Murphy*?) *Shuartiana*
fuit in lib. ad cl. Soudr.
In collibus prope Port. Sorell
litoris boreali-occidentalis
Sarmatiae.

isth aliis jam prima fronte
foliis apice triidentatis disper-
nitur. *Pronaya* *ericae* for-
sare proxima.
Vere!

tandem oblongo-elliptica vel lanceolata, pollicem et ultra longa, vix 2 lin. lata, acuta, integerrima, plana, membranacea, villosa, ceterum reliquis conformia, sed confertiora et erecto-patentia. *Pedunculi* in apice ramulorum annottinorum axillarium et terminalium terminales, rarius e sinu foliorum axillares, solitarii, simplices vel a medio bifidi, teretes, filiformes, foliis duplo longiores, purpurascens, pilis diametro multo longioribus horizontaliter patentibus juniores cano-villosi, demum calvescentes, basi bracteolis subulatis, linealibus, 1-2, villosis suffulti, apicem versus in receptaculum floris sensim incrassati, erecto-patentes, sub anthesi nutantes. *Flores* speciosi, campanulati, petalis divergentibus fere bilabiati, semiunciales. *Calycis foliola* 5, imo margini receptaculi floris conici adnata, distincta, subulato-acuminata, bilinealia, basi latiore vix $\frac{1}{6}$ lin. lata, extus convexiuscula ibique et margine longe pilosa, intus concaviuscula, glabra, subaequalia, pallide lutea, apicem versus purpurascens, aestivatione imbricata corollae adpressa, sub anthesi patentia, persistentia. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, distincta, spatulata, ad 6 lin. longa, subaequalia, marginibus aestivatione imbricata, sub anthesi unguibus fere trientem petali occupantibus, lineam latis, introrsum marginibus involutis canaliculatis pallide luteolis in tubum subobliquum conniventibus, laminis ad sesquilineam latis, cuspidato-apiculatis, lacte violaceis, patentibus apice reflexo, tota venis quinque longitudinalibus parallelis, in petalis tribus superioribus sursum reflexis atris, in inferioribus duobus magis divergentibus pallidioribus, et venulis horizontalibus percursa. *Stamina* 5, petalis alterna, hypogyna, distincta, in alabastro duplo, sub anthesi triente breviora, subaequalia, tubum parum excedentia; *filamentis* e basi latiore intus sulco exarata subulato-filiformibus, glabris, albis, in tubum sursum incurvum conniventibus, apice antheriferis; *antheris* ovatis, obtusis, semilinealibus, baseos emarginatae dorso affixis, luteolis, erectis, post anthesin retrorsis, biloculatis, loculis introrsum longitudinaliter dehiscentibus; *pollinis* granulis globoso-triedris, luteolis farctis. *Ovarium* et *fructus* jam in charactere generali exposita. *Semina* nunc in quovis loculo uniseriata, globosa; *raphe* a puncto insertionis funiculi seu umbilico axim capsulae versus horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, toruloso-tumida, integumento communi seminis hic discolor obducta, intus cava, filo tenuissimo e vasorum fasciculis tela cellulosa connexis, albido, corrugato percursa. *Testa* seminis e strato cellularum cubicarum parietibus sat crassis et profundius coloratis superficiali constructa, adnata strato cellularum simplici, teneriori, hyalino albido, cum membrana interna tubuli raphes continuo, in regione chalazae placentulam vasculosam includente et nucleum ipsum undique arcte ambiente. *Nucleus* membrana obsolete cellulosa, tenerrima, transparente, tandem a chalaza soluta et undique libera involutus. *Albumen* subglobosum, ad chalazam complanatum, integrum, solidum, fere corneum, coloris lactei, ad micropylum a testa retractum impressum, ibique intus cavitate ellipsoidea undique clausa, humore repleta, vix $\frac{1}{200}$ partem albuminis consumente embryonem includens. *Embryo* in fundo cavitatis micropylum spectante sacculo proprio, tenerrimo, pellucido inclusus, compresso-ovalis, vix $\frac{1}{100}$ lineae permetiens, basi attenuata umbilicum spectans, apice obtuso paullulum emarginatus, coloris lactei, transparentis, simplex, mere cellulosus, partibus certis nondum discernendis.

MARIANTHUS Hügel msc. Endl. gen. n. 5664.
Meisn. gen. pag. 348.

1. **Marianthus candidus** Hügel. ramis flexuosis, volubilibus, glabris, punctulato-verruculosis; ramulis erecto-patentibus, superne sericeo-incano-tomentosis, apice flori-

feris; foliis alternis, subsessilibus, inferioribus rameis late ellipticis, bipollicaribus et ultra, ad $\frac{2}{3}$ pollicis latis, superioribus oblongo-ellipticis, angustioribus, omnibus margine revoluti integerrimis, pallide viridescentibus, subtus pallidioribus, pilis adpressis pubescentibus, supra glabris, opacis, coriaceis, erecto-patentibus, sempervirentibus; pedunculis terminalibus, folio multo longioribus, teretibus, sat crassis, pilis adpressis sericeo-incanis, erectis, rectis, superne alternatim ramosis, ramulis bracteatis, rectis, trichotomis, in cymam multifloram (50-100-floram), dispositis; floribus speciosis, 7-8-linealibus, campanulatis, erectis; calycis foliosis subulato-acuminatis, purpurascens, pubescentibus; petalis candidis, ungue purpurascens; antheris caeruleis; capsulis

Marianthus candidus Hügel msc. Endl. Enum. pl. Hügel pag. 8. Putterlick Synops. Pittosp. 22.

In Australia austro-occidentali ad fluvium Cygnorum (Dec. 1833. L. B. ab Hügel): in Colonia Swan-River (Dec. 1837. J. Drummond, n. 82.) in arenosis sylvae prope oppidum Perth Nov. 1839. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1285.

Frutex robustus, scandens, 6-10 pedalis, floribus innumeris ubicunque onustus, elegantissimus.

2. ***Marianthus coeruleo-punctatus*** Klotz. ramis erecto-patentibus, volubilibus, pubescentibus, apice floriferis; foliis brevipetiolatis, inferioribus spathulatis, bipollicaribus, $\frac{3}{4}$ pollicem latis, brevissime acutis, grosse serratodentatis aut pinnatisectis, superioribus oblongo-ellipticis, utrinque longe attenuatis, $1\frac{3}{4}$ pollicaribus, 7-2 lin. latis, integerrimis, pubescentibus, tandem calvis, erecto-patentibus; pedunculis in apice ramulorum terminalibus, solitariis, teretibus, folio supremo plus duplo longioribus, junioribus pilis adpressis sericeo-pubescentibus, fructiferis calvescentibus, erectis, rectis, superne alternatim ramosis, ramulis basi bracteatis erecto-patentibus, rectis, simplicibus vel superne trichotomis, imo iterum divisis, pedicellis basi bracteatis in cymam multifloram (12-36-floram) dispositis. teretibus, superne in receptaculum floris sensim ampliatis, pilis adpressis sericeo-incanis, sub anthesi nutantibus, fructiferis erectis; floribus speciosis, ad 9 linealibus, divergenti-campanulatis; calycis foliolis subulato-acuminatis, viridibus, interdum apice purpurascens, sericeo-pubescentibus; corollae petalis longe spathulatis, subaequalibus, laete e violacco-caeruleis, superioribus tribus sursum reflexis in ungue candido caeruleo-punctatis, inferioribus duobus divergentibus reclinatis concoloribus; staminibus post anthesin reclinatis, antheris caeruleis; capsulis oblongo-ovalibus, cylindraceo-compressiusculis, toruloso-elevatis, membranaceis, bilocularibus, bivalvibus, polyspermis, seminibus in quovis loculo biseriatis 10-24, purpurascens. — Klotzsch

Hillebrandia, n. g. fuit Muell.

Iniusque cum *Thibatio* confusum
~~in proximum~~, pro be tamen de-
finitur: antheris versatilibus glan-
dula defutis ^{calyce dentato} & capsulis digynitis
planis at in *Eriophrone* liberis;
ab ~~xxx~~ ultimo differt antheris
in appendiculatis, denique a
Chorilaena *Pylo* simplicie, &
stigmatibus integro minuto &
calyce haud manifeste abste-
ato. ~~ultima nota~~ ~~Thibatio~~
hoc ultimo signo *Hillebrandia*
capitata (*Thibadium* *capitatum*
fuit Muell. nunc autem in hb.) *Chorilaenae*
convenit igitur ^{quam} *Eriophrone* *Thibatio*
potissimum considerata, utriusque
fuit tamen nomen reputat
fuerit.

Hillebrandia *capitata* &
fruticulosa (*Eriophrone* *fruticulosa*
~~Thib.~~ Lab., *Thibadium* *Billardieri*
~~Ad. Juss.~~) ~~plura~~ obolitissimum *bra-*
teata sunt. *Thibatio* &
Eriophrone *Thibatio* in *Hillebran-*
diae genus transfundat. An idem
genus quam *Hillebrandia* *Thibatio*
non nisi nomine innotuit?

in Icon. plant. rar. h. b. Berol. I. 28. t. 12. Walp. Re-
pert. I. 256.

In Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Dec. 1839. J. Drum-
mond); 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. sine Num.

Frutex 4-6 pedalis, ramis copiosissimis, longissimis, volubilibus, pubescentibus, saepissime in aliis plantis scandens. — *Fructus* in pedicellis erectis rectus, in receptaculo floris superstiti stipite brevissimo insidens, capsularis. *Capsula* oblongo-ovalis, cylindraceo-compressiuscula, basi in stipitem attenuata, faciebus planioribus medio juxta axim sulco longitudinali impressa, parietibus juxta sulcum utrinque e seminibus incrassatis torulosa, angulis obtusiusculis medio juxta longitudinem sutura valvarum decurrente subanceps, apice rotundata subemarginata, in emarginatura styli basi persistente coronata, pallide virescenti-flava, glabra, nitida, tenuissime membranacea, intus e semiseptis in axi contiguas biloculata, loculis polyspermis, tandem loculicide et septifrage rupta bivalvis, valvis patentibus apice parum reflexis, in semiseptorum nunc liberorum marginibus prominulis loculum utrinque spectantibus alternatim seminiferis. *Semina* in quovis loculo biseriata, alternatim mox ex uno, mox ex altero margine septi egredientia, funiculo brevissimo vix $\frac{1}{6}$ lin. longo, corrugato, fusco suspensa, globosa, diametro lineali, purpureo-purpureo, laevia, nitida, 12-16 in quovis loculo. *Raphe* brevi ab umbilico axim capsulae versus horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, toruloso-tumida, integumentum communi seminis colore obducta, intus cava, filo tenuissimo e fasciculis vasorum tela cellulosa connexis albedo, corrugato perducta, ad chalazam in placentulam orbicularem vasis pertextam ampliata. *Testa* seminis e strato cellularum crassarum intensius coloratarum simplici superficiali, adnato strato interiore e cellulis tenuioribus albedo, transparente. *Nucleus* membrana tenerrima transparente, tandem a chalaza soluta involutus. *Albumen* subglobosum, ad chalazam complanatum integrum, solidum, sat durum, fere corneum, coloris lactei, ad micropylum parum impressum, intus cavitatem ellipsoideam, vix $\frac{1}{200}$ albuminis consistentem, undique clausam et embryonem includentem continens. *Embryo* in fundo cavitatis situs, sacculo proprio tenerrimo pelucido inclusus, ovalis, complanatus vix $\frac{1}{100}$ lineae permittens, basi attenuata hilum spectans, apice obtuso, coloris candidi, simplex, mere cellulosus.

3. **Marianthus erubescens** *Pattert.* ramis volubilibus glabris; foliis petiolatis, inferioribus lato-ellipticis, bipollicaribus, ultra pollicem latis, superioribus oblongo-ellipticis, aequilongis, angustioribus, apice cuspidato brevissime apiculatis, margine integerrimo subrevolutis, planis, laete viridescentibus, subtus pallidioribus, glabris, coriaceis. erecto-patentibus; pedunculis e ramulorum lateralium vel foliorum axillis solitariis, imo haud raro binis superpositis, teretibus, folio brevioribus, purpurascens, glabris, erecto-patentibus, superne di-trichotomis, pedicellis basi bracteatis, sub anthesi nutantibus; floribus speciosis, fere pollicaribus, campanulatis, irregularibus, nutantibus; calycis foliolis ovatis, acutis, dorso glabris, purpurascens, margine pallido subtilissime ciliolatis; petalis longe spathulatis, intense purpureis, intus in ungue candidis, subaequalibus, superioribus tribus sursum reflexis, inferioribus duobus magis distantibus reclinatis; antheris flavis; capsulis oblongo-ellipticis, utrinque compressiusculis, longitudinaliter juxta axim sulco impressis, ancipitibus, membranaceis. coloris testa-

cei, venis saturatoribus anastomosantibus pictis, biloculatis, loculis polyspermis (16-24); seminibus utrinque in loculis biseriatis, purpurascens. — Putterlick in Nov. Stirp. Mus. Vind. decad. VII. pag. 60 n. 69. Synops. Pittospor. 23. Walpers Repert. I. 256.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Dec. 1839. J. S. Roe) ibidem (Dec. 1839. J. Drummond, collect. n. 78); in solo glareoso sterili ad Eucalyptos fruticosos scandens, prope Wicklow. 9. Nov. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1292.

Frutex scandens, 4-6 pedalis, floribus intense purpureis, in genere hucusque maximis, inter folia laete viridia sparsis, adspectu eximius.

4. **Marianthus pictus** Lindl. ramis ramulisque erecto-patentibus, flexuosis, glabris, nitidis; foliis inferioribus obovatis, 6-8 linealibus, 4 lin. latis, basin versus in petiolum brevissimum angustatis, apice rotundatis, obtusis, e nervo mediano parum excedente brevissime apiculatis, margine integerrimis, superioribus brevi-petiolatis, ellipticis, apice acutis, margine hinc inde argute serrato-dentatis, omnibus marginibus angustissime revolutis, lacte virescentibus, infra pallidioribus, rore glaucescente praecipue infra obductis, planis, glabris, opacis, erecto-patentibus; pedunculis in apice ramulorum annotinorum terminalibus vel e sinu foliorum supremorum axillaribus, teretibus, filiformibus, semipollicaribus, rufis, glabris, erecto-patentibus, apice alternatim ramulosis in cymam pauciflorum, (3-6 florum) dispositis; floribus speciosis, 6 linealibus, irregularibus, fere bilabiatis, nutantibus; capsulis oblongo-ellipsoideis, cylindraceo-compressiusculis, medio utrinque juxta axim sulco longitudinali impressis, membranaceis, biloculatis, loculis polyspermis; seminibus in quovis loculo 12-16, uniseriatis, purpurascens. — Lindley in Append. to Bot. Reg. 1839 in notis pag. XXII. n. 93. Walpers Repert. I. 256.

Oncosporum bicolor Putterlick in Nov. stirp. Mus. Vind. decad. II. pag. 9. Synops Pittosp. 21. (exclusa descriptione fructus) Walpers Repert. I. 256.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Jan. 1834. L. B. ab Hügel); Dec. 1837. (J. Drummond); in districtibus York, Wicklow, Victoria, etc. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1286.

Frutex 2-3 pedalis, a basi ramosus, ramis cylindricis, pennae asserinae crassitie, sursum sensim tenuioribus, pedalibus et longioribus, cortice ferrugineo et laminis tenuissimis epidermidis hinc inde solutae cinerascens vestitis, erecto-patentibus, erectis, strictis, undique alternatim ramosis, ramulis teretibus, filiformibus, flexuosis, purpurascens, opacis, inferioribus longioribus, erecto-patentibus, fere fastigiatis, alternatim dissite foliatis, apice floriferis. *Folia* solitaria, inferiora obovata, 6-8 linealia, ad 4 lin. lata, basin versus sensim in petiolum brevissimum angustata, apice rotundata, obtusa, e nervo mediano parum excedente brevissime apiculata, fusco-virentia, infra pallidiora, rore glauco obducta; superiora elliptico-obovata vel elliptica, pollicaria, ad semunciam lata, basi in petiolum 1-2 linealem supra canaliculatum subtus convexiusculum angustata, apice acuto imo in supremis cuspidato apiculato hinc inde argute serrato-dentatis, omnibus

marginibus angustissime revolutis, nervo mediano infra basi versus parum prominulo pallidiore perducta, lateralibus obsoletis, pallide viridescens, infra pallidiora, utrinque sed infra evidenter rore glaucescente obducta, plana, juniora pilis brevibus consita, adulta glabra, opaca, erecto-patentia persistentia. *Pedunculi* in apice ramulorum annotinorum terminales vel e sinu foliorum supremorum axillares, teretes, filiformes, semipollicares, purpurascens, glabri, erecto-patentes, superne alternatim ramosi, *pedicellis* 3-6, teretibus, filiformibus, circiter 1 linealibus, viridibus, glaberrimis, basi bracteola minima, ovata, acuta, vix $\frac{1}{2}$ lineali, caducissima stipatis, superius cicatrice una alterave instructis, in cymam paucifloram dispositis. *Flores* speciosi, sexlineales, campanulati, petalis fere bilabiatis divergentibus, subaequalibus, irregulares sub anthesi mutantes. *Calycis foliola* 5, marginiextimo receptaculi conici floris inserta, distincta, ovata, $\frac{2}{3}$ lin. longa, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata, acuta, dorso convexusculo purpurascens, intus cava, albidia, glabra, aequalia, in alabastro marginibus imbricata, sub anthesi corollae adpressa, demum decidua. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, distincta, spatulata, superiora tria $\frac{5}{6}$ linealia, inferiora duo paulo longiora, fere 7 linealia, ad unguem vix trientem longitudinis attingentem fere lineam lata, superne in laminam duas lineas latam obovatam, apice rotundatam brevissime apiculatam desinentia, aestivatione marginibus imbricatis sese tegentia, sub anthesi unguibus, marginibus parum involutis canaliculatis in tubum sursum incurvum conniventia, laminis patentibus apice reflexo, tria superiora sursum recurvata, duo inferiora magis distantia reclinata, in basi unguis glandula luteola instructa, ceterum candida, in pagina exteriori et suprema parte laminae luteola, venis quinque parallelis purpureis, tribus intermediis latioribus longitudinaliter percursa, in unguibus trium superiorum inter venas purpureo-punctatis, plana, glaberrima. *Stamina* 5, hypogyna, petalis alterna, distincta, subaequalia, in alabastro petalis duplo, sub anthesi triente breviora, in tubum sursum incurvum conniventia, apice divergentia, demum divaricata et deorsum reclinata; *filamentis* subulatis, e basi latiore complanata, dorso convexuscula intus canaliculata sensim filiformibus, albidis, apice antheriferis; *antheris* ovatis, semilinealibus, apice obtusis, integris, baseos emarginatae dorso filamento affixis, luteis, erectis, post anthesin retrorsis, biloculatis, loculis appositis, superne contiguis connectivo adnatis, inferne subdivergentibus, longitudinaliter introrsum dehiscentibus, pollinis granulis globoso-triedris, luteolis, glabris larcitis. *Ovarium* basi stipite brevissimo glandulis quinque cum staminibus alternantibus instructo subsessile, liberum, longe ellipsoideum, cylindraceo-compressiusculum, bilineale, in faciebus planiusculis medio juxta axim longitudinaliter sulco impressum, angulis convexusculis, acutiusculis anceps, glabrum, basi rotundatum, apice parum attenuato in *stylum* teretem, filiformem, germinis fere longitudinem attingentem et stamina vix superantem, una cum ovario sursum paulo incurvum, glabrum, apice *stigmatibus* oblique depresso simplicissimo terminatum continue transiens; intus e semiseptis parietalibus in axi contiguis biloculatum, septis in marginibus utrinque loculum spectantibus parum prominulis, et juxta axim decurrentibus alternatim ovuliferis. *Ovula* funiculo brevissimo introrsum curvato suspensa, sub globosa, basi cordato-emarginata, prominentia una umbilicali funiculo affixa, altera ad latus extrorsum prope umbilicum micropylum aperiente, anatropa, utrinque in loculo uniseriata, horizontalia, 12-16. *Fructus* stipite brevissimo e receptaculo floris superstitibus suffultus, capsularis, mutans. *Capsula* longe ovoidea vel ellipsoidea, cylindraceo-compressiuscula, in faciebus planioribus medio juxta axim sulco longitudinali impressa, angulis obtusiusculis fere anceps, basi rotundato-cordiformi, apice styli basi persistente coronata, glabra, coriaceo-membranacea, olivaceo-spadicea, nitida, intus biloculata, polysperma, maturitate, primo loculicide ab apice ad medium semi-bivalvata tandem septifraga complete bivalvis, valvis in semiseptorum nunc hiantium et marginalium marginibus introrsum prominulis caxum loculorum spectantibus utrinque seminiferis. *Semina* funiculo vix $\frac{1}{2}$ lineali corrugata suspensa, subglobosa, mutua pressione angulata, diametro lineali, purpurascens, laevia,

nitida, raphe brevi ab umbilico axim capsulae versus horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, parum tumida, integumento communi seminis concolori obducta, intus cava, fasciculum vasorum tela cellulosa continentium in filum tenuissimum corrugatum includente, ad chalazam in placentulam orbicularem vasis pertextam ampliata. Integumentum commune seminis sive *testa* e strato cellularum crassarum simplici, coloris profunde umbrini, tenerum, opacum, sat durum, adnatum strato cellularum teneriore, transparente, pallidi coloris. *Nucleus* membrana tenerima, transparente, tandem a chalaza soluta involutus. *Albumen* subglobosum, ad chalazam complanatum, integrum, solidum, durum, corneum, coloris lactei, ad micropylum parum impressum, intus cavitatem ellipsoideam, vix $\frac{1}{200}$ albuminis consumentem, undique clausam et embryonem includentem continens. *Embryo* in fundo cavitatis situs, sacculo proprio tenerrimo pelucido inclusus, ovalis, complanatus, vix $\frac{1}{1000}$ lineae permiens, basi attenuata micropylum versus umbilicum spectans, apice obtuso, coloris lactei, simplex, mere cellulosis.

Brounea angustifolia Lehmann.

5. ~~*Marianthus angustifolius*~~ Putterl. ramis erecto-patentibus, rectis, virgatis, plus minus fastigiatis, glaberrimis, foliosis; foliis subsessilibus, fere linearibus, $1-1\frac{1}{2}$ uncialibus, latioribus ad 2 lin. latis, a medio basin versus sensim angustatis, superne marginibus parallelis apice brevissime acuto, apiculatis, integerrimis, planis, laete viridescentibus, infra pallidioribus, glaucescenti-nitentibus, glabris, erecto-patentibus, pedunculis ramulos annotinos continue terminantibus, solitariis, folia suprema superantibus, filiformibus viridescentibus, glabris erectis, superne cymoso-ramosis, paucifloris; pedicellis simplicibus, bitridisve, erectis, floribus speciosis, 5 linealibus, campanulatis; calycis foliolis subulato-acuminatis, dorso pubescentibus; petalis violaceo-coeruleis, ungue saturatiore; fructibus

Habitat in Australiae austro-occidentalis Colonia Swan-River (Nov. 1840. (Drummond) 1839. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1287.

Suppetunt specimina tria, unum tantum suprema radice de fractae parte adhuc instructum, *trunco* cylindrico, bipedali et altiore, inferne vix penna corvina crassiore, superius sensim attenuato, cortice rufescente, longitudinaliter rugoso, nitido, in ramulis pallidioribus vestito, ligno denso, duro, albido praedito. *Rami* ex axillis foliorum persistentium jam a basi, vix pollicem ultra radice initium, egredientes, inferiores distantia circa pollicari alternatim dissiti, superiores sensim magis approximati, pedales et longiores, plurimi apicem trunci attingentes, filo emporetico vix crassiores, plerumque simplices, rarius inferiores apicem versus ramulosi, erecto-patentes, superiores fere cum trunco erecti, stricti, virgati, a basi foliosi, apice floriferi. *Folia* solitaria, alternatim in ambitu ramorum dissita, subsessilia, fere linearia, $1-1\frac{1}{2}$ uncialia, ad 2 lin. lata, superiora angustiora, a medio versus basin sensim angustata, superne marginibus integerrimis parallelis apice brevissime cuspidato apiculata, apiculo plus minusve oblique recurvo, plana, margine paulo crassiore obtusiusculo tenuissime marginata, nervo mediano pallidioribus infra in basi paulo prominente perducta, venulis lateralibus horizontalibus et anastomosantibus nonnisi in foliis adultioribus conspicuis intra marginem arcuatim connexis, laete viridia, sublus pallidiora, glaucescenti-nitentia, sempervirentia, glaberrima, erecto-patentia. *Pedunculi* ramulos annotinos continue terminantes, solitarii, teretes, folia suprema plerumque superantes, erecti, sparsim pilosi, superne cymoso-ramosi, pe-

dicellis 4-6 linealibus, filiformibus, longitudinaliter sulcatis, adpresse pilosis, erecto-patentibus, basi bracteola subulata vix lineali pubescente suffultis, apice in receptaculum floris paulo ampliatis, simplicibus vel superius bi-trifidis, ramulis bracteola conformi suffultis. *Flores* campanulati, 5 lineales, erecti. *Calycis foliola* 5, hypogyna, distincta, margini extimo receptaculi floris conici adnata, e basi ovata subulato-acuminata, sesquilinealia, basi latiore $\frac{1}{3}$ lin. lata, dorso convexiuscula, ibique et marginibus pilosa, aestivatione marginibus imbricata, sub anthesi patentia, persistentia. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, in receptaculo superius adnata, distincta, spatulata, 5 linealia, aestivatione convoluta-imbricata, sub anthesi unguibus $\frac{1}{2}$ lin. latis marginibus involutis canaliculatis, vix trientem petali attingentibus, intense violaceis in tubum conniventibus, laminis $1\frac{1}{2}$ lin. latis, obovatis, planis, apice brevissime cuspidato apiculatis, patentibus apice reflexo, laete violaceis, una cum ungue venis 3 saturatioribus parallele longitudinalibus, et venulis horizontalibus praecipue marginem versus anastomosantibus perductis. *Stamina* 5, hypogyna, petalis alterna, distincta, in alabastra petalis dimidio breviora, sub anthesi $\frac{2}{3}$ petalorum attingentia, tubum floris superantia; *filamentis* subulatis, intus extusque canaliculatis, tetrapteris, albidis, rectis, post anthesin paulo extrorsum curvatis, apice antheriferis; *antheris* ovatis, obtusis, luteolis, baseos emarginatae dorso affixis, intus biloculatis, loculis superne contiguis, connectivo adnatis, inferne parum distantibus, longitudinaliter introrsum dehiscens: *pollinis granulis* globoso-triedris, luteolis faretis. *Ovarium* stipite brevissimo glandulis 5 cum staminibus alternantibus instructo apice coni receptaculi floris insidens, longe ellipsoideo-compressiusculum, lateribus convexiusculis medio juxta axim impressum, obtuse anceps, glabrum, superne in stylum teretem, filiformem, ovario dimidio breviorum, et stamina aequantem, glabrum, apice *stigmatibus* obtuse bilobo papilloso terminatum continue transiens; intus biloculatum e semiseptis in axi contiguis et marginibus utrinque loculum spectantibus duplicatis alternatim ovuliferis. *Ovula* funiculo brevissimo extrorsum curvato suspensa, subglobosa, horizontalia, anatropa, micropyle ad latus externum prope umbilicum aperta, uniseriata, 8-10 in quovis loculo. *Fructus*

**CHEIRANTHERA All. Cunningh. Meisn. gen.
pag. 66. (48.) Endl. gen. n. 5665.**

1. **Cheiranthra? Preissiana Putterl.** ramis filiformibus, flexuosis, volubilibus, junioribus pilis canis deorsum directis dense pubescentibus; foliis alternis, brevissime petiolatis, ovatis vel ovalibus vel oblongo-ovalibus, utrinque rotundatis, apice praeterea emarginatis, planis, margine integerrimo revolutis, utrinque pilis canis patentibus dense villosulis, junioribus in axillis adultiorum fasciculatis, erecto-patentibus; pedunculis ex axillis ramulorum et foliorum axillaribus et ex apice ramulorum annotinorum terminalibus, filiformibus, foliis multo longioribus, simplicibus, junioribus patentibus-pilosis, adultis calvis; floribus . . . ; ovario longe-ellipsoideo, cylindraceo-compressiusculo, basi in stipitem brevissimum, receptaculo floris superstitē insidentem contracto, faciebus planiusculis medio juxta axim sulco longitudinali impresso, angulis obtusiusculis subancipiti, glabro, apice in stylum teretem, filiformem, sursum incurvum, stigmatibus obtuso, truncato terminatum continue transiente. intus

biloculato, loculis multi-ovulatis (12-16), ovulis in loculo uniseriatis; fructibus . . .

In Australiae austro-orientalis rupestribus montis Currie prope oppidum York, die 15. Aprilis 1840. Herb. Preiss. No. 1291.

Planta deficientibus floribus et fructibus ex ovarii unici foecundati, parum evoluti, solummodo superstitis et ovulorum constructione certe Pittosporoarum familiae civis, quoad genus quidem dubia; at habitu universaliter et reliquorum partium conformatione cum duabus speciebus novis, exacte *Chorizantherae* generis, ab J. Drummondio 1839 floriferis et fructiferis in eadem colonia collectis, etiam inflorescentia et ovarii constructione quam maxime congruens, et cum nullo alio Pittosporoarum genera, excepto forsitan genere *Billardiera*, quod vero ovariorum constructione et fructibus pendulis, non erectis, recedit, magis convenit.

Fruticuli 4-6 pedalis, in vicinis plantis lubenter scandentis, ramulos video teretes, adultiores vix penna corvina crassiores, plurimos filum emporiticum crassitie vix superantes, longissimos, tripedales et longiores, flexuosos, volubiles, cortice laete ferrugineo, spiraliter rugoso-striato, glabro, laevi, nitido vestiti, superius epidermide tenuissime membranacea, pilis mollibus, canis, deorsum directis obsita et hinc inde a cortice soluta, sed ramulos adhuc interruptim amplectente instructos, superne epidermide adhuc integra et pilis mollibus, canescentibus, deorsum directis densissime canovillosos, foliis alternatim, basi distantia circiter bipollicari, superius sensim decrescente, dissilis, apicem versus in axillis ramorum fasciculatis. *Folia* brevissimo petiolo infra convexiusculo, supra canaliculato patenti-villosa insidentia, ovata, ovalia, vel oblongo-ovalia, 3-4 linealia usque pollicaria, 2-6 lin. lata, plana, utrinque rotundata, apice praeterea acute emarginata, margine integerrimo revoluta, in sicco convoluta, laete luteo-viridescencia, subtus pallidiora, utrinque pilis mollibus, canis patentissimis, praecipue juniora dense incano-villosa, patentia vel erecto-patentia, persistentia. *Ramuli* ex axillis foliorum egredientes, e gemma, bracteis minimis ovatis, acutis, dorso convexiusculis margineque breviter pilosis, intus cavis glaberrimis, primo marginibus sese imbricatim tegentibus, conniventibus, serius patentibus, et primo in sinu pedunculum unum alterumve ima basi bracteolis 1-2, minimis suffultum exserens, tandem in ramulum foliferum, ex axillis foliorum hinc inde iterum pedunculum solitarium emittentem, et apice in pedunculum solitarium terminante proveniunt. *Pedunculi* simplices, teretes, filiformes, foliis multo longiores, 1-2 pollicares, apicem versus in receptaculum floris sensim ampliati, pilis mollibus, canis horizontaliter-patentibus dense incano-villosi, adulti calvescentes, erecto-patentes, recti vel apice parum nutantes. *Flores* et *fructus* omnes delapsi. *Ovarium* foecundatum unicum superstes, basi attenuata in receptaculo floris superstite, convexiusculo et medio impresso fere subsessile, longe ellipsoideum, cylindraceo-compressiusculum, 4 lineale, diametro latiore transversali $\frac{2}{3}$ lin., angustiore $\frac{1}{3}$ lin. latum, in faciebus planiusculis medio juxta axim sulco longitudinali impressum, parum inclinatam, angulis exterioribus obtusiusculis stria suturali medio longitudinaliter insignitis fere anceps, glabrum, apice attenuato in stylum teretem, filiformem, sursum tenuiorem, ovario fere duplo breviorum, lateribus utrinque sulco ex ovario continue decurrente exaratum, apice stigmatibus obtuse convexiusculo, obsolete bilobo terminatum, glabrum, parum inclinatam, persistentem continue transiens; intus e semiseptis in axi contiguis et cohaerentibus biloculatum, loculis multiovulatis. *Ovula* in marginibus semiseptorum juxta axim capsulae contigue parallele decurrentibus et in loculos utrinque prominentibus funiculo brevissimo, albido, corrugato alternatim, mox ex uno mox ex altero margine egrediente suspensa, subglobosa, diametro semilineali, mutua pressione angulato, basi emarginato-cordata, torulo uno umbilicali funiculo adhaerentia, altero micropylum prope umbilicum ad latus externum constituite: *raphe* ab umbilico introrsum horizontaliter per quadrantem circumferentiae ovuli producta, parum tumida, testa communi obducta, in

regione chalazae paulo ampliata; intus nuclei loco in cavo sacculum albidum corrugatum, chalazae adhaerentem et contractum includentia.

SOLLYA Lindl. Meisn. gen. pag. 66. (47.)

Endl. gen. n. 5666.

Billardierae spec. Labillardiere.

Labillardierae spec. Roem. et Schult.

1. **Sollya heterophylla** Lindl. Suffrutex 2-4 pedalis, ramulis volubilibus; foliis alternis, oblongo-ellipticis, primariis serrato-dentatis, serioribus integerrimis, supremis linearibus; pedunculis solitariis in ramulis annotinis ex axi foliorum supremorum axillares vel terminales superne in cymam 5-9 florum divisus; floribus nutantibus, coeruleis; fructibus longe cylindraceis baccatis pendulis. — Lindl. Bot. Reg. 1831. t. 1466. Don in Sweet Flow. Gard. t. 232. Loddiges Bot. Cab. t. 1795. Hooker in Bot. Mag. t. 3523. Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 9. Putterlick Synops. Pittosp. 25.

Sollya angustifolia Lindley in Bot. Reg. 1831. sub n. 1446. et 1840. n. 3. n. 1466.

Sollya linearis Lindley in Bot. Reg. 1840. t. 3.

* *Billardiera fusiformis* Labillardiere Nov. Holl. pl. spec. 1. 65. t. 90. Dryander in Ann. of Botany II. 515. Decand. Prodr. I. 345. Spreng. Syst. veg. I. 792. Don. Gen. Syst. 373. Confr. Hook in Comp. to the Bot. Mag. II. 63.

Labillardiera fusiformis Roem. et Schult. Syst. veg. V. 330.

Crescit in Australiae insulae Van Diemen, (Jan. 1793. Labillardiere! ex sched. specim. authent.) Dec. 1804. (Ferd. Bauer) in Australiae ora orientali prope Sydney, Illawara (Dec. Jan. 1803 Ferd. Bauer); (1833. L. B. ab Hügel); in ora austro-occidentali ad sinum regis Georgii (1822 All. Cunningham, Baxter, 1833. L. B. ab Hügel); in colonia Swan-River prope Freemantle (Jan. 1834. L. B. ab Hügel); (1839. J. Drummond); in calcareis declivium montis Baldhead, 16. Oct. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1289; in interioribus continentis a promontorio Le-schenault ad King George's Sound (1842. J. S. Roe).

PRONAYA Hügel. Endl. gen. n. 5667.

Meisn. gen. pag. 348.

Spiranthera Hooker in Bot. Mag. sub n. 2523, non A. St. Hilaire.

Campylanthera Hooker Icon. pl. I. 82, non Schott.

Billardiera spec. Decand. Prodr. I. 345.

1. **Pronaya elegans** Hügel. ramis erecto-patentibus, volubilibus, junioribus pilis erectis adpressis incano-pubescentibus; foliis brevipetiolatis, lanceolatis vel oblongo-lanceo-

latis, sesquipollicaribus, ad 4 lin. latis, breviter cuspidatis, superioribus brevioribus et angustioribus, planis, margine integerrimo revolutis, laete viridescens, subtus concoloribus, junioribus subtus pilis canis adpressis sparse pilosis, supra glabris, adultis calvis, erecto-patentibus; pedunculis terminalibus erectis, brevissimis, vix interdum semipollicaribus, superne alternatim ramosis et una cum ramulis simplicibus vel bi-trifidis basi bracteatis in cymam multifloram vix folia superantem dispositis, pilis adpressis sericeo-incanis; floribus campanulato-patentibus, 5 linealibus, erectis; calycis foliolis subulatis, laete viridibus pilis adpressis sericeo-pubescentibus; petalis spathulatis ungue brevi angustioribus, lamina latiora acuminatis, intense violaceo-caeruleis; antheris sagittiformibus, post anthesin spiraliter revolutis; fructu baccato, oblongo-cylindraceo, fusco-virescente. — Hügel in Bot. Archiv. 6. Endl. Enum. pl. Hügel 9. Putterlick Synops. Pittosp. 26. Walpers Repertorium 257.

Spiranthera Fraseri Hooker in Bot. Mag. sub n. 2523.

Campylanthera Fraseri Hooker Icon. pl. I. tab. 82.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Fraser; 1833 L. B. ab Hügel; 1839. Drummond); in arenosa sylva prope oppidum Perth, 20. Jan 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1284.

Frutex 2-3 pedalis, ramis volubilibus in vicinis plantis scandens; floribus speciosis, intense violaceo-coeruleis onustus.

2. **Pronaya Hügeli**ana Putterl. ramis erecto-patentibus, longissimis, volubilibus, apicem versus confertim foliatis, junioribus pilis deorsum adpressis pubescentibus; foliis subsessilibus vel brevissime petiolatis, inferioribus spathulatis vel obovatis vel ovalibus, obtusiusculis, semipollicaribus usque pollicaribus, 2-3 lin. latis, margine hinc inde denticulatis, superioribus lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, sesquipollicaribus, apicem versus longitudine decrecentibus, 2-3 lin. latis, integerrimis, omnibus margine tenuissime revolutis, secus planiusculis, obscure viridibus, subtus pallidioribus et pilis longis, canis villosulis, supra pilis brevibus strictis tuberculo insidentibus pilosis, erecto-patentibus; pedunculis in ramulis terminalibus, et in ramulis lateralibus foliatis ex axillis foliorum superiorum emergentibus terminalibus, subsessilibus, vel brevissimis vix 1-2 linealibus, superne ramosis, ramulis bi-trifidis in cymam densifloram, multifloram, (10-24-floram,) folia vix superantem congestis, dense villosis; floribus campanulato-patentibus, 5 linealibus, erectis; calycis foliolis subulato-acuminatis, dorso purpurascens, dense villosis; corollae petalis spathulatis, lamina latiore acuminato-apiculatis, laete caeruleis; antheris ovatis, post anthesin apice reflexis; fructu baccato, sicco, obovato-cylindraceo, utrinque compressiusculo, rugoso, fusco-viridi.

Willardiera frandens Smith. var.

~~Willardiera~~
Hb. et Tasmanniae n. 45 sub nom
B. frandensis. Hb. haec ultima
differt solummodo don pedunculis
florum longioribus, calicis latioribus
a B. multabili pedunculis glabris
foliis lanceolatis, a B. Congillora
in Tasmannia quidem detecta, pe-
dunculis longioribus villatis.

Sic aut Hb. frandensis geminosa
varietas, Lamm ex procerum. unica
incompleta non determinanda.

Proxime accedit ad nostram B.
discoloratam, si praeceperit autem
pedunculis phyllis pro caliginis
longioribus axillaribus.

Varia alba fidem Stuart.
frater frandens 5-6'. Lamm ex
Tasmanniae, hb. N. II n. 58
Joss. Sorrell, hb. N. I. n.
me!

Violariaceae Hb. trib. I. Violae Hb.

Eruption Hb

Novum genus nunquam cum Viola
confundendum & commutandum!

1. E. gynhalaria DeCandolle!

E. reniformis Sweet

Viola E. nudicaerulea Weber! in Linnaea
1848 procerum laevum desertionis.
non La Willardiere.

Corolla apice pallida medio albo-barbata
violacea saturate viridis. In solo fertilione
umbroso procerum revolutum tanquam ad
fides montium Marasso range! Sept. 1848.
In humidis montibus districtus Westwai
et ad fl. Onkaparinga Dec. 1848. Ab E. pu-
violari nunc distincta separandum longe
distat, et neque huius combinandum nec
sectioni. Leptidum subcongruum! ubi
et. Dr. Weber quaerit. Similimum in horto
bot. Litchfieldi calceae huius pertinet.

2. E. nudicaerulea Don.

Viola nudicaerulea DeCand. non Hooker, Weber
Lamm ad fl. Sorrell. Est rari Tass., hb. N. II
n. 150. (p. 11). Viola violacea margini albidum
nec saturatis periclysa fimbria barbata. In umbrosis
humidissimis regionum interiorum vespis Rivoli Bay Oct 48

In Australiae orientalis montibus sic dictis caeruleis et in montanis prope Illawara (1833. L. B. ab Hügel); in solo turfoso inter frutices densos ad littora portus Princess Royai Harbour 20. Dec. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1296.

Frutex 3-4 pedalis, ramis longissimis, volubilibus in vicinis plantis scandens. Rami teretes, robustiores pennae corvinae crassitie, cortice rufopurpurascente longitudinaliter et spiraliter rugoso-striato, glabro, laevi, nitido vestiti, superne pilis deorsum directis pubescentes et confertissime foliati. Folia subsessilia vel brevissime petiolata: inferiora spathulata, obovata vel ovalia, vix semipollicaria, ad 3 lin. lata, obtusiuscula vel apice brevi-cuspidato brevissime apiculata, margine hinc inde denticulo uno alterove instructa; superiora lanceolata, vel oblongo-lanceolata, sesquipollicaria, apicem versus sensim breviora, pollicaria, 2-3 lin. lata, integerrima, omnia marginibus tenuissime revoluta, secus planiuscula, obscure e luteo-viridia, subtus pallidiora et pilis longis canis adpressis villosula, supra pilis brevibus strictis, tuberculo insidentibus, patentibus pilosa, nervo longitudinali subtus prominente percurta, lateralibus saturatioribus tenerrimis horizontalibus inferne vix parum conspicuis, erecto-patentia vel patentia. Pedunculi brevissimi, fere subsessiles, vix interdum in ramis supremis foliis longiores, superne alternatim ramosi, ramulisque brevibus, basi bracteolis subulatis suffultis, bitridis in cymam densifloram, 12-24 florum, folia suprema raro superantem congestis, dense villosis, erectis. Flores campanulato-patentes, 5 lineales, erecti. Calycis foliola e basi latiore subulato-acuminata 2-3 linealia, dorso convexiuscula et purpurascens, intus excavata, utrinque villosa, aestivatione marginibus imbricata, sub anthesi patentia, persistentia. Corollae petala spathulata, 5 linealia, basi ungue vix trientem petali consummentis, angustioris, lineam latis, marginibus involutis canaliculato, albedo in tubum conniventibus, laminis ad $1\frac{1}{2}$ lin. latis patentibus cuspidato-apiculatis apice reflexis, laete coerulea, venis tribus parallelis longitudinaliter perducta. Stamina in tubum conniventia, illumque floris parum superantia, subaequalia; filamentis e basi latiore intus canaliculata, dorso convexiuscula subulato-filiformibus, albidis, apice antheriferis; antheris ovatis, obtusis, bascos emarginatae dorso affixis, albidis, biloculatis, loculis superne contiguis, connectivo adnatis, basi divergentibus, longitudinaliter introrsum dehiscens, pollinis granulis globoso-triedris, albis faretis, erectis, demum retrorsis, apice reflexis. Ovarium basi attenuata in receptaculo subsessile, ellipsoideum, cylindraceo-compressiusculum, adpresse pilosum, apice in stylum teretem, brevissimum vix $\frac{1}{2}$ linealem, rectum, stigmatate convexiusculo medio impresso papilloso terminatum glabrum continue transiens, intus e semiseptis in axi contiguis biloculatum, marginibus septorum juxta axim contiguae decurrentibus et in loculos utrinque paulo prominulis alternatim et biseriatim ovuliferis. Ovula funiculo brevissimo suspensa, subglobosa, mutua pressione tandem complanata, diametro vix semilineali, horizontalia, anatropha, 16-24 in quovis loculo, plurima abortiva, in liquore resinoso, spisso, suave aromatico nidulantis. Fructus in receptaculo floris basi calycis foliolis basibus superstitibus amplexus sessilis, obovato-cylindraceus, utrinque compressiusculus, 6 linealis, apice attenuato emarginato stylo brevissimo superstitie coronatus, superficie rugulosus, glaber, fusco-virens, hancam exsuccam, sat duram constituens, intus semiseptis in axi contiguis et connatis utrinque seminiferis biloculatus, pleiospermus. Semina in quovis loculo uniseriata, pauca, vix 3-4 evoluta, reliquis abortivis, in succo inspissato denso duro, albedo interstitia loculorum explente nidulantis, subglobosa, diametro lineali, horizontalia raphe laterali brevi, testa purpurea, glabra, rugulosa, nitida vestita. Embryo in fundo albuminis totam fere seminis molem occupantis, solidi, durioris, coloris lactei prope umbilicum minimus, orthotropus, incompletus, mere cellulosus.

POLYGALEAE Juss.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

COMESPERMA Labill. Endl. gen. n. 5649.
Meisn. gen. pag. 23. (20.)

§. 1. Erectae.

α. Foliis angustissimis subconvolutis vel linearibus.

* *Bracteis (in omnibus demum deciduis) ante anthesin flores superantibus.*

1. **Comesperma longifolia** Steud. caule (basi) frutescente ramoso vel subsimplici glabro sursum diviso racemifero; foliis sparsis non approximatis linearibus angustissimis margine revolutis elongatis (pollice longioribus) acutiusculis glabris; racemis elongatis multifloris laxis. bracteis setaceis flores (nondum evolutos) superantibus. labio medio acuto integro lateralibus brevior. ‡

In arenosis sylvae prope Limekiln districtus Perth, 29. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2359.

Radix valida, crassa, perpendiculariter descendens, parce fibrosa: *caulis* basi suffrutescens, divisus vel simplex, inferne cicatricibus foliorum notatus, teres, uti tota planta glaberrimus, mox foliatus, sursum in ramulos racemiferos divisus; *folia* sparsa, angustissima, pollicaria et ultra, patentia, subarcuata, margine revoluta carinata, linearia, apice acutiuscula, basi in petiolum brevissimum attenuata; *ramuli* in apice caulis subumbellato-aggregati, basi foliati, mox racemiferi; *racemi* inaequales, fructiferi demum elongati (3-7 pollicares) simplices; *flores* in pedicellis $1\frac{1}{2}$ lineas longis; *bractae* tenuissime setaceae; *fructus* basi in stipitem attenuati, apice ad latera obtusi, medio breviter mucronulati, *semina* unilateraliter membranula pellucida tenui marginata.

2. **Comesperma corniculata** Steud. caule erecto fruticuloso glaberrimo vix striato tereti inferne cicatricibus foliorum deciduorum notato caeterum nudo, superne ramoso; ramis angulatis foliatis; foliis sparsis in ramulis confertioribus linearibus margine revolutis abbreviatis (4-6 lineas longis) obtusiusculis; racemis terminalibus, bracteis setaceis; alis corollam superantibus lobo corollae medio postice corniculato. ‡

In glariosis sylvaticis circa Wuljenup ditionis Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. 2360.

Radix subsimplex fibris tenuibus; *caulis* fruticulosus, teres, sursum cum ramulis angulatus; *ramuli* sparsi vel subumbellato-congesti; *folia* linearia, margine subrevoluta, bisulcata, 4-6 lineas longa, unam lata, basi in petiolum

Trieb # (Viol.) Aljodineae. Fr. Br.
Himnanthura. Wankes

1. Al. angustifolia! Brown.
Kt. fl. South. Esp. river Tasmanian, p. 45
hb. Nth. 50. Nov. 15. 1848. Folia divisa.

Comaspermum ^{Engl. Syn. 2. p. 275.}
Syst. gen. II. 17. Ord. Cranchia

2. Al. dentata! Fr. Br.

Accipi solum specimen & coram
& proutum carcutum & finimibus
in colonia Victoriae collatis
Quorum Tasmanian hb. Nth. 440.
In character generis multas: purpurascens 2
lobulatis, lacinio 1 saepe absciso.

3. Erpison concolor Ferd. Müller.

radice dichotoma vel bipartita stolonibus crecitas
vel horizontalibus emissis, foliis fasciculatis
angulato - rotundis vel subreniformibus ^{acutiusculis}
subtruncato imbricatis decurrentibus comu-
latis v. aspidatis, ligulis lanceolato linearibus
pubulato acuminatis, fissatis v. apiculatis
lanceolatis, pedunculatis, folia paullo superantibus
Thallus molis expositus pariter ab E. hederacea
proximo distinguatur habitu dupione ruzis
recto floribus, canaliculatis & saepe stolonibus
brevibus v. subnullis.

In arthropis fidei Tasmanianae (incipiente
anthesi) Oct. Nov. 1848 hb. Nth. n. 184. In
monidium fozis gravibus, luffinae, Nov.
et laces similibus auct. Ont. appariga.
Du. 48 - In solo areufo raxupore
inter frutices arorum flat. It. Da import
versus finem Rivoli-Way Oct. 1848.

Notae sequentes in planta viva scriptae.
Floris concoloris corollae; filamento alba-
verbata, antherae fusco - carinae v. auram-
biae triangularis membratae, phi-
gma simpliciter.

x4 Conespermum retusifolium ^{num!} La. Willardiana

In uliginosis ad fl. Murphy - rivum.
1-3' hb. St. John II n. 345. Kun.
21. 1849. Habitu Sonchiae.

Conespermum linearifolium Kun.

P. acutifolium Griseb. Mill.

(P. acutifolium (Poeht.)

C. retusifolium hb. St. sin. num.

Inagi George - town, Jamaica.

Frutex 2-3' floribus purpureis.

(var. L.)

Mura varietatum Conespermatis
erivini exhibere videtur! itaque

C. erivinum P. acutifolium
dicendum!

brevem crassiusculum desinentia, apice obtuse attenuato subcartilagineo: *bracteae* flores clausos duplo superantes, lanceolato-setaceae; *alae* violaceae corollam superantes; *corollae* basi violaceae apice lutescentis lobus medius dorso in corniculum brevem productus; *fructus* (immaturus) apice obtusissime truncatus.

3. **Comesperma longibracteata** Steud. fruticosa glabra basi simplex vel vix ramosa nuda, superne fasciculato-ramosa; ramis foliatis; foliis sparsis non approximatis anguste linearibus subtortuosis apice acutiusculis; racemis ante florescentiam comoso-bracteatis, florentibus subconferto-multifloris elongatis; alis oblongo-ovatis obtusis corollam superantibus, lobo medio subintegro. ♀

In turfosis fruticosis districtus Princess Royal Harbour, 27. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2361.

Radix simplex, descendens, fibris parvis; caulis basi suffrutescens, teres, simplex vel in *ramos* aliquot divisus, nudus, 4-pedalis, glaber, sursum cicatricibus foliorum notatus, apice in *ramulos* 4-6 divisus, 6-8 pollicares, angulosos, foliatis; *folia* 4-6 lineas longa, semilineam lata, sparsa, linearia, subtortuoso-flexa, obtusiuscula, in pedicellum brevem attenuata; *racemi* simplices, ante florescentiam conspicue comoso-bracteati; *bracteis* in floribus vix evolutis jam deciduae; *flores* albo-violacei; *fructus*

4. **Comesperma rosea** Steud. caule erecto stricto glaberrimo striato basi nudo simplici tereti superne ramoso, ramis foliatis; foliis sparsis remotiusculis anguste linearibus margine subrevolutis apice obtusiusculis; racemis terminalibus ante florescentiam longe comoso-bracteatis; florentibus laxiusculis; alis corollam superantibus, lobo medio vix emarginato. ♀

In humoso-arenosis depressis umbrosis prope Monger'slake, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2363.

Radix fibrosa, fibris albidis tenuibus; *caulis* simplex, erectus, strictus, teres, 4-5-pedalis, per $\frac{3}{4}$ longitudinis efoliatus vix hinc inde cicatrice folii elapsi notatus, sursum in ramulos 5-6 divisus simplices, pedales et ultra, foliis sparsis remotiusculis vestitos; *folia* angustissima, linearia, 4-6 lineas longa, semilineam lata, subarcuata erecto-patentia, basi in pedicellum brevissimum attenuata; racemi terminales, simplicissimi; *flores* in pedicellis brevibus (lineam longis); *calyx* roseus, *corolla* lutea; *bracteae* ante florescentiam corollam cum petiolo duplo superantes, lanceolato-subulatae, 3 lineas longae, post evolutionem florum deciduae; *fructus*

5. **Comesperma megapteryga** Steud. caule basi ramoso, ramis paucis virgatis strictis glabris sulcatis; foliis raris angustissimis linearibus acutiusculis; racemis terminalibus ante florescentiam confertissimis, bracteis ovatis acutis flores subaequantibus, demum laxis paucis (6-10-) floris; alis (albis) corolla (alba) longioribus ovato dilatatis corollae labio medio integro postice mucronulato. 4 ♀

In arenosis districtus Sussex, Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2370.

Radix exilis emittens *caules* 2-3 subvirgatos, strictos, tenues, remote et rarer foliatis; *folia* angustissima, linearia, subpollicaria, plus quam longitudinem suam distantia, facile decidua; *racemi* in apice caulis abbreviati, con-

ferti, etiam post florescentiam pollice vix longiores: *bracteae* ovatae, acutae, subconcaevae, flores vix aequantes; *fructus*

6. **Comesperma aemula** Steud. caule basi simplici tereti superne ramoso anguloso glabro; foliis sparsis linearibus acutiusculis; racemis laxis bracteis setaceis flores superantibus cito deciduis; alis corolla (flavescente) longioribus, lobo medio integro lateralibus subbreviore.

In arenosis districtus Sussex, 19. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2371.

C. ericinae Dec. proxima sed folia non revoluta plana.

Radix tenuis, simplex; *caulis* vix frutescens, basi simplicissimus, teres, 1-2 pedalis, superne ramosus, uti rami angulatus; *rami* subumbellati, congesti, apice raro simplices sed in ramulos racemiferos iterum divisi; *folia* vix in petiolum attenuata, nervo medio prominente plus minus utrinque sulcata, 3-5 lineas longa, vix unam lata; *racemi* laxi, vix pollice longiores, fructiferi elongati laxiores; *bracteae* flores inapertos superantes, evolutos vix aequantes; *flores* parvi, alae calycinae intense purpureo-violaceae; *corolla* apice flavescentis; *fructus* apice marginibus elongatis et commissura medio producta 3-dentatus; *semina* non marginata.

7. **Comesperma contracta** Steud. caule fruticoso glaberrimo striato tereti basi nudo superne foliato ramoso; ramis angulatis; foliis sparsis subtortis anguste linearibus margine subrevolutis apice acutiusculis; racemis terminalibus abbreviatis ante florescentiam bracteato-comosis. bracteis filiformibus; alis corollam superantibus, corollae lobo medio postice breviter corniculato antice contracto.

In turfosis inter arundines ad marginem lacus prope villam Dr. Helms, districtus Perth, 24. May 1839. Herb. Preiss. No. 2373.

Caulis teres, basi simplex, cicatricibus foliorum notatus, sursum ramosus, uti rami subangulatus et foliatus; *folia* caulina lineari-lanceolata, plana, 4-6 lineas longa, ultra lineam lata, obtusiuscula, ramea angustiora, acutiora, subtorta; *racemi* abbreviati (1-2-pollicares) laxiusculi, ante florescentiam bracteis lanceolato-setaceis flores vix duplo superantibus muniti; *calycis* alae subpatentes, pallide roseae, corolla apice lutescente longiores; lobus medius postice in corniculum brevissimum productus, antice contractus, lateribus brevior et angustior: *fructus*


8. **Comesperma tenuis** Steud. caule simplici vel diviso tenui glabro remote foliato; foliis anguste lanceolatis planis; racemo ante florescentiam bracteolis scariosis flores vix superantibus instructo demum laxo; floribus (albo et coerulesco-variegatis) parvis, lobo medio acuto.

In subumbrosis ad Aron Dale, districtus York, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2367.

Caulis tenuissimus, striatus, teres, simplex vel parum ramosus; parcellatus; *folia* saepius plus quam duplam longitudinem remota, anguste lineari-lanceolata, sessilia; *rami* terminales, simplices, laxiusculi; *flores* parvi; alae albo-coerulescentes, patentes, corollam concolorem aequantes; *fructus* immaturi vix in stipitem elongati, utrinque obtusi, medio mucronulati.

Gomphrena ericifolia DC. ^{pl. St. nov.}

In collibus rupestribus ad
portum regnorum Tarranise
pl. St. n. 757. Nov. 49. 1 1/2' alt.
Habitu *Tetrathecae ericifoliae*
pilosa.
est idem ac *C. limariaefolia*
Cunningh. In hac parte de-
sum?



** *Bracteis ante anthesin flores non superantibus vel nullis.*

9. ***Comesperma hirtula* Steud.** caule basi subsimplici tereti hirsutulo superne ramoso ramis subconferto-foliatis, foliis linearibus margine subrevolutis pilis brevissimis hirsutis apice acutis, racemis (semper an denum?) ebracteatis submultifloris; floribus (carneis) subconfertis, fructibus abbreviatis. ♀

In turfosis humidis umbrosis, Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2362 et 2364.

Radix simplex, perpendicularis; *caulis* basi simplex vel ramulo uno alterove sursum inordinate ramosus; *rami* pilis brevissimis pubescentes, angulati; *folia* sparsa, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, margine plus minus quandoque ad costam usque revoluta, setis brevibus vix sine lentis ope conspicuis munita, apice vix cartilagineo acuta; *racemi* terminales, simplices, post florum evolutionem (juniores desunt) omnino ebracteati, laxiusculi, 1-3 pollices longi; *capsulae* apice rotundatae, medio tantum obtuse mucronulatae, glabrae; *semina* post pilos longiores delapsos membrana tenui pellucida cincta.

10. ***Comesperma ramosissima* Steud.** caule basi ramosissimo, ramis erectis teretibus adscendenti-strictis superne simplicibus vel divisis glabris; foliis sparsis remotis linearibus margine reflexis apice acutis; racemis brevibus, confertis pauci (8-12-) floris, bracteolis non prominentibus; floribus (albido-coeruleis) parvis; alis oblongis corolla brevioribus lobo medio integro.

In turfosis arenosis prope oppidulum Albany, 4. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 2369.

Caulis basi ramosissimus; *rami* erecti, subvirgati, simplices vel sursum divisi, striati, subteretes; *folia* sparsa subpollicaria vel breviora longitudine sua, plus minus remota linearia, apice vix cartilagineo-acuta basi sessilia, suberecto-patentia quandoque subtorta; *racemi* in apice ramorum brevissimi, pauci (10-12-) flori, bracteolae nunquam exsertae; *flores* parvi, *ala* et *corolla* coeruleo-albicantes, lobo medio integro; *fructus* . . .

11. ***Comesperma xanthocarpa* Steud.** caule a basi simplici tereti subpruinoso foliato superne ramoso glabro ramis angulatis; foliis subconfertis supremis sparsis margine revolutato subteretibus apice obtuso cartilagineo; racemis omnino ebracteatis laxiusculis obovatis; alis ovatis corollam subaequantibus lobo medio integro, capsulis elongatis flavescentibus. ♀

In subturfosis arenosis prope oppidulum Perth, 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2368.

Radix perpendiculariter descendens, parce fibrosa; *caulis* basi simplex, teres, sursum uti rami angulosus, cum his 2-3-pedalis, superne confertim ramosus; *rami* stricti, simplices vel iterum ramulosi; *folia* subconferta uti caulis subpruinoso-glaucia (precina tandem evanescente), linearia, marginibus sese fere attingentibus reflexa, subpollicaria, in pedicellum distinctum brevem (lineam aequantem) desinentia, erecta, stricta; *racemi* terminales, abbreviati, vix (etiam fructiferi) pollicem excedentes; *bractee* omnino nullae vel vix in racemis nondum evolutis conspicuae; *alae* ovatae, corollam superantes, pallide lutescentes; *corollae* flavae lobus medius integer vel vix denticulatus laterales subaequans; *capsulae* elongatae, erecto-patentes, basi valde attenuatae, flavescentes; *semina* non marginata.

12. **Comosperma laxiuscula** Steud. caule tereti basi simplici vel uti superne ramoso virgato glabro, ramis angulatis; foliis sparsis linearibus abbreviatis (3-5 lineas longis) deciduis; racemis terminalibus laxis plurifloris ante anthesin bracteatis bracteolis flore minoribus; alis corollam superantibus lobo medio integro. 5

In lapidosis districtus York, 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2372.

Caulis 2-pedalis et ultra, basi plerumque simplex, teres, apice divisus in ramulos virgatos mox aphyllus: *folia* ramulorum parva, linearia, aucta, saepe minima, subulata, 3-5 lineas non excedentia; *racemi* terminales, laxiusculi, unciales et ultra; *pedicelli* duas lineas longi, suberecto-patentes, laxiusculi 1-1½ lineas remoti; *bracteae* subulatae, pedicellum vix aequantes, mox deciduae; *flores* pallide carneo-rubescences, corolla ferrugineo-rufescens; *fructus* basi stipitatus, striatus, apice rotundatus, marginibus non productis, medio vix apiculatus; *semina* non marginata.

β. *Foliis lanceolatis vel obovatis-planis.*

13. **Comesperma varians** Steud. caule basi vix frutescente ramoso vel simplici hispidulo superne glabro; foliis infimis oblongo-lanceolatis caulinis angustioribus linearibus remotis; racemis simplicibus vel paniculatis laxis multifloris ante florescentiam munitis bracteolis lanceolatis acuminatis florem subaequantibus; poribus (coerulescentibus) parvis, alis corolla longioribus. 4 5

In subturfosis arenosis inter frutices prope Strawberryhill, 24. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2365.

Caulis basi striis flexuosis tenuibus notatus, pilis brevibus rigidiusculis albidis sursum evanescentibus, scabridus; *folia* in ramulis radicalibus sterilibus oblongo-lanceolata, vix petiolulata, acutiuscula, ¾-1 pollicem longa, 2-2½ lineam lata, caulina multo minora, anguste linearia, suprema subsetacea; *racemi* terminales nunc simplices nunc paniculato-compositi; *bracteolae* ante florescentiam lanceolatae, acutae, flore nondum evoluto breviores, post evolutionem deciduae; *alae* albo-coerulescentes *corolla* apice pallide lutescent-longiores; *fructus* basi stipitato-attenuatus, superne marginibus parum productis truncatus, subtridentatus; *semina* immatura non marginata.

14. **Comesperma parviflora** Steud. caule basi diviso foliato apice ramuloso striatulo tenuissime (sub lente) pubescente; foliis planiusculis lanceolatis tenuissime ciliolatis, apice cartilagineo-mucronulatis; racemis terminalibus confertiusculis ante anthesin scarioso-bracteolatis, bracteolis flores subaequantibus serius deciduis; calycibus marcescentibus corollam (coeruleam) vix aequantibus. 4 4

In calculosis montium continuorum Darling'srange districtus Perth, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2374.

Caules e radice exili plures (2-4) 1-1½ pedales, basi pube tenui sursum evanescente muniti, stricti, simplices vel sursum ramosi, striati, teretes, foliati; *folia* sparsa infra dimidiam, superne totam longitudinem remota, plana, lanceolata, acuta, pollicaria, 1-1½ lineas lata, margine (sub lente) ciliolata; *racemi* terminales, simplices, primum conferti, breves, demum laxi, elongati; *fructus* in stipitem attenuati, apice subtruncati, obtuse tridentati.

Cotoneaster oligophylla Gerdm.
15. ? An huj. locis planta raru-

fissima a Stuartio sub nomine

C. volubile (N. 64) communis

& hb. Lips. N. 25. Huj. speciei

maxima mihi specimina. Tix

C. volubili, *C. chinensis*

var. *hor.*, *lutea*, *purpureis* &

rostratis. *Pinjores* prope Gau-

litzow. Nov. 48.

Cotoneaster volubile Labill.

16. hb. St. Jansmanni. n. 109.

Prope urbem Lammethan, 4-31

St. Jansmanni. 017.10.1848. hb. St. J. II n. 38. ad

Sivan port hb. St. J. III n. 644.

Nov. 1849. 3-41, *Guichenot* bag

febr. 1850. In praevis elevatis

calicibus prope Entfeld ad

castrum fruticosa. 017.10.

Folia aculeolata (comp. *Stictis* in

Lehm. pt. Dr. II, 302.) signum charac-

teristicum non fingunt, quoniam *Lappula*

abrupta fuit! - Nov. Storpeth, Tarm.

§. 2. Volubiles vel subscandentes.

15. **Comesperma herbacea** Steud. caule subvolubili subsimplici vel basi ramoso tenui glabro vix ima basi fruticuloso; foliis ovato-vel simpliciter lanceolatis margine subrevolutis apice subcartilagineo mucronulatis; racemis laxis, (an semper?) ebracteatis; alis corollam aequantibus, corollae labio medio integro acuto, fructibus subflavescentibus. 4

In Australasia occid. Herb. Preiss. No. 2366.

Caulis debilis, glaber vel basi subpubescens, 1-2 pedalis; *folia* sparsa vel alterna (inferiora minora) oblongo-lanceolata vix in petiolum attenuata, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lineas lata, summa anguste linearia, omnia longitudine sua vel ultra distantia; *racemi* simplicissimi, terminales, laxi, 12-20-flori; *fructus* in brevem stipitem attenuati, vix denticulati.

16. **Comesperma volubilis** Labill.? caule volubili striato ramosissimo glabro basi frutescente; foliis dissitis lanceolatis planis glabris; ramulis apice racemiferis abbreviatis ebracteatis laxiusculis. (Flores evoluti et semina desunt.) 4 ♀

In arenosis insulae Gnadenland, 10. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2375.

17. **Comesperma scandens** Steud. caule scandente profunde striato glabro ramoso, ramis sparsim dissite foliatis; foliis anguste linearibus obtusis planis; racemis terminalibus (ante florescentiam?) ebracteatis abbreviatis laxe-et pauci (6-10)-floris, corolla antice subemarginata. 4 ♀

In arenosis districtus Sussex, 25. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2376.

TREMANDREAE. R.Br.

(Auctore J. STEETZ.)

TETRATHECA Smith.*) Endl. gen. n. 5644.

Meisn. gen. pag. 22. (20.)

Sectio I. EUTETRATHECA. Filamentis crassiusculis, antheris quadrilocularibus.

a. *Subaphyllae*: ramis subaphyllis, foliis minimis.

1. **Tetrathea affinis** Endl. glaberrima, ramis foliaceo-compressis basi ancipitibus, foliis alternis setaceis minimis

*) Genus hoc hactenus non nisi perpaucis speciebus, floris partium structura inter se maxime affnibus compositum, detectionibus Preissianis non solum specierum numero, sed

sessilibus, pedicellis bibracteolatis axillaribus, floribus pentameris, staminibus puberulis. — Endl. in Hügel. Enumerat. pag. 7. n. 23.

In subarenosis prope oppidulum Albany, (Plantagenet) d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1334. (Comparavi specimen Hügelianum!)

Proxima *Tetrathecae junceae* Smith. Differt vero primo intuitu: ramis magis foliaceo-compressis, floribus pentameris, sepalis paullo acutioribus, antheris evidenter puberulis, tubuloque antherae longitudinem aequante, qui in *Tetr. juncea* triplo brevior est.

2. ***Tetratheca virgata* Steetz.** caule a basi ramoso, ramis teretibus inferne aphyllis superne foliis alternis minimis linearibus brevissime petiolulatis vestitis, pedicellis basi bracteolatis axillaribus folia corollamque superantibus, floribus tetrameris, staminibus glabris, filamentis tubuloque antherae longitudinem aequante discoloribus, ovario cum stylo rectiusculo glaberrimo.

In limoso-calculosis inter frutices plantieci haud procul a praedio rustico Dom Brockmann (York) d. 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1332, ex parte.

Fruticulus pulcherrimus, superne floribus purpureis creberrime tectus. *Caulis* pedalis et ultra, a basi ramosus. *Rami* glaberrimi, graciles, teretes, erecti, virgati, apice abortientes, inferne aphylli, leviter rugulosi. *Folia* in superiore ramorum parte alterna, arrecta, crassiuscula, brevissime petiolulata, margine revoluta, obtusiuscula, linearia, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, utrinque glaberrima, vel summo apice pilis paucissimis rigidulis brevissimis non nisi lente conspicuis conspersa, decidua. *Pedicelli* axillares, solitarii, uniflori, patenti-curvati, filiformes, apice paullo incrassati, glaberrimi, basi

etiam formis divergentibus adhuc incognitis auctum est: quare in sectiones distribuere coactus sum. Partium floris numerus, iam monente cl. Endlichero in Hügel. Enum. pag. 8 sub n. 24 valde inconstans est, ideoque distributionis malum principium suppeditat. Observavi enim in una eademque planta flores tetmeros et pentmeros promiscue. Sed antherarum fabricam et structuram, contra cl. Endlicherum l. c., semper valde constantem reperi, neque ex his sectiones constituere dubitavi. Filamenta plerumque crassiuscula, brevissima, in unica specie filiformia sunt, in omnibus cum anthera continua. Antherae apice semper in tubulum poro terminali instructum productae sunt, qui in speciebus orae orientali Novae Hollandiae et Terrae Van Diemen indigenis hucusque notis semper brevis est, floribus tetrameris praevaletibus. In speciebus orae occidentali indigenis, quae, paucis exceptis, omnes fere floribus pentameris gaudent, tubulus plerumque longior, antherarum longitudine vel illum superans observatur, si *Tetrathecam nudam*, *Tetrathecam conferti foliam* et *Tetrathecam Preissianam* excipias. Non possum, quin pauca referam de ovulis in ovario biloculari. Cl. Endlicher l. c. signum genericum constans commemorat in *Tetratheca*: Ovula bina in quovis loculo, et in *Tremandra*: Ovula solitaria, quod equidem consentire nequeo. Creberrimis et accuratissimis summa cum patientia institutis sectionibus ovariorum plurimarum specierum, nunquam ovula bina in loculo reperi mihi contigit. Loculus semper ovulo solitario, quod sine ullo opere evolvi, totus repletus erat; abortitine forsitan alterum? An plane abest? Non credo, me feliciorum fore examinando plantam vivam quam siccam, arena madida iterum molliam. Restat denique, ut pauca dicam de indumento, in plerisque speciebus quam maxime variabili. Occurrit enim saepius una eademque species tum tota glabra, tum pubescens, tum setis validis patentibus undique obsita. Nec in ipsis florum organis indumentum semper constans est. Observavi ovarium glabrum, pubescens et imo villosum in *Tetratheca thymifolia* Smith. Quum vero formas varias in ipsa patria colligere et observare mihi non contigerit, aegre equidem ausus sum, specierum et varietatum limites strictissime circumscribere, bene conscius, singula specimina sicca non sufficere ad rem absolvendam.

In character generico loculi germini-
nis unius ad bi-ovulati sunt deseri-
bendi contra et. Endlicher, qui
solummodo ovula in quaque ovari-
loculo una observavit et contra
et. Dr. Steety, qui nunquam ger-
mina talia videre testatus est.

x *Tetratheca cœnorhiza* ^{Gardner}

In for. Kallaroo (Australia
pélée ?) hb. St. 830.

St. villosa immitans, sed pedun-
culis longioribus (jam inter
anthem polia caplo superan-
tilibus), foliis omnibus verti-
catis 4-6nis, subula anthera-
rum apicali brevior et
sepalis glandulosa pilosis
vix gelidum solum vixi-
tibus inermis.

ut plurimum bracteola minima suffulti, in apice ramorum aggregati. *Sepala* 4 ovata, acutiuscula, lineam longa, colorata, glabra, margine leviter ciliolata, introrsum puberula. *Petala* 4 obovata, latiuscula, patentia, rosea in planta viva, (teste cl. Preissio) purpurea in sicca, basi macula atropurpurea notata, 4-5 lin. longa. *Stamina* 8, glabra, conniventia. *Filamenta* breviter, semilineam longa, crassiuscula, plano-compressa, pallida; *antherae* cylindricae, quadriloculares, atropurpureae, extrorsum rugulosae, introrsum basi ciliis paucis vix conspicuis vestitae, apice cum tubulo subaequilongo, pallido, oblique truncato, poro terminali instructo, scabriusculae. *Ovarium* sessile, glabrum, ovatum, compressum, roseum, biloculare; *ovulum* in loculis solitarium, apici appensum, caruncula subfungosa, uncinata, obtusiuscula terminatum. *Stylus* stamina vix superans, glaber, rectiusculus, vel paullisper tortus; *stigma* simplex. *Capsula* in speciminibus desideratur.

β **setigera nob.** ramis undique setis sparsis patentibus rufescentibus basi bulbosis 1-2 lin. longis vestitis.

In Australasia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 1333.

Bina modo specimina in promptu habeo, in quibus duo tantum flores evoluti sunt, quorum alter petalis 5 staminibusque 10, sed sepalis 4, tribus regularibus, et quarto e duobus connato, apice bilobo instructus est; alter flos evolutus et omnes ceteri clausi petalis et sepalis 4, staminibusque 8 gaudent. Varietas haec praeter setas non differt a specie primaria, nisi statura paullo humiliori, ovario apice obtusiori, styloque paullo longiore et magis torto. *Folia*, *pedicelli*, *calyces* et *ovaria* aequae glabra sunt, et setae non nisi caule ramisque insident.

3. ***Tetratheca nuda* Lindl.** glaberrima, caule subsimplici parce ramoso, ramis teretibus junceis subaphyllis, foliis rarissimis linearibus minimis in petiolum brevissimum attenuatis deciduis, pedicellis sparsis basi bracteolatis axillari-bus corollae longitudine, floribus pentameris, staminibus glabris, filamentis tubuloque antherae triplo brevioribus, ovariis hirsutis, stylo recto basi hirsutiusculo apice glaberrimo. — Lindl. Swan River pag. XXXVIII n. 186.

In Australasia leg. cl. Preiss, sed ubinam? et quando? Herb. Preiss. No. 1332 ex parte. *)

Obiter inspecta *Tetrathecae virgatae* habitum prae se ferens, propter stamina propius ad *Tetrathecam junceam* Smith accedit, a qua vero primo vultu differt: ramis teretibus, floribus pentameris, ovario hirsuto, foliisque in petiolum brevissimum attenuatis. Filamenta et antherae cum tubulo fere eadem ac in *Tetratheca juncea*, sed concoloria nigra, quum in hac tubulus purpureascat. A *Tetratheca virgata*, quacum statura, caulibus teretibus apice abortientibus et foliis petiolulatis convenit, recedit: Caulibus simplicibus, hinc inde non nisi ramum unum alterumve junceum elongatum agentibus, foliis rarioribus margine non revolutis, floribus pentameris, pedicellis duplo brevioribus minus aggregatis hinc inde sparsis, praesertim vero ovario hirsuto staminibusque totis diversis: tubulus enim brevissimus, anthera triplo vel quadruplo brevior, concolor. — Quoad stamina planta haec et sequens ad species orae orientali et australi Novae Hollandiae indigenas approximatur; ceterae species collectionis Preissianae hujus et sequentis sectionis tubulis antheram aequantibus vel superantibus instructae sunt.

*) In collectione Preissiana planta haec cum *Tetratheca virgata* plane confusa est: Exemplaria quae cl. Preiss sub No. 1332 ad examinandum et definiendum designavit sunt *Tetratheca virgata*; ea vero, quae pro herbario meo sub eodem numero mecum communicavit, sunt *Tetratheca nuda* Lindl.

b. Foliatæ: ramis densius foliatis.

4. **Tetralthea confertifolia** Steetz. caule simplici vel ramoso tereti hispidulo dense foliato, foliis alternis vel oppositis vel verticillato-aggregatis sessilibus linearibus obtusiusculis margine revolutis hispidis, pedicellis axillaribus folia longe superantibus in apice ramorum aggregatis hispidulis, floribus pentameris, tubulo anthera brevior, ovario ovato hispidissimo, stylo rectiusculo basi hispidulo apice glabro.

In confragosis montium continuorum Darling's-range, (Perth) d. 1. Nov. 1839 Herb. Preiss. No. 1328, et in regionibus interioribus Australasie meridionali-occidentalis. No. 1329.

Fruticulus. *Caulis* simplex vel supra basin ramosus, cum ramis teretibus setis minimis subappressis hispidulus, dein glabratus et propter folia delapsa cicatricibus tectus, $\frac{1}{2}$ -1 pedalis. *Folia* conferta, approximata, alterna vel opposita vel subverticillata, arrecta, sessilia, basi attenuata, linearia, integerrima, obtusa, crassa, margine revoluta, utrinque hispidula, et supra, præsertim margine, setis validioribus, rigidulis, patentibus, basi bulbosis ornata, minervia, nervo supra vix impresso, subtus valido, prominulo, hispido, 3-5 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. *Pedicelli* in apice ramorum axillares, solitarii, aggregati, uniflori, patentes, hispiduli, pollicares, fructiferi apice mutantes. *Sepala* 5 lanceolata, acuta, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, setoso-hispidula, plerumque reflexa. *Petala* 5 obovata, patentia, sepalis duplo majora, ante anthesin albidula, dein purpurea, basi macula atropurpurea notata. *Stamina* 10 commixta; *filamenta* brevia, $\frac{1}{2}$ lin. longa, crassiuscula, parce puberula, et cum antheris earumque tubulo concoloria, atropurpurea; *antherae* cylindricæ, quadriloculares, in tubulum ipsis paullo brevior, oblique truncatum, portæ terminali instructum productæ, rugulosæ, glabræ, vel introrsum ciliis paucis, lente vix conspicuis, puberulæ. *Ovarium* sessile, ovatum, subcompressum, biloculare, hispidissimum. *Stylus* stamina paullo excedens, rectiusculus, vix tortus, basi latiore sensim attenuatus, medio tenus hispidulus, apice glaberrimus, utrinque longitudinaliter sulcatus, simplex, vel, sicuti in floribus binis observavi, secundum sulcum bifidus. *Stigma* simplex. *Capsula* obovata, compressa, basi attenuata, apice emarginata, utrinque longitudinaliter sulcata, hispidula, 2-2½ lin. longa, 1½-2 lin. lata.

Specimina sub No. 1329 ab illis sub No. 1328 dimissa nulla nota differunt, nisi foliis paullo minoribus. Flores nondum evoluti, solito more, petalis albis gaudent.

5. **Tetralthea setigera** Endl. caule parce ramoso tereti. ramis setigeris, foliis alternis oppositis subverticillatis ovato-oblongis grosse paucidentatis subtus glabriusculis supra setoso-strigosis, pedicellis axillaribus gracilibus folia superantibus apice setulis hinc inde conspersis vel glabris, floribus pentameris, petalis obovatis patentibus purpureis basi concoloribus, filamentis brevissimis vix ullis, antheris cum tubulo ipsis paullo longiore apice pallido, ovario ovato styloque recto, glaberrimis. — Endl. in Hügel. Enumerat. pag. 8. n. 24.

In solo turfoso arenoso inter frutices densos ad Stirling's-Terrace, (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1326. (Comparavi specimen Hügelianum.)

Specimen unicum mihi obvium nulla linea ab Hügeliano differt, sed antheras, quarum permultas secui, semper quadriloculares inveni. (Cf. Endl.

Terratheca pilosa Labillardiere

Cis flumen Murray fruticibus
montium opulenter intermixta.

T. ericifolia Smith. (Perjourn)

In lavis montanis pascuis vixit
pagum abundant. Apr. 27. 1848.

Floribus ciliatis - purpureis; an-
theris & connatis oviculis apertis
nigra crumecis. hb. Stuart

N. 32. & *p. albiflora* etiam a
Sm. inuenta observata. N. 33.

Fruticulus fruticulus ulnam raro excedens.

T. calva Fend. Muhl. Radix plurimae

ramis ramosa fruticosa foliis

foliatis, foliis alternis vel oppositis
vel verticillatis aggregatis

lobis brevissimis petiolatis tri-

aribus obtusiusculis margine

revolutis sub labris vel hispi-

diolis, pedicellis axillaribus lon-

gitudine foliorum in apice rami-

corum aggregatis glabrescen-

tis floribus tetra- variis p. m.

clavatis, tubulis anthera brevioribus

ovario ovali trigono glandulosa

residuali. Non tuberculatis.

T. lanata aringa vixit locum Victoriae
1848. In pagum Lethal. Jun. 1848.

T. glandulosa Labillardiere. N. 30.

In insula Van Diemens Land.

hb. Stuart Tarnam. 59.

Ad sectionem primam & se-

riam b. *Stedii* pertinet, pro-

xima inter plantas Australiae

occidentales. *T. foliiger* ac.

Ad fl. Mafy, var. hb. N. 4 n.

325. fr. 1-2' Jan 18. 1849.

New-Norfolk.

8 *Pulchella* ferd Muller
In insula Van Diemens Land!
Hb. St. Tasmannii n. 69.
fol. alternis linearibus oblatis
in margine revolutis cum sa-
mulis angulatis & callicornu-
lis, & corib. & tramis, spalis
minimus triangulati orbis-
culatis.

Planta pulchella nana. Novae
indagationis in proximis ^{locis} perfetus
systema me docent, ~~et~~ solum
varietatis valde habere. In ele-
vatione montium 5000' Tasm.
Hb. St. T. n. 377.

Pilosa La Billardiere
P. eglandulosa ferd Muller
foliis glabris, calicorum
racemorum
& caulis pilis eglandulosis.
In insula Van Diemens Land!
leg. C. Stuart. Hb. St. Tasm.
num. 107.

P. grandifolia ferd Muller
foliis duplo majoribus,
pistulis eorum ^{et} racemulorum
longioribus valde magis
capiculis.
In nif. V. D. L. Hb. St. T. n. 36.
J. Hooker. Macleayfield, Sept.
Ad. South Esk river, Tasm. Hb.
St. T. n. 73, ubi valde variat.
Diagnosis *P. ericifoliae* nuda,
quum prius etiam *P. pilosa*
repperit.

licher I. c. eas biloculares observavit. Hujus speciei varietas memorabilis occurrit:

β elongata nob. caulibus elongatis virgatis, pedicellis gracilioribus glaberrimis, petalis purpureo-roseis, antherisque cum tubulo apice pallido multo brevioribus.

In subarenosis sylvae ad fluvium Canning, (Perth) mense Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 1322.

Fruticulus radice lignosa, multicauli. *Caules* graciles, elongati, virgati, hinc inde ramos subsimplices apice abortivos agentes, 2-3½ pedales, minus strigosi quam in specie primaria. *Pedicelli* basi bracteolis plerumque binis suffulti, gracillimi, glaberrimi, setulis plane destituti, 5-8 lin. longi. *Petala* 5 obovata, patentia, purpureo-rosea, basi concoloria. *Stamina* 10, glaberrima. *Filamenta* brevissima vix ulla; *antherae* cylindricae, quadriloculares, atropurpureae, cum tubulo ipsis paullo longiore, lurido, apice flavescente, oblique truncato et poro terminali instructo, levissime rugulosae, vix 1½ lin. longae. (In specie primaria 2 lineares.) *Ovarium* sessile, ovatum, roseum, cum stylo recto, filiformi, basi roseo, apice flavescente, stamina paullo superante, glaberrimum; *ovulum* in loculis solitarium. *Folia* et *sepala* a specie primaria non differunt. Specimina fructifera non suppetunt. — Forma quidem insignis, quoniam transitus nullos detexi, attamen verisimiliter nil nisi mera varietas, orta in loco natali diverso.

Obs. Ovarium unicum trigonum, loculis tribus instructum observavi; cetera compressa, bilocularia inveni.

6. ***Tetratheca gracilis Steetz.*** caule gracili erecto ramoso hinc inde setis raris consperso ceterum glabro, foliis ternatim verticillatis subsessilibus lineari-lanceolatis margine revolutis utrinque glabris internodiis multoties brevioribus, pedicellis axillaribus folia longe superantibus filiformibus glaberrimis ebracteolatis, floribus pentameris, filamentis brevibus pallidis, antheris cum tubulo atropurpureis scabris, ovario obovato apice subemarginato glaberrimo, stylo

In subarenosis sylvae ad fluvium Serpentine-River, (Murray) d. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1335.

Suffruticulosa. *Caules* plures graciles, erecti, ramosi, fere pedales, et cum ramis arrectis teretes, rugulosi, glabri, vel setis patentibus, rufescentibus, basi bulbosis hinc inde, praesertim sub foliorum verticillis, vestiti; *rami* simplices, utplurimum ternatim verticillati. *Folia* pari modo ternatim verticillata, crassiuscula, in petiolum brevissimum planiusculum attenuata, lineari-lanceolata, integerrima, apice mucronulis 1-3 minutissimis terminata vel mutica, margine revoluta, utrinque glabra, internodiis multoties breviora, 3-4 lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Pedicelli* axillares, uniflori, filiformes, apice incrassati, glaberrimi, solitarii, oppositi vel ternatim verticillati, 7-9 lin. longi, basi bracteolis destituti. *Sepala* ovata, acutiuscula, lineam longa, glabra, ciliolata, introrsum puberula, colorata. *Petala* 5 purpureo-rosea, basi concoloria, obovata, sepalis duplo vel triplo longiora. *Stamina* 10; *filamenta* brevissima, semilineam longa, ¼ lin. lata, planiuscula, pallida; *antherae* cylindricae, quadriloculares, introrsum ciliatae, cum tubulo subaequilongo (?) scabrae, atropurpureae. *Ovarium* sessile, compressum, glabrum, obovatum, apice subemarginatum, viride. *Stylus* . . . *Capsula* obovata, subinflata, apice emarginata, utrinque longitudinaliter sulcata, 2½ lin. longa, 2 lin. lata.

Obs. Hujus pulchrae speciei exemplaria pleraque floribus carent; in altero capsula, in altero flos unicus adest, et hic insuper incompletus. Sepalorum enim duo medio tenus connata, antherarum tubuli apice corrosi sunt, et stylus paullo supra basin defractus est. Ex ulterioribus igitur observa-

tionibus patebit demum, an character de speciminibus prorsus defectis similis, constans sit.

Sectio II. DITHECA. Filamentis crassiusculis, antheris bilocularibus *).

7. **Tetratheca viminea** Lindl. caule a basi ramoso, foliis subsessilibus, inferioribus rhombeo-ovatis ternatim verticillatis internodiis multoties brevioribus, superioribus approximatis ovatis verticillatis alternisve, pedicellis axillaribus gracilibus folia longe superantibus glaberrimis, floribus pentameris, antheris cum tubulo ipsis paullo longiore gracili scabris, ovario ovato cum stylo tortuoso glaberrimo. — Lindl. Swan River pag. XXXVIII. n. 184.

In arenosis umbrosis sylvae Bellevue ad fluvium Cygnorum d. 5. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1327.

Fruticulus. *Caulis* 1-2 pedalis et ultra, a basi ramosus, inferne et interdum superne sub foliorum verticillis, setis brevibus rufescentibus patentibus basi bulbosis parce conspersus, ceterum cum ramis glaber, teres, cortice cinerascete ruguloso tectus. *Rami* alterni, oppositi vel verticillati, juniores interdum hirsuti. *Folia* in petiolum brevissimum attenuata, acuta, uninervia, coriacea, supra rugulosa et minutissime punctulata, nitidula, subtus opaca, nervo medio valde prominulo, utrinque glabra; *inferiora* ternatim verticillata, rhombeo-ovata vel subrotunda, internodiis multoties breviora, 3-5 lin. longa et 2-4 lin. lata; *superiora* ovata, sensim minora et angustiora, verticillata, vel saepissime alterna, approximata, internodiis vix breviora, juniora plurimum supra sparse strigilloso-setosa margineque rigide ciliata. *Pedicelli* pollicares, axillares, uniflori, patentes, filiformes, apice paullisper incrassati, glaberrimi, rubescentes, solitarii, et saepe, quoniam e quavis foliorum axilla orti, ternatim verticillati, basi plerumque sed non semper stipulis 1-2 bractaeformibus suffulti. *Sepala* 5, glabra vel tenuissime ciliolata, ovata, acuta, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, membranacea, rosea, sub anthesi reflexa. *Petala* 5, ovata, acuta, 3-3 $\frac{1}{2}$ lin. longa, patenti-erecta, purpureo-rosea, basi macula atropurpurea notata. *Stamina* 10, conniventia; *filamenta* crassiuscula, complanata, basi plerumque dilatata, concoloria; *antherae* cylindricae, biloculares, basi rugulosae, levissime ciliolatae, superne cum tubulo ipsis paullo longiore, gracillimo, summo apice attenuato, laevi, flavescente, oblique truncato, et poro terminali instructo, purpureae vel atropurpureae, scabrae. *Ovarium* sessile, ovatum vel subrotundum, compressum, roseum, biloculare, et cum stylo albido glaberrimum; *ovulum* in loculis solitarium. *Stylus* filiformis, stamina non superans, tortuosus, i. e. paullisper supra basin geniculatus et iterum sursum plicatus, utrinque longitudinaliter sulcatus. *Stigma* simplex. *Capsula* desideratur.

Observavi varietates duas hujus speciei memorabiles.

β **microphylla** nob. foliis multo minoribus, pedicellis paullo longioribus, petalisque obscure purpureis.

In arenosis sylvae prope oppidulum Albany. (Plantagenet) mense Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1318.

Unicum tantum specimen ad manus habeo. *Folia* minora 1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, *pedicelli* pollice paullo longiores et *petala*, (in planta

*) Antherae biloculares quidem, rudimenta tamen septorum secundariorum, sub lente bene conspicua, semper conservant.

[illegible]


+ Tetrathua caricifolia Ford. McC.

Novae Hollandiae fortasse austro-orientalis. ~~hb. N. 827~~

T. thymifolia Smith pinnatoparvidens videtur, cujus forte ~~sanctum~~ moran varietatem efformat. et *T. ciliata* longe distat: geminis fereis, sepalis acuminatis, calis angustioribus et.

Tetrathua thymifolia Smith.

N. Holl. fortasse austro-orient.
hb. N. 827.



sicca saltem) saturrime, fere atro-purpureae plantae habitum quidem impertunt alienum, sed haec signa ad differentiam specificam constituendam non sufficere videntur. Ceterae floris partes nullo modo divergunt, nec constructione, nec indumento, nec forma magnitudineque. Tota planta glaberrima est, sed folia interdum juniora, aequae ac in specie primaria, apice sparse et minutissime strigilloso-setosa margineque ciliata sunt.

Obs. Etiam in hac planta, inter cetera normalia, ovarium unicum anomalum, trigonum, triloculare inveni.

γ setosa nob. caule ramisque pubescentibus setosisque, setis patentibus confertis basi bulbosis, foliis hinc inde denticulatis, denticulis setigeris, subtus glabris supra strigoso-setosis, pedicellis gracilioribus, floribus minoribus et ovario cum styli ima basi levissime ciliato.

In subarenosis sylvae ad fluvium Vasse-River, (Lussen) d. 24. Decemb. 1839. Herb. Preiss. No. 1317.

Non possum separare hanc plantam, ejus unicum tantum specimen exstat, a *Tetratheca viminea* Lindl. Praeter denticulos enim levissimos et raros, dispositio et forma foliorum plane eadem est, et floris partes omnes nullo modo nisi magnitudine ciliisque paucis in ovario et styli basi differunt. *Folia* inferiora supra plerumque glabrata, et *rami* superne densius setosi sunt. Transitus observabis in *foliis supremis* speciei primariae, quorum superficies strigilloso-setosa, in *ramis junioribus*, qui revera pubescunt, et in *parte inferiore caulis*, ubi non raro setis similibus sparsis vestitus est.

8. ***Tetratheca hispidissima* Steetz.** caule tereti ramoso, ramis setoso-hispidissimis, foliis breviter petiolatis alternis oppositis subverticillatisve ovalibus subintegerrimis utrinque setosis margine setis validioribus vestitis, pedicellis axillaribus gracilibus folia longe superantibus glabris vel apice setis raris conspersis, floribus pentameris, petalis ovatis acutis, antheris cum tubulo ipsis paullo longiore gracili scabris, ovario ovato appresse hirsuto, stylo basi pubescente superne glaberrimo recto, staminibus brevioribus.

In arenosis sylvae ad sinum regis Georgii III. mense Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1316.

Fruticulus $1\frac{1}{2}$ pedalis. *Caulis* teres, inferne simplex et glabratus, versus medium ramosus et cum *ramis* strigoso-hispidus setisque rigidulis, patentibus, rufescentibus, basi bulbosis densissime onustus, praesertim in ramis junioribus. *Folia* breviter petiolata, alterna, opposita vel ternatim approximata, subverticillata, subcoriacea, ovalia, obtusiuscula, cum petiolo utrinque setoso-strigosa, margine subintegerrima vel levissime undulata, subrevoluta, ciliata, et setis validioribus longioribusque, rufescentibus, patentibus, sparsis, interpositis vestita, supra obscure viridia, subtus cum nervo medio prominulo setis onusto, pallidiora; *inferiora* 3-4 lin. longa, 2-2½ lin. lata; *superiora* sensim breviora et angustiora. *Pedicelli* axillares, solitarii, uniflori, in apice ramorum conferti, 6-9 lin. longi, filiformes, apice incrassati et nutantes, patentes, glabri vel versus apicem setis raris, plerumque glanduliferis, conspersi. *Sepala* 5, ovata, acutiuscula, lineam longa, extrorsum glaberrima, introrsum puberula, obscure trinervia, e viridi purpurascencia. *Petala* 5, ovata, acuta, patenti-erecta, purpurea, basi macula atropurpurea notata, 3-3½ lin. longa. *Stamina* 10, atropurpurea, apice albicantia, paulisper graciliora quam illa speciei praecedentis, a quibus ceterum non differunt. *Ovarium* sessile, ovatum, compressum, biloculare, pilis appressis dense hirsutum. *Stylus* staminibus evidenter brevior, filiformis, rectus vel obsolete tortus, non vero tortuosus, basi latiore hirsutus, sensim attenuatus, supra medium glaberrimus. *Stigma* simplex. *Capsulam* non vidi.

Obs. Hujus quoque speciei distinctissimae unicum tantum specimen existat, quod obiter ad aspectum varietatem *γ* *setosam Tetrathecae vimineae* Lindl. refert, paullo tamen diligentius consideratum: *foliis* non revera verticillatis, et *stylo* recto staminibus brevioribus ab illa recedit. Proxima dein *Tetrathecae setigeræ* Endl. Distinguitur vero facillime: *foliis* petiolatis utrinque setoso-strigosis, *petalis* basi macula atropurpurea notatis, *antheris*que bilocularibus scabris.

9. ***Tetratheca epilobioides* Steetz.** caule tereti ramoso, ramis hirsutiusculis, foliis subsessilibus margine undulatis supra strigosis subtus molliter hirsutis, inferioribus oppositis vel ternatim verticillatis oblongo-ovatis, superioribus alternis lineari-oblongis, pedicellis axillaribus filiformibus glaberrimis folia longe superantibus, floribus pentameris, petalis ovato-lanceolatis acutis erectis, antheris cum tubulo aequilongo gracillimo apice glabro scabris, ovario subrotundo submarginato compressiusculo margine apiceque ciliato, stylo tortuoso basi ciliato, apice glaberrimo.

In limoso-calculosis sylvae inter Mahoganycreek et Halfwayhouse, (Darling's range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1325.

Fruticulus 1-3 pedalis, pulcherrimus. *Caulis* erectus infra medium parce ramosus, apice simplex, cum ramis erectiusculis teres, rugulosus, hirsutiusculus, vel interdum inferne glabratus. *Folia* coriacea, subsessilia, basi attenuata, apice obtusiuscula, margine revoluta, undulata et obsolete denticulata, rigide ciliata, penninervia, supra nervo medio impresso, setoso-strigosa, setis marginalibus validioribus, subtus nervis omnibus prominulis et nervo medio pilis longiusculis mollibus obsito, molliter hirsuta; *inferiora* opposita vel plerumque ternatim, raro quaternatim verticillata, oblongo-ovata, 6-10 lin. longa, 3-4 lin. lata; *superiora* ut plurimum alterna, raro opposita, sensim angustiora et breviora, lineari-oblonga. *Pedicelli* axillares, solitarii, uniflori, patentes, filiformes, glaberrimi, rubescentes, apice paullo incrassati, saepissime stipula minima bracteaeformi suffulti, 9-12 lin. longi. *Sepala* 5, ovato-lanceolata, valde acuta, $1\frac{1}{2}$ lin. fere longa, rosea, extrorsum glaberrima, introrsum albo-pubescentia, demum reflexa. *Petala* 5, ovato-lanceolata, acuta, fere semipollicares, purpureo-rosea, basi macula atropurpurea notata, erecta. *Stamina* 10, conniventia; *filamenta* crassiuscula, semilineam longa, concoloria; *antherae* cylindricae, biloculares, basi et introrsum parce ciliolatae, rugulosae, et cum tubulo aequilongo, gracillimo, sensim attenuato, summo tantum apice glaberrimo et flavescente, oblique truncato et poro terminali instructo, verrucis creberrimis scabrae, atropurpureae vel fere nigrae. *Ovarium* sessile, subrotundum, submarginatum, compressiusculum, glabrum, marginibus et apice levissime ciliatum, biloculare; *ovulum* in loculis solitarium, apice appensum, caruncula uncinata obtusa auctum. *Stylus* filiformis, fere capillaris, basi latiore ciliatus, medio tortuosus, apice glaberrimus. *Stigma* simplex, acutum. *Capsulam* non observavi.

10. ***Tetratheca aculeata* Steetz.** ramis pubescentibus hinc inde setosis, foliis alternis subverticillatisve subsessilibus oblongo-ellipticis subintegerrimis margine revolutis supra hispidulis subtus molliter hirsutis, pedicellis axillaribus filiformibus folia superantibus apice striatis et aculeolatis, floribus pentameris, antheris cum tubulo aequilongo gracili apice glabro scabris, ovario ovato compresso margine apiceque ciliato, stylo recto basi hirsuto apice glaberrimo staminibus subbrevisiore.

X Scirpus papillosum var. p. 261.

Sub 1/2-1 1/2' gracile. Panis patens
& ramorum rhachis papillis summis
albis clavatis obtusi. Folia #1-2^o by 2-4^o
lata glabra in margine papilloso-
scabra. Flores minuti. Siliqua 2-3^o by
laevi crassiusculus, pappi angusta
dim. ^{calliculus} gluf, Lupa. ^{calliculus} ~~calliculus~~ - ovata vix 1^o by
In montibus prope Crystal
brook & Rocky - vix exuberans!
Cuth: minus vire.

In Australasia occidentali leg. cl. Preiss, sed quando? Herb. Preiss. No. 1319.

Specimen unicum exstat, et hoc insuper non nisi summitas caulis, foliis inferioribus plane destitutum est. Proxime ad speciem praecedentem accedere videtur, a qua dignoscitur: *foliis* supra non strigosis, sed tantum hispidulis, *pedicellis* versus apicem incrassatum striatis et aculeolis patentibus obsitis, *petalis* purpureis nec purpureo-roseis, *ovario* ovato, nec subrotundo nec subemarginato, *styloque* recto, staminibus subbreviore. *Rami* pubescentes hinc inde setosi, setis abbreviatis rufescentibus, basi bulbosis, apice interdum glanduliferis. *Sepala* 5, atropurpurea et pruinosa, acuta, apice setula brevi hinc inde conspersa.

Obs. Suspicio, hanc plantam jam a cl. Lindleyo in App. ad Bot. Reg. pag. XXXVIII. descriptam esse sub nomine *Tetrathecae rubrisetae* l. c. n. 185, sive *Tetrathecae hirsutae* l. c. n. 187. Diagnosis enim utriusque in plantam nostram quadrat. Ceterum, quum ex diagnosi adeo imperfecta, sine autopsia exemplarium authenticorum, plantae definiri non possint, equidem, ne confusio augeretur, *Tetrathecae* nostrae novum nomen imponere coactus sum.

Sectio III. TREMANDROPSIS Filamentis filiformibus.

11. ***Tetratheca Preissiana* Steetz.** caule ramisque pubescentibus setosis, foliis sessilibus basi attenuatis ternatim verticillatis deltoideo-ovatis acutis ciliatis medio dentatis, dentibus setigeris, vel integerrimis supra hirsutiusculis subtus glabris, pedicellis filiformibus folia paullo superantibus, floribus tetrameris et pentameris, staminibus luteis in tubulum brevissimum productis.

In arenosis montis prope Cataractam versus caput fluvii Cygnorum d. 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1323.

Fruticulus. *Radix* multicaulis, *caules* simplices vel ramosos, $\frac{1}{2}$ -1 pedales agens. *Rami* alterni, oppositi vel ternatim verticillati, cum *caule* teretes, pubescenti-hirsuti, asperi et undique, praesertim infra basin foliorum, setis elongatis, patentibus, rufescentibus, basi bulbosis onusti. *Folia* sessilia, subcoriacea, ut plurimum ternatim verticillata, pauca opposita vel alterna, deltoideo-ovata, acuta, ciliata, basi cuneato-attenuata et apice integerrima, medio dentata, dentibus paucis, utrinque 1-6, acutis, inaequalibus, setigeris, vel tota integerrima et subtriangularia, supra obscure viridia, hirsutiuscula, nervo medio impresso, subtus pallida, glabra, nervo medio prominulo, valido, lateralibus minus conspicuis, 2-6 lin. longa, 1-4 lin. lata; *superiora* sensim minora, ceterum conformia. *Pedicelli* solitarii, ex foliorum axillis plerumque ternatim verticillati, basi stipulis bracteaeformibus minimis suffulti, uniflori, patentes, filiformes, juniores folia vix superantes, puberuli, adulti 6-8 lin. longi, glabrati. *Sepala* 4 vel 5, ovata, acutiuscula, lineam longa, glabra, ciliolata, viridia vel purpurascencia. *Petala* 4 vel 5 ovata, saturrine purpurea, 2-3 lin. longa, erecto-patentia. *Stamina* 8 vel 10; *filamenta* filiformia, semilineam longa, cum *antheris* quadrilobaribus, cylindricis vel obtuse quadrangulis, lateribus sulcatis, in tubulum brevissimum, $\frac{1}{4}$ lin. longum, poro terminali amplo, truncato, vel hinc paulisper emarginato instructum, productis — continua, concoloria, lutea, glaberrima. *Ovarium* sessile, ovatum, compressum, biloculare, hirsutum; *ovulum* solitarium in loculis. *Stylus* rectus, stamina vix ac ne vix quidem excedens basi latiore sensim attenuatus, infra medium hirsutiusculus, apice glaberrimus. *Stigma* simplex. *Capsulam* frustra quaesivi.

Obs. 1. In specimenibus meis flores plerumque tetrameris occurrunt, sed in omnibus pentameris quoque observavi, vel in uno eodemque verticillo cum floribus tetrameris alternantes. Exemplaria omnia juniora sunt, et flores perpauci tantum evoluti pedicellis brevibus puberulis insident.

Obs. 2. Planta nostra, obiter adspecta, *Tetrathecam ciliatum* Lindl. refert, cujus specimina Mitchelliana et iconem comparavi in Hook. icon. plant. T. 3 tab. 268; sed in hac folia superiora semper alternant, pedicelli breviores et cum sepalis et ovario glanduloso-setosi sunt. Filamenta inprimis crassiuscula et stamina atropurpurea, qualia in speciebus sectionum praecedentium reperiuntur, differentiam satis superque constituunt.

Obs. 3. Prima fronte suspicatus sum, *Tetrathecam piliferam* Lindl. Swan-River pag. XXXVIII. n. 188, (non nisi e diagnosi brevissima mihi notam) eandem esse plantam, ac nostram. Quum vero cl. auctor de staminibus a ceteris Tetrathecae speciebus adeo diversis nil commemoret, non amplius dubitavi, quin planta illa revera differat a nostra.

Occurrit in collectione Preissiana varietas:

β **integrifolia** nob. statura graciliori, foliisque integerrimis vel 1-2 dentatis.

In limoso-calculosis districtus York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1324.

Humilior, gracilior, ramosior, minus setosa, verisimiliter in loco steriliore nata. Folia plerumque integerrima, subtriangularia, basi cuneata, vel dentibus 1-2 utrinque instructa sunt; ovarium paullo magis rotundatum evadit quam in specie primaria, a qua praeterea non differt. Flores aequae variant tetrameri et pentameri, tetrameris praevalentibus. Stirps habitum alienum prae se fert, quoniam specimina floribus bene evolutis, pedicellisque semipollicaribus, glabratis, purpurascens abundant, qualia in specie primaria, cujus specimina priori anni tempore collecta sunt, raro inveni.

Obs. Tetratheca Preissiana quoad filamenta filiformia et antherarum tubulum brevissimum, transitum quasi in genus *Tremandrae* R.Br. explicat. Sed propter filamenta cum antheris continua, et propter totum habitum a *Tetrathecae* genere separari non potest.

PLATYTHECA Steetz.

Calyx 5 partitus. *Corollae petala* 5. *Stamina* biserialiter disposita, inaequalia; *filamenta* brevissima, plano-compressa, cum antheris continua; *antherae* compressae, quadriloculares, loculis uniserialibus, tubulo apicis deliscentes. *Ovarium* biloculare, loculis . . . ovulatis. *Stylus* filiformis, simplex. *Stigma* capitellatum. *Capsula* . . . ? *Semina* Fruticuli graciles ramosi, foliis linearibus integerrimis margine revolutis verticillatis vestiti, (Galii species quasi simulantes,) pedicellis filiformibus axillaribus unifloris.*)

Genus a *Tetratheca*: filamentis planis antherisque compressis, biserialiter dispositis, inaequalibus, 4 locularibus, loculis uniserialibus et stigmatibus capitellato bene distinctum. In *Tetratheca* antherae semper cylindricae, aequales, bi-vel quadriloculares, loculis biserialibus, ovarium uniserialiter cingunt. Itaque etiam aestivatio utriusque generis plane diversa. In *Tetratheca* petala stamina geminata segregantia utrinque involvunt. In *Platytheca* vero petala utrinque involuta, ad apicem usque sepalis valvatis tecta, stamina non includunt. — Specimina fructifera non vidi.

1. **Platytheca galioides** Steetz. glaberrima, foliis sessilibus verticillatis suboctonis linearibus carnosulis margine revolutis acutiusculis, axillis penicillatis, pedicellis axillari-

* Nomen e *γλῆς*, planus et *θῆκη*, locus.

Notra J. Oswaldiana New Siphert
a *J. ciliata* Lill., cuius diagnosi
hunc in promptu habeo.

Port Sorell, ad litus boreali occidentali
Tasmaniae, lib. N. 917.

Trabidol. triglossum f. Mcl

In olivis arenosis prope Cygal Brook
Mroughton plumer, curvata, nervis ad
ripas orange-argillaceas

Spicae per Nervosae. Petala alba ~~per~~
horizontal. patuit. Nervis lignosa ~~per~~

Microlepidium pilosulum, f. Mcl.
caulis ^{validioribus} ~~pilis~~ ^{approximatis} ~~brevis~~ rigidulis obfatis,
nerviis ~~filivula~~ cordato-runcatae bre-
vioribus

Sub nom. *Cappella* N. p. pubes Sandro nisi.
In parte inferiore virgultoso Murray
lib. N.

Trabidol. filifolium f. Mcl

Trabidol. filifolium f. Mcl. ^{plumbeum}
glabra, foliis linear-filiformibus ~~pa-~~
sciculatis, pedicellis raphisoculis pa-
suisibus filigulae aequilongis, valvis
subantheris uniserviis, stylo brevi,
stigmae ^{depresso} ~~antheris~~ ~~capitata~~ vix cerni-
gruato.

Prope Cygal Brook. Flores desunt.
Pteris ^{habitus} ~~prostratus~~ ~~concomit~~ ~~ram~~ ~~et~~ ~~tri-~~
loba, in ultima stylo ~~depresso~~, stigma
rappis est ~~propendius~~ ~~emarginatum~~,
pedicellis ~~longioribus~~ ~~minores~~ ~~minores~~
patulis ~~per~~ ~~erectis~~, reliqua dupla
longiora, ~~folia~~ ~~varie~~ ~~fitta~~ ~~partita~~
famina ~~minora~~ ~~Arabidella~~ ~~sub~~ ~~Albano~~
path: ~~minora~~ ~~vire~~ ~~per~~ ~~sub~~ ~~mag.~~ ~~calycis~~ ~~patulo~~

Nasturtium officinale, K. N. ~~per~~ ~~sub~~ ~~mag.~~ ~~calycis~~ ~~patulo~~
S. simplicifolium f. Mcl

S. simplicifolium f. Mcl.
pygmaea, foliis ad sessum lobum ~~trun-~~
catis, lobis nullis lateralibus,
styl paulo longiore
Cygal Brook! ~~Fraxin~~ ~~forma~~ ~~reogin~~ ~~ultra~~
alta. Folia curv. debilis analogie ~~simpliciora~~

bus solitariis saepe oppositis filiformibus folia superantibus, antheris ovatis scabriusculis ciliatis, in tubulum gracillimum ipsis sesquolongiorem productis, ovario ovato hirsuto, stylo rectiusculo.

In arenosis umbrosis inter frutices densos ad Preston Creek, (Perth) d. 30. July 1839. Herb. Preiss. No. 1330.

„Suffrutex, ramis flaccidis“. *Caulis* erectus, teres, inferne propter folia delapsa articulatus, cortice purpurascente, nitente tectus, a basi ramosus, cum ramis glaberrimis, 2-3 pedalis et ultra. *Rami* subsimplices, axillares, alterni vel saepius praesertim superne oppositi, foliosi. *Folia* in verticillos disposita, suboctona, sessilia, linearia, carnosula, margine revoluta, ita ut teretia videantur, utrinque glaberrima, vel supra hinc inde setula minutissima adspersa, nitida, acutiuscula, divergentia vel demum reflexa, 4-8 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata, in inferiore caulis parte internodiis multo breviora, in superiore et in ramis internodia aequantia, vel paullo etiam superantia. *Verticilli* articulis apice turbinatim incrassatis et penicillatis insidentes. *Pedicelli* axillares, solitarii, plerumque oppositi, uniflori, filiformes, glabri vel versus apicem incrassatum puberuli, patentes, pollicares. *Sepala* 5, ante anthesin valvatum petala tota tegentia, basi brevissime connata, lanceolata, acuminata, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longa, sub anthesi colorata, margine ciliolata, infra medium ciliis longiusculis, apice glandulosis internixtis, ceterum glabra. *Petala* 5, obovata, mucronata, sepalis paullo longiora, patentia, purpurea, basi macula atro-purpurea notata. *Stamina* 10, inaequalia, biseriatim disposita, quorum interiora 5 ovarium cingentia longiora, ab exterioribus 5 brevioribus alternatim teguntur; *filamenta* brevissima, plana, cum antheris continua, basi attenuata; *antherae* compressae, quadriloculares, loculis uniseriatis, ovatae, extrorsum purpureo-luridae, scabriusculae, introrsum laeves, pallidae, longitudinaliter trisulcatae, margine ciliatae, apice in tubulum anthera sesquolongiorem, medio tenus verrucis acutis deorsum spectantibus onustum, et basi ciliis longiusculis barbatum, ex purpureo sensim roseum, supra medium glaberrimum, flavescentem, attenuatum, oblique truncatum et poro terminali instructum — productae; *tubuli* antherarum interiorum exterioribus paullo longiores, graciliores, basi minus verrucosi, sed magis barbati conspiciuntur. *Ovarium* sessile, ovatum, compressiusculum, biloculare, hirsutum; *ovula* in loculis conspiciere mihi non contigit, speciminibus ad examinandum non sufficientibus. *Stylus* filiformis, staminibus paullo brevior, rectiusculus, basi medio tenus ciliis sursum spectantibus hirsutiusculus, superne glaberrimus. *Stigma* simplex, capitellatum. *Capsulae* non suppetunt.

2. **Platytheca Crucianella** Steetz. ramis pubescentibus, foliis sessilibus verticillatis subdenis linearibus carnosulis margine revolutis acutiusculis supra sparse muricato-setosis, axillis penicillatis, pedicellis axillaribus solitariis filiformibus folia superantibus levissime puberulis, antheris ovatis vix scabriusculis ciliatis, in tubulum gracillimum ipsis duplo longiorem productis, ovario ovato velutino, stylo supra basin paullisper torto.

In regionibus interioribus Australasiae meridionali-occidentalis mense Novembr. 1840. Herb. Preiss. No. 1331.

Proxime ad speciem praecedentem accedens, nil forsitan nisi varietatem ejus exhibet. Differt vero praeter characteres indicatos: Habitu peculiari, multo graciliore, caule humiliore, vix pedali, foliis minus divaricatis non reflexis, sed potius arrectis, articulis densius penicillatis, pedicellisque semper solitariis, (in speciminibus 6 a me examinatis nunquam oppositos vidi). In planta sicca praeterea petala angustiora et breviora videntur, et tubulus antherarum imo exteriorum minus verrucosus, totus fere flavet.

3. **Platytheca crassifolia** Steetz. ramis pubescentibus, junioribus glanduloso-pilosis, foliis sessilibus verticillatis suboctonis linearibus carnosissimis margine revolutis obtusiusculis supra undique muricato-tuberculatis, axillis penicillatis, pedicellis axillaribus solitariis raro oppositis filiformibus folia superantibus setulis brevissimis patentibus obsitis, antheris late ovatis vix scabriusculis margine laevibus in tubulum gracillimum ipsis triplo fere longiorem productis, ovario subrotundo velutino, stylo supra basin torto.

In Australasia occidentali et meridionali - occidentali leg. cl. Preiss, sed quando? Herb. Preiss. No. 1320 et No. 1321.

Affinis quidem speciebus duabus modo commemoratis, sed sine ullo dubio bona species. *Antherae* enim breviores, margine non ciliatae cum tubulo longiore minus barbato, et *folia* muricato-tuberculata, crassissima, fere obtuse triquetra, abbreviata, lineas 6 raro excedentia, obtusiora, plantam prima fronte distinguunt. No. 1320 et 1321 quorum non nisi specimina singula vidi, nullo caractere essentiali inter se differunt.

TREMANDRA R.Br. Endl. gen. n. 5645.

Meisn. gen. pag. 22. (20.)

1. **Tremandra oppositifolia** Steud.*) caule erecto ramoso pilis stellatis dense tomentoso, foliis oppositis petiolatis basi subcordatis ovatis subundulato-crenatis obtusiusculis supra asperulis subtus pilis stellatis dense et albo-velutinis, pedicellis axillaribus unifloris oppositis foliis dimidio brevioribus.

In turfosis umbrosis sylvae ad radices montis Elphinstone, (Plantagenet) d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1669. Ferd. Bauer!

„Frutex bipedalis“. *Caulis* erectus ramosus, et cum *ramis* axillaribus oppositis, decussatis, teres, pilisque stellatis, olivaceis dense tomentosis. *Folia* opposita, decussata, petiolata, petiolo tereti stellato-tomentoso 1-2 lin. longo, basi vix cordata, ovata, obtusiuscula, subundulata, integerrima vel margine leviter inaequaliter et obtuse crenata, penninervia, supra nervis impressis viridia, pilis stellatis sparsis basi tuberculatis asperula, subtus nervis prominulis reticulata, albida, mollissime velutina, pilis stellatis densissime obsita; *inferiora* 1-1½ pollicaria, 10-12 lin. lata, *superiora* et *ramorum* sensim breviora et angustiora. *Pedicelli* axillares, uniflori, oppositi, ebracteati, crassiusculi, penduli, pilis stellatis dense tomentosi, 4-7 lin. longi. *Sepala* 5, lanceolata, acuta, membranacea, pilis stellatis extrorsum conspersa, introrsum glabriuscula, 2 lin. longa. *Petala* 5, obovata, breviter unguiculata, sepalis paullo excedentia, erecto-patentia, venosa, purpurea; *lamina* utrinque glabra, in unguem cuneatum, planum, continuum, ciliatum, extrorsum glabrum, introrsum supra imam basin laevem, pilis simplicibus albidis densissime barbatum — attenuata. *Stamina* 10; *filamenta* filiformia, 1-1½ lin. longa, concoloria, cum *antheris* bilocularibus, obtuse quadrangulis, lateribus longitudinaliter sulcatis, sordide purpureis, undique setis brevibus pa-

*) Planta errore quodam cum Büttneriaceis ad cl. Steudelium missa, nomine hoc characteristico ornata in manus meas venit. Diagnosin et descriptionem accuratorem egerunt ipse elaboravi.

Elatineae, Cambricoides.

E. gratiolaris, Juss. Muller

E. gratioloidea All. Cunningham.
(nomen ob falsam constructionem
mutatum)

Loric inundatis prope Elshabe
inter primum speciei & mutans
F. Lindbergii

Descriptio melioris recognitionis ergo
augenda: Folia caespitibus oblonga
expirationem pellucida 1/2-3^{la} lata
& duplo longiora. Flores ~~sup~~ in-
terdum manifeste petiolata.
Calycis laciniarum suboratae 3.
Sepala 3 rotundata rubra. Stam.
6. Petalum. Styli 4 reflexi. Capsula
diametro lineari, ^{valvis} leniteris. Sem.
vitula pulva nitidula testum lineam longa
Rath: vire.

Eupimum cardaminoides, Juss. Mull.

Cardamine pubnula n. 262
Transitum a horti varietate ad
Arabidellam fugit.
Stems albi.

Monoptera phlebotetala, Juss. Mull.

caulibus herbaceis simplicibus v. paucis
angulatis, foliis lato linearibus carnosis
putalorum lamina angusta oblonga ruga
filiculis pidiello longioribus subrotundis
ultra medium paulo angustatis vix ad
quintam partem usque diffusis breviter ac-
guato alatis, stylo lobulos filiculae aequante
vel superante!

Cappi prope rivum Rocky-creek.

Stuba pueris nata ^{v. affinis} pulcherrima vel digitalis mul-
tivalis. Melius cum pteribus N. H. ardeatelo

tentibus hispidis, poro terminali, marginibus oppositis hinc convexis illinc concavis, dehiscentibus — articulata. *Ovarium* sessile ovatum, compressum, pilis stellatis densissime velutinum, biloculare; *ovulum* in loculis solitarium evolvere mihi non contigit, duobus tantum exemplaribus suppetentibus. *Stylus* filiformis, rectus, $1\frac{1}{2}$ lin. fere longus, ima basi pilis paucis stellatis conspersus, ceterum glaberrimus, crassiusculus, summo apice attenuatus, utrinque longitudinaliter sulcatus. *Stigma* simplex. Specimina fructifera non vidi.

Obs. *Tremandrae* generis character minus, ut mihi videtur, collocandus erit in *loculis uniovulatis* ovarii bilocularis, (quales etiam in plurimis *Tetrathecae* speciebus observavi,) sed potius in *antheris bilocularibus, tubulo plane destitutis, et cum filamentis filiformibus articulatis.*

SAPINDACEAE Juss.

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

DIPLOPELTIS. Endl. gen. n. 5625. Meisn. gen. pag. 346.

1. **Diplopeltis Preissii** Miq. foliis serrato-vel plerumque pinnatifido-incisis, (segmentis latis vel linearibus, integris, vel incisis) marginibus nervis utrinque cauleque pilosis, pedunculis pedicellis sepalisque marginibus glandulis pedicellatis instructis, floribus roseis.

Crescit in clivulis calcareis inter frutices densos, haud longe ab ora maris, in regione Perth, 18. Jun. 1839 cum fl. Herb. Preiss. No. 1281.

A *D. Hügelii* Endl. *Pl. Hügel.* pag. 13. foliis profundius incisis, floribus roseis (nec candidis), et squamae e disco productae forma abunde differt. „Suffrutex 2-3-pedalis, erectus“, ramosus, foliorum variabilitate (sed in iisdem ramis plus minus conformium) insignis. *Rami* virides vel purpurascens, teretes vel superne obtuse tetragoni, inferne glabrati, superne albido-pubescentes. *Folia* alterna, sessilia, erectiuscula, viridia, nervis in quibusdam purpurascens, coriacea, oblonga, apice obtusa vel acutiuscula, in aliis ramis serrato-incisa, incisuris obtusiusculis, mediis quam superiores latiusculae et infimae angustae stipularum ad instar cauli appressae longioribus, in aliis pinnatifido-incisa, segmentis oppositis remotis, linearibus, integris vel inciso-dentatis, majora 3-4 cent. longa, superiora sensim minora, nec tamen minus incisa, si excipias *floralia* plerumque lanceolata minuta, primas inflorescentiae ramos subtendentia. *Omnia* marginibus incrassatis nervisque majoribus utrinque hirtello-pubescentia. *Panicula* terminalis e *racemis* erecto-patulis alternis scorpioideis apice floriferis composita, 16-20 cent. longa, pubescens, glandulis pedicellatis atro-fuscis pube intermixtis. *Bractae* pedunculos primarios subtendentes, *infimae* aliquando foliiformes incisaе, *reliquae* lanceolatae, superne sensim minores, marginibus glandulis pedicellatis pilisque ciliatae, saepe rubescentes. *Pedunculi* tennes, sparse bracteolati, apice scorpioideo-floriferi. *Flores masc. Pedicellus* 4-6 mm. longus, crebro-glandulosus, basi *bractea*, decidua lanceolata ciliata aliquando basi fere pedicellatim contracta stipatus. *Sepala* ovato-elliptica, obtusa, concava, intus laevia, pallida, extus viridia pilis albis sparse hirtella, marginibus glandulis pedicellatis nigro-ciliata, $1\frac{1}{2}$ mm. circiter longa, anti-

cum et posticum paullo latiora. *Petala* 4, rosea, in sicco juniora saturatiuscula dilute violacea, obovato-rotundata basi in unguem $\frac{1}{3}$ long. contracta, integerrima, e basi flabellatim venulosa, 6 mm. longa. Discus postice *squamam* carnosam in sicco subaurantiaco-fuscam, lata basi sessilem rotundatam latam, sepalo retrojacente brevioris bilamellatam productus; *lobellae* subaequilongae, exterior paullo brevior, margine undulata, interior cristato-incisa. *Stamina* 8, 3 ante sepala exteriora, 1 sepalo sinistro, 1 dextro opposita *filamentis* dilute violaceis glabris petala superantibus, *antheris* violaceis sensim pallescentibus, oblongis, bilocularibus, localis oppositis antice dehiscentibus, postice medio affixis. *Ovarii* rudimentum minimum.

2. **Diplopeltis Lehmannii** Miq. foliis spathulato-lanceolatis versus apicem sparse serratis utrinque incano-tomentoso-pubescentibus, panicula glanduloso-asperula, petalis retusis, capsulae trilobae coccis rugoso-reticulatis pedicellato-glandulosis.

Crescit in lapidosis subumbrosis montium continuorum Darling's-range in reg. Perth, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1282.

„Frutex bipedalis erectus“. Habitu florum magnitudine ac colore praecedenti haud absimilis, sed foliorum forma ac tomento distinctissimus. *Rami* inferne glabrescunt vel minute puberuli, teretes vel obsolete tetragoni, *ramuli* nascentes tomentose hirti. *Folia* (superiora stirpis feminae) spathulato-lanceolata acutiuscula, versus apicem sparse irregulariter serrata, basi integerrima attenuata, coriacea, incana, 3-4½ cent. longa, ½-1 cent. lata. *Paniculae* elongatae axes *pube* minuta appressa *glandulisque* pedicellatis atro-fuscis patentibus demum inflexis rigidulisque subasperuli. *Bractee* *bracteolaeque* ellipticae vel elliptico-lanceolatae. *Sepala* ut in praecedenti disposita, sed elliptica, obtusa, pube appressa albida in dorso, glandulisque pedicellatis inprimis in marginibus instructa. *Petala* subrotunda leviter retusa, integerrima in unguem $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ long. contracta. *Stamina* 8 ut in praecedenti specie disposita, in *floribus masc.* qui racemorum apices occupant, petala aequantia, *filamentis* in sicco purpurascens, in *femineis* castoreo, *filamentis* abbreviatis. *Antherae* oblongae, obtusae, fusciscentes. *Discus* *squamam* bilamellatam fuscam, lamella extrema brevior truncata, interna dentata. *Capsula* immatura triloba, calyce persistente suffulta, coccis angulo centrali cohaerentibus (*stylo* centrali filiformi diutius persistente demum deciduo), inferne contractis nudis, vertice rotundato reticulato-rugosis, glandulis pedicellatis venulis fuscis impositis. *Pericarpium* cartilagineum. *Semen* in quovis loculo unicum adscendens, fuscum, cum rudimento ovuli non foecundati.

THOUINIA Poit. Endl. gen. n. 5618.

Meisn. gen. pag. 52. (37.)

Sodonaea

1. **Thouinia (?) adenophora** Miq. foliis alternis imparipinnatis, glandulosis, foliolis oppositis carnosissimis anguste cuneato-linearibus, inferioribus bifidis, superioribus emarginatis, summis integerrimis, racemis axillaribus vel in ramulis terminalibus, capsulis tricoccis trilobatis.

Crescit in confragosis montium continuorum Darling's-range. Herb. Preiss. No. 2442.

Species quoad genus haud omnino certa, cum ne rudimentum quidem floris in unico ramulo capsulifero reperire licuit, et a reliquis *Thouiniis* foliis impari-pinnatis, coccis basi etiam alatis et cotyledonibus oblongis nec linearibus.

x ad. rouspida. Don.

in pueris Loominica. Diagnosis quoniam
brevissima sed exacte quadrans.

Propter lacum inter ad H. South St.
river. fruct. 10-12'. hb. N. H. n. 54

ad species Donianae ab auctoribus
quorundam ^{calyptrae} neglectas, fortasse Loominicae

sunt plures novae Miquelianae.

inter Cygnus-river, hb. St. J. H. 633.

hb. 1849. fruct. 10-15' near Aggr.
way.

Miquetia Loominica.

Sub hoc nomine plures species
videntur confusae, nam planta
mea exquiritissime diagnosi Wedd.
apud Desf. f. 31 (brevissima quoniam)
convenit, non omnino descriptioni
Donianae.

Inter ripam piscinam ad aqua-
rum marginem in vallibus mun-
do Kaisyfahl. Specimen feminina
deflorata. Apr. 14. 1848. Dm.

In speciem Loominicae (hb. L. n. 33)

folia parva adpressura.

Dodonaea erythraea Erp. f. ma.

glabra, viridula, ramulis angulatis,
foliis planis, lanceolatis v. oblongo-
renatis acutis vel retusis cum aromati-
co angulati, ramulatis, in margine appen-
dis vel integris, p. ovibus diacis axillaribus
et terminalibus, in axillis in paniculas pro-
ut multifloras (estis brevibus pedicellatis, foliis
nec raris, capsulis rubris) loto triplex, alis
— 2. ramulata. Loc. et Miquetia

Haec nominata a uxoribus ex
herbario Suarriano (n. 59).

Ad omnibus a Dono &
Miquetia descriptis ad folia
herbarii Miquetiana bilam p. paranda
— 3. defigurata. Loc. nata
Superior.

bus recedens, an cum *Th. australi* A. Rich. in proprium genus conjungenda? Frutex. *Rami* teretes; *ramuli* subangulosi, glandulosi. *Folia* alterna, sessilia, valde glandulosa et ut videtur viscida, impari-pinnata, *rhachi* crassa planiuscula, articulata, *foliolis* 1-3-5-jugis, erectis angustissimis articulatis, 6-2 mm. longis. *Capsulae* confertissimae, in racemis paucifloris vel in axillis foliorum trifoliorum solitariae, trialatae, breviter pedicellatae, in samaras tres extus totas alas, axi centrali tenui adnatas solubiles, alis glandulosis, fuscis, venosis. *Semen* solitarium, compresso-lenticulare, *testa* coriacea, atropnita, *embryone* curvato, cotyledonibus oblongis plicatis.

DODONAEA Linn. Endl. gen. n. 5626.

Meisn. gen. pag. 53. (38.)

1. **Dodonaea pterocaulis** Miq. ramulis triquetris anguste trialatis, foliis subsessilibus elliptico-vel obovato-lanceolatis, basi attenuatis, apice subpungenti-acutis, marginibus revolutis integerrimis, supra glabris, viscidulis?, subtus minute puberulis sensim glabratis, pedicellis axillaribus solitariis-ternis, capsula tetragona (rarissime pentagona!) subverniosa, carpellis dorso infra apicem in alam acutam erectam productis quadricorni parumper brevioribus.

Crescit in rupestribus montis prope Tjallop reg. Kent. 17. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2440.

„Frutex bipedalis“. *D. ceratocarpae* Endl. in Enum. pl. Hügel. pag. 13. *D. triquetrae* Andr. et *D. Baueri* Endl. l. c. affinis. — *Rami* vetustiores trigoni subapteri; *ramuli* densi, breves, erecti. *Folia* 1½-2 cent. longa, 5-7 mm. lata. *Capsulae* absque alis 7 mm. longae. *Semina* lenticularia, atra, nitida.

2. **Dodonaea aptera** Miq. ramis teretibus, ramulis compressis, foliis breviter petiolatis obovatis, oblongo-vel spatulato-obovatis, basi attenuatis, apice rotundatis vel emarginatis utrinque glabris, nascentibus viscosis, marginibus leviter revolutis, pedicellis e pedunculo communi ternis vel paucioribus capsulam latam brevem tetragonam infra apicem alae rudimento coriaceo e carpellorum dorso producto subapteram multo superantibus.

Crescit in clivulo calcareo Arthur's-head (Perth) et in insulis Garden-island et Rotenest, 9. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2439.

„Frutex 2-5-pedalis“, conferte ramosissimus. *Ramorum* vetustiorum cylindraceorum cortice rimoso-fibroso. *Ramuli* triquetri-compressi ancipites. *Folia* pallide viridia, coriacea, glabra, nascentia vernicosa, 2½-4 cent. longa, ⅔-2 cent. lata. *Capsulae* subverniceo-punctatae, 7 mm. longae, 10 latae, tetragonae, *carpellis* apteris, dorso infra apicem in alae rudimentum rigidum acutato-producto. Dissepimenta seminifera tenuiter membranacea. *Semina* lenticularia, castaneo-fusca, laevissima, nitidissima.

3. **Dodonaea sororia** Miq. ramis teretibus, ramulis semitereti-ancipitibus, foliis coriaceis utrinque glabris, viscosis longiuscule petiolatis, elliptico-obovatis, basi valde contracta in petiolum decurrentibus, apice lato plerumque retusis, subtus subtilissime venulosis, racemis axillaribus pau-

cifloris, pedicellis subfastigiatis elongatis, capsulisque juvenilibus tetragonis glandulosis.

Crescit in collibus arenosis insulae Rotenest 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2388.

D. ceratocarpae Endl. et *D. apterae* cognata, sed pedicellis valde elongatis statim dignoscenda.

„Frutex bipedalis“. *Rami vetusti* teretes, *juniores* tetragono-ancipites, compressi, *ramuli* semitereti-compressissimi, ancipites et ut folia viscida. *Folia* inprimis superiora longius petiolata, adulta rigide, *juniora* membranaceo-coriacea, utrinque viscida, $2\frac{1}{2}$ -5 cent. longa, $1\frac{1}{3}$ - $2\frac{1}{2}$ lata, iis *D. apterae* simillima sed subtus evidentius venulosa. *Pedicelli* 1-2 cent. longi, sursum incrassati. *Capsulae* tetragonae, apiculatae, adhuc valdopere juveniles apterae.

4. ***Dodonaea humifusa* Miq.** ramulis triquetro-compressis, foliis obovato-cuneatis vel obovato-lanceolatis, basi attenuatis, apice spinoso pungenti tridentatis vel integerrimis supra versus margines subtus in nervo medio minutissime puberulo-hirtellis, cito glabratis, capsulis tetragonis apteris pedicello brevioribus.

Crescit in limoso-glareosis districtus Hay. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2441.

Capsularum forma *D. apterae*, foliorum autem *D. asplenifoliae* Rudge et *D. cuneatae* Smith (Linn. Transact. Tom. XI Tab. 20 et 19) affinis.

„Frutex humifusus“. *Caulis* decumbenti, flexuoso, tereti, radicante, cortice rimoso solubili. *Rami* decumbentes, teretiusculi, densi, *ramuli* triquetro-compressi, herbacei, nascentes minutissime puberuli. *Folia* ob ramorum situm decumbentem ad unum latus directa, patula, coriacea, pallide virida, vix vernicosa, supra versus margines minute puberula marginibus ciliolata, subtus inprimis in nervo medio prominente minutissime puberulo-hirtella. forma varia, majora obovata cuneata, apice tridentato-spinoso-pungentia (rarissime quinqueidentata), alia repanda, alia elliptico-lanceolata, integerrima, omnia marginibus revoluta, 1-2 cent. longa, 4-10 mm. lata. *Pedicelli* axillares solitarii vel terni, sursum incrassati, 1-2 cent. longi. *Capsulae* tetragonae, 6-7 mm. longae, carpellorum dorso versus apicem extenuato-acutato (rudimento alae). *Semina* lenticularia, nigra, nitidula.

5. ***Dodonaea Preissiana* Miq.** partibus omnibus junioribus verniceo-viscosis, foliis erectis rigido-coriaceis glabris junioribus grosse glandulosis, spathulato-linearibus, apice triangulari acutiusculis, versus basin sensim in petiolum contractis, marginibus subrepandis, floribus dioicis racemosis, capsulis lato-tripteris, alis maturis membranaceis.

Crescit inter rupium fissuras montis Hardy, reg. York. 11. Sept. 1839, sp. masc. et fem. Herb. Preiss. No. 2437; et in rupestribus montis Currie.

D. viscosa L., *D. spathulatae* Smith, affinis videtur, foliorum autem forma et capsulae alis facili negotio discernenda.

„Frutex 4-5 pedes altus“, ramosissimus. *Rami vetustiores* teretes, sordide nigricantes, cortice rimose soluto, *juniores* cortice fusco nitido obducti. *Ramuli* angulati subtetragoni, glandulis elevatis subtiliter tuberculati et vernice nitente obducti. *Folia* alterna, erecta, coriacea, *juniora* saturate viridia, grosse glandulosa et tota vernicosa, *adultae* et vetustiora lutescentia et vernice sensim diminuto in sicco minus rigida, spathulato-linearia, fere inde ab apice sensim et demum versus basin in *petiolum* contracta, apice ipso plerumque triangulariter acuto acutiusculo, marginibus integerrimis vel obiter subdenticulatis repandis et subrevolutis, nervo medio percurrente subtus inprimis prominente venulas vix visibiles patulo-ascendentes emittente, 3-5 mm.

In plantis hinc virgultis in catibus
solentur - range v. n. p.

D. angustata Forstn.

D. attenuata hb. L. n. 61, Forstn.
quidem attinet, talis plantis
eio divinum, in edictiva

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

D. aurata Forstn.
In arundinis ad montem Hoover
frequenter. crata, glabra

Retro 8.

Dodonaea cuneata axifolia Fu. m.
 in pineto Callitris rufus
 litorum finis sancti Vincentis
 Nov. 1848. D. M. M. Folia
 lanam pinguiam v. albi amulant
 (fr. D. M. M.) definitionem et
 designationem a l. detestoni
 linguo. C. D. M. M. novum a

me datum ^{viscop. disticta} ^{vel elongatis erectis} ^{plano}
 glaberrimis brevibus patulibus, lere
 serrulatis, foliis coriaceis ^{emarginatis} ^{apiculatis} ^{integerrimis}
 cuneatis, oblongis, retusis
 floribus dicatis axillariis termin
 libusque solitariis, binis, ternis
 antheris albidis, capsulis viridibus
 tri-raro tetrapteris, alis angustis
 Frut. 3-4'. In fylva Pine-forest
 trans rivulum v. alto-creek by
 C. D. M. M. Nov. 48. Flori & fructif.
 Corpus McClintock in ^{fruticetis}
 "Murray scrub" v. alto. Apr. 49.

- D. deflexa End. M. C. conf. p. 230.
D. lobulata Fu. M. C. conf. p. 231.

D. littoralis Lin.
 Cum arviculis phragis Canianee
 quam defectus capfulas plan
 tam meam eam debent ^{frutis}
 legum species insignita & pini
 foliae proxime florentia. H.
 pl. euphorbiacea? hl. A. fin. n.
 raro in aruosis litoris distinctus
 litoralis End. M. C. Wag. dicti.
 pl. etioria F. m.

ut pinnatifolia
Dodonaea humilis End. C.
 et C. Murray v. p. McClintock
 Aug 1849. L. m. unguinalis. 3 pin
 o lavi phragi M. C. p. 1. 1. 1.

longa, 3-5 mm. versus apicem lata. *Flores* dioici, in racemis axillaribus et terminalibus dispositi, viscidissimi. *Masc.* brevius pedicellati, virginales tetragoni. *Sepalis* ellipticis acutis marginibus floccoso-laceris (an ex viscidine?) *staminibus* 8, sepala haud superantibus, *filamentis* brevissimis, *antheris* oblongis, bilocularibus, leviter introrsum curvatis. *Racemi feminei* pauciflori, *capsulis* longe pedicellatis, subpendulis, basi annulo e sepalis superste suffultis, trialatis. *Alae* subsemiorbiculares vel semilunatae, membranaceae, juniores virides, glandulosae, viscidissimae, adultae tenuiter membranaceae, fuscrescentes, 1 cent. circiter longae. Dissepimenta e tenui axi producta, tenuiter membranacea. *Semina* nigricantia.

6. **Dodonaea (?) ericoides** Miq. tota hirtello-pubescentis, foliis oppositis summis subalternis alternisque (axillisque fasciculato-foliosis) anguste linearibus subacerosis integerrimis vel apice tridentatis, semitereti-revolutis, supra in medio sulcatis, rigidis, pedicellis terminalibus solitariis brevissimis, capsulis tetragonis incano-pubescentibus, angulis in medio dorso cornuto-alatis.

Crescit in regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis, raro!! Herb. Preiss. No. 2435.

Species habitu singulari, foliis oppositis, pedicellis terminalibus, calycibus ad immaturam capsulam persistentibus inter congeneres fere heterogenea, ob capsulam tamen plane congruentem huc relata.

„Fruticulus humilis ramosissimus“. *Rami* vetustiores teretes, cortice fibrose soluto. *Ramuli* tereti-tetragoni, herbacei, hirtello-pubescentes. *Folia* opposita, summa alternantia sed plerumque binatim approximata, omnia in axillis fasciculos foliorum foventia, in sicco rigida, acerosa, laete viridia, angustissime linearia, usque ad nervum medium prominentem revoluta, supra sulcata, integerrima vel versus apicem tridenticulata, utrinque patentim hirtella, 5-8 mm. longa. *Flores* solitarii, terminales, brevissime pedicellati, deflorati: *calyx* quadripartitus, patens, lobis ovato-ellipticis, acuminatis, viridibus postice pubescentibus. *Filamenta* 8, brevissima, teretia, sepalis opposita et alterna. *Ovarium* minutum subtetragonum *Capsulae* immaturae calyce persistenti suffultae, incano-pubescentes, tetragonae, carpellorum in dorso medio in alam brevi-lanceolatam coriaceam quasi cornu referentem producta; e media capsula *stylis* rudimentum glabrum exsurgit.

7. **Dodonaea pinifolia** Miq. glabra viscosa, ramulis tetragono-compressis, foliis sparsis acerosis rigidis angustissime linearibus, valde revolutis glandulis elevatis, remote stigmatosis, nitidis, floribus dioicis axillaribus solitariis, masculis brevissime pedicellatis octandris, femineorum pedicellis clavatis capsula tetragona quadriloculari valvulis dorso infra apicem cornuto-alatis quadricorni brevioribus.

Crescit in glareosis montis prope St. Ronan's-well, reg. York et in planitie arenosa Quangen, reg. Victoria, 12. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 2438.

Species distinctissima, *D. ericoide* proxime accedens, sed omnium partium glabritie et singulari foliorum forma facili negotio inter congeneres discernenda.

„Frutex pedalis“. *Rami* vetustiores subteretes cortice filamentose secedente. *Ramuli* glandulosi vernicosi, tetragono-compressi. *Folia* alterna vel in ramulorum apicibus subfasciculata, lutescente-viridia, vernicosa, angustissima, integerrima vel rarissime uno alterove margine unidentata, supra glandulis elevatis stigmatosa, valde (usque ad nervum medium) revoluta et hinc supra convexa, 1-2½ cent. longa. *Flores masc.* brevissime pedicellati,

clausi, tetragono-subtetraquetri, *sepalis* vernicosis ellipticis acutis, capsulam mentientes. *Capsulae tetragonae*, 7 mm. longae, *pedicello* clavato 5 mm. longo sustentae, styli demum in partes 4 soluti vestigio rostellatae; *dissepimentis* molliter membranaceis, valvulis navicularibus, vernicosis, dorso ad apicem alae rudimento cornuiformi instructae.

OLACINEAE Mirb.

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

OLAX Linn. (R.Br.) Endl. gen. n. 5492.
Meisn. gen. pag. 45. (33.)

1. **Olex Benthamiana** Miq. foliis sessilibus linearibus apice uncinato-mucronatis, floralibus densis ovalibus vel obovatis apice postice mucronulatis, carinato-complicatis, flores solitarios amplexantibus, corolla quinquefida, filamentis sterilibus bifidis, inferne pilorum seriem juxta corollam demittentibus.

Crescit inter saxa calcarea clivuli haud longe ab ora maritima, distr. Perth. 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2095.

Olax strictae R.Br. ex phrasi nostram adscripsissem, nisi cel. auctor expressis verbis declaraverit, in *Olacibus* Novae Hollandiae a se examinatis filamenta sterilia *indivisa* esse, in nostra autem bifida reperi.

„Frutex bipedalis, erectus, ramis distichis. Flores albi“. *Ramuli* viridescens, glabri, angulosi aliquando fere tetragoni. *Folia* lata, basi articulatim sessilia, linearia, inferne paullo contracta, apice obtusiuscula, subuncinatim mucronata, uninervia, 1-1½ cent. longa, 2-fere 3 mm. lata, superne concaviuscula. *Folia floralia* (fere bractae dicenda, et inflorescentia fere spicata) densa, fere imbricata, illis multum breviora, ovalia vel obovata, apice postice mucronata, omnino carinato-complicata et florem axillarem solitarium recipientia. *Flos* breviter pedicellatus, 5-6 mm. longus, virginialis cylindraceo-clavatus. *Calyx* patens truncatus a lateribus utrinque elevatus, hinc quasi bilobus. *Corolla* quinquefida, an petalo quinto toto libero?, *petalis* lineari-lanceolatis. *Stamina* fertilia 3, *filamentis* brevibus, *antheris* ovalibus luteis, polline aureo. *Filamenta sterilia* exserta, alba, bifida, laciniis planis linearibus, apice subcapitellato-involutis. *Stigma* trilobulatum.

Dodonaea fasciculifolia Cunningham
Sub hoc nomine a Stuartia
missa a Don non in typica
recepta, affinis *D. paniculata* et
filiiformis.

frut 8-10' alt. South Is. riv.
Sarm. hb. St. H. n. 34. 184. 25. 48.
fol. alterna! conferta non fasci-
culata!

Dodonaea illisa Forst. M. C.

Dodonaea illisa Forst. M. C.

^{glabra}
Dodonaea - *virens*, ramis *erectiusculis*,
ramulis *angustis*, foliis *lineari-*
auriculato vel *oblongo* - *spathulatis*
obtusis *acuminatis* in *apice*
angustatis *marginibus* *vix* *revolu-*
tis, *floribus* *diocis* *altrius*
sexus *indistinctis* *axillaribus* et
terminalibus *racemosis* *paniculatis*
latis *marculis* *brevibus* *se-
vatis* *cum* *medimento* *germinis*,
racemosis *longius* *paniculatis*,
anthodis *minutis* *germinibus*
fructu *capsulis* *latis* *triplicis* *alis*
inativitate *membranaceis*

frut *vuln* *raginata* *D. Preiss-*
anae *Miq.* (forte *solummodo*
ut *varietas* *diversa*) *non*
non *D. conferta* *Don* et *lon-*
gissimae *Don.*

frut *4* (fr 15' ^{passim} *arborescens*).

Para minor, *Barroza* - *rango*, *Simferopolis*,
Musk-riv et *Murray* *inter rupes* ad
inulas, *hb. St. H.* *hb. J. 33.*

Chlorazifera xij.

* *Thryx pedunculata* L.

Sumida Tan Gremens-Land!

alt. 4. Tasmannit. n. 90

Adonoum laticornis 5-6' hb. St.

W. H. n. 408. Jan. 20. 1849.

Styracineae. Gel.

Garphodonta lucida. Latr. Cond.

On insula Van Diemens Land.

ab G. Tarmannia n. 58, 40 pluvii
1844 - 50, Jan. 10. 49.

Muzm. ripas ab arbor 40-50' Jan. 10. 99.

26. II n. 586.

66. 586.
Frathy's Billardieri spach.

so monotonous. Copy. Dec. 28. 1847
w/pen with ink

Ad montem Coffy. Dec. 28. 1881
alibi quae frequenter Appl. a. with lph. r. 1881
Farm. 46. 11. 11. 1881

alibi quae frequenter videntur in
22. D. "Sunt hinc ad flum." in - 2118

et. Piceis signatim cones, in
minquam aliis

...anath, qui ego nunquam
...quam vitellini vidi. Nam

sa multiformis, caule teretibus

20 valer elato vel hreni limo;

a forma ultima planta legum^{radice}
 ... caule terminata,

Leptosomus, "aurea" *Leptosomus*,
"aurea" *Leptosomus*, "aurea" *Leptosomus*.

ovatus, & natione longitudinis latior.
15. pupilla planior. Sere imp.

oribus. In ultima clona per unum
clonam apice intra xalia fali

varia in B. B. claudieri varius,

rigurimenter. Varietas prostratissima

Thymus *sp.* (very small) under plants m.
Thymus *sp.* (very small) under plants m.
Thymus *sp.* (very small) under plants m.

Wigandia perfolium Choisy
B. Lillard

Sorghum humilifolium L. Willard

Finda fluvium Onkaranya & m
Macgregor. Apr. 26. 1848

gum Maculati. Sept. 20. 1880.
Lamina numeravi 20. Formis instm.

artibus cum superiore confluit
Tannus in umbrosis.

HYPERICINEAE DC.

Endl. gen. pag. 1031. Hypericaceae Lindl.
 Introd. ed 2. pag. 77. Spach. in Ann.
 des sc. nat. 2^e Ser. 5. pag. 349 sq.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

Trib. I. HYPERICEAE. DC. l. c.

BRATHYS Spach. consp. Hyperic. in Ann.
 des sc. nat. 2^e Ser. 1836. V. pag. 366. (ex parte).

1. **Brathys Billardieri** Spach. caule adscendente quadri-
 quetro, foliis ovato-oblongis ovatove lanceolatis obtusis
 pellucido-punctatis, pedunculis ex dichotomia et subalternis
 folio longioribus caulem paniculatum exhibentibus, calyce
 lanceolato acuto, corolla involuta proptereaue calyce bre-
 viore, stigmatibus capitatis. Spach. l. c. pag. 367.

Hypericum involutum DC. Prodr. 1. pag. 549. *Ascyrum*
involutum Labill. Novae Holl. 2. pag. 32. t. 174.

In solo humoso arenoso ad flumen Cygnorum. Herb. Preiss. No. 1961 et in
 turfosis uliginosis ad fl. Cygnorum supra oppidulum Perth, Februario a. 1839. Herb.
 Preiss. No. 1960.

„Flores incarnati“ (Preiss).

Variat caule vel erecto fere simplici vel a basi ramosissimo. *Color*
glaucescens. 5. 24.

Obs. *Hypericum pedicellare* Endl. in Enumerat. pl. Hügel. pag. 12 nisi
 staminibus paucioribus (8-10, cum nostrae sint circiter 30) vix differt.

BÜTTNERIACEAE Brown.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

MACARTHURIA Hügel msc. Endl. gen.
 n. 6889.

1. **Macarthuria australis** Hügel msc. ramis elongatis
 simplicibus florentibus aphyllis sterilibus remote alternatim
 foliatis, foliis subspathulato-linearibus obtusis, cymis fasci-
 cularibus sessilibus bi-decemfloris squamoso-bracteatis

juxta totam ramorum longitudinem dispositis. ♀ — Endl. in Enumerat. plant. Hügel. pag. 11.

In arenosis inter frutices circa oppidulum Perth, 17. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1671.

2. **Macarthuria foliosa** Preiss. msc. ramis elongatis simplicibus, foliis infimis lanceolatis superioribus squamiformibus, floribus ad basin ramorum vel in ramis brevissimis radicalibus cymosis confertis. ♀.

In arenosis sylvae ditionis Perth, 18. Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 1672.

GUICHENOTIA Gay. Endl. gen. n. 5323. Meisn. gen. 33. (26.)

1. **Guichenotia ledifolia** Gay.

In colliculis arenosis iasulae Rotenest, Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1670.

THOMASIA Gay. Endl. gen. n. 5324. Meisn. gen. 33. (26.)

1. **Thomasia macrocalyx** Steud. caule ramoso stellato-hispido; foliis petiolatis ovato-oblongis integris, margine subundulatis subreflexis, pilis simplicibus stellatisque utrinque obsitis; stipulis magnis foliaceis oblique ovatis; racemis oppositifoliis longissimis pedicellis basi (præter bracteolas hypocalyceinas reflexas) bracteola ovata caduca instructis; calycibus (lilacinis) demum tumidis magnis utrinque pilosis; staminibus 5, sterilibus petalisque nullis; capsula profunde trisulcata nitida puncticulato-venosa glabra, loculis dispersis, seminibus puncticulatis. ♀.

In arenosis sylvae ad fluvium Preston ditionis Wellington. Herb. Preiss. No. 1657.

Tota planta pilis stellatis vel simplicibus hispida: *petioli* 3-5 lineas longi, saepe revoluti; *folia* magnitudine varia $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pollicaria, $1\frac{1}{2}$ - 4 lineas lata; *stipulae* magnae, sessiles, folia æmulantia, altero latere latiores, basi subcordatae; *pedunculi* elongati folio multoties longiores, basi nudi, apice subsecundo floriferi; *flores* 5-8 in pedicellis 3-4 lineas longis; ad basin pedicellorum bracteola ovata vel ovato-oblonga saepe caduca; *bractee* calycinae 3, patentes, calycem fere æquant, lineares; *calyx* petaloides, amplus, violaceus, sub anthesi patens, demum subclausus, tumidus, membranaceus, fulvus.

2. **Thomasia montana** Steud. caule ramosissimo; ramis stellato-hispidis demum glabrescentibus; foliis petiolatis (petiolo saepe reflexo) utrinque sparsim stellato-hispidis ovatis undulatis margine reflexis; stipulis ovatis oblongis cordatis obliquis foliaceis parvulis; racemis oppositifoliis folia multo superantibus 3-5-floris; calycibus utrinque stellato et simpli-

* *Ledonaea lobulata*, fructu Mueller

fruticosa, recta, ramosissima, obo-
 ramis heretico-sculis, foliis approximatis
 lato linearibus obtusis, usque in basi
 cuneatis margine utroque lobu-
 los purpureos breviter ovatis in-
 quartibus vel integerrimis ^{in piceis hinc inde}
 ... , capsulis lato tripteris ^{in piceis hinc inde}
 hinc vel solitariis.

In collibus rupestribus virgultosis mon-
 tium Thunders range, prope Cana-
 ka & Eiders - range.

Fruticosa pluripedalis amplius; ramis
 oppositis oppositis - tuberculati acule-
 n. egriantes. Folia 1" v. paulo ultra longe
 apicem versus 1 1/2 2" et lobulis utrinque
 1-4 parabilibus 1/2-1" longis in ^{terminis}
 foliolorum representibus instructa, trans-
 tum igitur superiorum foliis pinnatis
 praedictarum ad simplicifolias jam
 sedivelli & periculis brevi vel ^{fructu}
 & axi 3-5" longi. Capsulae a viridi fere
 plus minore purpureascentes, a ^{fructu}
 ambitu coequis ^{in piceis hinc inde} ovatis, alis ^{fructu}
~~2 pla longioribus & aequae latas utaque~~
~~tota longitudine circutibus eque~~
~~aequilatis longitudine latitudine aequa-~~
~~libus.~~

Anth:

Fructu per
 velvaceum

* *Fitzroya*, n.g. ~~Fructu velvaceum~~
 efformant alabastro, nondum definitum
 st. supralis fructu ^{Fructu velvaceum}

In montibus humilibus arvis prope
 Canaka glabra ^{raspuncta}
 rubra 4 5' sine simpliciter cristata. Folia linearis, ^{in piceis hinc inde}
 rubra ^{in piceis hinc inde} 4-5" longa praesumpt 3 lobis, lobis
 acutis fere 2" longis, superiora folia simpliciter ^{in piceis hinc inde}
 axillares 1-2 flori 1 1/2" longi, praesumptum praesumptum
 5' pro fidum, laciniis subulatis calyce (ovariis
 ut auro) ad nudum 5' pro pluriore breviter
 bus. Calycis laciniis subulatae. Petala rari-
 sonantia

Anth: varis fine

Lavura jam differt rorunctio
 muliari.

citer pubescentibus; petalis 5 squamaeformibus; staminibus sterilibus nullis; ovario glabro. 3.

In lapidosis cacuminis montis Bakewel, ditionis York. 5. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1661.

Caulis ramosissimus pilis facile secedentibus hispidus; *petioli* 3-4 lineas longi, erecti vel arcuati vel deflexi; *folia* (adulta) 4-5 lineas lata, ovata, obtusissima; *stipulae* petiolo breviores, sessiles; *racemi* folio 3-4-plo longiores, 3-5-flori; *pedicelli* 3 lineas longi, basi bracteola valde caduca, ovato-oblonga; *bracteae* calycinae lineares.

3. **Thomasia rupestris** Steud. caule ramoso subherbaceo, ramis stellato-hispidis; foliis brevi-petiolatis (quandoque petiolis reflexis) utrinque stellato-hispidis oblongis obtusis margine subundulatis subreflexis; stipulis oblique ovatis petiolos superantibus foliaceis; racemis oppositifoliis folia superantibus apice 3-5 floris; calycibus utrinque stellato-pubescentibus; petalis staminibusque sterilibus nullis; ovario verrucosulo (purpureo, flores parvi, fructus . . .) 4. 3.

In rupestribus montis Elphinstone, ditionis Plantagenet, 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1648.

Caulis ramique debiles; *petioli* 1-1½ lineas longi, plerumque erecti, rarius deflexi; *folia* parva, vix semipollicaria, ovato-oblonga, obtusa; *stipulae* oblique ovatae, sessiles vel brevissime petiolulatae folii petiolum superantes, quandoque magnitudine auctae et ob folium delapsum vera folia sessilia mentientes; *pedunculi* filiformes, folio duplo longiores, apice racemosi, pauci (3-5) flori; *flores* parvi.

4. **Thomasia cynopotamica** Steud. fruticulosa; ramis herbaceis pilis stellatis mox evanidis hispidis; foliis (exceptis novellis stellato-hispidis) glabratis lineari-vel obovato-oblongis integris vix una alterave undula notatis; stipulis foliaceis 2-3-fidis 3-nerviis; racemis terminalibus 2-4-floris; bracteis hypocalycinis oblongis coloratis; calycis lobis medio demum subinduratis margine membranaceis; petalis staminibusque sterilibus nullis; stylo filiformi basi piloso: capsula glanduloso-pubescente. 4. 3.

In limoso-arenosis inter frutices planitie ad fluvium Cygnorum, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1667.

Caulis basi fruticosus, *rami* erecti, subsimplices, pedales et ultra; ob glabritiem partium adultorum planta a reliquis hujus generis speciebus quasi aliena, apice vero et in partibus floralibus stellato-pubescentibus convenit; *folia* internodiis folia superantibus remota, vix pollicaria, oblongo-ovata, obtusa; *stipulae* petiolo longiores, foliaceae, inaequales uno latere auricula vel lobulo simplici auctae.

5. **Thomasia lucida** Steud. fruticulosa; ramis foliisque novellis stellato-pubescentibus, foliis mox glabratis pedicellatis oblongis vel obovatis vix undulatis lucidis; bracteis foliaceis ovatis integris vel subbilobis; racemis terminalibus paucifloris; calycibus membranaceis; capsula puncticulato-pubescente. 4. 3.

In arenosis ditionis York. 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1645.

6. **Thomasia rulingioides** Steud. caule ramosissimo stellato-hispido; foliis subsessilibus lineari-oblongis subsinuato-undulatis utrinque stellato-hispidis; stipulis (relatione foliorum) magnis basi subbilobis auriculatis; racemis oppositifoliis 3-5-floris; calycibus dense stellato-hispidis; petalis squamaeformibus; filamentis sterilibus nullis; capsula sub-5-loculari glabra. 3.

In solo ferrugineo limoso vallis prope Limekilen, ditionis Perth, 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1663.

Ambigit inter Thomasiam, cui adscribenda ob petala non in ligulam producta, et Rulingiam, cui similis ob capsulam divisione duorum loculorum sub-5-locularem.

Caulis fruticulosus, basi glabrescens, sursum uti tota planta stellato-hispidus; *rami* teretes, petioli brevissimi ad summum lineam longi; *folia* parva, 5-8 lineas longa, vix 2 lata, plus minus conspicue sinuato-undulata, obtusa; *stipulae* foliaceae, longitudine folii dimidium aequantes eoque basi cum auricula fere latiores, sessiles, vix cordatae; *racemi* folio 3plo longiores.

7. **Thomasia cognata** Steud. caule ramosissimo stellato-hispido; foliis brevi-petiolatis oblongis subsinuato-undulatis, margine subreflexis utrinque stellato-hispidis; stipulis foliaceis oblique ovatis basi auriculatis; racemis oppositifoliis 3-5-floris folia multo superantibus; calycibus stellato-hispidis; filamentis sterilibus petalisque nullis; capsula dense villosa. 3.

In arenoso-conchiliosis humidis vallis prope lacum insulae Rotenest, 19. Aug. 1839: et alibi in N. Holl. Herb. Preiss. No. 1660 et 1666.

Adeo similis praecedenti, ut tantum fructificationis partibus dignoscenda.

Caulis fruticulosus, ramosissimus, basi demum glabrescens, sursum uti tota planta stellato-hispidus; *petioli* breves 1-1½ lineas longi, patentes vel raro reflexi; *folia* 4-6 lineas longa, 1-2 lata, oblonga, obtusa, margine subundulata, subreflexa; *stipulae* foliaceae, sessiles, vix basi cordatae sed lato-auriculatae; *racemi* folio 3-4-plo longiores, apice floriferi. Variat foliis minoribus, calycibus minus hispidis. Herb. Preiss. No. 1666.

8. **Thomasia angustifolia** Steud. fruticulosa ramis stellato-pubescentibus; foliis breviter petiolatis sublineari-lanceolatis subrepando-crispulis; stipulis sessilibus oblongis quandoque auriculatis; racemis oppositifoliis folio multo longioribus 3-5-floris; pedicellis (praeter bracteam hypocalycinam) basi bractea lineari instructis; filamentis sterilibus petalisque nullis; ovario piloso, stylo glabro. 3.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1634.

9. **Thomasia subhastata** Steud. caule diffuso ramoso demum glabrescente; ramis tenuibus piloso stellato asperis; foliis lanceolatis basi subcordato-hastatis utrinque stellato-hispidis; stipulis oblique-cordato-oblongis foliaceis petiolo subaequantibus; pedunculis hispidis apice subtrifloris foliorum longitudine; staminibus 5; petalis nullis; stylo basi incrassato germineque tomentoso. (An *T. pauciflora* Lindl. Swan-Riv. Bot. n. 81.?)

In Nov. Holl. aust. occ. Herb. Preiss. No. 1633, 1640 et 1647.

Ramuli breves, tennes; *petioli* 2-3 lineas longi; *folia* lanceolata, remota, solitaria, 6-8 raro 10 lineas longa, apice obtusiuscula, basi plus minus profunde cordata; *stipulae* obliquae petiolo breviores vel eum aequantes; *pedunculi* folii longitudine, apice subtriflori; *calyces* pallide violacei in nervo medio fulvo praesertim stellato-hispidi. Lindl. var. *angustifolia*? Anne *Thomasiae angustifoliae*?

10. **Thomasia pumila** Steud. fruticulosa pumila (vix 4-6 uncialis) superne pubescens (pilis stellatis raris, pluribus simplicibus); foliis confertis suboppositis vel ternis linearibus reflexis supra puncticulato-scabridis subtus tomentosulis; stipulis foliiformibus; racemis paucifloris; filamentis sterilibus petalisque nullis; stylo basi ovarioque piloso. 4. 5.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1643.

11. **Thomasia aemula** Steud. foliis cordatis oblongis margine reflexis supra glabris glauco-viridibus subtus stellato-tomentosis; stipulis ovatis (saepe mox caducis); racemo oppositifolio folia suprema superante (ut terminalis videatur) apice (3-) florifero; calycibus basi dense tomentosis laciniis pilosis intus glabris, ovatis acuminatis; staminibus elongatis apice (albo-rostrato-) elongatis basi subhastatis; stylo glabro basi in ovarium pilosum abeunte; floribus magnis (rubellis $\frac{1}{2}$ pollicem in diametro.) 4. 5.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1641.

12. **Thomasia lasiopetaloides** Steud. caule subherbaceo simplici vix stellato-piloso; foliis cordatis oblongis infra medium vix in lobum obscurum contractis, supra scabriusculis, subtus pilis intricatis (vix stellatis) tomentosulis; stipulis (an in omnibus?) plane nullis; racemo oppositifolio folia longissime superante (ut terminalis videatur) apice paucis (3-) floro; staminibus apice (albo-rostrato-) elongatis basi subhastatis; calyce basi hirsuto laciniis pubescentibus ovatis obtusis breviter acutis. 4. 5.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1636.

13. **Thomasia discolor** Steud. ramis petiolisque dense pubescentibus; foliis grosse sinuato-dentatis vel obtuse 5-7-9-lobis supra ad nervos pubescentibus caeterum puncticulato-scabriusculis subglabris; subtus albo-tomentosis pilisque stellatis ferrugineis plus minus dense conspersis; stipulis foliaceis pedicellatis ovatis vel subrotundis cordatis obtusissimis; sepalis (magnis rubro-lilacinis) extus ferrugineo-stellatis, intus nervo medio valido rubro striato notatis; staminibus sterilibus petalisque nullis; ovario dense villosa; stylo glabro. 5.

In rupestribus sub umbrosis chasmatis clivuli William's-point, ditionis Plauta genet, 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1658.

Pulcherrimus fruticulus; *petioli* (in genere) elongati, in junioribus $\frac{1}{2}$ -in adultis 1-pollicares, validi; *folia* $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ pollices longa, basi pollicem et ultra lata, grosse sinuato-dentata vel lobata, inter lobos subintegra, apice

obtusiuscula; supra ad nervos pilis sine ordine (vix stellato-) intricatis pubescentia, caeterum ruguloso-vel puncticulato-scabra; subtus dense tomentosa, inter tomentum album pilis stellatis ferrugineis conspersa; stipulae breviter pedicellatae subcordatae late ovatae quandoque subrotundae, petioli multo breviores; *pedunculi* petiolo vix longiores, paniculato-racemosi.

14. **Thomasia viridis** Steud. ramosissima; ramis adultis glabris novellis stellato-pubescentibus; foliis petiolatis ovatis lobato-angulatis viridibus utrinque pilis stellatis sparsim obsitis caeterum glabris subtus pallidioribus reticulato-venosis; stipulis herbaceis minutis lanceolato-ovatis; racemis oppositifoliis subpaniculatis; bracteis hypochaeridis linearibus; calycibus stellato-pilosis; staminibus sterilibus petalisque nullis; ovariis pilosis. ♀

In limoso-arenosis subumbrosis ad fluvium Cygnorum 29. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1630, 1649 et 1653.

Frutex ramosissimus, *ramis* adultis validis lignosis, junioribus tenuioribus; *petioli* (in genere) longi, folium longitudine saepe aequantes; *folia* forma et magnitudine varia, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, plerumque inaequaliter sinuata vel 7-5 vel 3-loba, ambitu ovata, lobis saepe vix distinctis; *stipulae* minutae, vix lineares, saepe caducae; *pedunculi* petiolos superantes, paniculato-racemosi; *flores* parvi.

Quoad descriptionem *Thomasiae foliosae* Gay nimis affinis, sed folia vix sunt cordata nec stellato-pubescentia, pilis vero stellatis sparsim obsitis, caeterum glabra. Variat: ramis hirsutioribus, stipulis vix ullis, foliis fusco-viridibus.

15. **Thomasia stipulacea** Lindl. glabra, sed pilis ferrugineis stellatis hispidis; foliis cordatis subhastatis angulatis obtusis sinuatis, margine recurvis; stipulis magnis foliaceis petiolatis cordatis subtrilobis, latioribus quam longis; racemis secundis foliis longioribus; calyce basi hispido; staminibus 5 sterilibus subulatis; petalis nullis. Lindl. Swan-Riv. Bot. n. 79. ♀.

In Nov. Holl. occ. Herb. Preiss. No. 1635.

16. **Thomasia glabrata** Steud. caule ramoso glabro; ramis novellis stellato-hispidis; foliis obtuse sinuato 5-7-lobis utrinque glaucescentibus praeter pilos sparsos stellatos glabris; stipulis obovatis obtusis vel subtrilobis foliiformibus; sepalis glabris basi tantum hispidulis; filamentis sterilibus petalisque nullis; capsula dense hispidula. ♀.

In arenosis ad fluvium Cygnorum 21. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1639.

17. **Thomasia hypoleuca** Steud. caule ramosissimo, ramis stellato-asperis demum glabrescentibus; foliis sinuato 3-5-lobis utrinque pilis stellatis sparsim conspersis supra caeterum glabris glaucescentibus, subtus dense albo-tomentosis; stipulis polymorphis ovatis, subrotundis, cordatis integris vel sublobatis subsessilibus; floribus in racemis brevibus paucifloris praesertim versus apices ramorum; staminibus sterilibus petalisque nullis; ovario villosa. ♀.

In calcareis ad tergum montis Baldhead, ditionis Plantagenet, 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1646.

Laurenoria olivacea Fur. Moll.
Coffee-bay. With Port Gawler, Salt
creek, Guichen bay.

Aspidium annott f. *L. spirata*
Hbark; regius definitio ehen
in repertorio Walpurgiana de-
picturamus. A *L. glomerata* et
pneumata jam distinctur
vel foliorum vel stipulorum
forma.

Folia ab involis (sicut) aequi ac
Spinacia requiruntur, unde nomen
Spinale creari.

Asiopetalum (Subg. *Artemophilum*) *roseosiflorum*, n. sp.
foliis cordato-vel lanceolato-ovatis supra densum
glabris ^{subtus} pubescentibus - tomentosis, floribus
~~glomeratis~~ ^{capitatis} capitatis, cespitibus pedunculatis
bracteatis radiatis, ^{subtus} ^{pubescentibus} superatis.

[illegible]

receptis angustata pinnula apice alba & hinc et ibi
 culo poro aperta supra basin affixa. Stylus, pili
 mis glaberrime pinnatifidus. Capsula 2-3
 mialis magis tunc triduo sub abactis exus
 tomento sa plus minusve glaberrima. Actus alio pilosus
 valis oblonga lineam met recta vnde angulata
 infundata magnitudine pili brevis pinnis alio
 sparsis pili, trochista pili brevis pinnis alio
 pili regulam brevem pinnis vnde latiuscula
 et tunc, ceteris latiuscula pili brevis pinnis alio
 ad angustatam pinnam pinnis vnde latiuscula

Lasiopetalum Guzmanii Steud.
L. Chynthoffmannii Steud.
Lasiopetalum Guzmanii Steud.

L. parvillora primum
 forte a Steudt. Jam 1848.
 Ad rupes prope Swan-port
 prostratum. Ad litor. austr.
 orientalia Terrarum, ab.
 VI. T. 597. Nov. 49. A *L. Guzmanii*
 differe videtur foliis angustis oblongis

St. 3. L. 1848. v. 4. p. XXVIII

* *L. griseo-purpureum* Steud.

1. *L. Lindenbergii* Steud. & Dougl.
 ad fluminis Murrays ripam
 arinosas hinc inde, ab. VI. 24.

caule ramoso tomentoso, foliis lani-
 linariis pinnatis basi et apice
 obtusis supra pinnis glaberrimis
 et his pubes tomentosis vnde
 pinnis pinnis pinnis pinnis pinnis
 foliis pinnis pinnis pinnis pinnis

L. purpureum Steud. & Dougl.
 in caulem albidus griseus
 aut purpureus.

Frutic. paucipedalis inter fruticosa
 murray scrub usque monum.
 Barkeri Oct. 1848. Steud.
 prope Swan-port prope Swan-port
 igne, vnde. Floris paulo odorati
 petala intus alba basi intus
 rubra rubra

Caulis valde lignosus *ramique* fusco-purpurascens, glabrati, juniores vix stellato-hispidi; *petioli* 1-2-lineares; *folia* magnitudine varia, 4-8 lineas longa, 3-loba vel ob lobum medium iterum lobatum 5-loba, supra praeter pilos stellatos sparsos glaberrima, glaucescentia, infra albo-tomentosa, praesertim ad nervos pilis stellatis fulvescentibus sparsis obsita. Vix videtur *T. quercifolia* Gay, cui valde affinis, an var.?

18. **Thomasia macrocarpa** Hügel. foliis ovatis cordatis angulato-dentatis supra hirtis subtus hirsuto-tomentosis; petalis nullis; staminibus decem, alternis sterilibus; ovarii loculis biovulatis. Endl. Nov. stirp. Decades n. 40. 5.

In saxosa ad jugum montis Darling's-range prope cataractam ad caput fluvii Cygnorum, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1654.

19. **Thomasia glutinosa** Lindl. foliis cordatis hastato-trilobis, supra pilosis subtus stellato-tomentosis; stipulis nullis; racemis subterminalibus erectis multifloris, pilorum fasciculis sparse stellatis glutinosis; antheris quinque rostratis; petalis nullis; stylo tenui filiformi glabro basi piloso Lindl. Swan-Riv. Bot. n. 82. 5.

In limoso-calculosis inter frutices densos ad radices montium Darling's-range, 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1668.

LASIOPETALUM Smith. Endl. gen. n. 5325 Meisn. gen. 32. (26.)

1. **Lasiopetalum indutum** Steud. caule ramuloso ramisque tomento piloso-intricato demum secedente indutis; foliis linearibus (1-2 pollicaribus) sublanceolatis obtusiusculis supra glabratiss (novellis pilosis), subtus intricato-piloso-tomentosis, margine subreflexis; cymis oppositifoliis calycibusque pilis ramosis (vix stellatis) intricatis tomentosis, intus basi glabris striatis; capsula pilis stellatis asperula. 5.

In infragosis fruticosis collium, ditionis Kent, 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1655.

Rami sub tomento rufescentes; *petioli* 2-3 lineas longi, erecti, patentes vel reflexi; *folia* linearia, 1-2 pollices longa, subcoriacea, 2 lineas lata, apice basique obtusiuscula, margine plus minus perspicue reflexa, supra glabrata, sub lente tenuissime reticulata et punctulis minutissimis scabriuscula, subtus pilis albidis intricatis tomentosa; *pedunculi* axillares vel oppositifolii, folia aequantes, apice racemoso-paniculati, pauciflori; *calyces* densissime piloso-tomentosi.

2. **Lasiopetalum cordifolium** Endl. foliis cordatis, petalis nullis, stylo barbato. Endl. in Hügel. Enumerat. n. 33. 5.

In rupestribus ad tergum montis Melville, ditionis Plantagenet, 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1659.

CORETHROSTYLIS Endl. Endl. gen. n. 5326.

1. **Corethrostylis membranacea** Steud. foliis cordatis membranaceis subdiaphanis ciliatis utrinque pilis stellatis conspersis, apice obtusis. ♀.

In arenosis colliculosis sylvae ad portum Lechenault, ditionis Wellington, 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1656.

2. **Corethrostylis coriacea** Steud. foliis cordatis subcoriaceis opacis utrinque pilis stellatis in adultioribus supra evanidis conspersis, apice acutiusculis. ♀.

C. bracteata Endl. (Nov. stirp. decad. n. 1.), in utraque specie sibi simillima bractee ejusdem formae.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1637.

KERAUDRENIA Gay. Endl. gen. n. 5327. Meisn. gen. pag. 33. (26.)

1. **Kerandrenia (?) integrifolia** Steud. foliis ovatis integerrimis, supra glabriusculis, subtus albo-tomentosis, pilis stellatis minutis; stipulis nullis nisi quandoque foliolo minore axillari; stylis apice liberis filamentis connatis ovarium tegentibus. ♀.

In humoso arenosis sylvae ad fluvium Cygnorum, 14. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1651.

Fruticulus ramosus; *rami* adulti lignosi denudati, juniores stellato-pubescentes; petioli breves lineares, raro erecto-patentes plerumque deflexi; *folia* parva, 2-4 ad summum 6 lineas longa, 2 lata, ovata, obtusa, integerrima, subundulata, supra ad marginem subinflexum pilis adpressis substellatis pubescentia, caeterum glabra, subtus pilis intricatis cinereo-albo-tomentosa; *flores* subcorymbosi; *pedicelli* ad basin bracteola lineari caduca muniti; *calyces* ebracteati, ante florentiam densissime pilosi, petaloidei, coerulei, venosi; *corolla* nulla; *stamina* 5 libera; *filamenta* basi dilatata; *stylus* unicus, filiformis, vix 3 in unum coaliti; hinc et ob fructus defectum genus dubium, forsitan novum.

FLEISCHERIA Steud.

Inflorescentia axillaris: floribus solitariis. *Bractee* hypocalycinae nullae. *Calyx* 5-partitus, laciniis persistentibus tenuissime venosis. *Corolla* 5-petala, petala ovata basi unguiculata. *Stamina* 5 libera sterilia nulla. *Styli* 5, filiformes, apice capitati. *Capsula* depressa 5-locularis: valvis apice in conum conniventibus, dorso ruguloso-tuberculosa, loculis monospermis. *Semina* basi strophiliolo subintegro cincta.

Lappetatum Behnii Fendner

foliis coriaceis angustis
 oblongis obtusis, ~~marginibus~~
~~venisque recurvis~~ ^{demum} supra glaberrimis
~~subtus ovatis~~ ^{marginibus} serratis
~~causculis velutinis~~
~~mutatis~~, cyma pauciflora
 folia appropinquata subaequilonga
 bracteata ^{capitata} breviter linearis, bractea-
 la (hypophyllina) tripartita
 calyce duplo ^{breviore} longiore
 is unilobatus lobis linearibus
 calycis lobis ^{stellatis} reflexis
 lacinis ^{auriculatis} breviter angustatis
 apertis, intus glaberrimis
~~furcis~~ ^{antheris utrinque}
~~horum~~ ^{deturcatis}
~~nigrescentibus~~ ^{genuinis}
~~phareis albis~~ ^{mutatis}
~~rioribus!~~

Coniophytis Behniana
 Fendner in littoris. In pilularis
 Pico prest. trazo. Salts-
 creek, Nov. 48 ^{Nov. 48} ^{Nov. 48} inventum.
 Thalamia elliptica hb Behn
 squarrosa stultia legit in
 eucalyptorum fratribus
 "Murray - frut." vesp. officina
 plurimis St. Wirth,

1. *Fleischeria pubens* Steud. ♀.

In umbrosis saxosis ad montem Mathilde, ditionis York, 11. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1662.

Fruticulus 2-3-pedalis; *rami* erecti, subvirgati, uti tota planta pube stellata incani; *petioli* 3-4 lineas longi, erecto-patentes vel deflexi; *folia* pollicem longa, 3 lineas lata, obtusa, oblongo-linearia, omnino integra vel sub-undulato-crenulata, pube stellata densa supra cinerea subtus pallide flavescens tecta; *flores* in ramulis axillares in pedunculis 4-5 lineas longis, flore majoribus; *calycis* laciniae ovatae, extus dense stellato-pubescentes, intus glabriusculae, venosae; *petala* ovata, glabra, calyce 3-4-plo breviora.

RULINGIA R.Br. Endl. gen. n. 5328.

Meisn. gen. pag. 32. (26.)

1. *Rulingia corylifolia* Grah. foliis ovato-deltaeideis, subcordatis basi lobatis, supra hispidis subtus hirsuto-tomentosis; stipulis ovato-acuminatis; corymbis oppositifoliis; filamentis antheriferis simplicibus, sterilibus ovato-lanceolatis alternantibus. Grah. in Bot. Mag. tab. 3182. ♀.

In rupestribus summitatis clivuli ad Princess Royal Harbour, 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1650.

COMMERSONIA Forst. Endl. gen. n. 5329.

Meisn. gen. pag. 23. (32.)

1. *Commersonia Preissii* Steud. caule fruticuloso; foliis ovatis breviter petiolatis dentatis subsinuatis supra hirsutis subtus pilis simplicibus intermixtis stellatis tomentosis; cymis axillaribus terminalibusque; stylis 5 distinctis filiformibus; filamentis sterilibus petala aequantibus. ♀.

In turfoso-arenosis umbrosis ad marginem paludis inter montes Elphinstone et Melville, ditionis Plantagenet, 21. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1652.

Caulis frutescens; *rami* subsimplices, rufescentes pilis stellatis obsiti; *petioli* validi erecti, 2-3 lineas longi, dense stellato-pubescentes; *folia* magnitudine varia, 1-1½ pollicaria, grosse dentata, dentibus obtusis hinc inde sinuata, supra obscure viridia, pilis simplicibus vel substellatis hirsuta, subtus pallida pilis densioribus tecta; *ramuli* axillares, folii circiter longitudine, apice foliati et in axillis vel apice cymas gerentes; *calyces* dense stellato-hirsuti.

2. *Commersonia cygnorum* Steud. foliis inciso-dentatis ovatis supra sparsim hirsutis subtus piloso-tomentosis; capsulis ovato-rotundis rigide setoso-echinatis, setis pubescentibus. ♀? 2?

Ad caput fluvii Cygnorum. Herb. Preiss. No. 1642.

3. **Commersonia cinerea** Steud. fruticosa, ramis glabratiss; foliis ovatis serrulatis supra viridi-subtus cinereo-tomentosis; capsulis rigide setoso - echinatis, setis apice stellato-pilosis. 3.

In planitie promontorii Cape Riche, 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1661

Frutex humilis, ramosus; *rami* fusco-rufescentes, rariter foliati; *ramuli* abbreviati, stellato-pilosi, foliati: *petioli* vix lineares, erecti vel reflexi; *folia* variae magnitudinis, 2-10 lineas longa, ovata vel oblongo-ovata, supra pallide viridia, subtus cinereo albida velutino-tomentosa: *capsulae* majores - cerasum parvam aequantes - densissime setis validis rigidis tectae, apice fasciculo pilorum stellatorum terminatis.

MALVACEAE Juss.

(Auctore Fr. A. Guil. MIQUEL.)

MALVA Linn. (ex emend. Endl.) Endl. gen.
n. 5271.

Sectio. MALVASTRUM DC. §. 3. Prodr. I. pag. 431.

1. **Malva Preissiana** Miq. tota pilis stellatis incano-tomentosa praeter foliorum paginam superiorem stellato-puberulam, his longe petiolatis subsemiorbicularibus obsolete trilobis vel integris irregulariter crenatis, floribus axillaribus glomeratis vel supra ramulos subspicatis, calyce exteriore diphylo, petalis basi intus hirsutis.

Crescit in insula Penguin-Island, 14. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1893.

„Frutex 6-8-pedalis“. *Ramuli* teretes, subflexuosi, *petioli* subsemiores, 3-7 cent. longi, *folia* subtus, *pedunculi* calycesque pilis stellatis incano-tomentosa. *Folia* subcoriacea, marginibus irregulariter crenatis rigida, sparse stellato-puberula, semiorbicularia, basi subcordata vel truncata, integra vel angulato-subtrilobulata, quinquenervia nervis subtus prominentibus, $3\frac{1}{2}$ -6 cent. lata, parumper breviora. *Stipulae* lanceolatae membranaceae. „Flores albi“ axillares, fasciculati vel supra ramos axillares foliis breviores subspicatim conferti (foliis scil. diminutis vel abortivis) ipsamque ramum terminantes, *pedunculis* sursum parumper incrassatis 3-8 mm. longae. *Calycis exterioris* phylla 2 obovato-rotundata calycis basi adnata ipsaque inferne cohaerentia, 4-5 mm. longa. *Calyx interior* campanulatus 7-8 mm. longus, phyllis lato-ellipticis, acutis. *Corollae* $1\frac{1}{2}$ cent. circiter longae, semiexpansae, petala obovata apice emarginata, basi valde contracta, intus hirsuta. *Tubus stamineus* glaber $\frac{1}{2}$ brevior. *Fructus* depresso-placentiformis, calyce clauso inflato inclusus, *carpellis* 10, dorso uninerviis, marginibus undulato-rugulosis, apice subbicornibus, *semine* reniformi nigricante.

HIBISCUS Linn. Endl. gen. n. 5277.

- Hibiscus hakeaeifolius* Giordano.
1. **Hibiscus (Bombicella) hakeaeifolius** Giordano. caule fruticoso; foliis anguste linearibus teretibus integris trifidisque, pedunculis clavatis angulatis, involuero gamophyllo sexdentato, calyce quinquepartito, corolla patente, stigmatibus clavato indiviso, capsula 5-loculari 5-valvi polysperma, seminibus lanatis. Giordano, Memoria sopra di una nuova specie d'Ibisco. Napoli 1833.

Crescit in solo humoso ad caput fluvii Cygnorum, 14. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 1342.

„Frutex 4-pedalis“.

Forma dentibus calycis externi aliquando 5, matura deflorata.

Crescit in glareosis sterilibus sylvae prope planitiem Quangen, distr. Victoria. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1838.

„Frutex 8-10-pedalis. Flores violaceo-coerulei“, mihi incogniti et ulterius cum iis praecedentis comparandi.

2. **Hibiscus (Bombicella) coronopifolius** Miq. caule fruticoso, foliis (planis) linearibus integerrimis vel plerumque sursum dilatatis tridentatis et quinquefido-dentatis, involutis glabris, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus clavatis angulato-sulcatis, calycis exterioris dentibus 6-7, interiore quinquepartito, capsula elliptica puberula quinqueloculari quinquevalvi.

Crescit in solo sublimoso ad fluvium Avon haud longe a praedio rustico D. Burges, distr. York, 13. Mart. 1840, capsulis maturis Herb. Preiss. No. 1337.

Hib. hakeaeifolius habitu et capsulis simillimus, sed foliis planis nec teretibus, plerisque grosse dentatis, (in sicco) involutis distinctissimis. „Frutex 2½ pedalis“. Rami ramulique teretes, hi virides cicatricibus foliorum fuscis maculati, illi fuscescentes. Folia dilute viridia, glabra, subcoriacea, majora inferne angustissime linearia, sursum dilatata et varie dentato-incisa, minora omnino linearia et involuto-teretia, 2½-5½ cent. longa, illa 4-8 mm. versus apicem lata. Pedunculus prope basin articulatus, 3 cent. circiter longus. Calyx exterior in nostris 6-7-irregulariter brevi-dentatus. Capsula matura (delapsis seminibus) fuscula, minute stellato-puberula, subelliptica 1½ cent. longa. Flores haud visi.

- Hibiscus azanza?*
3. **Hibiscus (Azanza?) Hügelii** Endl. caule fruticoso, ramis floccoso-puberulis, foliis glabriusculis ovatis tri-quinquelobis, lobis cuneatis inciso-pinnatifidis, pedunculis axillaribus inferioribus teretibus, calyce exteriori sinuato-12-dentato, interiore quinquefido, corolla semiexpansa extus pubescente, stigmatibus clavato indiviso, capsula lanata 5-loculari polysperma. — Endl. Enum. plant. Hügel. pag. 10.

Crescit in arenosis inter frutices densos ad fluvium Cygnorum haud longe ab urbiculo Freemantle, 5. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1341.

„Frutex 6-10-pedalis. Flores incarnati“. — Differt parumper a phrasi Endlicheriana: ramis haud tomentosis sed floccoso-puberulis cito glabratibus,

calyce exteriori 12-dentato. *Petala* lutea purpureo-unguiculata ab *Endlichero* dicta, in sicco ita vides, sed viva ex *Preisio* incarnata sunt.

4. **Hibiscus (Bombicella?) Meisneri**, *Miq.* caule fruticoso, ramis petiolis pedunculis calycibusque hirtomentosis, foliis petalisque extus hirtello-pubescentibus, illis tri-vel subquinquepartitis, lobis oblongis sinuato-pinnatifidis dentatis, floribus axillaribus solitariis longe pedunculatis, calycis externi phyllis 10 angustissime linearibus, interno quinquelido, tubo stamineo corolla ampla quater brevior, capsula quinqueloculari quinquevalvi, loculis polyspermis.

Crescit in solo coenoso exsiccatum ad marginem lacus Mathilde, distr. Hay. 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1336.

„Frutex 8-pedalis, gracilis, floribus lilacinis“. *Foliorum* forma praecedenti similis, sed calycis exterioris indole longe recedens. *Ramuli* angulosi, subtetragoni, pilis stellatis sublutescentibus hirti. *Folia* (superiora) petiolis hirtis 3-4 cent. longis sustentata, submembranacea, utrinque pilis paucis stellatis et subsimplicibus hirtella, circumscriptione cordato-ovata, 4-6 cent. longa, tri-vel quinquepartita (lobis infimis tunc reliquis multo minoribus) segmentis pinnatifido-incisis, oblongis, versus basin contractis, irregulariter crenato-dentatis. *Stipulae* angustissime lineares, hirtae, $1\frac{1}{2}$ cent. longae. *Pedunculi* axillares, solitarii, 10 cent. circiter longi, dense lutescenti-hirti, versus apicem folio minuto petiolato trilobo ac stipulato vel abortivo bractaeformi instructi, uniflori. *Calycis exterioris* phylla 10, angustissima, linearis, hirta, subpatula 1 cent. circiter longa. *Calycis interni* quinquepartiti 2 cent. superantis lobis lanceolato-acuminatis, nervosis, dense hirtis. *Corolla* semiexpansa, 5 cent. longa, extus pilis stellatis hirtella, in sicco violacea. *Tubus stamineus* corolla quater circiter brevior, *stigmatibus* quinque. *Capsulae* adsunt effloetae (de quibus autem non constat an huc pertineant) hirtellae, ellipticae, quinqueloculares, quinquevalves.

5. **Hibiscus (Bombicella?) Pinonianus** *Gaudich.* fruticosus foliis subrotundo-ovatis 3-5-lobis crenato-serratis utrinque ramulisque tomentosis flavido-canescens; floribus terminalibus et axillaribus solitariis; foliolis calyculi lineari-subulatis; stylo 1; stigmatibus clavato-capitato, seminibus hirsutissimis. — *Gaudichaud* lt. *Frey. Bot.* pag. 476 tab. 100.

Crescit in solo sublimoso-arenoso promontorii Cape-Riche. 22. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1340.

„Frutex tripedalis“ *Fragaria*

6. **Hibiscus (Bombicella?) grossulariaefolius** *Miq.* totus lutescenti-stellato-tomentosus, foliis brevibus petiolatis coriaceis subrugosis cordato-rotundatis, tri-vel subquinquelobis lobis obovatis obtusis incisis crenatis marginibus subundulatis, floribus axillaribus solitariis breviter pedunculatis, calycis exterioris octofidi dentibus lineari-subulatis, interni quinquefidi laciniis lanceolatis, styli tubum stamineum longe superantis stigmatibus capitato, an semigloboso?

Crescit in solo coenoso ad marginem lacus Mathilde distr. Hay. 9. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1339.

Malva borealis Walp. & C. C. C. C. C.

Malva diata Gerd. Müller. (1849)
(ser. I. Malvastrum, 83) ^{trilobata}
peltato-pinnatisectis, foliis longius
obliquis cordato, junioribus lobatis
v. reniformibus quinquelobis
crenatis-dentatis, floribus axillari-
bus paucis aggregatis solitariis
bracteis hypophyllis 2 linearibus
filiformibus.

Habitu *Malvae borealis* Walp. & C. C. C. C.
(etiam reperta florua) et eodem
modo ad cataplasmata emolli-
entia frequenter usa unde non
min coloniali Marsh-mallow
circa urbem Heliae a libigen
exiguam in rudibus et
locis cultis. M. 1848.

Aborigine radice admodum & una vocant
Hibiscus notabilis Gerd. Müller.

In interiori regione N. & austr. mod.
In ^{Claremont} ^{in. n. n.} ^{in. n. n.} ^{in. n. n.}
H. Vinoniano cum nomen affinis
sed altamen tam incommensurabile
quam flavescens distinctus.

Ex proximis videtur pulcherrimum
varietas ulmaris. Stola exserta
ropea magna. Int. 4-5' floribus parvis
volutum expectatum prope pedem M. K. Markkall.

Shrubletum Behrianum Gerd. Müller.

Barro *carle* *suffruticosa*, *fructu* *tomentosa*
foliis *cordatis* *repando* *venatis* *aru-*
minatis *tomentosis*, *floribus* *axillari-*
bus *solitariis* *vel* *paucis* *terminali-*
bus *approximatis*, *pedunculis* *pro-*
longioribus *longioribus* *vel* *breuioribus*,
capulis *carpellis* *absortitis* *capis*
nullis *cavities* *10* *pinguis* *semina*
paucis *inclaudens*

Stems *varis* *alta* *floris* *aurantiari* 15"
In *lacibus* *expiratis* *versus* *flav.*
Murray *ty.* *et* *Lo* *Dehr* *Apr.* 1849.
Infata *emarginata* *cum* *anthuris* *aurea*
In *lima* *expirata* *lacunarum* *ad* *Morm.*
aliogen *loris* *versum* *H. Murray*
orientalum *versus*. *visum* *in* *lacun.*
afficit

Frutex 4-6 pedalis, totus pilis stellatis lutescenti-tomentosis. *Ramuli* angulati, subtetragoni. *Petioles* $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ cent. longi, teretiusculi. *Laminae* supra sparse subtus dense luteo-hirtae, tri-vel subquinguenerves, nervis supra canaliculatis, subtus prominentibus, 2-2 $\frac{1}{2}$ cent. longae, cordato-rotundatae trilobae vel lobis lateralibus subbifidis quinquelobae, lobis incisicis crenatisque. *Stipulae* lingari-filiformes, hirtae, 8 mm. circiter longae. *Pedunculi* axillares solitarii, 2 cent. circiter longi, paullo supra medium bracteis linearibus instructi. *Calyx* exterior 8 mm. circiter longus, ultra medium in dentes lineares sinuato-partitus. *Interioris* 1 $\frac{1}{2}$ cent. longi lacinae lanceolatae-acuminatae. *Corolla* fere expansa, 3 $\frac{1}{2}$ cent. longa, in sicco violacea, pilis stellatis luteis extus sparse vestita.

Malvina *vidua*
SIDA Linn. Endl. gen. n. 5289.

MALVINDA §. *palmatilobae* DC. Prodr. I. pag. 465.

- Sida leiophloia** *Miq.* radice fusiformi, caule herbaceo erecto parce ramoso laevissimo glabro, foliis longius petiolatis, 5-6-lobatis, lobis oblongis incisicis vel dentato-crenulatis, utrinque pilis plerumque simplicibus sparse puberulis, floribus axillaribus binis ternis pluribusque ad ramulorum apices paniculatis, longe pedunculatis, calycis quinquefidi semiglobosi glabri lobis ovatis acutatis, carpellis 5-6 acuminato-rostratis.

Crescit in distr. Wellington. 5. Dec. 1839. *Herb. Preiss. No. 1896.*

Species procul dubio nova e speciminé paene aphylo et effoetis tantum fructibus instructo haud perfecte describenda. — E *radice* fusiformi albicante 12 cent. longa et 8 mm. apice crassa, *caules* duo metrum circiter alti exsurgunt, teretes, atrovirides, glabri laevissimi, remotis foliorum cicatricibus instructi, simplices, apice in *ramos floriferos* paniculatos partiti, *ramulis pedunculisque* angulosis subtetragonis. *Folia* (e fragmentis foliorum summorum) *petiolis* 3 cent. longis sustenta, rotundata, 5-6-loba, 1-2 cent. longa. *Flores* ex axillis foliorum bini, terni, quini, *pedunculis* variae longitudo 2-5 cent. longis. *Calycis* lobi trinerves cum 2 nervulis minoribus. *Carpella* subtriquetra, glabra, monosperma, rostellata.

- Sida (Malvinda) rupestris** *Miq.* radice tenui-fusiformi, caulibus pluribus prostratis herbaceis, foliis longe petiolatis cordato-rotundatis tri-vel quinquelobo-partitis, lobis obovatis oblongisve, subtridentato-incisicis, junioribus utrinque stellato-pubescentibus, adultis subglabris pilis simplicibus, floribus axillaribus solitariis, pedunculis petiolo brevioribus, calycis quinquefidi junioris hirtelli, maturi glabri semiglobosi lobis lato ovatis acutis trinerviis, carpellis 5-8, rostellatis.

Crescit in rupestribus insulae Mistakenisland. 12. Dec. 1840. *Herb. Preiss. No. 1897.*

Herba, an perennis? *Radix* perpendicularis, albicans, tenui-fusiformis, 10 cent. longa. *Caules* plures, an humifusi? glabri, teretes, ramosi, 10-20 cent. longi. *Partes juniores* stellato-hirtellae, *adultae* glabrae vel subglabrae, pilis simplicibus. *Petioles* 1 $\frac{1}{2}$ -4 cent. longi. *Laminae* membranaceae, 1 $\frac{1}{2}$

cent. longae et latae. *Pedunculi* $\frac{1}{2}$ -1 cent. longi, plerumque solitarii. *Calyces juniores* cylindracei, basi subglobosi, *adulti* effloeti semiglobosi.

3. **Sida (Malvinda) Hookeriana** Miq. herbacea erecta caule glabro subterete, foliis longe petiolatis cordato-tundatis, 5-7-pedatisectis, lobis oblongis incisus et serrate dentatis, junioribus substellato-puberulis, adultis subglabris floribus brevius pedunculatis axillaribus solitariis vel aggregatis supra ramulos axillares subracemose confertis, pedunculis puberulis, petalis albis, carpellis octo (immaturis subrostellatis).

Crescit in arenoso conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest, 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1894.

„Herba bipedalis erecta, floribus albis.“ *Caules* laeves glabri teretiusculi ramulos axillares florentes exserentes inque tales terminati. *Partes* juniores puberulae, adultae subglabratae. *Folia* longe petiolata, nascentia pilis stellatis subhirtella, adulta pilis simplicibus sparsis vel nullis. *Petioluli* 4 cent. longi; *laminae* membranaceae, 3-3½ cent. longae. *Stipulae* tenues membranaceae subscariosae, glabrae, lanceolatae, 5 mm. longae. *Pedunculi* $\frac{1}{2}$ -1 cent. longi. *Calyces* lobi ovato-acuminati, glabri; tubus sparse pilosus cito glabratus. *Calyx* 6 mm. longus; *petala* alba paullo longiora.

LAWRENCIA Hook. Hook. Icon. tab. 261 et 262. Endl. gen. Suppl. III. pag. 79.

1. **Lawrencia squamata** Nees ab Esenb. fruticosa, ramis nudis, ramulis floriferis fasciculum foliorum exhibentibus unifloris, foliis crassis lanceolato-linearibus squamatis

In planitie arenosa hieme aqua inundata ad fluvium Southern River, Perth Septembri 1841. Herb. Preiss. No. 1231.

„Frutex $1\frac{1}{2}$ pedalis floribus dioicis.“ *Caules* ramosi, distorti, rugosi, fusi. Ramulorum loco fasciculi foliorum 2-5. *Folia* 4-5 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, acuta, supra canaliculata, subtus obtuse carinata, squamis orbiculatis adpersis peltatis puncto medio obscuriori tanquam poro notatis micanibus dense vestita, elaeagnoidea. *Stipulae* parvae triangulares scariosae, fuscae persistentes. *Flos* in centro fasciculi solitarius, subsessilis, a folio summum ejus stipulis suffultus. *Calyx* $2\frac{1}{2}$ lin. longus, ovalis, quinqueangularis coriaceus, ore quinquefido clauso, squamatus sicut folia. *Corolla* longitudinalis calycis, tenera, rosea, infundibuliformis, ad medium usque quinquefida, laciniis obovato-cuneiformibus, obliquis. *Tubus* stamineus tubo corollae cohaerens, limbum aequans, in floribus δ paulo longior. *Filamenta* propria brevia $2\frac{1}{2}$ in flore δ in flore σ decem. *Antherae* unilocellatae, reniformes, rimae verticali dehiscences. In flore hermaphrodito styli 2-4 (5?), filamentis longiores, crassi, acuti, purpurei, introrsum stigmatosi. *Fructus* immaturus calyce corollaque marcescente vestitus, oblongus, trilocularis, loculis uniovulatis, nescio an in carpella secedens.

Obs. Differt a *Lawrencia glomerata* Hook. foliis integerrimis et floribus solitariis. (N. ab E.)

Laminaria conf. pag 234
crassum glomeratum Skule. Fr. prop. hort.
Caryophylleae. J. J.
crassum hemisphaerium L. (Cavillage)
Arenaria.

A. (Alpine) australis! Gent. M. (33)
foliis lanceolatis glabris, caulis
erectis, basi decumbentibus
glabris quadrangulis, pedunculis axil-
laribus folio brevioribus, foliis
seguentibus calycis lanceolatis, arum-
natis capsulae ovoideae longiori-
bus, floribus punctatis trigynis
apertis.

Hae species & sequens, plantae
erectae A. Raddianae. Siringe sunt af-
finis.
In graminosis montium Bryant-range,
non in rupibus muscosis.
Sept. 1848. In regionibus interioribus vixit
Rivali Bay. Oct. 1848.

A. (Alpine) australis! Gent. M. (33)
foliis lanceolatis acutis glabris, cau-
libus ascenduntibus basi decumben-
tibus glabris quadrangulis pedun-
culis axillaribus foliis multo brevi-
oribus foliis, seguentibus caly-
cis linearibus lanceolatis acutis cap-
sulae linearibus brevioribus, floribus
apertis, stylis 3, saepe 2 brevissimis.

In arenosis fruticetorum inter mon-
tem Barkeri & fl. Murray. Inven-
tae Octob. 1848. — In montibus alti-
ssimis tractus Barrow-range. Sept.
1848.

L. purpurea. Hb. N. 190.

Littoraria caryophylla J. J. M. (33)

caulibus diffusis, breviter velatis, foliis ses-
quialteris lanceolatis acutis, sine attenuatis, cor-
iaceis nitentibus margine ciliatis, junoni-
bus in axillis lacinulatis, pedunculis axillari-
bus foliis brevioribus, foliis longioribus, sepalis lance-
olatis minimis, ovulis 5, filamentis 5.

Petala alba corollae videntur breviora. Anthodae albae
fol. 12" et ultra longa, 2" et.

In pedem montis Murchisonia in regione arenosis
humidis siccis. Oct. 1848.

Inae observationes huius et aliquid sunt, prima, et typus
est, qui vegetationi nostrae impetitur, et aliae in hac familia rep-
unt, huiusmodi, et organorum, nuncius in hac familia evoluitus, immo
in hac familia evoluitus, immo

PHYTOLACCACEAE Endl. gen. pag. 975.

GYROSTEMON Desf. Endl. gen. n. 5264. Meisn. gen. pag. 235.

1. **Gyrostemon ramulosum** Desf. caule diffuso, ramis prostratis ramulosis, foliis lineari-semiteretibus. Desf. in Annal. du Mus. 6. tab. 17. — 8 tab. 10. fig. a. Endl. in Enumerat. plant. Hügel pag. 10.

In arenosis calcareisque inter frutices prope urbiculum Freemantle (Perth), m. Decembri 1838. Herb. Preiss. No. 1234.

„Frutex prostratus, ramis elongatis ramulosis.“

CARYOPHYLLEAE Juss.

(Auctore F. T. BARTLING.)

Subordo I. PARONYCHIEAE.

LEPIGONUM Fries. Wahlbg.

(Spergularia Pers. Endl. gen. n. 5218.)

1. **Lepigonum brevifolium** Bartl. glanduloso-pubescentis: caulibus simplicibus, internodiis compressis; foliis internodio brevioribus lineari-filiformibus supra planiusculis: cyma pauciflora aequali; pedicellis calyce sesquilingioribus; sepalis corollam aequantibus, capsula trivalvi subduplo brevioribus; seminibus immarginatis granulato-asperis.

In solo sublimoso vallis prope praedium rusticum Dom. Philips (Victoria) d. 19. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1945.

Caules digitales, simplices, erectiusculi, cum foliis pedicellis calycibusque glanduloso-pubescentes, internodiis compressis, intermediis subpollicaribus. *Folia* internodio duplo triplove breviora indeque remota, lineari-filiformia, supra planiuscula, subtus convexa, acuta mutica. *Cyma* terminalis dichotoma, regularis 5-7-flora. *Pedicelli* calyce circiter sesquilingiores, tenues, florentes et fructus maturos gerentes stricti, erecti, deflorati horizontales. *Calyx* 2 lin. fere longus, sepalis ovato-oblongis, obtusis, uninerviis, interioribus anguste membranaceo-marginatis. *Petala* alba, ovata, calycem subaequantia. *Stamina* 10, sepalis triplo fere breviora. *Capsula* calyce subduplo longior, trivalvis, valvulis superne recurvis. *Semina* parva, nigra, cuneato-semirotunda, immarginata, exalata, granulis minutis acutis aspera.

2. **Lepigonum anceps** Bartl. caulibus adscendentibus glabris, internodiis superioribus compresso-ancipitibus; foliis lineari-filiformibus mucronatis utrinque planiusculis; cyma subracemosa multiflora glanduloso-pubescente; pedicellis calyce pluries longioribus gracilibus; petalis (rubris) calycem aequantibus; capsula trivalvi calyce vix longiore; seminibus immarginatis.

In arenosis prope praedium rusticum Cl. Nash (Perth.) d. 10. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1944.

Caules spithamaei, adscendentes vel erectiusculi, glabri, parce ramosi, ramis plerisque abbreviatis. Internodia $\frac{1}{2}$ -2-poll. longa, ima teretiuscula, superiora eximie compresso-plana ancipitia. *Folia* caulina internodio saepissime breviora, ramulorum subfasciculata, carnosae. *Stipulae* ut in congenerebus. *Cyma* subfastigiata multiflora, pedunculis pedicellis calycibusque pilis articulatis glanduliferis patentibus parce glanduloso-pubescentibus. *Pedicelli* tenues capillares fere, demum 9-12 lin. longi, florentes erectiusculi vel subnutantes, deslorati saepe refracti, fructus maturos gerentes iterum erecti stricti. *Sepala* vix sesquilineam longa, anguste ovato-oblonga, uninervia, rotundato-obtusa, interiora margine lato membranaceo. *Petala* calyce vix longiora, ovato-oblonga, rubra, persistentia. *Stamina* 10, sepalis duplo breviora. *Capsula* anguste ovata, calyce vix longior, trivalvis, valvulis apice parum recurvis. *Semina* immatura immarginata: matura desunt.

3. **Lepigonum laxiflorum** Bartl. caulibus adscendentibus subpubescentibus, internodiis teretiusculis; foliis lineari-filiformibus submucronatis utrinque planiusculis, internodio brevioribus; floribus inferioribus axillaribus remotis, summis subcymosis; pedicellis elongatis gracillimis; petalis (pallide rubellis) calycem aequantibus; capsula trivalvi calycem subsuperante; seminibus immarginatis minutissime granularis.

In arenoso-conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest d. 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1943.

„Herba prostrata. Flores rosei“. *Semina* perparva cuneato-subtrigona, obscure fusca.

A *L. ancipiti*, cui proxime affine, differre videtur: *caulibus* a basi parce pubescentibus ramosioribus, ramis magis elongatis, internodiis longioribus omnibus fere teretibus; *pedicellis* gracillimis longioribus, omnibus fere remotis axillaribus solitariis vel alaribus, ultimis solummodo subcymosis, desloratis vix refractis sed potius patentibus vel horizontalibus; *floribus* paucioribus; petalis pallidioribus; denique capsulis calyce evidenter longioribus, valvulis magis recurvis.

Subordo III. ALSINEAE.

CERASTIUM Linn. Endl. gen. n. 5241.

1. **Cerastium glomeratum** Thuill. caule erecto vel adscendente; foliis subrotundis ovalibusque, inferioribus in petiolum angustatis; paniculae ramis glomeratis; bracteis omnibus herbaceis calycibusque apice barbatis; pedicellis fructiferis calycem aequantibus brevioribusque; petalis ca-

Spizularia (ancipis) compressa Don & Mel.

L. brevifolium ad *lacum Alpe*
ambinae collectum & sub
nomen a me nominatum
transitum quadammodo ad
L. aucipitum format Apr. 29. 1848.
Etiam specimen sub nomine *L. bre-*
vifolii exposita sic reiteratam
explorationem huc trahendo: & var.

glaucescens, pilis glaucescentibus
aliqui sectam praebuit et infig.
Pinnæ ob maximam affinitatem
juxta Lep. rubrum inferenda
Circa urbem Adl. Nov. 1848 frequenter
ad pagum Blunzig & Hindmarsh. Apr.
1849. L. laxiflorum vix ullo charactere
manifesto ab hoc diffat.

Singularia ^{rufescentia} ~~fargiflora~~ ^{partim} ~~forte partim~~ ^{Lan-}
^{natura partim} ~~ex diff.~~ ^{clia uti} ~~mutabilis~~
fargiflorum, ^{exalatis} ~~fero nulli~~.
& Singularia largiflora fargiflora

[illegible]

*castrametum! febr. 5. 1848. Dorn
Commissis in vicinia locorum cultorum, longe in
montionibus ubi olim oves parvae ortipavimus.
Ad Castra Victoria, in pascuis Laevae,
ad portum Helveticus. (F. G. L. per Stuart &
M. Philip per Joys.) Ad primum viciniam
permixtae fenum et arbor plus minusve ranae sunt.*

+ *Platine gratiolaris* *furcula* (E. Gratiol.)
Sp. plant. south. Carolina, hb. N. 788, m. 1848.
N. 788, m. 1848.

- *Cellaria media* Villars.

In graminoso humido ad flu-
vium apud cataractam. Hb. 3 48
Descriptio. L. m. p. 3. Cavensis. Hu-
mili haud male convenit. Dm.
S. flaccida. hb. N. (Book?) In umbrosa
S. fl. m. p. 3. 1849. hb. N. 386

- *Australapisa* *Perdrell* *Laffy*

Perdrell *Laffy* *Perdrell* *Laffy*
In graminoso humido ad flu-
vium apud cataractam. Hb. 3 48
Descriptio. L. m. p. 3. Cavensis. Hu-
mili haud male convenit. Dm.
S. flaccida. hb. N. (Book?) In umbrosa
S. fl. m. p. 3. 1849. hb. N. 386

- *Dichoglossis* *Australis*! *Schlechtendal*

In colib. *in* genus, *rejus* *circumscriptio*
arinos, *rejus*, *essentialiter* *et* *social* *diffen*.
In colib. *in* genus, *rejus* *circumscriptio*
arinos, *rejus*, *essentialiter* *et* *social* *diffen*.
In colib. *in* genus, *rejus* *circumscriptio*
arinos, *rejus*, *essentialiter* *et* *social* *diffen*.

- *Lichnis* *Githago* *Lamark* *Inter segetes*

- *Spargula arvensis* L.

Specim. nostr. varietatis *summa* *glabra*
gracilis. *Inter segetes* *inter marces*
field. *Sept 1848*.

- *Colobanthus* *Pillentienii* *Provinc*

- *Spargula apetalata* *Jordm.* *Long*

- *Spargula apetalata* *Labillard.*

In arinosi *floris* *ad fl.* *Smith* *Est. river* *Form*
hb. N. 5. 11. n. 557 *Georg* *hb. N. 557*
in *hb. N. 557* *Georg* *hb. N. 557*

- *Trigonella* *triflorata* *Willd.*

Trigonum *obscure* *bilobulare*, *corolis*
scutellatis. *Holff* *officij* *Hb. 10. 1848*.

- *Calanthe* *maritima* *Portulaca*

Calanthe *maritima* *Portulaca*
Calanthe *maritima* *Portulaca*
Calanthe *maritima* *Portulaca*

Calanthe *maritima* *Portulaca*
Calanthe *maritima* *Portulaca*
Calanthe *maritima* *Portulaca*

Calanthe *maritima* *Portulaca*
Calanthe *maritima* *Portulaca*
Calanthe *maritima* *Portulaca*

lycem subaequantibus. Koch. syn. ed. 1. pag. 121. — *C. ovale* Pers. syn. 1. pag. 521.

In solo turfoso-arenoso ad Stirling's-terrace, Plantagenet d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1949. in arenosis prope lacum insulae Rotenest d. 21. Aug. 1839.

Subordo IV. SILENEAE.

SILENE Linn. Endl. gen. n. 5248. Meisn. gen. pag. 24. (21.)

1. **Silene gallica** Linn. annua: racemis terminalibus plerumque geminatis viscoso-pubescentibus; floribus alternis; calyce tubuloso hirsuto, fructifero ovato, dentibus lanceolato-subulatis; petalis obovatis indivisis integerrimis denticulatis emarginatisve; foliis anguste oblongis, inferioribus obovatis. — Vaill. bot. par. tab. 16. f. 12.

In solo humoso prope Woodbridge, Perth, d. 31. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1950.

Calyces fructigeri in pedicellis adscendentibus erectiusculi.

PORTULACEAE Juss. Endl. gen. pag. 946.

Tribus II. AIZOIDEAE Endl. l. c.

(Auctore F. A. G. MIQUEL.)

TETRAGONELLA Miquel.

Calyx liber, quadrifidus, limbi laciniis ellipticis cœnosis, praefloratione subimbricatis. *Corolla* nulla. *Stamina* 12, ante et inter sepala disposita, *filamentis* filiformibus, *antheris* erectis oblongis bilocularibus, loculis oppositis, rima laterali antice hiantibus. *Ovarium* liberum, triloculare? loculis uniovulatis? *Stigmata* 3 vel 2, exserta, subclavato-teretia, hispidula.

Herba succulenta, glabra, crystallino-papillosa, *foliis* alternis vel in ramulis abbreviatis subfasciculatis, lanceolato-ellipticis cœnosis, *floribus* axillaribus solitariis longe pedunculatis.

Genus e siccis speciminibus fructibusque carentibus aegre extricandum, *Tetragoniae* et *Galeniae* affine, ab illa *stigmatibus*, ovarioque libero, et ab hac *staminum* situ satis diversum.

1. *Tetragonella amplexicoma* Miq.

Crescit in clivulis arenosis insulae Rotenest, 19. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2393.

„Herba ramis intricatis, floribus flavis.“ *Rami* filiformi-teretes, glabri epidermide fibrosa. *Ramuli* alterni, vagi, foliorum fasciculorum vestigiis tuberculati, juniores papilloso. *Folia* alterna, plerumque supra ramulos contractos fasciculata, comosa, in sicco submembranacea, glabra vel glabriuscula, flaccida, obsolete uninervia, non nisi ad lentem fortiozem parve venulata, elliptico-lanceolata, obtusa vel obtusiuscula, basi in petiolum longiusculum attenuata, cum petiolo 3-4½ cent. longa, ½-fere 1½ cent. lata. Bases petiolorum post folia lapsa persistentes incrassatae. *Flores* axillares, solitarii, *pedunculis* filiformibus sursum parumper incrassatis 1-2 cent. longis sustentis, virginales obovati, florentes obovato-semiglobosi, 2-3 mm. longi. *Calycis* succulenti quadrifidi laciniae ellipticae. *Stamina* 12 vix exserta (duo ante singulas calycis lacinias, alia inter sinus disposita? *filamentis* subulato-filiformibus; *antheris* laete luteis. *Stigmata* staminibus paullo longiora, in sicco nigricantia.

Tribus V. CALANDRINIEAE. Endl. l. c. pag. 950.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

TALINUM Adans. Endl. gen. n. 5178.

Meisn. gen. pag. 130. (94.)

Sectio inter b et c media. *Stylus* usque ad basin fere tripartitus, *stigmatibus* filiformibus divergentibus attenuatis. *Placenta* brevis. Plantae humiles, annuae, Novam Hollandiam incolentes. — *Petala* deflorata inferne in tubum cohaerentia, fructum calyptrae ad instar tegentia.

1. *Talinum nanum* N. ab E. caule basi ramoso ramis lateralibus procumbentibus adscendentibus apice caulis brevissimi longioribus, foliis carnosissimis alternis sessilibus oblongis obtusis subtus convexis supra depressis, floribus in racemum terminalem simplicem subsecundum tam caulis quam ramorum dispositis brevipedicellatis.

In depressis arenosis umbrosis ad ripam fluvii Cygnorum supra oppidulum Perth Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1930.

Planta vix pollice altior, *radice* tenui recta subsimplici. *Rami* simplices, inferiores caule sub duplo longiores, terrae incumbentes, adscendentes, apice racemiflori sicuti et caulis apex. *Folia* vix unguicularia, glabra, demum defluentia: superiora vix lin. longa, obovata. *Racemus* scorpioideus videtur, flexuosus, e cyma proficiscens, ebracteatus, vel ubi bractea accedit, lateraliter, nec pedicello subjecta. *Pedicelli* ½-1 lin. longi. *Flos* 2 lin. latus („sordide albus.“ Preiss.). *Calycis* foliola ovato-subrotunda, herbacea, decidua relicto disco orbiculari capsulam suffulcente. *Petala* quinque, oblonga, calyce duplo longiora, patentia, libera. *Stamina* 10; *filamenta* basi dilatata.

Paronychiae St. Hil

Polytrichon. Löffl. & v. Linn.

1. *alviniifolium* Debandolle. ranges
 mont. In valle ^{bus} ~~capitata~~ ^{montana} Löffl. & Lr
 28. 1848. Ad latus rivuli apud ca
 karakam. Jbr. 6. 1848. In latus an ^{mont}
 vide *Caryophylloae* ^{subtile}. ^{Paro}
nychieae. Hartl. p. 243
 Sign. ^{howarth} ^{ag. tenuis}. ^{enerid}!
 allego Novo Hollandia ^{quid} ^{Miller}.
 ved. pag. 248

Scleranthaceae Lk

My. Hill & Thoroughman river ^{Fluggers - ranges}
 1. *pueraria* St. Hil.
Ad litora maris ^{lancea} ^{quid}
Portum Adelaide. Jbr. 6. 1847
 (revo lamm) In arenosis ripariis
 ad p. ^{Murray} ^{ag. 48}.

2. *S. diander* St. Hil.
 2. *S. diander* ^{Stuart} ⁴⁸⁴⁴!
 flor. ^{Tasmania}. ^{J.D.L.}!
 In ^{littoribus} ^{ag. 48}.
 3. *S. tasmanica* ^{St. Hil.}
 In ^{littoribus} ^{Tasmaniae}. ^{ab. 12}. 100.

Utricularia St.

U. hibernica ^{Forster}
 Ad ^{U.} ^{South Esk river} ^{Tasm.}
 ab. ^{St. Hil.} ^{n. 117}. ^{Nov 48} -

Utricularia calypstrata ^{J.D. Hook.}
 In ^{montis} ^{petros} ^{ve. in ripariis} ^{ad font}
 et rivulis, Warrobae et Löffl. - range
 et prope Perth ^{Tasmania}. ^{ab. 12}. 146.
 Anua, ^{plum} ^{quid} ^{patiens}, ^{alta}. Folia ^{heret}
^{compressa} ^{supra} ^{leviter} ^{recurva} ^{succulenta}
 1-5. Petala ^{lilacina}
 Anua ^{juniora} ^{rotundato} ^{rephrudea}, ^{ornata} ^{simulata} ^{ob nigro}
^{perispermata} ^{lunata} ^{rephrudea} ^{minuta}
 elongata ^{gr. 1/2}
 pedalis, foliis ad 2" ^{1/2} ^{lati}, ^{rare} ^{longa}
 ad ^{bellis} ^{ag. 48} ^{volubilibus}, ^{floribus} ^{glandris}
 ad ^{fluvium} ^{Murray} ^{arenosam} ^{ripariam}. ^{ab. 12}. 48.
^{St. Hil.} ^{ag. 47}

antherae ovaes, locellis discretis parallelis. *Stigmata* longa. *Capsula* rigida, chartacea, nitida, petalorum marcescentium calyptra involuta, ovato-subglobosa, obsolete trigona, trivalvis, in nostris autem clausa valvulis arete cohaerentibus. *Semina* funiculis longis erectis placentae basilari brevi adfixa, multa, parva, ovali-lenticularia, striata, fusca.

Propter stylum ad basin ferme divisum, et vitam annuam cum sectione secunda (Talinastro) conjungi nequit, a genere autem tam diu haud removendam esse hanc speciem censeo, dum in eo restant sectiones *Talinellum* et *Eutmon*.

CALADRINIA H. B. K. Endl. gen. n. 5179.

Meisn. gen. pag. 130. (94, 357.)

C. Linifolia (Meisn.) Endl. n. 5179, 174, 135.

1. ***Calandrinia liniflora* Fenzl.** glaberrima, caulibus (ex una radice pluribus) simplicibus adscendentibus, foliis lineari-filiformibus teretiusculis carnosus basi attenuatis, racemo laxo terminali, petalis 5 late obovatis sepalis ellipticis mucronulatis subtriplo longioribus, staminibus 10 basi in anulum membranaceum connatis. Fenzl in Endl. Enumerat. pl. Hügel pag. 52. n. 172. Walp. Rep. 2. pag. 236. n. 22. (*C. linifolia* errore calami.)

In arenosis ad fluvium Cygnorum, Augusto a. 1839. Herb. Preiss. No. 1952.

⊙

2. ***Calandrinia polypetala* Fenzl.** glaberrima, caulibus adscendentibus, foliis teretiusculis filiformibus, racemo laxo terminali, petalis 8-10 oblongis ellipticisve integerrimis roseis sepalis ovato-subrotunda duplo superantibus, staminibus 8-10 in anulum membranaceum basi connatis.

α. caulibus simplicibus, racemo terminali *simplici* vel inferiori minori aucto.

Calandrinia polypetala Fenzl in Endl. Enumerat. pl. Hügel. pag. 51. n. 171. Walp. Rep. 2. pag. 236. n. 21. (Swan River, Hügel.)

β. **composita.** caule supra basin in ramos multos fastigiatos basi simplices a medio inde composita racemosos diviso.

In arenosis prope oppidulum York, Octobri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1951. „Herba annua, humifusa. *Flores* rosei.“ (Preiss.)

3. ***Calandrinia calyptrata* J. Hook.** caule ramosissimo ramis valde diffusis, foliis lineari-spathulatis, superioribus (supremis) minutis bracteiformibus, pedunculis circa rorum apicem axillaribus elongatis post anthesin deflexis, petalis in corollam calyptriformem conniventibus. — Hook. Icones plant. t. 296. Walp. Rep. 2. pag. 236.

In arenosis insulae Rotenest, Augusto a. 1839. Herb. Preiss. No. 2400.

Petala 5, distincta ut in reliquis, sed tenerima et apicibus denique marcescendo conglutinata, quo facto corolla calyptrae ad instar capsulae

vertici inhaeret. *Stamina* 5. *Stigmata* 3, subsessilia, clavata. *Calyx* ad $\frac{1}{4}$ bifidus. — Est planta digitalis et humilior, *Montiae* habitu, laxa, irregularis, floribus parvis. *Radix* simplex, annua.
„Flores pallide rosei.“ (Preiss.)

MESEMBRYANTHEMEAE Fenzl.
in Ann. Wien. Mus. 1. pag. 347, 349.
Endl. gen. pag. 945.

MESEMBRYANTHEMUM Linn. Endl. gen.
n. 5163. Meisn. gen. pag. 129. (93.)

§. 18. **HUMILLIMA** DeC.

1. **Mesembryanthemum australe** Ait. (?) caule summitereti reptante, foliis triquetris glaucescentibus punctulatis laevibus incurvantibus, pedunculis obtuse ancipitibus basi bibracteatis. H. Kew. 2. pag. 187. Haw. synops. pag. 241. ed. Schrank. pag. 261. DeC. Prodr. 3. pag. 428. n. 103. Salm-Dyk. 3. n. 12.

? Var. pedunculo (solo obvio, fructifero) subtripollicari.

In districtu Victoria, Martio, J. Drummond legit. Herb. Preiss. No. 1969.
Specimen nimis incompletum.

§. 20. **ACINACIFORMIA** Salm-Dyk.

2. **Mesembryanthemum virescens** Haw. caulibus (crassis) decumbenti-prostratis, foliis subinaequilateri-tri-quetris subvirentibus, pedunculis terminalibus solitariis alatis ancipitibus, calyce quadrifido, stigmatibus octo filiformibus. Haw. Syn. pag. 236. ed. Schrank. pag. 260. DeC. Prodr. 3. pag. 429. n. 117. Salm-Dyk Monograph. 3. t. 93. (secundum Walp. Repert. 2. pag. 268.), quae tabula in nostro hujus operis exemplo deest.

In arenosis prope oppidulum Freemantle, Decembri a. 1838. Herb. Preiss. No. 1908.

„Prostratum, ramis valde elongatis. *Folia* triangularia, subacinaciformia. *Flores* laete purpurei. Ab incolis Colonial-Figs et ab aboriginibus, quos fructum comedunt, Kolboje appellatur.“ (Preiss.)

Apud Candollium l. c. pro „petiolis basi albis“ legendum „petalis basi albis.“

Cappula basi oblonga apice attenuato-
trigona calycem paullo superantem
valvis denique patentibus coram
simulantibus!

In graminosis placis urbana et laeta
vivunt dactylus! finis lingue caris
ad rikunga nec non ad pudem mous
Norr in inferiori parte alibi que.
+ 122 australi Alton. Anth. var!
ill. aciculatare Alton.

Conf. R. Dr. ranniff. Vp. e D. V. Kes
 Ep. 86. Huc etiam M. australis
 pervenire videtur, quod e 'provinciis'
 huc usque est passim e doribus in aridum
 arct. caulis prostratus ramos nudi
 mores. Folia v. imo prostrata nervosa, velata, oblonga
 succine. Supra v. auge. prostrata, ciliat. v. oblonga, velata
 nervosa, v. prostrata, ramosa, velata, v. oblonga, velata

T. On fertilibus firmiter fissum
 ad 6" minimum. Wolfshagen! Sept.
 1848. Tidi. Dec. 1847 in paven.
 insula de eere & ad portum
 Voland. alibique, sed pelagum.
 in alluvia prope pelagum.

in Argentina inter Muscipula, meaga
multos molles, apertis patib ingrat
sub ali. *Piscula leucuraea. Sicuti augur est solus*
in parte caeca pallida. Nam, acida!
In Argentina et composita, super solum latitavit indians
Septate, vire. *My. acui laterale, havor et*
non praecedente, in arina,

Paspalum conjugatum Jacq.
cum ad littora, tum in plagis
longe a mari remotis aruosis
et non in montibus frutibus
pappi aruerunt. Folia permi-
bus quibusdam ceteris ^{foliis minoribus} ~~frutibus~~ ^{minoribus}
edunt. Fructus ~~perianthio~~ ^{perianthio}

Synthlipsis: virens, affluente. Na him lig^a coroll.
Tori pinnali rarius longhi pub. calycis bracteis 2 foliis vini
bus posticis. Calyx ^{inaccesibilis} 5-7 lobus. Petala in perianthium inveni-
tione triangularum. Nerva laevigata et breviter undulata longiora ac-
tus irregularia saturatius viridia minus glauca minus angusta
na nuda articulatiforme.
Megastomys utrumque et ystallinum L.

*Ad mare In arenis mari vicinis
prope Goldastham & portum Wilhelms-
Vne. afflat. Procreavit.
Haud differe videtur ad illam Tur-
cicam nativam, abgen dubio tunc intro-
ductam Varietas totam plantam operculatos limpa dicitur. Hanc
opide nota. Colp. mlt. otone. nris lo gmo mlt. m. v. r. capite
nra mlt. m. lla & mlt. m. mlt. m.*

Tetragonella implegiroma Mij.

Lociis umbrosis litoralibus vel
subfalsis inferiorum hinc inde.
glabra vel pilosa.

Plumpe procerus ^{nitida} suffrutescens
calice supra ~~glabra~~ ^{nitida} papilloso
pulsus crystallino papilloso
lincari - laurcolata basi longe
angustata facie formis inter
rubicis in formam rhombicam
vergens ad 1" lata et 2 1/2" cum
periclo longior. F. l. 88 intrus
lutei odoratissimi.

Anth: vere, aest.

Thellaria Australasica Jui Mij.
In vallibus maritimis mont. Lofy-v.
ad fl. Oukapar.

Anth. rubr. sing. nigrescent. Kb. intricola
in humis rufescente, glauca.

Thellaria

Fraxifera ex Europa, quum me
a antea a locum visitacchi nandum
" reperta " Mij. in litt.

Thellaria pulvinaris Jui Mij.

Locis ripariis fl. Murray aruapam
~~pinum~~ ^{montum} ~~ad fl. Oukapar~~ unius!

Capitis vel pulvinos ficiquis, quum
intricola macumbat. Anthraci ru-
bellas max nigrescentes. In lala
basi lincus piffa.

Anth: vere, aest.

in situ Stenographos farum Turner & unum flavos
 variegato unguis ut. 57

Frankonia pauciflora DC.

v. pubigera Griseb. Müll.
 calycibus pilis brevissimis
 paucifloris puberulis.
 Circa minima ~~ex~~ videtur
 in triplicata Labillardiere
 & H. K. & H. pauciflora
 quasi intermedia. ^{roja} ~~puberula~~ ^{caulem}
 f. ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 dec. L. ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 videtur! 4 fructus 1/2 - 3 ped. diffusus
 in oris marinis inter fructus
 apud portum Adelaide ^{varia} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 insula L. ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}

v. glanduligera Forst. M.
 ramis calycibusque gland.
 lobis pubescentibus
 Circa laxius ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 florum Murray. f. 1848!
 H. K. ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 varietate pubescentia validior est
 ibidem. Nov. 1848. Dr. Sch.
 var. a habet a ^{limbo} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 ibidem & sinum G. ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 & ad ripam actam a ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 fl. Murray ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 orientem ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}

Anth: vire.

* Diagonia inermis, Forst. Maccl. f. 12. ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 herbacea procumbens v. diffusa, foliis ovatis
 rugosis. ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 flatus, lobis axillaribus, ciliatis & minime
 pubescentibus, ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 lobis 4-7 floralibus ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 in apice dilatatis, in apiculas saepe protractis
 in pinnas, ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 lincis, ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}
 & cornuta, ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~capitulum~~ ^{capitulum}~~

FRANKENIACEAE St. Hilaire.

Endl. gen. pag. 913.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

FRANKENIA Linn. Endl. gen. 5053.

Meisn. gen. pag. 22. (20.)

1. **Frankenia fruticulosa** DeC. foliis linearibus acutiusculis margine revolutis glabris basi non ciliatis, caulibus erectis glabris; calycibus acutis glabris. DeC. Prodr. 1. pag. 350. n. 13.

In arenosis exsiccatis inter Restiones ad ripam fluvii Cygnorum prope Peninsulam, Januario a. 1839. Herb. Preiss. No. 1283.

„Suffrutex 2-3-pedalis, ramis intricatis. Flores incarnati.“ (Preiss.)

DROSERACEAE DeC. Endl. gen.

pag. 906.

DROSERA Linn. Endl. gen. n. 5033.

Meisn. gen. pag. 22. (19.)

Sect. I. ROSELLA DC. Prodr. I. pag. 317.

§. 1. ACAULES.

1. **Drosera platystigma** Lehm. foliis minimis orbiculatis petiolatis supra margineque glanduloso-ciliatis, stipulis scariosis, scapo simplici erecto uni-paniculato calyceque pauciglanduloso, stylis tribus indivisis, stigmatibus peltatis. Lehm. Pugill. VIII. pag. 37.

In solo glarioso inter frutices densos Plantagenet prope „Seven miles bridge“, d. 20 m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1994.

Planta pulchella, humilis. *Folia* numerosa, conferta, rosulata, terrae adpressa, cum petiolo 2 lineas longa. *Lamina* exacte orbicularis, pagina inferiore glabra, superiore glandulis sparsis versus marginem crebrioribus obtecta, margine longe glanduloso-ciliata: ciliis laminam aequantibus. *Petiolus* lamina duplo fere longior. *Stipulae* ad basin petiolorum scariosae, albae, margine serratae, a basi ad medium usque indivisae, dein trifidae, laciniis lateralibus plerumque bifidis, intermedia trifida, interdum vario modo laciniatae: laciniis lanceolatis. *Scapus* erectus, pollicaris, tenuis, apice

4-3 florus, glandulis nonnullis minutis instructus. *Sepala* ovata, acuta, basi angustata, extus glandulosa. *Petala* obovata, calyce triplo longiora, 2-2 lineas longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, pulchre punicea, venis saturatioribus striata. *Filamenta* glabra, calycem aequantia; antherae oblongae, longitudinaliter dehiscentes. *Ovarium* sphaericum, glabrum, subcoloratum. *Styli* tres, simplices, stamina subaequant, diaphani, stigmatibus peltatis nigris.

2. ***Drosera pulchella* Lehm.** foliis parvis orbiculatis petiolatis supra margineque glanduloso-ciliatis, stipulis scariosis, scapo adscendente simplici paucifloro calyceque pauciglanduloso, stylis 5, stigmatibus linearibus papillosis. Lehm. l. c. pag. 38.

In districtu Plantagenet ad Stirling's-terrace locis turfosis arenosis d. 8 m. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1992.

Herba bipollicaris. *Folia* rosulata terrae adpressa, in statu sicco late viridia. *Lamina* orbicularis petiolo plano, bilineari, glabro duplo brevior. *Cilia* marginem cingentia basi sunt latiora longitudine fere folii. *Stipulae* scariosae prope basin foliorum omnino ut in *Drosera Platystigma*. *Scapi* adscendentes plerumque bipollicares, glandulis minutis instructi. *Pedunculi* 2-4, breves, in modum racemi dispositi, inferiores lineam longi. *Petala* obovata, basi cuneata, calyce plus quam duplo longiora, rosea, striis saturatioribus longitudinalibus. *Stamina* quinque: antheris longitudinaliter dehiscentibus. *Styli* 5, indivisi: stigmatibus lateralibus elongatis papillosis. *Semina* oblonga, nigra, subpunctata.

Obs. D. Platystigma valde affinis; sed diversa foliis majoribus, scapo adscendente praesertim floribus minoribus, stylorum numero, stigmatibusque elongatis non peltatis.

3. ***Drosera pygmaea* DC.** foliis minimis orbiculatis subpeltato-petiolaris supra margineque glanduloso-ciliatis, stipulis scariosis, scapo simplici erecto paucifloro calyceque subglanduloso, stylis tribus indivisis, stigmatibus elongatis lineari-subclavatis. — DC. Prodr. 1. pag. 317.

Drosera micrantha Lehm. l. c. pag. 39.

Rarissime occurrit in locis arenosis prope oppidulum Perth, -d. 26 m. Sept. 1839 lect. Herb. Preiss. No. 1995.

Radix e fibrillis paucis, filiformibus, simplicibus, brunneis constat. *Folia* numerosa, dense rosulata, inferiora terrae adpressa, plerumque rufescentia, superiora in statu sicco obscure viridia, omnia 2 lin. longa. *Lamina* orbiculata, semilinearis, non sensim in petiolum attenuata sed subpeltato-petiolata. *Pili* glandulosi marginem foliorum cingunt et laminam longitudine superant. *Stipulae* scariosae ad basin petiolorum, margine serratae, acutitridae, lobis iterum divisis in lacinias plures setaceas. Haec stipulae in apice rosularum saepe dense aggregatae, imbricatae, bulbillum referunt album ut in *Drosera Platystigma* et *pulchella*, sed in his bulbillus ob folia majore minus conspicuus est. *Scapus* pollicaris, rarius bipollicaris, filiformis hinc inde glandulis minutis instructus, rarius glaber et subnitidus, apice 2-4 florus. *Pedunculi* breves vix semilineam longi, ut et calyces subglandulosi vel glabriusculi. *Sepala* lanceolata, obtusiuscula, $\frac{1}{2}$ lin. longa. *Petala* obovata, alba, calyce paullo longiora. *Stamina* brevissima, glabra: antheris subrotundis. *Ovarium* sphaericum, glabrum. *Styli* 3, simplices, breves: stigmatibus linearibus subclavatis indivisis, papillosis, stylo longioribus.

Obs. Characteribus accedit ad *Droseram Platystigma* et *pulchellam*, sed habitu valde est diversa. A priori differt praeter alias notas: floribus multo minoribus albis, a posteriore foliis minimis, scapo erecto, floribus minoribus stylorumque numero.

Cucurbitaceae, Juss.

Cucumis Linne

C. pubescens Willdenow

In interioribus legunt comites
armigari pinguetatoris Hort.

C. ...

Introductus occurrit ad Taurus
plumum & in hortis

Species ut videtur apud H
nondum descripta. Tunc accedit
C. prophetarum, sed fructus valde
amari sunt. Forth idem ac *C. pseudo-*
Colocynthis Koyli montium
Himalayensium, Tamen haec
valde ingratum est. Walpers descripta

Drosera pygmaea DC.

B. Ant. Quart. sine numero Forsk.

C. ... ^{Wag. Cap. Juss.} *descripta*

Lithmanniana papaver 2-6 florum
signat, quae ipse semper uniflo-
rum invenit, uti etiam diagnosi
Doniana docet. —

Sir. L. Harris

Litter. in herpatis - Eucoum

Wag. In utigineis ac fl. South

Est river Dec. 1848. hb. N. Tarm II

n. 780. In: *D. pusilla* R. Per non

Blux. Humboldt.

Habitu & fol. forma *Thayonellae*.

Tetragonia inermis: Calyx 4fidus: lobi-
nis 2 latioribus obtusis 2 acutioribus &
angustioribus, rarior brevifidus. Stamina
abortu pauciora pro calyce breviora
antheris flavae. Siphillis 4-7 linearia
brevissima, flavo virentia
antheris: vire.

Sect. II. ERGALEIUM DC. l. c.

§. 1. CAULESCENTES.

* *Foliis rosulatis.*

4. ***Drosera rosulata* Lehm.** caule brevi simplici squamoso, foliis rosulatis late obovatis basi cuneatis supra margineque glanduloso-ciliatis, pedunculis aggregatis unifloris folia aequantibus, calycibus glabris. Lehm. l. c. pag. 36.

Crescit locis arenoso-turfosis ad fluvium Cygnorum prope oppidulum Perth. d. 29 m. April. 1839. Herb. Preiss. No. 1883.

Radix in speciminibus Preissianis deest, sed verisimiliter bulbosa. *Caulis* erectus, pollicaris, et paullo longior, fibris cinerascentibus dense tectus. *Folia* 6-8 in rosulam expansa ut videtur terrae adpressa, 6 lineas circiter longa, 3-3½ lin. lata, obovata, apice rotundata basi cuneato-attenuata, non petiolata, nervo medio basi valde incrassato apice tenuiore ramulosoque percursa, subtus glaberrima, supra et margine glandulis stipitatis purpureis, cum stipite fere lineam longis ciliata. *Pedunculi* congesti, (4-10) longitudine foliorum, juniores breviores, glaberrimi, teretes, semper uniflori. *Sepala* ovata, acuta, glabra, 2 lin. longa. *Petala* calyce triplo longiora, obovata, basi cuneata, alba striolis (in floribus siccis non discoloribus) longitudinalibus. *Stamina* 5, calyce vix breviora. *Filamenta* aequalia: antheris subrotundis. *Ovarium* subsphaericum, glabrum. *Styli* capillaceo-multifidi. Secundum adnotationes Preissianas antherae in viva planta sunt badiae, filamenta alba et germen cum stylis viridi-flavum.

Obs. Valde similis *Droserae bulbosae* Hook. Icon. plant. tab. 375; sed nostra est humilior, foliis sessilibus triplo latioribus. *Pedunculi*, qui in icone Hookeriana foliis duplo longiores reperiuntur in *Drosera rosulata* folia non superant. An forsan varietas?

A *Drosera erythrorhiza* Lindl. differt statura humiliore et praesertim pedunculis brevibus unifloris.

5. ***Drosera erythrorhiza* Lindl.** radice bulbosa coccinea. caule brevi simplici, foliis rosulatis obovato-rotundatis supra marginibusque villosis glandulosis pedunculo solitario cymigero, cyma puberula. — Lindl. Swan-River Bot. pag. XX. n. 90.

In arenosis umbrosis sylvae prope oppidulum Perth, d. 13 m. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1987.

Caulis pollicaris squamis nonnullis lanceolatis glabris. *Folia* 6-7 lin. longa, 5-6 lin. lata, basi subangustata subtus glaberrima, supra margineque pilis albis (½ lin. longis) glandula purpurea terminatis dense vestita. *Pedunculus* glaberrimus circiter bipollicaris. *Cyma* 6-20-flora. *Pedicelli* plerumque glanduloso-puberuli. *Sepala* ovata, acuta, 2½ lin. longa. *Petala* alba calyce duplo longiora. *Stamina* calycem subaequantia: antheris subrotundis. *Styli* capillaceo-multifidi.

6. ***Drosera macrophylla* Lindl.** radice tuberosa solida, caule simplici, foliis (magnis) rosulatis cuneatis apice truncatis in petiolum brevem attenuatis supra marginibusque glanduloso-pilosis, pedunculis aggregatis folio longioribus 2-3 floris. — Lindl. l. c. n. 91. Hook. Icones plant. Vol. IV. tab. 376.

In solo turfoso humido ad portum Princess Royal Harbour, d. 17 m. h. 1839. Herb. Preiss. No. 1986.

Affinis *Droserae erythrorhizae*, a qua differt: foliis duplo majoribus basi magis attenuatis, tenuioribus reticulato-venosis, pedunculisque gracilioribus 1-3 floris.

7. ***Drosera glanduligera* Lehm.** foliis parvis obovato-rotundatis in petiolum attenuatis supra margineque glandulosi; scapo suberecto pedunculisque racemosis glandulosis. Lehm. l. c. pag. 37.

In solo sublimoso inter frutices Perth, d. 30 m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1976.

Planta pusilla. *Folia* omnia radicalia. *Lamina* obovata, rotundata, subtruncata, longitudine fere petioli, $2\frac{1}{2}$ lin. longa, subtus glabra, supra margineque pilis longioribus basi latioribus apice glandulosis instructa. *Scapus* erectus fere pollicaris, a basi ad apicem usque pilis glanduligeris tectus, in singulo specimine subsimplex apice biflorus in reliquis omnibus floribus 4-8 racemosis instructus. *Pedunculi* glanduloso-pilosi, 2 lin. circiter longi. *Flores* punicei, primum erecti, dein horizontaliter patentes vel subdilexi. *Calyx* extus glandulosus, sepalis lanceolatis, basi subattenuatis, lineam longis, margine fimbriatis: fimbriis glanduligeris. *Petala* obovata, basi cuneata, calyce duplo longiora.

8. ***Drosera ramellosa* Lehm.** caule brevissimo apice squamoso plerumque stolonifero, foliis parvis rosulatis suborbiculatis in petiolum attenuatis utrinque glabris margine glanduloso-ciliatis, pedunculis 1-3 floris foliis subduplo longioribus. Lehm. l. c. pag. 40.

In locis arenosis humidis prope lacum insulae Rotenest, d. 17 m. Junii 1839. Herb. Preiss. No. 1990.

Planta pusilla, vix pollicaris, glabra. *Radix* ut videtur bulbosa. *Caulis* semipollicaris, prope basin nudus, apicem versus squamis nonnullis glabris tectus et verticillo foliorum unico terminatus. Ex axillis foliorum oriuntur rami laterales seu stolones adscendentes, semiunciam fere longi. *Folia* ramorum lateralium alterna, ceterum reliquis conformia, omnia orbiculata, subcuneata et in petiolum aequilongum decurrentia, cum petiolo 3 lineas longa, glabra, margine pilis apice glandulosis ciliata. *Flores* solitarii insident pedunculo glabro, simplici vel subramoso et tunc 2-3 floro stolonibus vix styli ne vix quidem longiore. Quandoque pedunculi uniflori oriuntur in axillis foliorum ramorum lateralium, sed hi pedunculi semper sunt brevissimi et folia non superant. *Sepala* ovata, obtusa, glabra, apice denticulata, $1\frac{1}{2}$ lin. longa. *Petala* obovata, alba, calyce longiora. *Styli* tres, in lacinias 6 vel plures irregulares vel potius inaequales divisi.

9. ***Drosera porrecta* Lehm.** bulbo sphaerico coccineo, caule erecto anguloso glabro saepe stolonibus adscendentibus instructo, foliis verticillatis orbiculatis in petiolum angustatis, pedunculo e verticillo supremo orto apice paniculato subglanduloso. Lehm. l. c. pag. 41.

In locis arenosis montis „Eiza mountain“ Perth, d. 20 m. August 1839. Herb. Preiss. No. 1985.

Radix gracilis, perpendicularis, basi bulbo parvo, sphaerico, intus pulchre coccineo terminata, tota longitudine fibris tenuissimis subflexuosis et apice squamis herbaceis instructa. *Squamae* inferiores minimae, lanceolatae sequentes majores, supremae infra verticillum foliorum primum positae.

Eraera anagallidiflora Nutt.

D. glanduligera Ledeb. ! Nov. Hall: austr.

hb. St. J. sine descriptione loc. natalis. & num. Sp. Querc. se. c. c. c.

Ad flum. Torrens prope in hum-
midiusculis. Scapus saepe 2".

In pratis collinis ad Lindoch-valley
Tumidum plurimum Gauderi Sept.

48. Ad radices montium Boi-
raffer-range. Sept. 48. Flores
minuti. eos Anagallidis phal-
micalae aemulantes. ^{adoneo} Tamen spec.

profinum forte in D. anagalli-
difloram mutandum & rejici-

endum est. An forte frigoris parti-
onis? In istum vespas finem

Privati-Way ad-montem Boen.
Oct 48. Hinc inde in montibus

Bugle-range. i. var. 1848.

Mulje nativorum

Uperibyanthemum proax, Fort Hall

sulphureo-purpureo, ramis erectis,
plis triquetris glaucis viridibus ^{subtiliter} laci-

connatis margine ^{subtiliter} crenulatis, floribus
solitariis binisve immediate sub ra-

lyre bracteis poliofor. micis suffultis,
in pedunculata arripibile

Abitu non prostrato jam ab omnibus

supralacris & vernis queat. Jam
Octobre, fructus maturant, cum alia ² laxa

gionem. Solia ac Ray. inaequilatera,
triquetra atiam in suplo minor. Tunc

culor idus. In riam rictibus subsp. as
latu occurrente montium Flum. range

neari-subspathulatae, foliis simillimae et ab iis vix distinguendae. Verticilli semper duo, ex foliis decem compositi. *Folia* 5 lin. longa, *lamina* orbiculari, margine pilis purpureis glandulosis; petioli modo angustiores modo latiores, sensim in folium dilatati. *Caulis* circiter pollicaris, angulatus, glaber, verticillo foliorum altero terminatus. Ex hoc verticillo oritur *pedicellus* solitarius, vel 2-4, quorum unus et intermedius reliquis longior est. *Pedicellus* intermedius 3-4 poll. longus, glaber, aphyllus, laterales — si adsunt — circa bipollicares, verticillum unicum foliorum orbiculatum, petiolo 2-5 linearis insidentium ferentes. *Paniculae* corymbosae vel subracemosae; rami glandulis minutis sparsis instructi, plerumque basi bracteis setaceis fulti, inferiores 4-6 lin. longi, superiores breviores. *Sepala* in speciminibus siccis nigricantia, ovata, acuta, apicibus patentibus vel subreflexis. *Petala* alba sepalis duplo longiora. *Antherae*, teste cl. Preissio, sulphureae. *Styli* capillaceo-multifidi.

Obs. Simillima *Droserae stoloniferae* Endl. in Hüg. Enumerat., a qua differt: stolonibus lateralibus brevibus vel nullis, praesertim vero eo, quod flores semper e verticillo foliorum superiore proferuntur, nunquam vero e verticello inferiore.

10. ***Drosera stolonifera* Endl.** foliis radicalibus spathulatis rosulatis, stolonibus e basi procumbente adscendentibus, foliis suborbiculatis petiolatis quaternatim verticillatis scapum racemoso-paniculatum aequantibus, calycibus glabris. Endl.! in Enumerat. plant. Hüg. pag. 5. n. 13.

In locis arenosis umbrosis inter frutices silvae prope Peninsulam, Perth, d. 31 Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1984 et in solo turfoso-arenoso prope montem Wuljenup, Plantagenet, No. 1977.

Stolones nunc scapo florifero breviores nunc eo longiores, non semper steriles sed interdum ex axilla inferiore vel ex suprema pedunculos solitarios emittentes. *Folia* internodiis breviora nunquam longiora, petiolo latiori vel angustiori insidentia. *Flores* albi.

**** *Foliis sparsis solitariis ternisve.***

11. ***Drosera Hügellii* Endl.** caule erecto flexuoso glabro, foliis sparsis longe petiolatis peltatis orbiculatis, racemis paniculatis, pedicellis bracteisque glaberrimis, petalis sepala acutiuscula glaberrima ciliata duplo superantibus. Endl.! in Enumerat. plant. Hüg. pag. 6. n. 15.

In solo turfoso humido inter frutices densos planitiei prope oppidulum Albany (Perth,) d. 8 m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1980.

Flores secundum adnotationes Preissianas purpurei. *Petala* calyce plus minusve longiora. *Filamenta* calyce duplo breviora, antheris oblongis. *Styli* capillaceo-multifidi.

12. ***Drosera pallida* Lindl.** caule erecto flexuoso glaberrimo, foliis caulinis alternis longissime petiolatis peltatis orbiculatis glanduloso-fimbriatis, axillaribus brevibus geminis, racemis terminalibus paniculatis, petalis sepala acuta integerrima duplo superantibus. Lindl. Swan-River Bot. pag. XX. n. 87.

In arenosis subumbrosis haud longe ab oppidulo Perth, d. 29 m. April. 1839. Herb. Preiss. No. 1996.

Bipedalis et ultra. *Caulis* ad medium usque aphyllus, sed squamis nonnullis lanceolatis lineam longis instructus. *Folia* longioris petiolus ultra pollicaris folia brevia triplo superans. Internodia nunc semipollicaria nunc pollicaria.

13. ***Drosera macrantha* Endl.** caule erecto flexuoso puberulo, foliis caulinis alternis longissime petiolatis, axillaribus geminis, peltatis orbiculatis, racemis terminalibus paniculatis, pedicellis bracteisque pubescentibus, petalis sepala obtusiuscula pubescentia ciliata duplo superantibus. Endl. in Enumerat. plant. Hügel. pag. 6. n. 14.

In locis arenosis silvae prope oppidulum Guildford, d. 31 m. Aug. 1889 Herb. Preiss. No. 1982.

Caulis bipedalis et ultra, basi bulbo minimo subnunicato instructus. *Flora* secundum cl. Preiss albi vel rosei. *Petala* subconcaua. *Antherae* sulphureae.

14. ***Drosera sulphurea* Lehm.** caule erecto flexuoso glaberrimo, foliis caulinis alternis longe-petiolatis, axillaribus geminis ternisve peltatis triangulari-lunatis, racemis terminalibus paucifloris, pedicellis glabris, petalis sulphureis sepala acutiuscula pubescentia ciliata duplo superantibus. Lehm. l. c. pag. 43.

Crescit in districtu Plantagenet in solo turfoso et inter frutices densos plantis prope oppidulum Albany. Herb. Preiss. No. 1981.

Caulis erectus, 1-1½ pedalis, subangulatus, angulis inter folia evidentioribus, in parte inferiore squamis nonnullis exiguis lanceolatis instructus, a medio foliosus. *Folia* alterna, longe petiolata, petiolo subpollicari basi latiore canaliculato, apice tereti. Internodia nunc pollicaria nunc semipollicaria. *Folia* axillaria plerumque bina, interdum etiam terna, petiolo brevissimo bilineari, teretiusculo. *Foliorum lamina* peltata, lunato-triangulari, basi truncata auriculata, auriculis duabus e ciliis longis deorsum spectantibus laminam aequantibus formata, subtus glabra, in disco et margine ciliis glandulosis basi latioribus obsita. *Inflorescentia* subracemosa, e floribus 3-6 composita. *Pedicelli* erecti, glabri vel apicem versus glandulis paucis instructi, inferiores circa 4 lin. superiores 2-3 lin. longi. *Bractee* minime lineares, margine glandulosae. *Sepala* ovata, acuta, 2 lin. longa, in statu sicco nigrescentia, intus glabra, extus glandulis brevibus densis pubescentia, margine pilis longis, minutissime glandulosis ciliata. *Petala* sulphurea, obovato-cuneata, 4 lin. longa, apice subtruncata, 2 lin. lata. *Filamenta* calycis longitudine, glabra; antheris oblongis. *Ovarium* glabrum. *Styli* capillares multifidi, staminibus subbreuiores.

15. ***Drosera Neesii* Lehm.** caule erecto glabro, foliis caulinis alternis longe petiolatis, axillaribus geminis, peltatis triangulari-lunatis, racemis terminalibus subpaniculatis, pedicellis glandulosis, petalis purpureis sepala acutiuscula puberula glanduloso-ciliata triplo superantibus. Lehm. l. c. pag. 42.

In solo turfoso ad portum Princess Royal Harbour, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1978.

Radix ut videtur bulbosa. *Caulis* bipedalis, basi teres, apicem versus subangulatus, subflexuosus, glaber. *Folia radicalia* nulla, caulina inferiora squamaeformia, linearia seu lineari-lanceolata, 1-2 lin. longa, superiora in internodiis pollicaribus sejuncta, alterna, petiolo pollicari, prope basin canaliculata.

Cicum, *ipatorum* glabrities nota unice
constans videtur ad distinguendam sit
nostram a *D. pellata*, forte solummodo
varietas. ^{hincque} *Stamens* nullas formas
insurgentes ^{hincque} *antheris* et *proctis* *glo-*
rantis *gagum* *capitula* et *folia*
radicalia citius evanescentia. *A. D.*
vi, *vii*, *viii*, *latere* alio propinqua
gortius *signoscentia*. *pubescentia*
lib. v. s. n. — *Stamens* in *mantibus* *Stam.*
Nov. 48. *Stamens* *sept. 1848* — *in*
humidis *atque* *prope* *lacum* *Stam.*
Stamens *lib. v. s. n. 196* *Stamens*
pellata *admixta*! — *Stamens* *Stam.*

L. binata LaBillardiere? (Mar. 1847)
 n. nov. n. 227. Eucuculu Bay
 in arrectate *L. pygmaea* ac.
 in religinosa - paludosis expt.
 Murphy, Tern. Ab. V. II n. 416.
 Jan 25. 1848. In humis is maribus
 umbratis ad cataractam luviam
 monium adq. - rarius raro Tern.
 Socioli & foliola compressa. Caalis de
 reticulatus. Stola puro-alba. Vili
 eae aurantiavae. Signata dichotoma
 cum germine foliamentisque flare
 viridia. Foliola haud raro divisa, cu
L. picta hujus vel rectius haud sp.
L. pictae varietus expt. videtur.
 In th: exodo viris et initio aestatis.

culato, apice tereti, glabro, patenti vel subincurvo insidentia. Foliorum lamina lunato-subtriangularis, auriculis 2 longe ciliatis, diametro bilineari, subtus et in disco glabris, margine pilis basi latioribus apice glandulosis, diametrum laminae aequantibus ciliata. Folia axillaria gemina, brevi petiolata, petiolo glabro trilineari, lamina conformi. Flores in racemum subpaniculatum dispositi. Pedicelli glandulis brevibus obtecti, primarii circiter pollicares, secundarii 2-3 lin. longi, erecti vel subpenduli, deflorati semper erecti. Bractee ad basin pedicellorum, minimae, ciliatae. Sepala ovata, acuta vel sublanceolata, 2 lin. longa, extus glanduloso-pubescentia, margine fimbriato-ciliata, ciliis apice glanduligeris. Petala late obovata, sepalis triplo longiora et multo latiora, apice denticulata, purpurea. Stamina calyce breviora; filamentis glabris; antheris subrotundis. Ovarium subsphaericum. Styli capillaceo-multifidi, longitudine staminum. Semina immatura arcuatum caudata, membranaceo-arillata, parte crassiore dilatato calyculata, oblique truncata.

Obs. Proxime accedit ad sequentem, differt vero caule multo robustiore foliisque non orbiculatis. A *Drosera peltata* Sm. (Labill. Nov. Holl. Vol. I. tab. 106 fig. 2) facile distinguitur caule robustiore, foliis radicalibus nullis, caulinis fasciculatis et floribus multo majoribus.

16. ***Drosera filicaulis* Endl.** caule erecto flexuoso glaberrimo, foliis caulinis alternis longe petiolatis, axillaribus geminis peltatis orbiculatis, racemo terminali paucifloro glabro, bracteis ciliatis, petalis sepala obtusiuscula puberula ciliata plus duplo superantibus. Endl. in Enumerat. plant. Hügel. pag. 6. n. 16.

In locis uliginosis inter frutices prope oppidulum Perth, d. 1 m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1988.

Caulis pedalis et ultra, purpureo-nitidus, basi bulbosus et tunicatus. Racemus pauciflorus. Filamenta calyce breviora; antheris oblongis. Styli capillaceo-multifidi.

17. ***Drosera gigantea* Lindl.** caule erecto paniculato glaberrimo, foliis brevi petiolatis peltatis triangularibus, longissime fimbriatis, axillaribus geminis fere aequilongis, panicula laxa multiflora, alabastris subrotundis, petalis sepala acuta glaberrima superantibus. Lindl. Swan-River Bot. pag. XX. n. 88.

In locis turfoso-arenosis aquaticis inter frutices prope oppidulum Perth, d. 1 m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1991.

Radix perpendicularis tunicata. Caulis basi simplex apice paniculatus, erectus $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, subangulatus, glaberrimus, squamosus: squamis lanceolatis vel lineari-lanceolatis in parte caulis inferiore aggregatis, apicem versus sparsis. Folia peltata, non cauli sed ramis tantum insidentia, internodiis circiter pollicaribus sejuncta. Petiolus folii longioris 4-5 lin. longus, illi foliorum axillarium paullo breviores. Lamina triangularis, duas fere lineas lata, fimbriato-ciliata: ciliis ex angulis 2 inferioribus egredientibus longissimis, lamina duplo longioribus. Rami inferiores apice subramoso 10-20-flori, paniculam laxam formantes superiores sensim breviores pauciflori. Flores parvi, albi, pedunculo brevi lineari glabro insidentes. Calycis glabri sepala ovata, acuta, lineam longa, petalis ovato-oblongis subtriplo breviora. Filamenta brevia longitudine fere calycis.

SONDERA Lehm. Pugill. VIII. pag. 44.

Calyx profunde 8-fidus, aequalis. *Petala* 8, hypogynae oblonga vel oblongo-linearia. *Stamina* 8, petalis alterna, filamenta lineari-subulata, antherae extrorsae, biloculares: loculi longitudinaliter dehiscenibus. *Ovarium* uniloculare pluriovulatum placentis parietalibus. *Stylus* terminalis partitus, cruribus penicillato-multipartitis, stigmata obtusa. *Capsula* membranacea, unilocularis, bivalvis. *Semina* linearia, teretia in processum filiformem elongatum attenuata, testa crustacea, basi obliqua superficiei capsulae affixa.

Herbae Australasiacae elegantissimae, *Drosera*-~~typum~~ habitu, caule erecto, foliis alternis infimis squamaeformibus reliquis orbiculatis, petalis glanduloso-pilosis, junioribus circinatis, floribus terminalibus, subsolitariis, albis vel roseis.

1. *Sondera macrantha* Lehm. sepalis ovatis obtusis corolla triplo brevioribus, petalis oblongo-linearibus. Lehm. l. c.

Habitat in solo turfoso-arenoso planitiei prope oppidulum Albany. Herb. Preiss. No. 1979.

Radix bulbosa cum inferiore caulis parte tunicata. *Caulis* 1-1½ pedalis, subflexuosus, subangulatus, glaberrimus. *Folia* infima sessilia, subaggregata, squamaeformia, plana, lineari-lanceolata, 2-3 lin. longa, glabra, superiora petiolata, alterna, interstitio 3-6-lineari sejuncta, axillaria interdum bina sed plerumque deficientia. *Petiolus* 3-4 lin. longus, basi subsulcatus, glaber. *Lamina* semilunaris, excentrice peltata, supra margineque glanduloso-ciliata, subtus glabra. *Flores* terminales gemini, longe pedicellati: pedicellis glabris, ultra pollicem longis. *Calycis* lacinae ovatae obtusae, 3 lin. longae, glabrae, margine glandulosae, siccitate nigrescentes. *Petala* oblongo-linearia, prope basin attenuata, 7-8 lin. longa, in planum exsiccata rosea, striis longitudinalibus saturatioribus. *Stamina* calycem subaequantia. Filamenta glabra: antheris subrotundis, longitudinaliter dehiscenibus. *Styli* capillaceo-multifidi. *Capsula* subsphaerica, membranacea, glabra, 3 lin. longa, bivalvis. *Semina* nigricantia, glaberrima, basi obliqua latiori superficie internae capsulae affixa, lineari-subulata, 2 lin. longa, in processum (caudam) filiformem curvatum eadem longitudine attenuata.

2. *Sondera Preissii* Lehm. sepalis ovatis acutiusculis corolla quadruplo brevioribus, petalis oblongis. Lehm. l. c. pag. 45.

Crescit prope oppidulum Perth in locis depressis exsiccatis ad fluxum Cygurnum. Herb. Preiss. No. 1989.

Radix ut videtur bulbosa. *Caulis* erectus, pedalis, subangulatus, subflexuosus, glaberrimus, prope basin foliis sessilibus, squamaeformibus, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, 1-3 lin. longis tectus. *Folia* reliqua omnia petiolata, alterna, internodiis semipollicaribus sejuncta, erecto-patentia, axillaria nulla. *Petioles* glabri, 3-4 lin. longi, teretiusculi, basi latiore subenaliculati. *Lamina* foliorum excentrice peltata, semilunata, lineam longa, vix 1½ lin. lata, subtus glabra, supra margineque glanduloso-ciliata: ciliis marginalibus lamina ipsa longioribus, glandula nigra, subcapitata terminalis. *Flores* terminales, plerumque solitarii, rarius bini. *Calycis* glabri lacinae ovatae, acutae, 1½ lin. longae, siccatae nigrescentes, margine glandulis brevistipitatis ciliatae. *Petala* oblonga, obtusa, versus basin subattenuata, 5 lin.

longa, alba vel subrosea: striis longitudinalibus tenuissimis saturatoribus. *Stamina* calyce subbreviora, lineari-subulata: filamentis glabris, antheris subrotundis, longitudinaliter dehiscentibus. *Ovarium* sphaericum, glabrum. *Styli* capillaceo-multifidi, glabri: stigmatibus obtusis.

BYBLIS Salisb. Endl. gen. no. 5035. Ejusd.
Iconogr. gen. plant. tab. 113. Meisn. gen.
pag. 22. (19.)

1. **Byblis gigantea** Lindl. glanduloso-pubescens, caule erecto flexuoso (sesquipedali), foliis longissimis filiformibus, pedunculis solitariis unifloris axillaribus foliis brevioribus, sepalis lineari-lanceolatis 3-5-nerviis quam petala serrulata duplo brevioribus, stigmatibus simplicibus. Lindl. Swan-River Bot. pag. XXI. n. 92.

In locis arenosis inter frutices planitiei haud longe a praedio rustico „Mad-dington“ ad fluvium Canning, d. 1 m. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1993.

CRUCIFERAE Juss.

(Auctore A. BUNGE.)

STENOPETALUM R.Br. Endl. gen. n. 4920.
Meisn. gen. pag. 13. (13.)

1. **Stenopetalum gracile** Bge. foliis radicalibus inferioribusque caulinis pinnatipartitis; laciniis utrinque 2-3 distantibus linearibus obtusiusculis integerrimis vel dente majusculo auctis, superioribus tripartitis linearibusve integerrimis, racemis florentibus laxis, pedicellis calyce brevioribus demum cernuis, petalis sepala 3plo superantibus (albis), ovario 12-ovulato, silicula ?

In arenosis umbrosis vallis haud longe ab ora maritima Perth, 24. Juni 1839. Herb. Preiss. No. 1938.

A *St. lineari* R.Br. distinctum, uti sequentes, pedicellis demum cernuis, nec erectis. *St. robusto* Endl. affine videtur, at diversum: foliis neutiquam interrupte lyratis, pedicellis brevioribus, floribus majoribus, petalis longioribus. — *Caules* erecti, stricti, solitarii e radice tenui (bienni? vel annua), florentes pedales, diametro ad summum 0,8" metientes, teretes, striati, glabri. *Folia radicalia* 1½-2 pollicaria, pinnatipartita, rhachi lobisque utrinque 2-3, linea angustioribus, linearibus, inferioribus brevioribus, 2" longis, caeteris 4-5" longis, terminali longiore, apice obtusis vel rotundatis, integerrimis vel basi dente majusculo auctis, terminali saepius medio utrinque denticulis 2 brevibus instructo; *caulina* inferiora similia, superiora plerumque tripartita, lobis ut in radicalibus, vel etiam magis elongatis; *summa* et *ramea* linearia.

Racemi gracillimi, multiflori, jam florentes valde elongati, floribus ab invicem 7-10" distantibus. *Pedicelli* lineam longi, erecti, subinde cernui. *Sepala* albida, nervis 3 viridibus tenuissimis picta, infra apicem gibbosa, valvaria 1,7" longa 0,7" lata, placentaria breviora angustiora. *Petala* alba ex toto 6" longa, latiora, strictiora quam in sequentibus, lamina obliqua. *Stamina* calycem subaequantia. *Glandulae* hypogynae valvariae fere subulatae. *Ovarium* 12-ovulatum. Fructus, vel juniores, desunt.

2. ***Stenopetalum croceum* Bge.** foliis radicalibus inferioribusque pinnatifido 3-5-lobis; lobis lineari-spathulatis, summis linearibus integerrimis, racemis florentibus laxis, pedicellis calyce dimidio brevioribus demum cernuis, petalis sepala quadruplo superantibus (croceis) ovario 12-ovulato, silicula orbiculato-obovata pedicellum superante.

In arenosis sylvae haud longe ab oppidulo Perth, 13. Dec. 1838. Herb. Preiss No. 1939.

A praecedente facile distinctum florum colore, petalis angustioribus longioribus contortes. — *Caules* basi violacei, fructiferi altitudinem pedalem haud excedentes, plerumque humiliores. *Folia radicalia* fere omnia perdita, e rudimentis videntur similia sed minus dissecta ac in antecedente caulina omnia linearia. *Racemi* elongati. *Pedicelli* florum linea vix longiores. *Sepala* valvaria obovato-oblonga, albida, infra apicem extus gibba viridula, late membranaceo-marginata, 1,9" longa, basi in saccellum producta placentaria 1,7" longa, superne 0,8" lata, basi cuneata, apice obtusata. *Petala* crocea, unguiculata, lamina in appendiculum lineari-lanceolatum apice circinnatum longe producta, basi crispato-marginata, exteriora videntur paulo longiora, omnino explanata, 8" longa, (unguiculo 1", lamina 1", appendice 6" longis). *Filamenta* longiora sepala aequantia. *Glandulae* hypogynae valvariae utrinque binae, obovatae, placentariae nullae. *Ovarium* oblongum stamina subaequans, 12-ovulatum. *Stigma* sessile, capitatum, obsolete bilobum. *Silicula* (nondum omnino matura) 1,9" longa, 1,5" lata, obovato-suborbicularis, valvis convexiusculis, reticulato-venosis. *Semina* in loculis 2-3 (immatura) obovata, laevia, fusca. *Dissepimentum* tenuissime dense reticulato-areolatum, plica opaca, apicem versus evanida medio percursum.

3. ***Stenopetalum minus* Bge.** foliis radicalibus inferioribusque basi cuneatis obovato-oblongis inciso-dentatis, lobis utrinque 2-3 obtusis distantibus, summis lineari-oblongis integerrimis, racemis florentibus abbreviatis, pedicellis calyce brevioribus demum cernuis, petalis sepala duplo superantibus (croceis), ovario 8-ovulato, silicula

Ad Princess Royal Harbour Dec. 1840. Herb. Preiss, No. 1936.

Cum *St. croceo* convenit floris colore; ab hoc vero et *St. gracili* differt statura humili, petalorum longitudine et ovario. — *Radix* simplex, annua (vel biennis?). *Caules* solitarii, (vel in unico specimine, ex una radice plures laterales duo videntur steriles subaphylli?) basi puberuli, vel glabri, florentes 3-4 pollicares. *Folia radicalia* et *caulina infima* fere rosulata, pollicaria, cum dentibus 3-4" lata, dentibus lobisve linea paulo longioribus, lanceolato-triangularibus, subcurvatis, obtusiusculis; *superiora* angustiora dentibus minoribus, caulina caetera pauca, 5" longa, lineam lata, integerrima. *Racemi* terminales et axillares, florentes 1-1½ pollices longi, ebracteati, vix ultra 10 flores gerentes. *Pedicelli* lineam vix aequantes, ante petalorum expansionem erecti mox nutantes. *Flores* omnino praecedentis, at minores. *Sepala* breviora latiora, valvaria 1,5" longa, 0,9" lata, placentaria paulo breviora et angustiora. *Petala* 1,2" longa, appendice 2,2". *Ovarium* videtur 8-ovulatum. *Fructus* desunt. *Glandulae* valvariae tenuiores magis elongatae.

MENKEA Lehm. Ind. sem. in h. Hambg. 1843
collect. pag. 8.

(Nov. genus e Camelinearum tribu.)

Sepala quatuor, obovata, patula, basi aequalia. *Petala* 4 calycem aequantia, unguiculata, obovato-oblonga, integra. *Stamina* 6 tetradynama inclusa. *Glandulae* hypogynae. *Ovarium* suborbiculatum, stigmatibus sessilibus. *Silicula* sessilis obovato-oblonga, utrinque subacutata, plano-compressa, bivalvis, septo ad marginem angustissimum reducto, unilocularis. *Valvae* uninerviae, reticulato-venosae. *Placentae* inclusae filiformes. *Semina* minutissima, in funiculis setaceis elongatis, in toto placentarum ambitu horizontalibus, numerosa, quadriseriata, suborbiculata immarginata, striatim verruculosa. *Cotyledones* incumbentes.

Genus distinctissimum, affine ex characteribus *Orobio* et *Eudemati*, ex habitu *Stenopetalo*; ab *Orobio* differt seminibus numerosis quadriseriatis, funiculis horizontalibus ex toto placentarum ambitu ortis, nec paucis ex apice pendulis; ab *Eudemate* seminibus quadriseriatis et stigmatibus sessilibus, ab utroque habitu; a *Stenopetalo* petalis, et *Silicula* uniloculari.

1. Menkea australis Lehm. l. c.

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 1937.

Herba aquosa, debilis, glabra, habitu *Drabae vernae*. *Caules* 1-3 pollicares pluresque, teretibus simplici, exili, simplices vel ramo aucti, oligophylli. *Folia* radicalia obovato-spathulata integerrima caulinum unum alterumve, rarius plura, spathulato-oblonga, in petiolum brevem angustata. *Racemi* pauci (6-7) flori, ebracteati, laxi. *Flores* fugaces suaveolentes, minutissimi, 0,5" longi latique, pedunculati. *Sepala* obovata. *Petala* alba acutiuscula, calycem vix excedentia. *Antherae* pallide violaceae. *Stigma* sessile, bilobum. *Pedunculi* fructiferi laxi, elongati, 4-5" longi, filiformes. *Silicula* 2,5" longa, supra medium 1,3" lata, basin versus angustata, apice stigmatibus sessilibus, subacutata, facillime dehiscens; valvis delapsis persistunt placentae, latere interiore tenuissimum marginem hyalinum, dissepimenti rudimentum, gerentes, et funiculis horizontalibus inaequilongis numerosis (ultra 50) quasi fimbriatae. *Semina* 0,1" lata, paulo longiora, rufula, verruculoso-striata, 4 vel pluriseriata. *Cotyledones* stricte incumbentes.

MONOPLOCA Bge. (Lepiae sp. Desv. Journ.
bot. 166 et 181? Lepidii et Iberidis sp.
DC. Prodr. II. 537.

Sepala 4, oblonga, erecta, basi aequalia. *Petala* 4, obovata, aequalia, integra, obtusa. *Stamina* tetradynama, edentula libera. *Glandulae* hypogynae 4 valvares. *Ovarium* obcordatum, biovulatum, stylo elongato; stigma capitatum. *Silicula* a latere compressa suborbiculata, profunde bifida, bivalvis, valvis navicularibus dorso alatis, stylo inter alas libero, bilocularis, loculis

monospermis. *Dissepimentum* crassiusculum spongiosum, medio pellucidum, transverse rugosum. *Semina* pendula. *Cotyledones* dissepimento applicatae et parallelae, transversim ad basin semel plicatae, rostello longiores illique parte superiore incumbentes, apice subinflexae.

Obs. Embryonis structura distinguenda ab *Iberide* et *Lepidio* quibus cum convenit siliculis angustiseptis dispermis dehiscentibus. A *Lepia* (*Lepidii* sectione) differt insuper stylo omnino libero, elongato et dissepimenti structura. *Cotyledones* omnino ut in *Sennebiera*, *Subularia*, *Stroganovia* et *Lachnoloma*, a quibus differt valvis navicularibus alato-carinatis. Structura embryonis in veris *Diplecolobeis*: *Brachycarpaea*, *Chamiræ* *Heliofila* et *Cycloptychi* longe aliena, in his enim cotyledonis sunt vere bis plicatae in illis semel tantum, ad basin.

1. ***Monoploca rotunda* Dew.** caulibus angulatis asperulis, foliis oblongo-linearibus. Dew. l. c. (sub *Lepia*.) *Lepidium* rotundum. DC. l. c. Endl. in Hügel Enum. plant. pag. 5. In arenosis prope oppidulum Freemantle, 7. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1941.

2. ***Monoploca linifolia* Dew.** caulibus teretiusculis striatis, foliis anguste linearibus. Dew. l. c. (sub *Lepia*.) *Iberis* linearifolia. DC. syst. 2. pag. 405.

In limoso-arenosis porrectis circa urbiculum York, 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2070.

Hanc alteram, priori valde affinem, nec forsan specie distinctam, quamvis fructu maturo caret, sine ullo dubio huc traho. Utriusque habitus omnino idem, *Iberidem* potius, quam *Lepidium* aemulans. Hoc in *arenis* 3-4' altae, *caulibus* strictis rigidulis; prior robustior, (quia *caulis*?) caulibus exquise angulatis, asperulis, sub lente valida ad angulos divergentis cartilagineis minutis quasi muriculata; alterius caules multo tenuiores (quia planta junior, florens?) teretiusculi striati, vix ac ne vix quidem exasperati. *Folia* prioris pollice longiora 1-1½" lata, basi angustata, apice fere cuspidata, alterius fere filiformi-linearita, inferiora pollice longiora 0,5" vix lata. *Racemi* terminales 10-20 flori, laxiusculi, ebracteati. *Flores* (in *M. linifolia* tantum visi) albi, sesquilineares. *Petala* calycem parum excedentia. *Siliculae* maturae (in *M. rotunda* solummodo visae) pedicello depresso-plano horizontali 1,8" longo suffultae, adscendentes, extus convexae intus concavae, 3" longae, 2,3" latae, basi rotundatae, apice profunde bifidae, lobis (valvarum alis parum divergentibus. *Valvae* reticulato-venosae, alatae; ala superne loculum latitudine aequans; lineam ultra loculum producta. *Placentae* lineares crassiusculae, 2" longae. *Stylus* persistens 0,5" longus. *Semina* lapsis valvulis diutius persistunt, pendula, 1" longa, 0,7" lata, humefacta mucilagine multa obducuntur, uti semina *Lepidii sativi*.

LEPIDIUM (L.) R.Br. Endl. gen. n. 4932. Meisn. gen. pag. 14. (13.)

1. ***Lepidium (Dileptium) impressum* Bge.** glaberrimum; siliculis pedicello brevioribus ovato-oblongis emarginatis stigmate vix prominulo quasi truncatis, floribus corollatis tetradynamis, foliis carnosulis: inferioribus lineari-oblongis basi integerrimis a medio ad apicem remote inciso-

dentatis; dentibus acutis, superioribus angustioribus utrinque acutis 1-2 dentatibus integerrimisve, novellis subtus glaucis tenuissime impresso-punctulatis, caule erecto anguloso folioso ramoso, ramis patulis.

In arenosis prope oppidulum Freemantle, Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1942.

Ex specimine unico incompleto, et Diagnosi brevi cl. Desvauz adjudicari nequit, an nostra planta sit eadem cum *L. hyssopifolio* Desv.; cui sane propius accedit quam ad alias generis, e Nova Hollandia ortas, species. Neque enim diagnosis *L. foliosi* Desv. quadrat nostram plantam, licet siliculis majusculis cum illo convenit. — Specimen nostrum praebet *caulis* robusti partem superiorem, basi fere crassitie pennae anserinae, 8 pollicarem in ramos divisum, cum rhachi racemi primarii oppositifolia, quadripollicari superstiti, racemis ramos ramulosque paucos terminantibus fructus maturos gerentibus brevioribus. *Caules* ramique glaberrimi, angulosi foliis numerosis obtecti. *Folia inferiora* bipollicaria, crassiuscula, 4" lata, supra medium dentibus magnis remotis 5-6 incisa, penninervia, nervis subtus valde prominulis; *superiora* breviora, angustiora, parcius dentata vel integerrima, in ramulo novello juniora glauca, subtus sub lente punctis minutis impressa. *Flores* linea dimidia minores; sepalia glabra, obtusa, albo-marginata. *Petalula* minuta, in unico alabastro, quod examinare licuit, duo tantum extrorsum sita, interiorum vix vestigium ullum. *Stamina* 6, tetradynama. *Stigma* sessile. *Silicula* pedicello subpatulo bilineari et quod excurrit insidens, 1,8" longa, infra medium 1,2" lata, ovato-oblonga, apice emarginata, stigmate subsessili emarginaturam explente quasi truncata. *Valvulae* apice obtusae. *Placentae* basi dilatato-saccatae. *Semina* rufa, linea paulo breviora, dimidiam lata, obovato-oblonga. *Cotyledon* altera radiculae incumbens ad basin plicata, altera recta.

2. ***Lepidium (Dileptium) puberulum* Bge.** siliculis pedicellum aequantibus oblongo-obovatis brevissime emarginatis, stigmate exserto, floribus apetalis 2-4-andris, foliis subtus margineque tenuissime setulosis; inferioribus in petiolum longe attenuatis oblongis utrinque grosse inciso 4-5-dentatis; dentibus subaequalibus acutissimis, summis linearibus integerrimis, caule tereti simplici erecto vel ramoso decumbente pedicellisque dense puberulis, radice annua.

In rupibus calcareis insulae Rotenest, 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1940.

A *L. piscidio* Forst. quocum e Diagnosi Candolleana (Prodr. I. pag. 206) silicularum forma convenit, foliis omnibus, praeter summa, grosse incisis differt; a caeteris affinibus siliculis evidenter obovatis distinctum, praesertim a *L. omayhiensi* Cham. et Schl., cujus stigma insuper inclusum. *Specimina* plurima omnino desflorata, foliis orbata, caulibus erectis, strictis, 3 pollices et quod excurrit altis, superne in racemos fructiferos plures divisos; *pedicelli* erecti, puberuli, 1" longi. *Siliculae* glabrae pedicellum longitudine tantisper superantes, supra medium 0,8" latae, basi acutae, apice latiuscule emarginatae, stylo vix ullo, stigmate ex emarginatura prominente bilobo. *Valvulae* naviculares, carinatae, apice obtusae. *Placentae* filiformes, basi aequales. *Semina* rufa 0,5" longa, 0,3" lata. *Specimen* unicum simul folia, flores et fructus gerens pubescentia et silicularum forma exacte cum illis convenit, sed robustius, multicaule, caulibus decumbenti-divaricatis. *Folia radicalia et caulina inferiora* in petiolum semipollicarem attenuata, lamina 8-9" longa, 4" lata, oblonga, utrinque dentibus 4-5 magnis, acutis, interdum ad basin denticulo auctis, incisa; *superiora* lineari-oblonga, brevius petiolata, lamina longiore, 1,5" lata, dentibus minoribus distantibus incisa, summa linearia, integerrima. *Flores* minutissimi, 0,3" longi, sepalia oblonga, extus hirsutiuscula. *Petalula* nulla video. *Antheras* plerumque duas tantum in alabastris inveni,

rarissime quatuor. *Siliculae* omnino ut in caeteris speciminibus, at pedicello paulo longiori (1,5^m) insidentes.

RANUNCULACEAE Juss.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

CLEMATIS Linn. Endl. gen. n. 4768.

Meisn. gen. 1. (1.)

Sect. **FLAMMULA** §. 2. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 4.

1. **Clematis linearifolia** Steud. caule scandente striato angulato ad nodos praesertim piloso; foliis longe petiolatis biternatis; foliolis linearibus sublanceolatis basi pilosulis uninerviis; floribus dioicis umbellatis axillaribus; pedicellis folio brevioribus trifloris cum flore intermedio, bracteatis ad basin umbellulae lanceolatis sepalisque piloso-sericeis.

In arenosis sylvae Pointwater et insulae Rotenest, 18. Jul. 1839. 24. 5. Herb. Preiss. No. 1343.

Caulis ramosissimus, flexuosus, scandens, profunde striatus hinc angulatus, obsitus pilis sparsis patentibus ad internodia plus minus incrassata copiosis; petioli communes 2-3 pollicares, patentes, apice divisi, in partiales 2-3 pollicares et longiores, trifoliatos; *foliola* 1-1½ pollices longa, vix 2 lineas lata, pallida, basi et apice attenuata, uni-vel obscure trinervia; *flores* in axillis foliorum pseudo-umbellato-paniculati; *pedicelli* inaequales cum floribus dense piloso-sericei; bractae ad basin pedicellorum, 2 lineas longae; flores fructiferi desunt.

2. **Clematis indivisa** Willd. floribus paniculatis, foliis ternatim sectis, segmentis ovatis integerrimis mucronatis coriaceis glabris. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 5. n. 38. Willd. spec. plant. 2. pag. 1291.

In solo limoso sylvae ad fluvium Vasse-River, provinciae Sussex, 17. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1345.

3. **Clematis discolor** Steud. caule scandente striato angulato ad internodia pubescente; foliis longe petiolatis ternatis, foliolis petiolulatis ovatis nervosis glabris integerrimis subtus glaucis; floribus axillaribus paniculatis dioicis, petiolo communi pedunculo brevioris pedicellisq. sericeo-pilosis.

In limoso, calculosis sylvae Halfwayhouse, 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1344.

Caulis ramosus, flexuoso-scandens, angulato-striatus, pilis sparsis patentibus ad internodia parum incrassata copiosioribus; *petioli* basi plus minus pubescentes sursum glabri; *foliola* 1½ pollices longa, dimidiam lata, subcoriacea, margine subundulata, subtus glauco-albida, utrinque glaberrima, laxa

Wortorum aliquotum prope Taurundam.
Anno 1848.

Cardamine Tarmanxia Forst. Muell.
 foliis petiolatis glabris, inferioribus
 pinnatifidis, segmentis perfoliatis
 oratis oblongisve dentatis cum im-
 pennis ^{unicis} apice, superioribus lance-
 olatis, ^{unicis} racinis e longatis, siliquis
 in pedicellis duplo brevioribus ^{parentibus} ^{foliis}
 dentibus erectis rostratis f. 1/2 longis
 truncatis. Jan. 1849.

within H.C. St. nov. Hall in N. pl. ♂
Jag. & Port Phillips in N. pl. ♂
Port Phillip Jason. Mar 12. 92.
port Lincoln much common in winter months at present
very large

(appendiculata)

C. l. ^{hand} ~~Siemianowicz~~ ^{hand} ~~Jurine~~ ^{hand} ~~St. Petersburg~~
 20' *Anthuris ovatus* ^{hand} ~~fr. v. tridens~~ #
 a l. *aristata* ^{hand} ~~nov. v. vidua~~
^{musy - riv. Jan. 1849. M. V. J. # n. 304}
~~*P. integrifolia* ^{hand} ~~factus~~~~
~~*Incaulopsis* ^{hand} ~~bractea a lat. nit.~~~~
~~*concoloribus* ^{hand} ~~concoloribus~~~~
~~*sepalis* ^{hand} ~~sepalis~~~~

reticulato-venosa; *flores* axillares paniculati; *petala* lineari-oblonga, sub-pollicaria, extus praesertim sericea; *antherae* connectivo 1-1½ lineas producto superatae; *flores* foemineae desunt. ♀.

Praecedenti, uti sequens, proxima.

4. **Clematis cognata** Steud. caule scandente glaberrimo angulato-striato; foliis ternatis petiolatis, foliolis petiolulatis ovatis vel ovato-oblongis coriaceis glabris obscure nervosis; floribus paniculatis axillaribus folio brevioribus; carpellis ovato-lanceolatis pubescentibus, caudis elongatis longe pilosis.

In littore arenoso sinus Middelbowsbay, ditionis Plantagenet, 30. Sept. 1830. Herb. Preiss. No. 1346.

RANUNCULUS Hall. Endl. gen. n. 4783.

Meisn. gen. 1. (1.)

Sect. IV. HECATONIA. §. 4. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 33.

1. **Ranunculus plebejus** Brown. caule rectiusculo dichotomo basi petiolisque patentim pilosissimo apice subglabro, foliis 3-sectis villosis, segmentis petiolulatis ovatis inciso-dentatis, summis linearibus integris, calyce subreflexo. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 39. n. 118.

In regionibus interioribus Australasiae meridionali-occidentalis, 18. Nov. 24. Herb. Preiss. No. 1348.

2. **Ranunculus discolor** Steud. caule erecto dichotomo basi petiolisque patentim pilosissimis apice subglabro; foliis patenti-villosis trisectis subtus albescens, segmentis lateralibus brevius (medio longius) petiolulatis tri- (rarius bi-) partitis, laciniis inciso-dentatis, summis linearibus; calycibus reflexis carpellis glabris obliquis marginatis stylo acuminato terminatis.

In arenosis umbrosis sylvaticis haud procul ab ore maritima, in districtu Perth, 23. Sept. 1839. 24. Herb. Preiss. No. 1347.

Caulis 3-pedalis et ultra, fistulosus, striatus, internodiis 6-10 pollices distantibus, pilis basi tuberculis minutis insidentibus, 1-1½ lineas longis obsitus; *folia inferiora* longissime petiolata, petiolus basi dilatata impresso-striatus, semiamplexicaulis, uti caulis pilosus, 4-5 pollicaris; *folia superiora* breviter petiolata, summa sessilia; folia ternato-secta, foliola trisecta, segmenta 2-4 ter inciso-dentata, superiora simpliciora, trisecta trifido-dentata; *sepala* reflexa, longe pilosa, *petala* lutea, ovato-oblonga, striata; *carpella* in disco glabra, ad marginem incrassatum pilosa, in stylum uncinatum carpellis paucobreviorem terminata.

DILLENiaceae DeCand.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

PLEURANDRA Labill. Endl. gen. n. 4754. Meisn. gen. 2. (5.)

1. **Pleurandra enervia** DC. caule a basi ramoso, ramis strictis glabris; foliis anguste linearibus planis acutiusculis glabris; floribus in ramulis brevissimis sessilibus; sepalis ovatis ovariisque glabris. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 72. n. 16. ♀.

In arenosis fruticosis sylvae ad radices montis Parker, districtus Plantagenet, 9. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2155 et in turfoso arenosis clivuli prope villam Albany, districtus Plantagenet, 21. Dec. 1840. No. 2163.

Frutex $1\frac{1}{2}$ - 2-pedalis, a basi ramosus; *rami* erecti, subangulosi, fusco-cinerei, cortice facile secedente; *folia* interstitiis breviora, subfasciculata non immediate e ramo, sed plerumque mediante ramulo brevissimo ($\frac{1}{2}$ - 1 lineam longo) erumpentia, $1\frac{1}{2}$ - 4 lineas raro excedentia, glabra, subtrigona, enervia, saepissime florem sessilem foliis brevioris foveantia; *sepala* ovata, obtusa, mucronulata; *flores* pallide lutei. No. 2155.

Non differt nisi foliis paulo majoribus 5 lineas longis, floribus rarioribus, sepalis magis acuminatis. Etiam *P. riparia* Sieb. No. 150 vix differre videtur.

2. **Pleurandra recurvifolia** Steud. caule ramosissimo humili (vix pedali) ramis erectiusculis; foliis sparsis subapproximatis glaucescentibus brevibus (4 lineas longis) glabris rigidiusculis crassiusculis margine puncticulato-scarbris apice recurvo fasciculo pilorum brevissimorum deciduo terminato; floribus axillaribus sessilibus; sepalis ovatis puncticulatis; ovariis villosis. ♀.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup, districtus Kent, 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2170.

Fruticulus ex trunco crasso lignoso radicali mox ramosus, ramis erectis sursum ramulosis; *folia* in ramis primariis delapsa in ramulis laxè imbricata, apice distincte recurva, submucronulata, praeterea sub lente valida, pilis aliquod confertis brevibus mox deciduis, hinc in pluitibus deficientibus terminata; *pedicelli* folio longiores; *sepala* obtuse mucronulata, puncticulata, caeterum glabra.

3. **Pleurandra glaucophylla** Steud. caule ramoso glabrò, ramulis teretibus tenue pubescentibus; foliis subfasciculatis glaucis brevibus (3-4 lineas longis) rigidiusculis crassiusculis glaberrimis apice obtuso vel vix conspicue recurvato-mucronulato; floribus axillaribus sessilibus; calycibus bracteolis 1-2 accessoriis munitis, sepalis ovatis ovariisque glabris. ♀.

In arenosis prope Avon-Dale, districtus York, 10. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 2159.

R. colonorum Endlicher forte:
R. lasiocarpa Endl. var.
 forma humilior acutalobis
 In Hammondi herb. bot. et her.
 phyll. - val., Jul. 23. 1844.
 In pratis opimis
 Specimen novum et videtur distinctissimum
 mandistingui ab antecedente ha-
 bitu magiore firmitate, hinc ma-
 gis membranacea circumdata.
 et pinnatifida circa rad. radicali
 has distictio non determinanda
 In granivosis quid urbanis
 et silicibus (sanguineis proclaudis)
 Petala extra rubella. et in
 forma monomorphis. *R. lasi-*
ocarpa, cui affinis quatuor
 alii huius generis perhibentur
 in herb. Gratiola velleit.
 frequentissime in granivosis.
 Etiam *R. plebeia* cognatus
 communis in Germania, hb. N. 697

Pleurandra ovata Labillard.
 In insula Van Diemen Land.
 hb. St. sin. nov. num. 57
 5-8. *R. fragrans* arbt. Murray, hb. N. 11
 oolong. *R. fragrans* arbt. Murray, hb. N. 11
 uti *R. fragrans* arbt. Murray, hb. N. 11
 2. *R. fragrans* arbt. Murray, hb. N. 11

In insula Van Diemen Land.
 hb. St. sin. nov. num. 157. (C. Stuart
 loco legit nunc Mayo 1848. —
 Nilo-river, omni aetate 2' hb. N.
 N. 16. Murray-river. 1' Jan 10. 48.
 N. 329. Fitamentorum longitudine aetate
 aetate, proposita Th. St. Pauli nov. 1848.

Elysiurus minimus, L. 762
 In locis humidis aruosis ad
 R. Murray 16 milleas. ab oppo.
 Oct. 1848. Mix a fovea Europaea
 vivax et portasse ingesta. Hirs.
 in austr. Th.

f) *Staurandra* § 2. *Stigmaria* Dougl.
Staurandra gr. var.

all (usually) given away.

* O. sericea Lk. Bn. Hb. St. n.

George merr. pumila natalis. Hb. Jacq. n. 1

12954.

ad stat. p^{re}fixione^m loci natali:
ante curiam a portu Philippi,
ubi etiam H. Krocaphila

ad. muray, Oct. 1848 - From flat, N. Vancouver
(River) Bay, Aug. 19, 1848. *Stomach* *muray*
urged 11. *St. 1* *large* 2. *St. 2* 2' *large*
urged 11. *St. 3* *large* 2. *St. 4* 2' *large*
urged 11. *St. 5* *large* 2. *St. 6* 2' *large*
urged 11. *St. 7* *large* 2. *St. 8* 2' *large*
urged 11. *St. 9* *large* 2. *St. 10* 2' *large*
urged 11. *St. 11* *large* 2. *St. 12* 2' *large*
urged 11. *St. 13* *large* 2. *St. 14* 2' *large*
urged 11. *St. 15* *large* 2. *St. 16* 2' *large*
urged 11. *St. 17* *large* 2. *St. 18* 2' *large*
urged 11. *St. 19* *large* 2. *St. 20* 2' *large*
urged 11. *St. 21* *large* 2. *St. 22* 2' *large*
urged 11. *St. 23* *large* 2. *St. 24* 2' *large*
urged 11. *St. 25* *large* 2. *St. 26* 2' *large*
urged 11. *St. 27* *large* 2. *St. 28* 2' *large*
urged 11. *St. 29* *large* 2. *St. 30* 2' *large*
urged 11. *St. 31* *large* 2. *St. 32* 2' *large*
urged 11. *St. 33* *large* 2. *St. 34* 2' *large*
urged 11. *St. 35* *large* 2. *St. 36* 2' *large*
urged 11. *St. 37* *large* 2. *St. 38* 2' *large*
urged 11. *St. 39* *large* 2. *St. 40* 2' *large*
urged 11. *St. 41* *large* 2. *St. 42* 2' *large*
urged 11. *St. 43* *large* 2. *St. 44* 2' *large*
urged 11. *St. 45* *large* 2. *St. 46* 2' *large*
urged 11. *St. 47* *large* 2. *St. 48* 2' *large*
urged 11. *St. 49* *large* 2. *St. 50* 2' *large*
urged 11. *St. 51* *large* 2. *St. 52* 2' *large*
urged 11. *St. 53* *large* 2. *St. 54* 2' *large*
urged 11. *St. 55* *large* 2. *St. 56* 2' *large*
urged 11. *St. 57* *large* 2. *St. 58* 2' *large*
urged 11. *St. 59* *large* 2. *St. 60* 2' *large*
urged 11. *St. 61* *large* 2. *St. 62* 2' *large*
urged 11. *St. 63* *large* 2. *St. 64* 2' *large*
urged 11. *St. 65* *large* 2. *St. 66* 2' *large*
urged 11. *St. 67* *large* 2. *St. 68* 2' *large*
urged 11. *St. 69* *large* 2. *St. 70* 2' *large*
urged 11. *St. 71* *large* 2. *St. 72* 2' *large*
urged 11. *St. 73* *large* 2. *St. 74* 2' *large*
urged 11. *St. 75* *large* 2. *St. 76* 2' *large*
urged 11. *St. 77* *large* 2. *St. 78* 2' *large*
urged 11. *St. 79* *large* 2. *St. 80* 2' *large*
urged 11. *St. 81* *large* 2. *St. 82* 2' *large*
urged 11. *St. 83* *large* 2. *St. 84* 2' *large*
urged 11. *St. 85* *large* 2. *St. 86* 2' *large*
urged 11. *St. 87* *large* 2. *St. 88* 2' *large*
urged 11. *St. 89* *large* 2. *St. 90* 2' *large*
urged 11. *St. 91* *large* 2. *St. 92* 2' *large*
urged 11. *St. 93* *large* 2. *St. 94* 2' *large*
urged 11. *St. 95* *large* 2. *St. 96* 2' *large*
urged 11. *St. 97* *large* 2. *St. 98* 2' *large*
urged 11. *St. 99* *large* 2. *St. 100* 2' *large*
urged 11. *St. 101* *large* 2. *St. 102* 2' *large*
urged 11. *St. 103* *large* 2. *St. 104* 2' *large*
urged 11. *St. 105* *large* 2. *St. 106* 2' *large*
urged 11. *St. 107* *large* 2. *St. 108* 2' *large*
urged 11. *St. 109* *large* 2. *St. 110* 2' *large*
urged 11. *St. 111* *large* 2. *St. 112* 2' *large*
urged 11. *St. 113* *large* 2. *St. 114* 2' *large*
urged 11. *St. 115* *large* 2. *St. 116* 2' *large*
urged 11. *St. 117* *large* 2. *St. 118* 2' *large*
urged 11. *St. 119* *large* 2. *St. 120* 2' *large*
urged 11. *St. 121* *large* 2. *St. 122* 2' *large*
urged 11. *St. 123* *large* 2. *St. 124* 2' *large*
urged 11. *St. 125* *large* 2. *St. 126* 2' *large*
urged 11. *St. 127* *large* 2. *St. 128* 2' *large*
urged 11. *St. 129* *large* 2. *St. 130* 2' *large*
urged 11. *St. 131* *large* 2. *St. 132* 2' *large*
urged 11. *St. 133* *large* 2. *St. 134* 2' *large*
urged 11. *St. 135* *large* 2. *St. 136* 2' *large*
urged 11. *St. 137* *large* 2. *St. 138* 2' *large*
urged 11. *St. 139* *large* 2. *St. 140* 2' *large*
urged 11. *St. 141* *large* 2. *St. 142* 2' *large*
urged 11. *St. 143* *large* 2. *St. 144* 2' *large*
urged 11. *St. 145* *large* 2. *St. 146*

N. cinerea B. Fr.

Providence Bay Nov 1847.

Feb. 20. In moult. Light.

Apr 28. 1847. In woods Toronto

Mar 3. 1848. L. Bethal. Jun. 29

1848. Flores di Trini, putala abnormale.

Per totum hoc annum floruit. In locis
montanis virilibus frequenter

Ad hunc alia quidem tractat
deficiunt?

Parviflora! F. Bn

Charact. vobis excellantibus exacte
diagnosi & desor. 10. quadrat, sed notas
hquentes addo: Diffusa vel decumbens
caulis elongatis. Corolla facies ob-
^{longa}longa. ^{oblonga}oblonga. ^{oblonga}oblonga. ^{oblonga}oblonga.
prodiffilis. ^{oblonga}oblonga. ^{oblonga}oblonga. ^{oblonga}oblonga.
estratrisia. Diebu Ray? Oct 1848.

Atque omnino cetera. Specimina
habeo in herb. meo, huius speciei
gracissima & *P. virgatae*.

Les natal. neufs

18. *P. virgata* nostram videtur
pertinere.

+7) *Gincum Pleuranthae et Hibbertiae*
conjunctionem propono.

Staurandra aricularis La B. & H.

At river Sacas, near Port Townsend, bl. 11.945 Peré.

In arnoso lapidosis ad portum Lincoln.

virgata ! f. Mill

caule ~~vagata~~ ^{ramosa} ramosa, ramis
confundentibus striatis ramosi-
geris, ramulis crebris brevibus
fines, foliis in his imbricatis
in cellis parvis patentibus
omnibus exacte linearibus ob-
tusis stellata tenuissime peribus
auxiliis margine revolutis, flo-
ribus in ramulis terminalibus
numeratis, pediculis calia
suprautibus, ^{ut in brevibus} spalis et triconibus
lato lacceolatis intercoribus ca-
libes attenuato apiculatis !

frutic 2-3 pedales !

In montanis prope Tass Creek.
Jul. 1848. floribus non evolutis.

P. acrotrocha autiponensis.

P. striata Schmidt canadensis aff. P. aff.

P. striata Dr. a. et W. L. Latta

namquam vidi

striata ! Dr. ^{in h. varietatibus, sapientibus}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

striata Dr. ^{et f. in v. d. L. aff. - n. n. n.}

~~V. acicularis La Billardiere~~

peruviana (Mull.)

namque solusque gladius, hic spatio

114 *Lingulellus acutus* *pyrena* *habri* ^{habri}

var. Kalk. Sub margini revolutis. No

sub
sebae, *cap*, *Rebus*, *regalis* *crantes*

verminderter Glanz weniger

membraeaeis ovarii Hillosi

L. longiribus

16 & 17 April 1913. B. K. & B. K.

200000. Dec 1844. *fraxinosa*
Platanus *calycina* *fraxinosa*

15 *Adans. caly. m. 66 p. 28 m. 15*
Comm. baccharis 1 *Siber*

Aspid. varium Philippii Ab.

1. *Helianthus scaberrimus*. L.

2. *Scorpaen. nem.* 7 & 8 p.
 3. *Scorpaen. nem.* 7 & 8 p.

84 *Leuvalloanae* Dc

37 ft. 10 in. 100 ft. 10 in. 100 ft. 10 in.

immixta G. & M.

impagata

P. olivaceus *furcata*.

1. accus obnoxiosus bus; sepe a-

Let puerne pilas villosulas

2. *Hel. laevis* m. 48. laty x filurungu glas

A. pl. G. B. found specimens complete

mini hand figurarii. Polymorpha est
var. clabra, interp. clabra, Ham. 4-12. Nig. 2.

Var. *glabra*, *gulya* - *glabra*, *Ham. 4-12*.
 fr. et. *subulata* vel *subulata*. *Fol. crispata*.
Ham. 4-12. *Ham. 4-12*. *Ham. 4-12*.

C. affinis, Gerst Muller (§ III)

Periclymenum affinis
periclymenum affinis in frut. a. ca.

Furciculenta anthusi - seen first at
Murray - several Oct 1848. - 24 P. 1848

V. asperula: Kirchner. (§ III)

"*P. angustipinnis* *limittima* fr

incremento asfáltico e bituminoso.

Congiuntione, la quale si fa
 a tutto l'arco Frankford, per

Habitat in p. ...
Flores: ... (in ... - ...)

Murray (Port Murray, N.J.)
 1st. Apr. 1849. to Dr. Willb. W.

113 Apr. 1897 112 113
Polycentrus. water. 113

Liber de ar. riuum Vnde colligitur

Ammonia coronaria

in planctone grassinoga circa rectus

29. Laido rāto nūmū saro ena tita

Erigeron pinnatifidus, var.

... ..

Fruticulus parvus 6-9-pollicaris, cortice pallide rufescente facile secedente; *rami* subalterni subpatenti-erecti tenui, pubescentes; *folia* interstitiis breviora, solitaria, bina-quaterna in apice ramulorum quandoque (juventute?) viridia caeterum glauca; *flores* pallide lutei.

4. **Pleurandra hemignosta** Steud. caule ramis cortice cinereo secedente glabris; foliis subsetaceo linearibus glabris acutis; floribus ad foliorum fasciculos sessilibus; calycibus glabris; sepalis ovato-lanceolatis margine scariosis apice acutis; ovariis glabris. ♀.

In Australasia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 2172.

5. **Pleurandra hibbertioides** Steud. caule fruticoso basi ramoso, ramis simplicibus vel sursum divisis; foliis fasciculato-confertis lineari-subulatis glabris; floribus axillaribus vel in ramulis brevissimis sessilibus; calycibus glabris; sepalis ovatis mucronatis; antheris subumilateralibus; ovariis glabris. ♀.

Ob stamina fere aequaliter ovaria cingentia ad *Hibbertiam* accedens, toto habitu *Pleurandris* affinior.

In lapidoso ad latus septentrionalis montis Bakewell, dittonis York, 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2164.

Fruticulus $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, truncus basi lignosus in radicem validam attenuatus, a basi ramosus; *rami* erecti, simplices vel sursum ramosi, pedales et ultra, glabri, a basi dense foliati; *folia* setacea, subteretia, 4-9 lineas longa, in ramulis brevissimis pseudofasciculato-conferta; *flores* praesertim inferne in ramulis terminales solitarii vel raro bini inter folia nidulantes vel versus apices ramorum simpliciter racemosi; *sepala* margine pellucido-membranacea petala pallide lutea fere aequantia. *Pleurandrae camphoromae* Sieber. (Herb. mixt. No. 506.) proxima ejusque forsani varietas robustior magis glabra.

6. **Pleurandra diamesogenos** Steud. caule basi ramosissimo, ramis superne divisis angulatis glabris; foliis sparsis anguste linearibus margine reflexis glaucescentibus sparsim longe villosis demum glabrescentibus; pedunculis subaxillaribus elongatis folia duplo superantibus; calycibus bractea accessoria (plerumque) munitis; sepalis ovato lanceolatis longe pilosis margine membranaceis; staminibus unilateralibus; ovariis 2 villosis. ♀.

Generice ad *Pleurandras* pertinet habitu vero uti sequens species inter utrumque genus intermedia.

In turfosis sylvaticis districtus Sussex, 17. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2141.

Fruticulus vix pedalis, e trunco lignoso divisis in ramos plures basi simplices, sub medio iterum ramulosos; *folia* 6-8 lineas longa, vix semilineam lata, subtus marginibus sese non attingentibus reflexa, glaucescentia, nitida primo intuitu glabra sub lente sparsim ex puncticulis asperis pilosa; *pedunculi* versus apicem ex axillis foliorum, erecti, glabri; *sepala* oblongo-lanceolata acuta pilosa; *petala* pallida, flava.

7. **Pleurandra cognata** Steud. caule humili (vix pedali, basi parum) superne ramoso; ramis angulatis glabris; foliis sparsis anguste linearibus margine revolutis apice acutis undique punctis elevatis setulisque minutissimis asperulis; ovariis villosis. ♀.

In fissuris rupium ad latus orientale montis Melville, ditionis Plantagenet, 5. Oct 1840. Herb. Preiss. No. 2156.

Simillima praecedenti, a qua differt: *ramis* superne magis confertis; *foliis* marginibus arcte incumbent-reflexis, subtus non adeo carinatis quam bilineatis, evidentius punctulato-scabris, brevius (calycibus vero densius) pilosis, floribus aureo-luteis.

HIBBERTIA Andr. Endl. gen. n. 4753. Meisn. gen. 2. (5.)

DC. Prodr. Vol. 1. pag. 74. §. 2.

1. **Hibbertia perfoliata** Hügel. caule volubili, foliis ovatis perfoliatis aristulato-serrulatis; pedunculis oppositifoliis unifloris folio longioribus. Endl. in Hügel Enumerat. plant. pag. 3.

In subumbrosis scaturiginosis prope villam clb. Andrews supra urbiculum Perth.

4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2127.

- 2 **Hibbertia amplexicaulis** Steud. caule erecto flexuoso glabro; foliis amplexicaulibus ovato-oblongis basi subhastatis levissime repando-denticulatis integrisve; pedunculis oppositifoliis unifloris folio longioribus; calycis sepalis ovato-lanceolatis (magnis) glabris bracteola accessoria multo minore munitis; staminibus basi subcoadunatis; ovariis glabris. 3.

Staminibus basi submonadelphis et floribus in genere maximis generi *Candolleae* affinis.

In limoso calculeosis umbrosis sylvaticis prope Mahagony-creek, 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2129.

Caulis fruticosus; *rami* subflexuosi, glabri, fusco-rufescentes, cortice tenui facile secedente; *folia* $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pollices longa, glaberrima, oblongo-ovata, arcte amplexicaulia basi profunde cordato-emarginata, line subhastata, lobis obtusis, apice in mucronem plicato-contorta, margine subreflexo integerrima, vel hinc inde denticulo uno alterove ex undulatione notata; *pedunculi* subpollicares flore longiores; *sepala* oblongo-lanceolata, acuminata, 5-6 lineas longa, ad basin calycis bracteola accessoria; *petala* ovata obtusa, margine (in siccis) subundulato-crenata.

A praecedente specie facile diagnoscutur: floribus duplo majoribus, foliis non perfoliatis, sed amplexicaulibus oblongis, pedunculis folia non superantibus.

3. **Hibbertia hastata** Steud. caule subvolubili glabro cortice secedente; foliis basi hastata amplexicaulibus linearibus vel sublanceolatis integerrimis apice mucronulatis; pedunculis axillaribus folia subaequantibus unifloris; calyce unibracteato; ovariis 2 glabris; staminibus liberis. 3.

In Australasia occidentali-meridionali. Herb. Preiss. No. 2128.

Caulis debilis vix fruticulosus, ramosus, cortice in ramis adultioribus facile secedente; *folia* bipollicaria et ultra, 2-3 lineas lata, uninervia, nervo subtus prominente, margine subrevoluta, supra fusco-viridia, subtus pallidiora, utrinque glabra; *pedunculi* in axillis foliorum solitarii, elongati, arcuati, folium

Lyndochia vaticana
 Macbride. Dec. 1848. Laramie
 cones novum et parvum
 novum vix dubitabilis. ^{Her. Laramie}
 fl. auriculis inopinguissimis
 habita recto vel diffuso et brach
 is latis membranis, flaminibus
 paucioribus diffinitur. Sed nullum
 suppurulentum dixerim repertum, quod
 et glandulosa *Valutundalis* fit
 distinguenda ab planta nostra vulgata,
 quae diversis locis ^{et} solo formos
 inter se valde divergentes producit
 varietates speciosas a *Valutundalis*
 condita minime ut varietas tra-
 ctanda nova et parallela formae
 angustifoliae *Grevilliae* lavandae.
 laevae ad fl. *Macbridei* rariorem
Piti. articulati rarioris glandulosi
 saepe desunt! Folia caulesculata demum
 caudat-vallay et in campis montanis ^{explanata!}
 vix. Petala oblongata ^{obtusata}

11. *Ranunculus fessiliflorus!* R. & S.

Ad fontem montium Barossa-
range 14. Sept. 1848. validis
Fructibus, aequus, etulis (obtusis et

Delatus ferd. M. eructa caule
pedali, foliis profundius fissis
et incis.

In pratis inundatis ad rivulum
Mount-Walker-Creek. Oct. 1848.

platycarpus ferd. M.
kui. h. f. *capitulis* compressis margini
apertis, *lobis* minus abrupis, *calicem*
lobis unguis, *caule* eructis
quam c. R. & S. *radice* pluribus. Ad ripam
invenit vocat
analogam hunc inundatam fluminis Murray
lore hinc. *nilhor. ab offio.* Oct. 1848.

pedunculatus ferd. M., villosissimus
caule eructis, *floribus*
evidenter (saepe longissime) pe-
dunculatis. Ad montium tu-
tra Barossa range et in
parvis firris non Lindar-valley
Sept. 1848.

Alpis ut omnis *progenies* in
zona temperato-valida australi
multiformis. In ultima varietate
capitulae gerunt setas admodum
vel crispas!

12. *R. japiensis!* R. & S.

Ad latera montis
Tarnant d. h. m. i. i. divergit. Ad montium
peak 2000' *latra* Jan. 1849, h. N. 401. *specimen* minus certe
acti. Nov. 1849, h. N. 401. *non* *diversum* sed *diff.* in h. N. 401
num 402 *sed* non *R. incandens*

qui *toto* *caelo* *diffat.* In *limite*
saepius *inundatis.* Jan 10. 1849
marcescens *et* *saepius*
quod *alis* *et* *typo* *in* *capite* *sup*
causibus. *Thidus.*

aequantes vel superantes; *sepala* ovata basi bracteola multo minore aucta, 6 lineas longa, petala subaequantia.

4. **Hibbertia lactucaefolia** Steud. caule erecto vel subflexuoso glabro subancipiti-anguloso; foliis linearibus elongatis (2-3-pollicaribus) basi hastata amplexicaulibus integerrimis glabris apice mucronulatis; pedunculis axillari-bus unifloris folio (sub-) brevioribus; calyce ebracteolato ovariisque glabris. ♀.

In sublimosis sylvaticis districtus Sussex, 23. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2161 et in umbrosis sylvaticis prope Albany, districtus Plantagenet, 22. Sept. 1840. No. 2173.

Difficile a praecedente praeter notas allatas distinguitur: caule erecto basi distincte fruticuloso, stricto, minus ramoso; foliis multo angustioribus, latitudine lineam saepe non attingentibus, raro vix excedentibus; pedunculis brevioribus erectis in apice caulis copiosioribus et tunc quam folia vix evoluta parva vix longioribus.

5. **Hibbertia confertifolia** Steud. caule fruticuloso erecto ramoso piloso-scabro demum cortice secedente glabro; foliis subfasciculato-confertis sessilibus oblongo-cuneatis obtusis utrinque pilosis; floribus sessilibus axillaribus; calycibus bracteolis ferrugineis (gemmarum phyllis persistentibus?) involucriatis; sepalis ovato-lanceolatis longe pilosis acutiusculis; petalis obovatis emarginatis; germinibus (3?) glabris. ♀.

In subarenosis districtus Plantagenet, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2143.

Fruticulus sursum ramosus, ramuli teretes cano-pubescentes; folia in intervallis parvis $\frac{1}{2}$ -1 pollicaribus, superne magis approximata, in fasciculos unilaterales conferta, 2-3 lineas longa, — juniora praesertim — pilis sericeis elongatis obsita; flores in axillis foliorum sessiles, involucriati, bracteis ovatis ferrugineis deciduis; *sepala* (plerumque) ad marginem membranaceo-scariosa petala subaequantia.

6. **Hibbertia commutata** Steud. caule fruticuloso erecto basi ramoso pubescente demum cortice secedente glabro; foliis confertis oblongo-lanceolatis utrinque (praesertim infra) villosis; floribus axillaribus (saepe ad axillas foliorum dejectorum) sessilibus bracteis ferrugineis involucriatis; sepalis lanceolatis dense villosis; ovariis 3-4 glabris; stylis stamina superantibus. ♀.

In saxosis vallis cataractae ad caput fluvii Cygnorum, 26. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2136.

Fruticulus ramis brevibus (2-pollicaribus) praesertim ad basin vel in medio caulis superne simplicis; folia subconferta 3-5 inaequalia, ovato-oblonga vel lanceolata, apice breviter acutata, minora 2-3 reliqua ad summum 7 lineas longa, supra obscure viridia pilosa, subtus dense pilis longioribus albidis subintricatis canescentia; flores axillares in fasciculis foliorum sessiles, bracteis ferrugineo-rubris apice pubescentibus caeterum glabris involucriati; calyx villis longis albidis dense obsitus, *sepala* ante florescentiam in conum acutum conniventia, aperta oblongo-lanceolata acuminata.

7. **Hibbertia discolor** Steud. caule fruticuloso ramoso cinereo-villoso vel cortice secedente demum glabro; foliis

oblongis vel oblongo-linearibus supra tenuissime adpresse pilosis vel nudiusculis opacis subtus pube alba intricata brevi velutinis; calycibus bracteis ferrugineis involucreatis; sepalis ovato-lanceolatis, extus dense villosis, intus basi subglabris; ovariis (2-3) glabris. ♀.

In limosis ad fluvium Canning, 22. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2137.

Variat: caule stricto minus ramoso et hirsuto.

A praecedente simillima differt praecipue: *ramis* strictis elongatis firmioribus; *foliis* majoribus 5-12 lineas longis utrinque pube brevioribus indutis; *reliqua* praecedentis, cujus forsitan var.

8. **Hibbertia argentea** Steud. caule humili erecto sericeo-villoso cortice secedente demum glabro; foliis confertis oblongis obtusis utrinque (praesertim junioribus) calycibusque sericeo villosis; ovariis glabris. ♀.

Ad promontorium Cape-Riche, 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2144.

9. **Hibbertia depressa** Steud. caule fruticuloso prostrato ramoso cortice secedente; ramis villosulis; foliis subfasciculato-confertis linearibus margine revoluta longe sericeo-villosis subrecurvis; floribus axillaribus terminalibusque sessilibus; sepalis lanceolatis pilosis; ovariis (5) glabris. ♀.

In clivulo arenoso prope oppidulum Albany, ditionis Plantagenet, 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2153.

Caulis diffusus ramosus; *rami* subhorizontales pilis plus minus longis cum epidermide deciduis obsitis; *folia* plerumque in interstitiis folio longioribus fasciculata, raro in ramulis secundariis solitaria, alterna, anguste linearis, margine revoluta subteretia, 4-8 lineas longa, curvata, pilis longis sericeis, in adultis rarioribus obsita; *flores* in axillis foliorum sessiles; *bractee* involucreantes, pallide-ferrugineae, multo minus quam in praecedentibus conspicuae; *sepala* extus dense, intus in medio tantum, pilosa, aequantia petala, pallide flava.

Proxima videtur *Hibbertiae prostratae* Hook. Journ. l. 246, sed vix dubie diversa.

10. **Hibbertia tenuiramea** Steud. fruticulosa ramosa glabra, ramis attenuatis divaricatis; foliis linearibus apice subdilatis glaberrimis obtusiusculis; pedunculis axillaribus folia subaequantibus; sepalis ovatis obtusis glaberrimis petalis emarginato-bilobis (duplo) brevioribus; ovariis glabris. ♀.

In arenosis subumbrosis fruticosis prope Perth, 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2145.

Fruticulus 1-2 pedalis, a basi ramosus, omnino etiam in partibus junioribus glaber; *folia* vix fasciculata, sed saepe basi subimbricata, 2-4 approximata, quandoque solitaria, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ pollices longa, angusta, linearia, infra medium attenuata; *pedunculi* solitarii, axillares, teneres, subflexuosi folia subaequantes; *sepala* glaberrima, patentia, margine pellucido-scariosa, *petala* aureo-flava.

11. **Hibbertia basitricha** Steud. caule fruticuloso ramoso glabro, cortice secedente; foliis linearibus margine revolutis basi pilosis sursum glabris apice acutiusculo; floribus axillaribus sessilibus; sepalis ovato-lanceolatis piloso-sericeis margine membranaceis; ovariis glabris. ♀.

microphylla DC.

Clematis plumifera Ledeb.

nitida var!

*sepala ochroleuca, semina
arida.*

A. C. microphylla Differt
caudis ^{caudicibus} ~~aristatis~~ longiori-
bus, foliis trinerviis a C.
semprepala foliis integerrimis
est.

In fruticulis sylvium circa Kiviat
Bay. Oct. 1848. fruticosa. & Fu-mae
vibris. Lacty-ranges arcata.
rattas. Oct. 2. In sylvibus
fimus. Oct. 2. Oct. 2. Oct. 2.
Clematis aristata Ledeb. & DC. (austro
orient.?) hb. St. 818.

C. microcaulata Ledeb.

x-*C. abanda* Hooker.

In montibus Hollandia forte austro-
orientali ubi antea nusquam lita
a unde R. Stuart-Smith. hb. St. 819.

A. C. appendiculata nostra
habitu minore, sepalis ratione
longitudinis latioribus et foliis
integerrimis paucis pedunculis
nervis distinctis. Habitu C. micro-
phylla, sed antheras appendice
summumulato gaudent. A. C.
plumifera foliis acutis et flori-
bus plurimigen pauculatis discre-
pat. Diagnoses trium specierum
novarum primum specimen a.
completa utriusque speciei prius
elaborabo.

Sociatus 15-20' In umbrasis
Tormanniae, hb. V. H. n. 5. Oct.
1848. ♂ Cum binaside clitoroide DC.
foliis nocte accedens considerare ne-
bis ob pedunculatos folia sylv. plurimigen
supinatis atque sepala margine pubescenti-
bus.

ternatis gentianoides! St.
in rursatilibus repensibus
in portum agnatum Tarraco-
nae, an. 1849. hb. St. II, 664
Flora maritima et litoralis
muri cito evanescens. Fr.
tantum perimura maris
padi altitudinem attingit.
Huius prope!

Camunobius platycarpus
H. & M.

R. psittaciformis var. *platy-*
carpus Andrews pag. 26
R. leptorhynchus *brook* *apivis*

Camponotus Penicillio H. Br.

(artissime ad portionem septi-
 mam pertinet et valde ac-
 curat. R. *difficileflora*, pro
 specifice revivere videtur
 solius *inacis*, digestis, ^{carpinis} ~~fructibus~~
 minoribus, ^{copulis} stylo breviora
 et descriptione *brevis*
 fons ex *proximo* *acut-*
ata differt rex *essentialis*
pro *haec* *suavitate* *carpinis*
subpedali, *fructibus* *carpinis*
numerosis et *fructibus* *omni-*
bus *magis* *evolutis*. *Arvo*

glaberrimus L. & M.
M. pappiliferus Del. & C. & S. fuscus

Salicaps pinnatus

Tasmanianae (Nov. 49. hb. 124)

In confragrosis ad radices jugi montium Darling's-range, ditionis Perth, 4. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2165.

Fruticulus tenuis pedalis et ultra, ramosus; *folia* in interstitiis variis fasciculato-aggregata, anguste linearia, vix semilineam lata, $\frac{3}{4}$ -1 pollicem raro ultra longa, margine revoluta, erecta, plerumque curvata, glaucescentia, basi pilis longiusculis notata sed vix ampliata, *sepala* acuminata, margine membranaceo glabra, medio pilosa, *petala* pallide flava subaequantia.

12. **Hibbertia pachyrrhiza** Steud. radice lignosa incrassata ramosa; ramis erectis strictis ramulosis pubescentibus ad foliorum ortum conferto-albo-pilosis; foliis subfasciculatis elongatis anguste linearibus revolutis striatis basi pilosis, sursum glabris; floribus axillaribus solitariis sessilibus; sepalis vix puberulis; ovariiis glabris. ♀.

In arenosis montium Darling's-range, ditionis Perth, 20. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2149.

Caules e trunco radicali crasso lignoso plurimi, erecti, 1-1½ pedales, glabrescentes vel pilosuli ad foliorum ortum dense villosi; *folia* raro solitaria sed 2-4 approximata, anguste linearia, 1½-2 pollices longa, margine revoluta subcanaliculata, basi parum dilatata subamplexicaulia; *flores* arcte sessiles; bractae involucrentes nullae; *sepala* ovata, medio praesertim puberula, aequantia petala pallide flava.

13. **Hibbertia subexcisa** Steud. fruticulosa a basi ramosa; ramis subsimplicibus vel brevi-ramulosis pubescentibus; foliis longiusculis (pollicaribus) sublinearibus margine revolutis glabris, basi dilatata subamplexicaulibus ciliatis, apice emarginatis; pedunculis pilosis axillaribus solitariis folia subaequantibus; sepalis lanceolato-ovatis ovarisque (2?) glabris. ♀.

In arenosis sylvae prope oppidulum Perth, 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2146.

Fruticulus 1-2-pedalis, e trunco lignoso incrassato ramosus; *rami* erecti, basi cortice secedente glabri sursum pubescentes; *ramuli* breves, foliati; *folia* approximata, linearia, inferne angustiora, basi pilosa et dilatata, in parte dilatata lineola transversa notata quasi articulata, in margine ampliata baseos pilis longiusculis albidis ciliata, apice plus minus conspicue emarginata quandoque mucronulata; *pedunculi* folio plerumque parum breviores, patentim pilosi; *sepala* ovata, apice mucronulata aequantia petala pallide flava.

DC. Prodr. Vol. I. pag. 74. §. 3.

14. **Hibbertia latifolia** Steud. caule prostrato serpente adscendente tereti asperulo; foliis petiolatis ovatis subincisodentatis pilosis ruguloso-scabris; pedunculis axillaribus folio longioribus unifloris; carpellis pilosis. ♀.

In clivulo arenoso inter frutices prope Pointpossession, 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2126.

Caulis longissime prostratus, nudus, tandem in ramos adscendens erectos, foliatos, piloso-asperulos, pedales et ultra; *petioli* 3-4 lineas longi, erecti vel recurvi; *folia* 2-4 subconferta, magnitudine varia, majora pollicem longa et $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$, lata, ovata vel oblongo-ovata, minora subrotundata, supra pilis brevibus scabra, subtus pilis adpressis longioribus pubescentia, margine subinciso-crenata crenis obtusis; *pedunculi* axillares arcuati, patenti-pilosi

basi; *sepala* pilosa, duplo breviora quam petala pallide flava, ovata, emarginata.

15. **Hibbertia ovata** Steud. caule fruticuloso a basi ad apicem ramoso villosulo vel cortice secedente glabro; foliis ovatis (raro oblongis) utrinque praesertim subtus villosis, hinc inde dente uno alterove notatis vel integerrimis; floribus axillaribus terminalibusque sessilibus; calycibus bracteis ferrugineis involucriatis; sepalis ovato lanceolatis extus albido-villosis, intus (basi) glabriusculis; ovariis velutinis. ♀.

In limoso-calculosis fruticosis prope Mahagony-creek, ditionis Darling's-range

12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2134.

16. **Hibbertia montana** Steud. caule fruticuloso ramoso villosulo vel demum cortice secedente glabro; foliis subconfertis oblongis obtusis integerrimis utrinque dense molliterque villosis; floribus axillaribus terminalibusque sessilibus; calycibus bracteis ferrugineis involucriatis; sepalis ovato-lanceolatis, extus albido-villosis, intus (basi) glabriusculis; ovariis velutinis. ♀.

In limosis lapidosis cacuminis montis Bakewell, ditionis York, 5. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2135.

Fruticulus pedalis diffuse ramosus; *rami* lignosi, validiusculi, villis longis albidis plus minus dense vestiti; *folia* fusco-viridia, sessilia, 6-8 lineas longa, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lata, margine reflexo, uti ramuli villis albidis dense utrinque obsita; *flores* in apice ramulorum inter folia vel in axillis sessiles, bracteis lutescentiferrugineis, ovatis, obtusis vel mucronatis, glabris vel carina et apice pilosis involucriati; *sepala* acuta petala intense lutea aequantia.

17. **Hibbertia astrophylla** Steud. foliis oblongo-linearibus integris obtusis margine revolutis supra pulvinato-stellato-asperis pilosis, subtus stellato-intricato-cinereo-pilosis; floribus in pedicellis brevibus demum parum elongatis; sepalis ovatis obtusis asperis; ovariis dense velutinis. ♀.

In rupestribus ad latus occidentale montis Clarence, districtus Plantagenet. 28. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2167.

Frutex 1-2 pedalis, ramosissimus; *rami* subvalidi lignosi, post epidermidis secessum glabri; *ramuli* pilis stellatis simplicibusque asperi; *folia* alterna in apice ramulorum magis conferta, basi in petiolum brevissimum attenuata, 6-8 lineas longa, $1-1\frac{1}{2}$ lata, margine revoluta, obscure viridia subtus pallidiora; *flores* sparsi, axillares et terminales, brevissime pedicellati; *sepala* breviora quam petala ovata, profunde emarginata, obscure flava; *stamina* ovarium quidem cingunt, sed uno latere confertiora, hinc ad *Pleurandram*, coalitionem eorum ad basin ad *Candolleam* accedens species.

18. **Hibbertia aspera** DC. foliis oblongis obtusis margine subrevolutis superne subscabris subtus cinereo-velutinis; floribus pedicellatis digynis; ovariis hirsutis. ♀. DC. Prodr. Vol. I. pag. 74. n. 14.

Ad fluvium Cynorum locis arenosis 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2136.

Pleurandra unita frut Mill. (S. III)

in callos P. erioxiphalae proxima
frut. sp. qualis exterioribus hanc
occurminatis frut. obtusis parum
attenuatis et praesertim ovario
subovoides velutinis in fructum
unicum ^{subcordatum} longitudinaliter con-
cretis et ab hac et ab aliis
hujus sectionis discrimina-
tur. Quae occurrunt varietates:

A. glaberrima, foliis pinnatis
glabris nitentibus

Needy-creek trans St. Maryae
Aug. 50. frut 1-2'. et. Situlzmu

B. pubescentula frut Mill.

foliis pinnatis pubescentibus. frut. 1-2'
Needy-creek frut. Aug. 50.
et. Situlzmu legit.

Inthesis: vix similis portulacae
Floris gracilioribus.

+ (Tralys in reportorio suo onxit species
quatuor Siberianas huj. gen. jam in con-
gm. frut. nuptas.)

Pleurandra monadelphica frut Mill.

(P. aristata? Tralys. ab. pl. Form. 954.
Virps pinnatis, et c. omnibus ejusdem
sectionis pinnatis, et foliis pinnatis
pinnatis et pinnatis longe, et c. omnibus
discrimina.

In albidioribus 5-6 pinnis pinnatis.
habitu pinnatis.

et c. pinnatis York-town, Form. 954.
Nov. 1850.

19. **Hibbertia proxima** Steud. caule erecto stricto brevi ramuloso asperulo sparsim rigide villosa; foliis planiusculis oblongo-linearibus margine revolutis rugulosis junioribus (praesertim margine) villosis, villis demum deciduis, supra nitentibus asperis, subtus pube densa brevissima canescentibus; floribus in apice ramulorum axillaribus terminalibusque pedunculatis; pedunculis folia subaequantibus; sepalis ovatis tenuissime asperulis pilosulis apice acuminatis vel obtusis; ovarii velutinis. ♀.

In sublimoso-glareosis umbrosis jugi montium Darling's-range, ditionis Perth, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2147.

Caulis erectus strictus pallide-rufescens, pilis brevissimis adpressis asperulus, intermixtis sparsim longioribus patentibus rigidiusculis pilosus; *rami* erecti, breves, 1-2-unciales; *folia* sparsa, linearia, 6-10 lineas longa, 1-2 lata, supra rugulosa, punctis lepidotis sparsim notata, ad marginem pilis rigidiusculis demum deciduis ciliata; *sepala* breviora quam petala, aureo-lutea, margine crenulata, apice emarginata. *H. asperae* DC. proxima.

20. **Hibbertia trachyphylla** Steud. caule fruticuloso (bipedali) ramosissimo glabro; ramulis punctulato-asperulis subpilosis; foliis anguste linearibus margine revolutis (hinc subteretibus) supra punctato-vel sublepidoto-asperis demum denudatis subtus glabriusculis; floribus in apice ramulorum terminalibus vel axillaribus; pedunculis folia superantibus; sepalis ovatis punctulato-scabris; petalis ovatis emarginatis; ovarii 2 velutinis. ♀.

In arenosis prope oppidulum Perth, 31. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2132.

Caulis bipedalis et ultra, diffuse ramosissimus, glaber; *rami* pallide rufescentes, erecto-patentes, sub lente punctis minutis plerumque ex pilis brevissimis compositis asperuli; *folia* alterna, in apicibus ramulorum magis congesta, angusta, vix $\frac{1}{2}$ lineam lata, 6-10 longa, obtusiuscula, margine revoluta subtus canaliculata, glaucescentia, punctis vel squamulis ex epidermide elevatis albidis asperula; *pedunculi* folia aequantia vel superantia similiter asperuli, erecti; *sepala* ovato-oblonga, extus punctato-scabra, margine evanescenti-ciliolata et apice mucronulato intus brevissime pilosula, basi glabrescentia, quam petala laete lutea breviora.

21. **Hibbertia cinerascens** Steud. caule fruticuloso erecto asperulo sparsim piloso brevi ramuloso; foliis planis oblongo-linearibus margine subreflexis supra lepidoto-asperis subtus pube brevissima cinerea velutinis; pedunculis axillaribus terminalibusque folia superantibus; sepalis ovatis oblongis asperulis; ovarii velutinis. ♀.

In limosis ad praerupta vallis Cataractae, ditionis Perth, 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2140.

Frutex 2-3 pedalis, ramosus; *caules* rufescentes pilis brevissimis rigidis adpressis asperulus, intermixtis sparsim longis albidis; *folia* sparsa, subalterna, magnitudine varia $\frac{1}{2}$ - 1 pollicaria, 1-2 lineas lata, supra fusco viridia squamulis sub epidermide nidulantibus albidis aspera, subtus cinereo-albicantia, utrinque praesertim ad margines pilis sparsis rigidiusculis munita; *pedunculi* erecti, asperuli et pilosi; *sepala* intus glabrescentia petalis aureo-luteis emarginatis breviora.

22. **Hibbertia pilosa** Steud. caule subscandente patentiramoso piloso; foliis oblongo-ovatis acutis supra sparsim lepidoto-punctatis pilosis; floribus axillaribus sessilibus solitariis vel 2-3 aggregatis; sepalis oblongis pilosis obtusiusculis mucronulatis; carpellis 1-2 dense longeque undique pilosis. ♀.

In densis umbrosis montis Darling's-range, ditionis Perth, Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 2130.

23. **Hibbertia pallida** Steud. caule basi ramoso: ramis strictis simplicibus angulosis glabris; foliis sparsis anguste linearibus margine revoluta (hinc subteretibus) glabris apice subrecurvo mucronulatis; floribus versus apicem ramorum axillaribus vel in ramulis brevissimis terminalibus (subracemosis); calycibus bracteola lanceolata auctis; sepalis ovatis acutiusculis glabris; ovariis (2?) velutinis. ♀.

In sublimoso glareosis ad radices jugi montium Darling's-range, ditionis Perth. 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2152a.

Caules e trunco radicali lignoso plures, erecti, simplices, pedales et ultra, luteo-albidi; *folia* glaucescentia, sparsa, solitaria, pollicaria et ultra, basi in foveola conspicua elevata nidulantia, post delapsum foliorum persistente; *flores* vel immediate e caule vel in ramulis brevissimis, 2-5 lineas longis, sessiles; *petala* pallide lutea emarginata quam sepala parum longiora.

24. **Hibbertia aurea** Steud. caule erecto sursum ramoso ramisque glaberrimis cortice demum secedente angulosis; foliis sparsis anguste linearibus margine revoluta (marginibus sese non attingentibus) puncticulis elevatis sparsis exasperatis, apice apiculatis; floribus versus apices ramulorum (subracemosis) axillaribus sessilibus; calycibus glaberrimis bracteis pluribus ovato-lanceolatis involucreatis; ovariis (2?) velutinis. ♀.

Cum antecedente lecta. Herb. Preiss. No. 2152b.

A praecedente simillima, quacum in *Preissii* herbario erat commixta, differt: *caule* sursum ramosiore, bracteis 6-8 imbricatis calycem involucreantibus, sepalis similibus sed minoribus tenuissime ciliatis, primo intuitu vero petalis aureo-luteis.

25. **Hibbertia lineata** Steud. caule fruticulosò a basi ramoso; ramis erectis strictis cortice cinereo secedente glabris; foliis sparsis superne subconfertis anguste linearibus longitudinaliter sulcato-striatis strictis rigidis margine punctato-asperis; floribus axillaribus solitariis pedunculis folia subaequantibus; sepalis asperulis ovatis bracteola lanceolata (decidua) munitis; ovariis (2.) velutinis. ♀.

In confragosis umbrosis sylvaticis ad latus septentrionale montis Wuljenup, ditionis Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2151.

Caules e trunco radicali incrassato lignoso plures, erecti, stricti, 11-2 pedales, basi nudi supra medium foliati; *folia* magnitudine varia, 4-8 lineas longa, una vix latiora, supra vix convexiuscula, glabra, ad margines praesertim punctis elevatis exasperata, infra sulcis 3 longitudinalibus percrensa, apice breviter

Gyrogonia (Codonocarpus) pyramidalis

Fr. Mueller. foliis linearibus acutis
supilibus glaucis ~~carinatis~~ ^{angustatis}, floribus
pauca racemellana in ~~racemellana~~ ^{racemellana} infera
rem racemellis manifeste bracteolatis
calycis dentibus 8-12 breviter ~~triangul~~
laribus, praetibus late oblongis ~~pe~~
in ~~racemellana~~ ^{racemellana} in ~~racemellana~~ ^{racemellana}
ampliaturum subaequantibus, car
indis rivis 30 oblongo-cuneatis
apicem ~~lunatum~~ ^{lunatum} exsertum anguli
interioris deltoideis ~~phylo~~
coronatis, columna plasm in
diversa ~~signatopum~~ ^{signatopum} ~~concaum~~
vilatata.

2^a vallibus humilibus parum, fertilibus
lori ~~moratalia~~ ^{moratalia} a nativis dicti prope
montes Elders-range ~~interioris~~
ubi primo ~~Detrit~~ ^{Detrit} ~~et~~ ^{et} ~~Georgius~~ ^{Georgius} ~~Mierthout~~
~~et~~ ^{et} ~~longinus~~ ^{longinus} ~~rosipugum~~ ^{rosipugum} ~~armulans~~
Fructus arboris ~~pyramidalis~~ ^{pyramidalis} valde
flexilis tamen tenax 8-12' altus, trans
basim 3-6" diametro vix lignosus in
durante cum ramis ~~cano~~ ^{cano} ~~viri~~ ^{viri} ~~g~~ ^g
rescente laevissimus; rami crebri
altum angulo acuto recte ~~di~~
urgentes. Folia 2-4" lg 1-1 1/2" lt ~~pum~~
in ~~basim~~ ^{basim} & plerumque in apicem ~~con~~
conulatur ~~angustata~~ ^{angustata}, ~~nota~~ ^{nota} ~~plana~~
stipular ~~lineata~~ ^{lineata} ~~pubulata~~ ^{pubulata} 1/2" lg ~~ce~~
didiculi ~~lors~~ ^{lors} ~~horizontales~~ ^{horizontales} ~~vel~~ ^{vel} ~~recurvi~~
apice ~~flexi~~ ^{flexi}. Flores paucissimi ~~cui~~
glabro, diametro 3 lineari, styli ~~pubulati~~
radiatum ~~reflexi~~ ^{reflexi}. Fructus ~~plano~~ ^{plano} ~~virus~~
8-9" longus & ~~virus~~ ^{virus} 1/2" lt. Venusta ~~ilata~~
pulva ~~opaca~~ ^{opaca} ~~tubularia~~ ^{tubularia} ~~transversum~~
luniter ~~regulosa~~ ^{regulosa} ~~attenuatur~~ ^{attenuatur} ~~altus~~ ^{altus} & ~~de~~
mis ~~in~~ ⁱⁿ ~~racemellis~~ ^{racemellis} ~~affixa~~ ^{affixa} 2" lg 1 1/2" lt
prophiala ~~notand~~ ^{notand} ~~cordata~~ ^{cordata} ~~albida~~ ^{albida} ~~stipata~~
sapor totius plantae ~~nauposa~~ ^{nauposa} ~~amar~~
Auth: ~~fructus~~ ^{fructus} ~~foemine~~ ^{foemine} ~~primo~~ ^{primo} ~~vire~~

+ Gyropteris (Codonocarpus) acariensis

frut. pall., foliis lanceolatis rari-
 boratis rhombiceve acutis vel obtu-
 zigem apiculato petiolatis glaucis rari-
 lentis, floribus ultra ramulorum, in
 racemosis vel paniculatis minus
 bracteatis, calycis dentibus 8-12 bre-
 vibus firmata, fructibus subrampan-
 ticulatis vix apice incrassato fere
 plicato brevioribus, carpiis 30-40 ablo-
 reneatis apicem anguli interioris tan-
 quam delincentibus, columna fere
 in disco pinnatifido concava et laevi-
 In solo arthropo - argillacea planitie
 morosa prope Elstabe intra montes
 Fluctus - range et fere spem apice
 frut. altis vix arbutula. Forme
 brevis erectus partim hypogaeus pro-
 cumbens ad 1/2 diametrum lignum
 coriis longitudinaliter & transversim
 fulvo nigricante totus, ligno levi
 rami validi plus minusve tor-
 taces omnes - fusti copiosi ad hunc
 diametrum, ramuli divaricati vel
 angulo divergentes rebello vel fla-
 vido nitenti, juniores plerumque
 magis virentes. Folia ovata 1 1/2" lg 1 1/2"
 in petiolum pinnatifidum ^{definita} ^{definita} ^{definita}
 definita. ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita}
 subulata ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita}
 absolutae, calyx patelliformis. Petalae
 fere pollicares divaricati saepe apice
 fructus pallide & fovea virens circ.
 & apice totidem latus. virens fulva
 mucinato - centularia haec vix
 altitudo altis & demissis in carpiis
 pta 1 1/2" lg 1 1/4", plicata rotunda
 laba alba variegata

capo foliorum ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita}
 amaricans. ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita} ^{definita}
 Juvies acutae hie adumbratae intra quos
 roppionis & Codonocarpi ambiguae sunt.
 Juvies unica carpidiorum & pinnatifida
 praecipue has approximant Gyropteris
 vides hactenus notis, dum columna in
 pinnatifidum ampliata, forma & delincentibus
 carpidiorum, pinnatifidum sitis bracteaeque
 Codonocarpi conveniunt. Quam claudere
 Gyropt. Codonocarpi pro altera Codonocarpi

recurva, mucronulata; *pedunculi* erecti vel subarcuati glabri; *calyx* praeter punctula minuta asperula glaber; *petala* sepalis majora pallide lutea, emarginata.

26. **Hibbertia microphylla** Steud. caule erecto parvulo (4-8-unciali) ramoso fruticuloso; foliis confertis brevissime petiolatis crassiusculis oblongo linearibus obtusiusculis (raro mucronulatis) glabris; floribus axillaribus pedicellis folia superantibus; sepalis obtusis ante anthesin pilosis demum glabris; ovariis (2?) pilosis. ♀.

In glareosis prope montem Wuljenup districtus Plantagenet, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2154 et 2180.

Fruticulus parvus 6-8 uncialis vel pedalis, e trunco radicali lignoso ramosus, ramis plerumque simplicibus strictis vel plus minus ramulosis (No 2180) folia approximata, sparsa (non fasciculata) 1-1½ lineas longa, dimidium lata, subcarnosa, viridi-glauescentia, glabra vel punctis minutissimis sparsis asperula; flores ad apices ramorum axillares, *pedunculi* folia superantes; *sepala* oblonga petalis luteis vix emarginatis breviora.

CANDOLLEA Labill. Endl. gen. n. 4755.

Meisn. gen. pag. 2. (5.)

1. **Candollea assimilis** Steud. caule ramoso epidermide secedente glabro; ramulis subunifariam pilosis; foliis linearibus subconfertis margine revolutis sparsim — basi ampliata — dense pilosis apice mucronulatis; floribus axillaribus pedunculatis pedunculis pilosis folio brevioribus; sepalis ovatis obtusiusculis ovariisque glabris. ♀.

In arenosis ad fluvium Cygnorum, 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2133b.

Fruticulus praecedenti simillimus, pedalis et ultra, caule glabro cortice facile secedente; *rami* rufescentes praesertim ramuli unifariam pube alba sericea quandoque in totum ramulum diffusa pubescentia, in apice ramulorum subcongesta; folia ½-1 pollicaria, ad margines inflexos vix semilineam lata, sursum parum dilatata, mucronulata, basi ampliata ciliolata, caeterum glabra glaucescentia; *pedicelli* folio breviores, 4-5 lineas longi, pubescentes; *sepala* ovata, tenuissime pubescentia. Iterum *Pleurandrae* facie sed stamina partim dianthera intermixtis monantheris.

2. **Candollea latifolia** Steud. caule diffuse ramoso ramis angulatis pubescentibus; foliis glabris subcoriaceis obovatis apice dentatis basi angustata, junioribus minoribus saepe omnino integerrimis; floribus solitariis in apice ramulorum inter folia sessilibus; sepalis ovatis glabris mucronatis (basi) ciliolatis petala obovata superantibus; phalangibus 2-3-andris. (*C. tetrandrae* Lindl. proxima, an var?)

In depressis umbrosis ad portum Leschenault, Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2162.

Caulis lignosus, diffuse ramosus, inferne glaber uti ramuli dense pubescentes, cicatricibus et basi foliorum delapsorum persistente notati; folia sparsa, versus apicem ramorum approximata, magnitudine varia ½-1 pollicaria et ultra, ovata vel ovato-oblonga, coriacea, versus apicem dentibus remotis 3-5 notata, supra fusco- (subtus pallidius) rufescentia; *sepala* quam in praecedente

parum minora sed petala eis multo longiora, ovato-oblonga, margine subcrenulato-undulata; *ovaria* 5, glabra.

3. **Candollea Preissiana** Steud. caule fruticoso erecto (2-3 pedali) ramuloso pubescente; foliis lineari-cuneatis apice obtusis subemarginatis medio mucronulatis subcoriaceis superne demum glabris, basi dense pilosis et dilatato-semiamplexicaulibus; floribus ad apices ramulorum inter folia subracemosis pedunculatis; calycibus pilosis sepalis ovato-lanceolatis acutis; staminibus sublateralibus 2-4 andris; carpellis glabris. (Si mavis ad Pleurandras sect. IV. *Candolleanas* DC. referre possit.) ♀.

Inter saxa calcarea colliculi maritimi ditionis Perth, 9. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 2159b.

Caulis subflexuosus, inferne cortice facile secedente glaber sursum pubescens; *rami* patentes, plerumque abbreviati, densius pube albida vestiti; *folia* in ramulis conferta, pollicem et ultra longa, 2-4 lin. lata, basin versus attenuata, ima basi dilatata subamplexicaulia, apice subtruncata; *pedunculi* dense pilosi, ex axillis foliorum his breviores; *sepala* margine membranacea, glabra, medio pilosa, petalis pallide-luteis breviora.

4. **Candollea calycina** Steud. caule fruticoso (6-8 pedali) ramoso rigido piloso demum glabrescente; foliis subcoriaceis glabris margine subrevolutis oblongo-lanceolatis raro integris sed apice 3-5 dentatis mucronulatis basi in petiolum brevem subdilatato-amplexicaulem abeuntibus; calycibus magnis, sepalis ovatis apice acutis petala superantibus glabris; staminibus antheras 2-4 gerentibus; ovaris 2-5 glabris stylis capitatis antheras aequantibus. ♀.

In colliculis arenosis ad portum Leschenault et ad littora maritima districtus Sussex, 11. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2131.

Caulis valde lignosus, diffuse ramosus; *rami* cicatricibus foliorum noduloso-notati, sursum foliati puberuli albidi; *folia* in petiolum angustum brevem attenuata, ima basi sursum semi-amplexicauli-dilatata, subcoriacea, magnitudine varia 4 lineas-pollicem et ultra longa, oblonga, quandoque linearia, plus minus lanceolata; nunc (praesertim juniora) omnino integra nunc apice dentibus 3 rarissime 5, plus minus distinctis notata; *flores* in apice ramulorum brevissimorum sessiles; *calyces* in genere maximi, *sepala* foliacea margine et basi membranacea, semipollicaria; *petala* pallide lutea.

5. **Candollea glaberrima** Steud. caule fruticuloso erecto ramosissimo (ut tota planta) glaberrimo; foliis linearibus margine revolutis apice leviter emarginatis vel obtusis mucronulatis basi valde ampliatis subamplexicaulibus; floribus axillaribus sparsis sessilibus, sepalis ovato-lanceolatis acutis, staminibus diantheris et simplicibus. ♀.

In arenosis fruticosis sylvaticis cis oppidulum Guildford ditionis Perth, 2. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2157.

Fruticulus 1-2 pedalis, radice lignosa, parum fibrosa; *caulis* a basi ramosus, cinerascens, uti rami hinc inde cicatricibus foliorum notati; *folia* erecto-patentia, subpollicaria, 1½-2 lineas lata, basin versus parum angustata, ima basi late ovato-ampliata et hac basi subimbricata, glaucescentia; *flores* basin

[illegible]

Clavoglossa H.

aromatica K. Pr in d B. Typ
T. fragrans ab et. 997. M. p.
in d. South Esk river, Ta-
smaniae, specim. macron
8-10' Oct. 15. 1848. hb St
J. # n. 15. A Tasmaniae
aromaticae descriptione a
Coudall's randa multa
more nisi foliis grassum &
lacinibus crispata.

ampliatam excedentes, *sepala* 3-4 lineas longa, margine subscariosa *petala* flava subaequantia.

6. **Candollea subvaginata** Steud. caule erecto fruticoso ramoso glabro, ramis junioribus pubescentibus; foliis apice cuneato dilatatis mucronulatis vel submarginatis (raro omnino obtusis) integerrimis glabris basi dilatato-vaginantibus; floribus axillaribus subsessilibus staminibus 2-4 antheras gerentibus; sepalis lanceolatis acuminatis petala superantibus; ovariis 3-4 stylis longis filiformibus. ♀.

In sublimosis districtus Hay, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2160.

A praecedenti simillima, cujus forsitan varietas, differt: habitu tenuiore, foliis apice vel omnino obtusis vel simpliciter mucronulatis nec subtruncatis nec 3-dentatis, basi magis solutis, caulem quasi subvaginantibus; ramis junioribus praesertim ad divisiones et foliorum ortum omnino nec in linea laterali pubescentibus.

7. **Candollea rupestris** Steud. caule fruticoso (4-5 pedali) ramoso, ramis junioribus pubescentibus; glaberrimis sublineari-cuneatis apice obtusiusculo subtridentato vel mucronulato, basi subdilatata subamplexicaulibus; floribus axillaribus sparsis subsessilibus; sepalis lanceolatis acuminatis glabris; staminibus 2 antheriferis vel simplicibus; germimbus glabris. ♀.

Inter rupium rimas montium Darling's-range ditionis Perth, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2158.

Caulis fruticosus, 4-5-pedalis; *rami* rufescentes, glaberrimi, *ramuli* juniores apicem versus unifariam pubescentes; *folia* subalterna sparsa, linearia, pollicem et ultra longa, 1-1½ lineas lata, apicem versus plerumque latiora, truncata et utrinque in dentem plus minus conspicue excedentia vel obtusa dente medio solum restante, ima basi subamplexicauli-dilatata, glaucedine fugaci adspersa; *flores* axillares, brevissime pedunculati, *pedunculis* bractea una alterave munitis; *sepala* lanceolata, margine subscariosa, longe subpungenti-acuminata *petala* flava subaequantia.

8. **Candollea striata** Steud. caule fruticuloso (1-2 pedali) ramoso, ramis subteretibus (junioribus) pubescentibus; foliis angustissime linearibus (3) striatis, superne glabris basi pilosis vix ampliatis; floribus axillaribus sessilibus; sepalis ovatis acuminatis pilosis ciliatis; staminibus 2-3 antheriferis et simplicibus; ovariis pubescentibus. ♀.

In arenosis prope oppidulum Perth, 6. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 2148.

Caulis et *rami* erecti vel divaricato-patentes, glaberrimi; *folia* in ramulis brevibus subfasciculato-conferta, 1-1½ pollices longa, marginibus reflexis subteretia, striata, sursum glabra, nitida, basi pilosa, apice subpungentimarginata; *flores* in apice ramulorum inter folia sessiles, solitarii; *sepala* semipollicaria, extus pilis sericeis munita, intus glabra, acute acuminata *petala* pallide lutea superantia.

9. **Candollea cygnorum** Steud. caule erecto debili parum ramoso pubescente; foliis anguste linearibus integris pilosis basi non dilatata semiamplexicaulibus; floribus oppositifoliis pedicellatis pedicello infra calycem bracteolato; se-

palis ovatis acuminatis extus pubescentibus intus ovariisque glabris. 2. 5.

In arenosis prope cataractam ad caput fluvii Cygnorum, 26. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2174.

Caulis vix pedalis, ramosus, debilis, inferne glabrescens superne dense pubescens, pallide rufescens: *folia* erecta, pollicaria et ultra, vix lineam lata, plana, margine vix revoluta, basi praesertim pilosa; *pedunculi* oppositifolii 5-6 lineas longi, medio bractea filiformi 3-4 lineas longa muniti: *sepala* petalis obscure flavis sublongiora, acute acuminata.

10. **Candollea parviflora** Steud. caule fruticuloso (1-1¹/₂ pedali) erecto ramoso piloso; foliis linearibus margine revolutis supra basin glabris apice leviter emarginatis, basi pilosis dilatatis subamplexicaulibus; floribus axillaribus pedunculis folia subaequantibus pilosis: sepalis glabris ovato lanceolatis acutis: staminibus 2-3 antheris: germinibus glabris. (Habitus *Pleurandrae*, stamina *Candolleae*.) 5.

In arenosis montium Eliza mountain ditionis Perth, 17. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 2150 et ad Princess Royal Harbour, 11. Oct. 1840. No. 2168.

Frutex 1-1¹/₂ pedalis, diffuse ramosus, omnino *Pleurandrae* facie ad filamentis diandris et foliis basi dilatatis *Candolleae* congener; *caulis* autem corticis secessum ramique plus minus dense molliter pilosi; *folia* subfasciculato-conferta, pollicem et ultra longa, 1-1¹/₂ lineas lata, margine plus minus revoluta, praesertim basi pilosa, ad 2-2¹/₂ lineam dilatata et quoad basin subimbricata, apice obtuso subtruncato subemarginata, quandoque mucrone brevissimo munita, subtus pallidiora; *pedunculi* axillares, pilosi, folio nunc breviores nunc sublongiores, ebracteati, subfiliformes; *calyx* parvus, glaber, *sepala* vix 3 lineas longa, oblongo ovato *petalis* pallide flavis vix breviora.

11. **Candollea? exasperata** Steud. *) caule ramoso cinerascens cortice secedente; foliis sparsis ad apices ramulorum confertis glaucescentibus linearibus apice mucronatis punctato exasperatis dorso tenuissime sulcato lineatis: floribus inter folia sessilibus terminalibus. 5.

In glareosis planitiei Quangen ditionis Victoria, 12. April 1840. Herb. Preiss. No. 2175.

*) Genus dubium, flores nulli adsunt evoluti; ex unico staminum rudimento divisio genus divinari potest.

Cunoniaceae Br.

Banera Salisb.

B. Billardieri ! David Don.

B. rubioides La Billardiere

not Andr. Sims Fendler.

B. rubiacifolia hb. St. L. 54. Tasm.

B. Salisb. ! T. G. L.
pl. l. 9. hb. n. 1, frut 3-4' hb. St. L. 54. Tasm.
Corollae procerum perminuum purpureae
in roseum vergentes vel albae
inconstans 3-4' alt. frut 2-3' hb. St. L. 54. Tasm.

Weinmannia L.

W. ligulata ! M. Cunningham

W. M. Murphy Tasm. 20

hb. St. L. 54. Tasm. 338. Jan. 49,

Eraclonae Br.

Anopterus glandulosa Lab.

Tasmaniae, hb. St. 793.

Fumariaceae

Fumaria Ekloniana Soudr.?

Introduita, nunc oratica prope
North Ireland.

Auth: vire

Pyramideum St.

Supra. dimingor.

Pyramideum (Causale)

non gen. 3508. 2 p. 181. cum
inone mediocri bona

In arenosis inter frutices, sic dictos
Murray. var. inuicem. War has
mexico. Phil. C. 2. 1848. In aliis
Capsulae raro apice tert. pedales
nonnullas. Color pedaleum hanc
reflexus in latitudinis. Caulis inter
cum humillimus? Capsulae asom
a) 11 longa? Significati in nostris
specimimbus. Caudum 5-6 ca
ciata in. Inque varietate a d in
aliis specimibus. Augus lat. eff. v. d.
+ In planta a nob. Mich. in interior
aperta + in libro suo pag 367 cum P. Dubio
comparata.

Crasulaceae. St.

Cellaea verticillaris. St.

Inguentissime in Nova Holl.
australi et Tarranania
tam montibus quam
planities. hb. v. n. 147.
Occurrit var. varia: digitatis ad
collicum alta longa, triaxa, gi
minus vel perar. In hunc, verticill
corp. congestis vel semotis diffin
lonibus fasciculis saepe p. p. filibus
anthipis: v. n.

+ Similis minutata ovato, v. n. 147. cum
+ Affinis v. n. 147. cum, supra verticillata.

CRASSULACEAE DC. Endl. gen. pag. 808.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

TILLAEA Mich. Endl. gen. n. 4607. Meisn. gen. pag. 134. (89.)

Characteri generico addas: *Calyx* 3-5-partitus. *Stamina* 3-5. *Ovaria* 3-5.

* *Tillaea* DC. Endl. l. c. *Flores* 3-5-meri. *Carpella* disperma.

1. ***Tillaea adscendens*** N. ab E. caule basi brevi spatio decumbente hinc stricte erecto inferne ramoso, foliis connatis ovato-cymbiformibus subcarnosis, floribus pentameris in axillis congesto-verticillatis omnibus sessilibus, sepalis petalisque membranaceis acuminatis, his duplo angustioribus.

In arenosis laud procul ab oppidulo Freemantle, Decembri a. 1838. Herb. Preiss. No. 1931.

Caulis vix digitalis, strictus, tetragonus, purpureus, brevi spatio e basi procumbens, dein erectus, basi ramosus. *Folia* in sicco statu pallida exsucca et valde collapsa, in vivo ergo succulenta, 1-2½ lin. longa. *Flores* ex omnium fere foliorum axillis, sessiles, inferiores gemini ternive, superiores oppositi, hinc habitus verticillatus, verticillis folia articulosque aequantibus densis. *Bracteolae* ad basin calycis duae, ovatae, apice subulatae, calyce plus duplo breviores ejusque laciniis similes. *Calyx* sessilis, basi truncatus, albo-membranaceus, quinquepartitus, laciniis basi hyalinis, superiora versus in disco purpureis, ambitu hyalinis, ovato-lanceolatis, subulato-acuminatis. *Petala* 5, lanceolata, setaceo-acuminata, saturatius purpurascens. *Stamina* 5. *Squamulae* obsoletae. *Carpella* 5, nonnullis saepe abortivis, oblique lanceolata, apice subulata retrorsum uncinata, compressa, disperma. *Semina* ovalia, fusca, ad hilum carunculata. *Discus* hypogynus delapsis carpellis quinqueareatus. ☉.

2. ***Tillaea colorata*** N. ab E. caule erecto stricto inferne ramoso, foliis connatis ovato-cymbiformibus subcarnosis, floribus pentameris in axillis congesto-verticillatis, verticillis sex-plurifloris confertis, flore intermedio cujusque axillae pedicellato, sepalis petalisque membranaceis acuminatis, his duplo angustioribus.

In arenosis silvae prope oppidulum Perth, Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1932.

Simillima *Tillaeae adscendenti*, cujus nescio an sit varietas, differt caule statim a basi erecto (ejusdem altitudinis), *verticillis*, praesertim versus apicem caulis et in ramis, contiguus, faciem alopecuroidem provocantibus, plurifloris, flore fasciculi cujusque lateris intermedio pedicello longitudine calycis praedito, lateralibus fasciculum triflorum flore *intermedio* et in hisce, ut brevi-

ter, pedicellato exhibentibus, ideoque verticillo quoque 14-flore, tametsi raro omnes flores perficiantur, — porro *florum* colore rufo seu rubro saturatiore calycem et petala undique inbuenti, saepe tamen etiam expallescente, *lact-nitis calycis* angustioribus oblongo-lanceolatis, petalis non modo sepalis angustioribus sed his etiam ¹, brevioribus, *disco hypogyno* minori non plano et evidentissime quinquealveolato, sed elevato subconico.

**** Bulliarda** DC. Endl. l. c. *Flores* tetra-pentameri. *Petala* ovalia vel oblonga, acuta vel acuminata. *Squamulae* hypogynae lineares, vel filiformes subcapitatae (staminum interiorum rudimenta). *Capsulae* ovaes, in stylum attenuatae, polyspermae (in medio haud contractae styloque deciduo denique obtusatae ut in *Tillaea muscosa* ejusque affinis).

3. **Tillaea (Bulliarda) intricata** N. ab E. caule diffuso intricato repente. ramis adscendentibus, floribus axillaribus sessilibus oppositis pentameris distantibus, sepalis petalisque ovato-lanceolatis acuminatis, foliis oblongo-linearibus obtusis carnosius supra depressis subtus convexis.

In arenosis conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest, Augusto 1839. Herb. Preiss. No. 1929.

Caulis 1-2 poll. longus, repens, ramosus; rami etiam decumbentes, apice adscendentes, purpurei, acute tetragoni, ut reliquae partes glabri: internodia foliis longiora aut ea aequantia. *Folia* patentissima, incurva, $1\frac{1}{4}$ -1 $\frac{3}{4}$ lin. longa, oblongo-linearia, obtusa. *Flores* in angulis foliorum inferiorum aggregati vel eorum loco gemmula microphylla, in superiorum foliorum angulis subsessiles, oppositi, folium aequantes ($\frac{3}{4}$ lin.). *Bractae* duae ad basin calycis, ovato-oblongae, obtusae, adpressae, succulentae, calyce dimidio breviores. *Aestivatio* calycis valvata. *Sepala* et *petala* longitudine aequalia, alba (?); illa latiora, utraque acuminata. *Stamina* longitudine pistilli, filamentis subulatis, antheris transversim ovalibus. *Stamina* sterilia capitulo parvo praedita, filamentis triplo breviora. *Ovarium* acute 4-5-angulum: *stylis* subulatis, papulosis, recurvi. *Ovula* plura. *Fructum* non vidi.

CEPHALOTEAE Endl. gen. pag. 812.

ROSACEAE, Tribus 5 **SANGUISORBEAE**, Subtribus 2, **CEPHALOTEAE** Meisn. gen. pag. 105. (74.) **CEPHALOTACEAE** Lindl.

Syst. ed. 2. pag. 14. ¹⁸⁴³

CEPHALOTES Labill. Endl. gen. n. 4628.

Meisn. gen. pag. 105. (74.)

1. **Cephalotes follicularis** Labill. Fl. Nov. Holl. Vol. 2. pag. 7. tab. 145. R. Brown in Flind. Vol. 2. pag. 601. tab. 4. opp. ed. Nees ab Esenb. 1. pag. 144. Hook. in Bot. Mag. Vol. 58. tab. 3118 et 3119.

In locis subturfosis arenosis, prope oppidulum Albany (Plantagenet) m. Januar. 1841. Herb. Preiss. No. 1204.

LORANTHACEAE Don.

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

NUYTSIA R. Brown. Endl. gen. n. 4587.

Meisn. gen. pag. 154. (110. 359.)

1. **Nuytsia floribunda** R.Br. glabra, foliis late linearibus obtusis crassis, staminibus petalis nudis aequilongis, stylo exserto. Lindl. Swan-River Bot. tab. 4. (mala.) Fenzl. in Endl. Enum. pl. Hügel pag. 57. Brown in Journ. of the royal geogr. Societ. I. pag. 17.

♣ Crescit in arenosis sylvae ad fluvium Cygnorum incolis Cabbagetree nuncupata, 18. Dec. 1838 florens. Herb. Preiss. No. 1608.

„Arbor 25-35 pedalis.“

LORANTHUS Linn. Endl. gen. n. 4586.

Meisn. gen. pag. 154. (110. 359.)

1. **Loranthus (Dendrophthoë) linophyllus** Fenzl. foliis ramulis floribusque albo-tomentosis fasciculatis oppositis alternisque tereti-filiformibus obtusis, cymis squamoso-dichotomis 3-5-floris simplicibus vel subcorymbosis axillaribus, floribus sessilibus, calycis limbo obsolete denticulato truncato, petalis 4-5 lineari-subspathulatis a basi liberis in alabastro clavato angulato coalitis, staminibus petalorum trienti superiori insertis, antheris aequilongis, stigmatibus filiformi. Fenzl. in Endl. Enum. pl. Hügel pag. 56.

Parasiticus in Casuarinis planitieci supra urbiculam Perth, 10. Oct. 1839. Flores coccinei (intus). Herb. Preiss. No. 1614.

2. **Loranthus (Dendrophthoë) Casuarinae** Miq. glaber, ramulis teretibus foliisque suboppositis vel oppositis tereti-filiformibus succulento-coriaceis brevi-mucronatis glabris, floribus axillaribus solitariis vel in pedunculo communi binis pedicellatis, calycis limbo obsolete denticulato, petalis 6 anguste subspathulato-linearibus in alabastrum tereti-subclavatum cohaerentibus, demum solutis, staminibus petalorum trienti superiore insertis, antheris anguste linearibus aequilongis, stylo filiformi.

Parasiticus in Casuarinis planitieci supra urbiculam Perth, 13. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 1615.

Rami teretes, trichotomi vel alternatim ramulosi, laeves, fusco-cinerascentes, haud fragiles. Folia subopposita, raro perfecte opposita, viridia, teretia, in sicca rugulosa, glabra, rigidiuscula, in brevem mucronem terminata, recta vel subflexuosa, 5-10 cent. longa, 1-2 mm. crassa. Flores axillares, solitarii vel in pedunculo communi 2-4 mm. longo bini, pedicellis

1 cent. circiter longis suffulti, basi *bractea* ovata brevi-acutata, concava, carnosa sustenti, 4 cent. paullo superantes, sulphurei, in sicco fuscii, virginales cylindraceo-subclavati versus apicem parumper curvati. *Calyx* 4 mm. longus, obconicus, margine pallido, obsolete denticulato. *Petala* linearia versus apicem aliquid dilatata, acuta. *Antherae* 7 mm. longae.

3. **Loranthus (Dendrophthoë) Preissii** *Miq.* glaber, ramulis teretibus, foliis suboppositis tereti-filiformibus strictiusculis subacutis muticis succulento-carnosis, floribus axillaribus in cymis di-vel trichotomis folio brevioribus, pedicellatis (vel intermedio sessili), calycis brevi-obconici limbo repando, petalis 5 lineari-spathulatis apice concavis, staminibus eorum quadrienti superiori insertis aequifoligis stylo filiformi sursum leviter incrassato paullo brevioribus.

Parasiticus in Acaciae specie, ad Perth, 8. Mart. 1841 florens. *Herb. Preiss.* No. 1611.

Præcedenti similis, sed inflorescentia et florum forma diversissimus. *Rami ramulique* teretes stricti, dichotomi, alterni, glabri, laeves, fuscescenti virides. *Folia* erecta, recta vel leviter curvata, 1-5 cent. longa, teretiusecula, in sicco rugulosa rigidiusecula, acutiusecula, mutica, 1-2 mm. crassa. *Flores* in cymis iteratim di-vel trichotomis *pedunculis* $\frac{1}{2}$ cent. circiter longis sustenti, *mediis* sessiles, *bractea* carnosa, colorata, ovata, acuta naviculari glabra apice subciliolato-lacera sustenti, in sicco fuscescens, $2\frac{1}{2}$ cent. longi, virginales clavato-cylindrici, basi parumper tumiduli, apice incrassato obtusi, rectiusculi, *calyce* brevi-obconico subcyathiformi 2 mm. longo, margine truncato repando, *petalis* 5 linearibus, apice elliptice dilatato acutiuseculo concavis, *staminibus* paullo infra partem dilatatam insertis, *antheris* spathulato-linearibus, acutis, 3 mm. longis. *Stylus* filiformis petala parumper superans, versus apicem incrassatus, stigmate vix capitellato subtruncato.

Loranthus Preissii, varietas? Rami et folia ut in specie, sed haec interdum omnino alterna. Flores desunt.

Parasiticus in Acacia Lehmanniana, reg. York. Flores coccinei, 8. Mart. 1840. *Herb. Preiss.* 1618.

4. **Loranthus (Dendrophthoë?) scoparius** *Miq.* glaber, ramis teretibus, foliis suboppositis erectis, axillaribus accessoriis plerumque subfasciculatis, filiformi teretibus acutiuseculis glabris, floribus

Parasiticus in Acaciae specie, reg. York, 20. April. 1840. *Herb. Preiss.* No. 1613.

Præcedenti foliorum forma similis, sed eorum situ plerumque fasciculato et minore magnitudine distinctus, ob flores incognitos haud tuto determinandus. Fruticulus dichotome et alternatim ramosissimus; *rami ramulique* teretes, in sicco fusco-grisei, densi, erecti. *Folia* versus ramulorum apices confertissima, viridia, erecta, subopposita vel plane opposita, accedentibus in eorum axillis plerumque uno binisve paullo brevioribus spurie fasciculata, filiformia, teretia, plerumque leviter curvata, glabra, 1-2 $\frac{1}{2}$ cent. longa, $\frac{1}{2}$ mm. in sicco crassa vel paulum crassiora, acutiusecula, mutica.

5. **Loranthus (Dendrophthoë) Miquelii** *Lehm.* *Mss.* glaber, ramis teretibus, foliis suboppositis vel oppositis longe petiolatis, infimis quibusdam obovatis vel obcordatis, reliquis lanceolatis vel linearibus plerumque leviter falcatis, obtusissimis muticis, basi attenuatis, uninerviis vel subtriplinerviis venulosis purpureo-marginatis, corymbis axillaribus

Loranthi Miguelii Cyperaspidites in Eucalyptis. caespitibus viridibus feracissimum. caten.
 platanis A. Stuart. Epiphyta nigra speciosa
 minima. nuda. nec feracissima viridi.
 fol. 1-3" lata 3-5" longa basi attenuata,
 flor. 1/2" laciniae filiformes virescentes
 tubo. flavo-roseo. Lili. filiformis.

Loranthus Breiten Meq.
 Petala saepe coalita in parte superiore, antherae tum
 connatae, etiam flores quadrifidi tetrandri observantur.
 stylus apice curvatus; bractea viridis margini pallido
 apice purpureo. Petala pallida, medio purpurea, super-
 ne in parte concava hyalata viridia. styl. purpureus.
 In araciae spul. ad latus montium Lofty-ranged
 Jan 2. 1848. In Leacia Melanocyclon.

Loranthus Breiten Meq. fol. 49. Petal. 1. In Aracia
 argyrophylla fides, fl. rhinoceros boreal.
 Ramis lutes nigris. Folia pinnatifida vel
 laciniosa pinnata complanata. Bractea phaeocoma
 Vm. aeth. pinn. magnitudine, ne dilata, rosea, fructu
 immo vire.

Loranthus Melaleuciae Lehm.

In Melaleucis plagae p. distal
 Galway. Leg. aust. 1851 et. Wilhelm
 Aquae ad L. Miraculosus ordo
 a corritum. Occurrit floribus tetra-
 meris.

Q. Legi in Eucalypti? ~~caespitibus~~ rarnis, quibus
 cumulate adhaerit & ab ejusdem plantae fo-
 lis colore lactone jam a longa insignitur.
 Flores d. 10. Jan. haud, plane coaliti
 ad rivum versus third creek. 8. M. —
 hb. L. s. cor. nuda & recurrens

Trigue lili. Lebanon

Loranthus pendulus Rob. & G.
Sed et raro occurrit in Casuarina quadrivalvi
e. i. i. ~~ad palmum~~

Tr. lili. ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~
ad palmum ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~

jun. Apr. 1848. fructiger. 80 m.
fructus vel semina parva viri-

dis.
In ieracipito odorata, son-
girophi a lili. ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~
Anth: ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~
Fructus ovatus!

Cum in Barkora australi tum in Malakura
curai Loranthos rari nequaquam tunc
florentes vel fructificantes. (L. Malakura
?)

Folia carnosa saepe utraque latere
convexiuscula vel toris exserta

ut stylus
Corolla (carnosa) apicem vix viridius
demum flavescens. Stylus viridis. Filamenta
saturate viridia autem nigrescentia

In Casuarinis secundum lili. &

Eucalyptus 100 y, flumen 200 y
H. 11 m. 323 ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~

& rariocis donata ita eadem arbore
(Myoporo regulari) affixari; corolla ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~
flava apicem vix viridius, stylus flavescens,
filamenta viridia, filamenta saturate
viridia. Rariora ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~ ~~ad palmum~~

[illegible]

solitariis longe pedunculatis folia aequantibus vel superantibus 4-5-fidis, ramis trifloris, floribus omnibus longiuscule pedicellatis, singulis ad basin bractea rotundata naviculari sustentis, calycis limbo truncato obsoletissime denticulato.

Parasiticus in Eucalyptis, distr. York, 13. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 1617.

Lorantho pendulo Sieb. fl. Nov. Holl. n. 241. DC. Mémoir. Loranth. Tab. I.! maxime affinis, sed species nihilominus distinctissima ob folia multo breviora obtusa uninervia, flores pedicellatos omnesque bracteatos.

„*Rami* valde elongati, penduli, brunneo-cinerascentes, *ramuli* purpurascens“, teretes, nodosi. *Folia* subopposita, summa plerumque plane opposita, coriacea, glabra, „purpureo-marginata“, longe petiolata, *petioli* semiteretibus $1\frac{1}{2}$ -3 cent. longis, *inferiora* quaedam obovata vel obcordata, 2-4 cent. longa, *reliqua* subobliqua, falcata, lanceolata vel summa linearia, obtusa, basi in petiolum contracta, 5-9 cent. longa, $1\frac{1}{2}$ -4 mm. lata, perspicue uninervia vel subtriplinervulosa, reticulata. *Corymbi* axillares solitarii, *pedunculis* purpureis $2\frac{1}{2}$ -4 cent. longis sustenti, umbellatim in ramos 4-5 teretes 1-1 $\frac{1}{2}$ cent. longos partitis, *ramis* trifloris, *pedicellis* 5-8 mm. longis. *Bractea* sub quovis flore subrotundata, concava, carnosae, apice subtilissime ciliata. *Alabastra* tereti-clavata, recta, 3 cent. circiter longa. *Calyx* obconico-cylindraceus, 3-4 mm. longus, limbo subdilatato truncato repando-denticulato. *Petala* 5 „coccinea“ linearia, apice subspathulato-dilatato elliptico concavo. *Stamina* trienti propemodum superiori inserta, petala circiter aequantia, *antheris* linearibus, versus basin attenuatis, fere 4 mm. longis. *Stylus* stamina parumper superans filiformis, sulcato-angulatus, stigmate „flavo“ subcapitellato, verruculoso.

***Loranthus Miquelii* Lehm. varietas?** foliis lanceolatis perspicue triplinerviis, floribus brevioribus (an nascentibus?) a specie differens. Baccae immaturae ovatae.

Parasiticus in Eucalyptis districtus Grantham, 7. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1612.

Uterius inquirendum num revera a specie differat, nam flores in praesente specimine $\frac{1}{2}$ breviores juveniles videntur et pressione tantum aperti.

6. *Loranthus* (*Dendrophthoe*) *Melaleucae* Lehm.

Mss. glaber, ramis ramulisque teretibus, foliis oppositis vel suboppositis decussatis longiuscule petiolatis coriaceis anguste spathulatis obtusis basi sensim in petiolum contractis obsolete uninerviis aveniis vel praesertim supra subvenuloso-reticulatis, floribus corymbosis pedicellatis pentameris, basi bractea oblonga concava glabra suffultis, calycis cylindraceo-conici longiusculi limbo subdilatato truncato.

In ramis Melaleucarum insulae Rotenest, 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1616.

Fruticulus dichotome ramosus. *Rami* vetustiores cylindracei cortice griseo-fusco laevi obducti, foliorum cicatricibus tuberculati, *ramuli* subteretes. *Folia* 2-4 cent. longa, 6-8 mm. versus apicem lata, sicca facile decidua. *Petioli* cum lamina confluentes semiteretes, $\frac{1}{2}$ -fere 1 cent. longi. *Pedicellus* 6 mm. longus teres sursum incrassatus. *Bractea* patula 1 mm. longa. *Calycis* tubus 1 mm. longus, carnosus, limbo angustissimo dilatato subundulato truncato vix aliquid repando.

7. *Loranthus* (*Dendrophthoe*) *miraculosus* Miq.

glaber, ramis teretibus, ramulis praesertim infra foliorum

insertionem compressis, foliis oppositis breviter petiolatis carnosio-coriaceis elliptico-vel subspathulato-lanceolatis basi contractis apice obtusis obsolete uninerviis aveniis, cymis breviter pedunculatis di-trichotomis, ramis trifloris, floribus pedicellatis vel medio sessili, bractea ovato-rotundata naviculari apice ciliolata, calyce truncato.

Parasiticus in Santali specie ad Wicklow, 8. Mart. 1841, florens. Herb. Preiss. No. 1609, ad York, 12. Apr. 1840 sterilis. No. 1610.

Species ob magnam cum planta materna similitudinem admodum insignis et in parasitismi physiologia memorabilis. Non solum enim foliorum forma, compage et nervatione, sed ramulorum juniorum compressorum, aetati tere-tium indole *Santalis* simillima.

„Frutex *Santalo* cui increscit simillimus sed paullo flavior“, dichotome ramosus, glaber, ramis teretibus laevibus, ramulis praesertim versus superiorem internodiorum extremitatem compressis, dilatatis. Folia opposita vix subopposita, decidua; cicatrices elevatas relinquentia, petiolis antice canali-culatis, 3-4 mm. longis sustenta, crasse carnosio-coriacea, elliptico-vel spathulato-lanceolata, versus basin cuneato-contracta, apice obtusa vel rotunda, $2\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ cent. longa, $1-1\frac{1}{2}$ supra medium lata, obsolete uninervia avenia. Cymae corymbosae, axillares, an et terminales, folio breviores, di-et-trichotomae, fragiles. Pedunculi triflori. Flores pedicellati vel inter-medio aliquando sessili. Bractae carnosae rotundato-ovata naviculari-concava, apice subtilissime ciliata. Calyx obconicus, repando-truncatus, 2 mm. paullo brevior. Petala 5, in sicco fusca, lineari-spathulata, apice elliptico concava, 8-9 mm. longa. Stamina paullo supra mediam altitudi-nem inserta, antheris lineari-ellipticis. Stylus stamina parum superans, fili-formis, anguloso-sulcatus, sursum plerumque flexuosus, stigmate verruculoso, subcapitellato.

UMBELLIFERAE Juss.

(Auctore A. BUNGE.)

HYDROCOTYLE Tourn. Endl. gen. n. 4355.
Meisn. gen. pag. 140. (102.)

1. **Hydrocotyle Cymbalaria** Benth. glaberrima, cauli-bus diffusis subulatis, foliis inferioribus subpeltatis cordato-reniformibus angulato-quinquelobis, lobis integerrimis acutiusculis, pedunculis petiolum subaequantibus. umbellis plurifloris capitatis, fructibus compressis orbicularibus utrinque quadricostatis. — Benth. in Endl. Enumerat. plant. Hü-gel. pag. 53. n. 175.?

In depressis arenosis umbrosis sylvae ad fluvium Cygnorum supra urbiculum Perth. 27. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2064.

Dubitanter huc refero plantulam, cujus pauca specimina praesto sunt: folia enim subpeltata, petiolo paulo supra basin laminae. nec margini inserto.

L. Quandang videtur affinis & L. congens
Loranthus miraculofus Mig.

F. plantaginifolia, ramis caulis
 non pilulosis ut in *F. ligulari*
 sed caulis, foliis et ramis
 glandulosis (areolatis
 glandulis *pyramidalibus* (Pateat
 p. 49!) ad flumen Ma-
 ray in vicinia montis Secor,
 raro communis! 1847. l. 6. Succus
 n. 224! *Folia* intusdem arbor
 quae *venulosa* & *lanceolata* *perforata*
myoporos *capitata* *myoporos* *perforata*. *Flor.* *aurant.*
varius *intra* *atro-rubri*. *Sedem* *lance*
varius *adhaerens* & *myoporos* *glaberrima*.
Hydrocotyle nana *Griffith*.

Syntherisma Hl. & Gilenii inferenda.
minuta, ^{pilifera} radice annua, cauli erecto simpliciter
 foliis sessilibus trifloris, lobis obovato-
 ovatis, apice ^{obtusis} - 3dentatis vel integris,
^{acutiusculis} brevibus ^{insetatis} dissimilis, "nec
 membranaceis lacrimatissimis, multulis

[illegible]

438 *Phellia annuina* Villarsiae forma
b. *Folia* *Pitulae* imilia
H. & J. Syst. veg. t. p. XXXII. *Pitula* ovato, rotundata acuta
obliquo margine vel apiculis subulata. Aetnae. Colorum p. castis exceptio
c. *convergentia* var. viridis. Mm, apt.
L. f. *convergentia* ! Nechl.

W. H. Th. vossii Th. 8. Thel.
Th. vulgaris R. Br. gen. num. p. 592.
H. pluricaulis Th. 4.
Jan. 1848. Leonardus Stuart
Th. edian in sigula Th. 4. Thel.
Laceped. Th. 4. Thel.
Th. verticillata Thel.
Th. verticillata, quae verticillata ut
species determinata est.

Stipulae majusculae, scariosae, integrae, margine tenuissime denticulatae. *Caetera* cum Diagnosi citata congruunt.

2. **Hydrocotyle hispidula** Bge. caulibus erectis basi nudis glabris, foliis utrinque sparse hispidulis cordato-reniformibus palmato 5-fidis partitisve quinquenerviis, lobis obovatis acute tri-pluridentatis, stipulis scariosis laceris, pedunculis oppositifoliis petiolo brevioribus, involucrio brevissimo scarioso-lacero, umbella subcapitata 7-10-flora, pedicellis aequantibus fructum didymum compressum minute punctulato hispidulum utrinque bicostatum.

In arenosis insulae Rotenest, 21. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2086.

H. tripartitae Rich. affinis videtur, sed folia, saltem radicalia et caulina inferiora semper quinquepartita, nec trisecta. — *Caules* erecti, 6" alti, a basi ad duas tertias partes nudi. *Folia radicalia* longe petiolata, petiolis 1-1½" longis; *lamina* ad summum 7" lata, 5" longa, ad medium usque vel profundius quinquepartita, sinibus acutis, rarius subrotundatis; *caulina* minora, petiolo inferiorum ad summum 8" longa, superiorum vix trilineari, *lamina* profundius partita, summorum interdum fere trisecta, lobis obovato-oblongis, inciso-pluridentatis; dentibus mucronato-acuminatis. *Umbellae* gracillimae, florentes subsessiles, globosae, vix linea dimidia in diametro latiores; fructiferae pedunculo 2-4" longo suffultae, pilis scariosis pedicellos subaequantibus involucretae. *Fructus* minuti 0,6" lati, 0,4" alti rufescentes. *Carpophorum* persistens, indivisum, rigidulum.

3. **Hydrocotyle callicarpa** Bge. annua, hirtula, erecta, foliis palmato-5-3-fidis, lobis ovatis acutis acute inciso-dentatis, supra sparse hirtis, stipulis scariosis fimbriato-laceris, umbellis oppositifoliis brevius longiusve pedunculatis exinvolucratis globosis 9-15-floris, fructibus pedicello brevioribus didymis dorso acutis lateribus turgidis ad commissuram utrinque profunde impressis laevibus subecostatis.

Ad portum Princess Royal Harbour, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2074.

Plantula 1-2 pollices alta. *Radix* exilis. *Caules* solitarii, erecti, basi rubentes glabri, superne hirtuli. *Folia* infima brevius petiolata, superiorum petiolis 2-3" longis, *lamina* inferiorum basi cuneata, acute 3-5-loba, lobis integerrimis, superiorum basi fere rectilinea, palmato 5-partita, lobis obovato-oblongis, inaequaliter acute 2-3-pluridentatis. *Umbellae* pedunculatae, pedunculo 1½-3 lineas longo, florentes in diametro lineam parum superantes, fructiferae fere bilineares, globosae. *Pedicelli* fructiferi 0,5" longi. *Petala* acutiuscula recta videntur rubicunda. *Styli* divergentes. *Fructus* singularis, a generis structura normali recedens; 0,6" latus, 0,4" altus, utrinque emarginatus, didymus; medio utrinque profunde impressus, cavitate subcordato-orbiculari producta sub juga lateralia arcuata tumida; *mericarpi* dorso acute marginata. *Semen* dorso arcuato acutum, medio turgidum, versus commissuram abrupte compressissimum. Nec haec ad stabiliendum novum genus sufficere videntur, quum caeterum habitu plantula nostra cum nonnullis veris *Hydrocotylis* Novae Hollandiae convenit.

4. **Hydrocotyle asiatica** L. DC. villosula vel glabrata, caulibus repentibus, foliis orbiculato-reniformibus aequaliter crenatis 7-nerviis, petiolis pedunculisque fasciculatis, umbellis capitatis brevi pedunculatis 3-4-floris, fructu orbiculari utrinque 4-costato. — DC. prodr. IV. pag. 62. n. 26.

In turfosis exsiccatis ad fl. Cygnorum prope urbiculam Freemantle, 17. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2065.

5. **Hydrocotyle tetragonocarpa** Bge. glabra, prostrata annua, foliis reniformi-orbiculatis 5-lobis, lobis late 3-pluricrenatis, stipulis ovatis scariosis margine laceris, umbellis oppositifoliis capitatis parce scarioso-involueratis 5-7 (?) -floris, fructibus pedicello longioribus acute tetragonis apice subtruncatis, mericarpiis trigonis utrinque obsolete costatis.

In arenosis conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest, 21. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2085.

Radix filiformis. *Caules* plures laxi prostrati. *Folia radicalia* longe ($1\frac{1}{2}$ -2 poll.) petiolata, ad summum 6" lata, a basi ad apicem $3\frac{1}{2}$ " alta, plerumque minora, sinu plerumque clauso orbiculata, rarius reniformia; lobi 5 subaequales late obovati, saepissime crenis tribus majoribus, interdum nonnullis insuper minoribus instructi. *Stipulae* scariosae late ovatae margine lacerae. *Folia caulina* radicalibus similia, at brevius petiolata. *Pedunculi* oppositifolii demum petiolum aequantes vel superantes. *Flores* sub anthesi capitati, capitulis vix lineae $\frac{2}{3}$ diametro metientibus. *Fructus* minuti 0.6" longi, 0.1" lati, tetragoni, basi subrotundati, in pedicellum acutati, apice subtruncati, stylis subsistentibus coronati, obsolete inter commissuram carinatum et jugo dorsalia acuta pluricostati. *Semen* triquetrum. Observavi etiam fructum e mericarpiis tribus conflatum, subhexagonum, angulis commissuralibus magis prominulis. Fructu ad commissuram haud compresso ab omnibus facile distinguenda, nec tamen, nisi invita natura, a genere removenda.

DIMETOPIA DC. *) Endl. gen. n. 4358.

Meisn. gen. pag. 140. (102.)

1. **Dimetopia hirta** Benth. ? piloso-hirta, caule elongato, foliis longe petiolatis trisectis, segmentis trifidis, lobis tridentatis, involucri umbella brevioris foliolis oblongis integris setoso-ciliato-dentatisve, mericarpio altero discolori laevi margine crenato. — Benth. l. c. ? (*Pritzelia discoides* Walp. l. c. ?)

In arenosis circa urbiculam Perth, 2. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2072.

Diagnosis et Descriptio nimis breves Benthamianae l. c. non male quadrant in nostram plantam, ad solvenda dubia tamen haud sufficient. Mericarpium interius maturum pallidius griseum, exterius pallide fuscum.

2. **Dimetopia Preissii** Bge. piloso-hirta, pumila, foliis longe petiolatis tripartitis, laciniis bi-trifidisque inciso-dentatis, involucri umbellam duplo superantis foliolis foliiformi-

*) *Observe* Huc sine dubio: *Pritzelia* Walpers Repertorium II. pag. 428. Petala inaequalia; mericarpia in speciebus a me observatis compressa, nec turgida, ex cl. Benth. Endl. Enum. pag. 54 etiam in *D. pusilla* compressiuscula. Mericarpium utrumque fertile, neque alterum, interius. constanter sterile, quale e manca observatione fructus immaturi *Pritzeliae* suae adseribit Walpers l. c. — *Hydrocotyle heteromeria* Rich. e descriptione fructus huc spectare videtur. Genus *Didisco* propius affine quam *Hydrocotyle*

bus, mericarpio altero concolori obsolete tuberculato margine acuto integerrimo.

In arenosis clivuli prope lacum insulae Rotenest, 21. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2089.

Specimina juniora tantum praesto sunt; praecedenti simillima, at involucro uti fructu evidenter distincta. *Radix* annua, (?) *folia* radicalia numerosa. *Petiol* 1-1½ pollicares, pilis complanatis patentibus apice crispatis hirsuti; *lamina* utrinque pilis similibus sparsis vestita. *Caulis* cum *umbella* primaria folia adaequans vel vix superans. *Involuceri* foliola inaequalia, nonnulla omnino foliiformia petiolata, omnia umbellam etiam fructiferam superantia. *Flores* in umbellis post anthesin contractis sub-20; radii exteriores longiores plano-compressi, rigidi, cum carpophoro post fructus delapsum fere tres lineas longi, fructus intimi subsessiles. *Mericarpium* utrumque brunneum, exterius muricibus nudique glochidatis dense obsessum, interius glabrum utrinque costa arcuata fere obsoleta notatum, versus marginem rugis vel tuberculis 2-3 parum elevatis instructum, margine ipso acuto continuo, nec ut in praecedente crenis aliquot interrupto.

DIDISCUS DC. Endl. gen. n. 4361.

Meisn. gen. pag. 149. (102.)

1. **Didiscus coeruleus** Hook. annuus hirsuto-villosiusculus, caule erecto simplici folioso, foliis petiolatis tripartitis, partitionibus 2-3-fidis, lobis grosse 2-3-dentatis, pedunculis involucrisque hirsuto-villosis. — DC. prodr. IV. pag. 72.

In virgultis inter saxa calcarea prope urbiculum Freemantle et in insula Garden Island, 18. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2055.

PLATYSACE Bge.

(Nov. gen. Hydrocotylearum.)

Calycis margo obsolete 5 dentatus. *Petala* oblonga retusosubemarginata concava intus carinata. *Styli* erecti juniores apice involuti e stylopodio crasso orti demum cum illo indurati subpungentes. *Fructus* a latere compressissimus didymus. *Mericarpia* aequalia dorso acuta utrinque unijuga, obsolete univittata, glabra. *Carpophorum* bifurcum. *Semen* compressissimum antice rectum semiorbiculare. — Umbellae compositae, involucratae; flores flavo-virentes.

Genus distinctissimum *Hydrocotylearum* tribui ob fructum adnumerandum, et quidem *Trachymeni* proximum, quamvis vitta obsoleta in altero vel in utroque mericarpiorum latere adest.

1. **Platysace cirrosa** Bge.

In lapidosis prope praedium rusticum Dom. Drummond, Victoria, 13. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2064.

Specimina fructifera foliis fere omnino orbata cum florum rudimentis. Ex schedula adjecta radix tuberosa, Aboriginibus „Kanna“ dicta, edulis.

Caules tenues, flexuosi, ramosi, ramis superioribus vel praesertim umbellarum pedunculis interdum cirrosis, sublignescentes, epidermide in inferiore parte soluta, angulato-sulcati: rami juniores subpentagoni. *Folia* (e rudimentis in ramulo juniori) sparsa, approximata, lineari-subulata, lineam circiter longa, in altero ramulo anguste linearia fere pollicaria. *Umbellae* terminales et axillares, compositae, involucratae, *involucri* foliolis linearibus brevibus: quinqueradiatae, accedentibus floribus nonnullis solitariis in pedunculis filiformibus inter radios 6-7" longos. *Umbellulae* 5-7-florae, involucellatae, radiolis in flore filiformibus 2" longis, interdum iterum divisis, 2 floris. *Calyx* cum ovario minutus, minutissime 5-dentatus. *Petala* 0,6" longa, aestivatione valvata (?). *Cremocarpium* nigricans, 2,5" latum, cum stylopodis 2" altum, utrinque emarginatum: emarginaturam superiorem explent et superant stylopodia compressa fere triangularia, cum stylo recto continua. *Carpophorum* persistens, 1½" longum, apice in furcam semicircularem divisam.

TRACHYMENE Rudge. Endl. gen. n. 4362. Meisn. gen. pag. 140. (102.)

1. **Trachymene teres** Bge. herbacea, glabra: caule tereti stricto apice ramoso, foliis inferioribus petiolatis multifidis, umbellis terminalibus multiradiatis compositis. mericarpiis compressis dorso acute carinatis rugulosis tuberculatis.

In arenosis inter frutices montium continuorum Darling's-range Perth. 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2083.

Radix lignosa, repens, (?) multicaulis: e basi suffruticosa surgunt caules sesquipediales erecti, stricti, ad summum crassitie pennae corvinae, teretes, striati, ad duas tertias partes usque indivisi, abhinc ramo unico vel 3-4 aucti: ramis erectis strictis. *Folia* (in speciminibus omnia jam deperdita: ex rudimentis) in parte inferiore caulis conferta, petiolata, petiolo 5-7" longo, trisecta, segmentis bi-trisectis lineari filiformibus (?) divaricatis; folia superiora, quorum ne rudimenta quidem supersunt, e cicatricibus ab invicem interstitiis 5-10 linearum remota. *Pedunculus* terminalis semipedalis. *Involucrum* polyphyllum. *Umbellae* radii subduodecim, (accedentibus radiolis nonnullis unifloris) 4-6" longi; *umbellulae* 3-9-florae: radiolis fructu duplo triplove longioribus. *Petala* obovata, subretusa, alba. *Styli* basi divergentes, arcuato-inflexi. *Fructus* 0,8" longi, subaequilati.

2. **Trachymene juncea** Bge. suffruticosa, glabra; caule angulato stricto ramoso, ramis erectis substerilibus, foliis caulinis linearibus, umbella terminali erecta subsolitaria composita multiradiata, mericarpiis compressis dorso acute carinatis tuberculatis.

In glareoso-sublimosis porrectis sylvae, haud longe a cataracta ad caput fluvii Cygnorum, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2069.

Ex schedula suffrutex tripedalis; praesto sunt *rami* herbacei, 1-1½ pedem longi, erecti, stricti, angulati, a basi ramosi. *Folia* fere omnia deperdita, e rudimentis lineari-filiformia, 5-6' longa, interstitiis fere pollicaribus ab invicem distantia. *Ramuli* juncei, rigidi, apice subpungentes semipedales vel breviores 3" longi, erecti, plerumque steriles. *Umbella* terminalis, longe pedunculata, composita, involucri polyphylli foliola linearia, radiis multoties breviora. *Radii* numerosi, ad summum 4" longi. *Umbellulae* sub 10-florae: radioli 1½" longi: flores flavicantes. *Styli* erectiusculi, apice

Cratylia Australasica Ford-Müll.

In udis limosis, subalgis in solietate Triglo-
chinis & cypripatis finium Holstestbay vafus.
^{vere!}

Plantula notabilis ^{genus} isthmi nusquam
nisi in America reporti! Herba flaccida
repens. Folia succulenta compressa pelli-
da septato-articulata. Flores virides in
rubros vergentes. Anthracae luteolae. Fructus
rorus parum compressus.

R. & L. Syst. veg. 6 p. XXXII

Cedrorus glaucifolius, Ford-Mueller

herbaceus, glaber, glaucus, foliis
palmatifidis, superioribus brevius
inferioribus longius petiolatis, illo-
rum pinnatis multipartitis, lobu-
lis angustis integris, fucilibus sub-
caevibus.

Unico tantum loco reperi, nempe: ad
quondam pionhem intra Monatalle
& Elders-rang in solo represso humore
pluvialium humido, umbrato.

Herba percreta paucifolia vel humi-
lior. Radix perpendiculis densa
internum digitum crassa flexuosa simplex
Caulis erecti parum ramosi, rarius
simplices ^{et} foliis pinnatis lineiglaucis
absorrenda superius. Folia ad 2" longa
oblonga petiolo in inferioribus 3". Fo-
runculi internum ultra pinnatis
^{laevibus} brevioribus. Umbellae ^{absorptae} paulo
minores quam ^{et} pilosi ^{et} minus divisi
pinnis fragrantibus. Fructus minoris ut
in D. piloso tanta styli longiores. For-
tan D. albidifloro maxime.
Anth: vni

[illegible]

convergentes. *Fructus* 1,2" lati parum longiores, compressi, ad commissuram contracti, dorso acuti, minutissime tuberculati.

3. **Trachymene Candelabrum** Bge. herbacea, glabra, multicaulis; caulibus acutangulis superne dichotome ramosissimis, foliis caulinis inferioribus petiolatis trisectis; segmentis filiformibus, superioribus linearibus, pedunculis oppositifoliis arcuato-reflexis, umbellis surrectis compositis multiradiatis, mericarpis dorso acute carinatis ruguloso-tuberculatis.

In calcareis haud longe ab urbicula Freemantle, 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2057.

Proxima videtur *Tr. pendulae* Benth., at umbellae multi-(10) radiatae et fructus evidentes tuberculati.

Radix simplex, crassitie pennae corvinae. *Caules* numerosi, erecti, stricti, graciles, pedales, a basi ad altitudinem pollicum 3-4 indivisi, abhinc dichotomi, superne ramosissimi, acutanguli, neque alato-compressi. *Folia inferiora*, usque ad umbellas primarias, mox emarcida petiolata, petiolo basi parum dilatato, subgibbo, 3^m longo, trisecta, segmentis lineari-filiformibus 2-3 lineas longis; *superiora* linearia, *summa* linea breviora. *Umbellae* primariae in medio caule oppositifoliae; pedunculus pollices tres longus, angulatus, arcuato-deflexus, apice inflexus. *Umbellae* surrectae, *involucrum* polyphyllum, foliolis lineari subulatis, acutis, reflexis. *Radix* sub 10. *Umbellulae* subdecemflorae, involucella patula. *Flores* ex schedula albi, in sicco flavicantes, plerique abortivi masculi. *Fructus* pedicello paulo brevior, 0,9" in diametro metiens, orbicularis, ad commissuram utrinque sulco profundo latiusculo exaratus; *mericarpia* dorso acute carinata, utrinque ruguloso-tuberculata; caetera generis.

4. **Trachymene scabriuscula** Bge. herbacea, multicaulis; caulibus angulatis scabris ramosis, foliis paucis linearibus abbreviatis, umbellis pendulis? mericarpis.....?

In arenosis humidis umbrosisque ad fluvium King's River, Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2075.

Specimen unicum incompletum, nondum florens, at praecedentibus evidenter congener et ab omnibus facile distinguendum scabritie caulium. Tota planta 2½ pollicaria; *caules* numerosi, ad angulos cartilagineo-denticulati, dichotomo ramosi, ramis flexuosis. *Folia* perpauca minuta, linearia, inferiora adpressa, suprema saepe reflexa. *Umbellae* virgineae cernuae, radiis tribus umbelluliferis nonnullisque unifloris. *Flores* nondum expansi. An *Tr. ramosissima* Benth. l. c.? sed caules scabri, et folia omnia integra.

5. **Trachymene platyptera** Bge. herbacea, multicaulis, ramosa, glabra; caulibus utrinque late alatis subdecem-nerviis, foliis omnibus sessilibus tenuissime multisectis, umbellis terminalibus, involucri foliolis multifidis integrisque, fructibus truncatis, mericarpis hinc turgidis dorso convexis tristriatis rugulosis etuberculatis.

α. turfosa; strictior, laevis, nervis alarum minus prominulis, venis transversalibus vix distinctis, involucri foliolis trisectis.

In solo turfoso-arenoso inter frutices densos ad portum Princess Royal Harbour, 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2062.

β. rupestris; flexuosa, asperula, nervis alarum venisque transversalibus valde prominentibus, involucri foliolis linearibus integris.

In fissuris rupium cacuminis montis Baldhead, 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2063.

Affinis *Tr. compressae* Spreng.; at distincta alis latioribus, foliis omnibus multisectis, mericarpiis tuberculatis. Varietates, quas proposuimus, (ex soli indole varia enatae?) forsan specie distinguendae, fructus forma, quantum ex immaturis varietatis α judicari potest, congruunt. *Radix* in utraque lignescens, tortuosa, crassa, multiceps. *Caulis* a basi ramosi, in α strictiores teneriores, ramis magis elongatis, in utraque ad summum 2,5" lati, in ϵ , quamvis juniore, 10 pollices alti, in β semipedales. *Folia* sessilia, omnia in lacinulas tenuissimas multisecta, in β pleraque emarcida, lacinulis, uti videtur, paucioribus brevioribusque. *Umbellae* in apicibus ramorum constrictis, sessiles, 4-5 radiatae, radiis subaequalibus, divaricatis, fructiferis 3-4 lineas longis. *Umbellulae* involucellatae, pauciflorae. *Fructus* submaturi lineam lati, 0,7" alti, basi apiceque subtruncati stylis brevibus reflexis coronati, lateribus hinc subconcavi, illinc turgidi, ad commissuram profunde contracti, dorso convexi, parce reticulato-rugulosi, tuberculis omnino nullis.

6. **Trachymene anceps** DC. herbacea, multicaulis, ramosa, glabra, caulibus ancipitibus quadrinerviis, foliis paucis summis brevissimis filiformibus, umbellis terminalibus sub-lateralibusque, involucri foliolis integris, fructibus ?
DC. Prodr. IV. pag. 73?

Ad promontorium: Cape-Riche, 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2061.

Specimen unicum vix florens. *Folia* omnia fere deperdita, summa videntur integra; attamen *Tr. compressa* Spreng. esse nequit: caules enim angustiores quam in icone Billardieriana (Nov. Holl. 1. tab. 101.) haud vere alati, sed ancipites 0,6"-0,8" lati (in *Tr. compressa* ex icone citata 1,6"-2" lati); umbellae multo minores graciliores, rami floriferi minus elongati. Melius igitur diagnosin *Tr. ancipitis* DC. quadrat.

7. **Trachymene stricta** Bge. herbacea, ramosa; caulibus strictis elongatis ramisque patulis anguste alatis; alis uninerviis, foliis inferioribus petiolatis minutis paucis, omnibus in lobos paucos tenuissimos fissis, umbellis axillaribus terminalibusque gracilibus, pauciradiatis patulis, involucri foliolis linearibus brevibus, fructibus turgidis cordato-reniformibus; mericarpiis dorso acute unicostatis dense acute tuberculatis.

In arenosis prope urbiculam Perth, 15. April 1839. Herb. Preiss. No. 2059.
Huc sine dubio etiam specimen incompletum nondum florens lectum: in limoso-calculosis jugi montium Darling's range, Perth, 16. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 2060.

Radix perennis, superne simplex, crassitie pennae corvinae vel columbinae; *caules* plures et rami inferiores elongati, stricti, bipedales et ultra, ad summum 1,5" lati, plerumque linea angustiores, longe indivisi; caule ipso tereti, at utroque latere abrupte in alam angustam expanso: alae plerumque uninerves; in caulibus parte superiore rami floriferi patentissimi, abbreviati. *Folia* pleraque jam ante anthesin deperdita, interiora (e rudimentis) petiolata, trisecta, segmentis tripartitis, linearibus divaricatis, superiora sessilia dissecta, segmentis abbreviatis, summa nonnulla integra filiformia. *Rami* umbelliferi in superiore parte caulibus horizontaliter patentes, $\frac{1}{2}$ -1-pollicares. *Umbellae* 3-5-radiatae, radiis inaequalibus patentissimis, 2 lineas circiter longis: *umbellulae* 3-5-florae, floribus albis, unico plerumque fertili. *Fructus* linea vix angustiores, reniformi cordati, commissura 0,6" longa. *Styli* patentissimi. *Stigmata* capitata.



8. **Trachymene filiformis** Bge. herbacea, glabra, ramosa; caulibus ramisque flaccidis elongatis filiformibus angustissime alatis, foliis minutissimis omnibus in lobos paucos subclavatos fissis, umbellis axillaribus terminalibusque gracillimis, fructibus turgidis didymis; mericarpiis dorso convexis unicastis dense acute muriculatis.

In arenosis umbrosis inter frutices densos ad rivulum prope villam cl. Andrews supra urticulam Perth, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2058.

Specimina valde incompleta. *Caules* basi flaccidi, tenuissime alati, 0,4" lati ramis sparsis laxis, pendulis. *Foliorum* vestigia pauca. *Umbellae* gracillimae inaequales, terminales vix $\frac{1}{2}$ pollicem in diametro latae, subquinque-radiatae, radiis nonnullis accessoriis, 1-3 floris; *umbellulae* pauciflorae interdum radiolo uno alterove umbellulifero. *Flores* plurimi masculi, pauci fertiles. *Fructus* multo minores quam in *Tr. striata*, 0,6" - 0,7" lati, commissura 0,4" longa, caeterum similes, at apice non rotundati, sed tantisper emarginati, *mericarpiis* turgidis, dorso obsoletius unicastis. *Styli* brevissimi patuli.

SCHOENOLAENA Bge.

Calycis tubus ovatus compressus; limbi laciniae cordatae vel peltatae deciduae cartilagineae albae. *Petala* quinque obovato-oblonga, lacinula acuminata infracta. *Stylopodia* planiuscula glabra. *Styli* subulati, demum corneo indurati, basi articulata decidui. *Fructus* evittatus compressus, mericarpiis quinquejugis, jugis nerviformibus, lateralibus a commissura remotiusculis. *Semen* compressum antice rectum. *Carpophorum* integrum liberum.

Plantae herbaceae junciformes; folia teretia. Umbellae compositae capitatae, glumaceo-involucratae.

Genus *Xanthosiae* proximum, ab hac differt stylopodiis, stylis et lacinis calycinis, a *Pentapeltide* petalorum forma et jugorum numero, ab utroque habitu.

1. **Schoenolaena juncea** Bge. umbellis capitatis; umbellulis quinque 4-5-floris, antheris lineari-oblongis.

In solo arenoso-anfractuoso ad fluvium Cygnorum supra urbem Perth, 26 Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2082.

Radix crassa, perennis, multiceps. *Folia radicalia* numerosa, florenti tempore emarcida, ex rudimentis, apicibus orbatiss, fere sesquipedalia, teretia, sulcata, fistulosa, crassitie pennae corvinae. *Caules* aequae crassi, 2-3-pedales, erecti, stricti, basi compressi, superne teretes sulcato-striati, superne ramosi, ramis erectis strictis. *Folium caulinum* primum circiter $\frac{1}{2}$ pedem supra basin caulis ortum basi dilatata semiamplexicaule, mox angustatum teres, striatum, superne canaliculatum, acutiusculum, 5-6 pollices longum; caetera ab invicem pollices 4-5 distantia, pauca, similia at breviora, summa 4 lineas longa. *Pedunculi* terminales et axillares 2-4 pollices longi. *Capitula* 4-5 lineas in diametro lata. *Involucri* foliola quinque, glumacea, 3 lineas longa, $1\frac{1}{2}$ lineas lata vel angustiora, basi attenuata, acuta, sordide albida, pallide fusco-lineata, adpressa. *Involucella* similia angustiora tetraphylla, flores superantia. *Flores* in quavis umbellula raro tres plerumque quatuor vel quinque. *Calycis* laciniae interdum orbiculatae, vere peltatae, vel saepius cordatae, sinu clauso, acutae, margine saepe denticulatae,

albo subdiaphanae, cartilagineae. *Petala* alba nervo lutescente, acumine longe inflexo. *Antherae* lineari-oblongae. *Styl'opodia* glaberrima, plana, persistentia, in sicco nigricantia. *Styli* cornei, rectiusculi, demum decidui. *Fructus* (maturus desideratur), 1,5" longus, 0,9" latus, compressus, basi cordatus, apice truncatus, margine rectilineus, albus, jugis tenuissimis filiformibus fusciscentibus.

2. **Schoenolaena tenuior** Bge. umbellis capitatis; umbellulis quatuor trifloris. antheris subglobois.

In solo subturfoso planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, 29. Jun. 1841. Herb. Preiss. No. 2080.

Præcedente multoties minor, glaberrima. *Radix* . . . ? *Folia radicalia* . . . ? *Caules* cum inflorescentia 6-9' alti, basi adscendentes, caeterum stricti, tenues, filiformes, simplicissimi, vel ramo uno alterove aucti, 1-4-phylli. *Folia caulina* florendi tempore fere omnino deperdita, linearia, basi parum dilatata, teretiuscula (?) superne canaliculata, acuta, rigidula, inferiora videntur pollicem longa, vel forsitan longiora, medium (ex unico integro superstiti) 3" longum, summa breviora squamæformia. *Umbellae* capitatae longe pedunculatae, pedunculo caulem aequante vel superante. *Involucri* foliola 4, glumaceo-cartilaginea, convexa, umbellam aequantia, adpressa, oblonga acuta, basi extus sordide albida, apice violacea, demum fusca, intus alba, 2" longa 0,7" lata, obsolete nervosa. *Umbellulae* 4, subsessiles; involucelli foliola 4: tria exteriora flores fructusque superantia, involucri foliolis similia, quarto interiori membranaceo scarioso albo, flores aequante. *Flores* in quavis umbellula 3, omnes hermaphroditi, paulo minores quam in *Sch. juncea*, caeterum similes. *Calyces* lacinae reniformes, sessiles vel subpeltatae, 0,2" latae albido-subdiaphanae, deciduae. *Antherae* subglobois fusciscentes. *Styl'opodia styl'ique* præcedentis. *Fructus* (quos observavi, omnes erant vacui) forma præcedentis, et minor, 0,7" latus, lineam fere longus.

XANTHOSIA Rudge. *) Meisn. gen. 140. (102.)

LEUCOLAENA R.Br. Endl. gen. n. 4364. sect. a.

Sect. CHLOROSIA. Involucri foliola parva herbacea vel membranacea; fructus paucijugi.

1. **Xanthosia glabrata** Bge. herbacea. glabra; caulis diffusis laxis, foliis petiolatis; petiolo ciliato, trisectis; segmentis oblongo-linearibus acutis margine integerrimis revolutis, umbellis axillaribus pedunculatis nutantibus untriflorisve, involucri foliolis linearibus longe ciliatis, calycis laciniis ovatis acutis, mericarpiis 5-jugis.

In umbrosis sylvae ad fluvium Canning, Perth, Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 2074

Planta videtur annua. *Radix* exilis. *Caules* tenues, laxi, 8-pollicares, vel longiores, ramosi. *Folia* petiolata, petiolo inferiorum pollicari summorum

*) *Observe.* Nomen antiquius servandum putavi. Genus forsitan in plura dividendum. Fructus enim in nonnullis speciebus paucijugati, in aliis multijugati; *X. rotundifolia* involucellis petaloideis, et habitu distat. Attamen in hisce omnibus calycis, petalorum styl'opodii, styl'orumque structura eadem. Longius distat *Leucolaena peltigera* Hook sine dubio generice distinguenda.

Xanthopis (Euxanthopis) pinnatifida
F. v. Mueller

He omnibus generis speciebus reser-
nicatur foliis ovato ~~oblongo~~ elliptici
prostrati pinnatifidis, rugulosis
pinnis minoribus hinc nova
species simulat.

Prope Pipers-river, Tarranall,
hli. N. 976. Vol. 51.

Anthosia? leucophylla, frut. null.

La parvus salpugnensis insul. hal
maturorum! part. austral. Inunda
z. fortissima nuda a X. glabrata et folia

Rumex Sch. Syst. veg. t. p. xxviii et glabritie seu
perspecta et foliis pinnatifidis
differt. flor & fruct. incompleti
sive emarginati. Fossile eadem ac *Athy-*
nolus? *granatensis*.
Sed *Chloropia*.

Stanthopa glabrata! Saenger,
in montibus a Clonitius
curia Delaives proximis
sed non ~~saft~~ firmum Ca
ramuta Bay uetus.

12 or 13: were

B minor. first time

a d reviam Tacuar

Harissine propre York-locum.
Tarnauicae, h. b. St. 1034

Ex investigationibus methueni in
Ang. pl. electis, ut varietas,
X. pilosae Bdg (*X. hirsutae* DC) esse
sufficit.

2" longo; omnia trisecta, segmenta lineari-oblonga, utrinque acuta, 8" longa, ad summum 1,2" lata, membranacea, subtus pallida, margine revoluta. *Umbellae* axillares, inferiores brevius pedunculatae, pedunculo lineam longo, superiores in pedunculo 4-lineari nutantes, in uno eodemque specimine 1-et 3-florae. *Involucri* involucellique foliola in unifloris 3-, in trifloris 6-linearia, flores superantia, pilis longis nitidis subplumosis ciliata. *Fructus* apicem versus hispiduli. *Stylopodia* majuscula villosa. Juga in quovis mericarpi 5, nerviformia, haud prominula.

2. **Xanthosia pusilla** Bge. herbacea; caulibus adscendentibus dense hirsutis demum glabratis, foliis petiolatis trisectis; segmentis oblongis basi attenuatis acutis obsolete dentatis ciliatis; ciliis demum evanidis, umbellis axillaribus sessilibus 1-2-floris erectis, calycis laciniis lanceolatis acuminatis, mericarpiis quinquejugis.

In arenosis humidis umbrosisque ad fluvium King's-River, Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2078.

Planta pusilla, vix bipollicaris; radix simplex, perennis (?) alte descendens; caules primarii erectiusculi, glabrati, rigidi steriles, laterales breviores adscendentes, hirsuti. *Folia* ima ad petiolum dilatatum, ovatum, amplexicaulem redacta, interdum apice tridentata; superiora petiolata, petiolo 2" parum excedente, trisecta, segmenta coriacea, lineari-oblonga, acuta, basi cuneata, juniora margine ciliata, demum glabrata, ciliorum basibus persistentibus denticulata, ad summum 4" longa, lineam lata. *Flores* solitarii vel gemini in axillis subsessiles, erecti; *involucri* foliola 3, flores superantia. *Calycis* lacinae angustiores longiores quam in praecedente. *Fructus* omnino praecedentis, sed parum angustior.

Sect. 2. EUXANTHOSIA. Involucri foliola parva herbacea vel membranacea; fructus multijugi.

3. **Xanthosia Hügelii** Steud. canescenti-hirta, caulibus erectis, foliis trisectis, segmentis linearibus subintegerrimis margine revolutis subtus tomentosis, umbellis nutantibus subquinquefidis, umbellulis bifloris, involuero involucellisque 2-3-phyllis, foliolis lanceolato-linearibus fructum multijugatum apice hispidum superantibus. — Benth. in Endl. Enum. plant. Hügel. pag. 55. sub *Leucolaena*.

In arenosis umbrosis sylvae prope lacum Mongerslake, Perth, 4. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2090.

4. **Xanthosia candida** Steud. caulibus demum glabratis procumbentibus erectisve, foliis ovatis oblongisve grosse et acute dentatis junioribus subtus niveo-tomentosis, umbellis breviter pedunculatis nutantibus subquinqueradiatis, involuero 2-3-phylo, umbellulis unifloris, media sessili exinvolucellata caeterorum involucello diphylo, foliolis oblongis fructum multijugatum puberulum superantibus. — Benth. in Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 55. sub *Leucolaena*.

a. prostrata.

In limosis scaturiginosis clivuli inter frutices prope praedium rusticum cl. P. Brown, ad fl. Cygnorum, 22. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2088.

β. erecta.

In sublimosis umbrosis districtus Sussex. 23. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2077.

Nisi caulibus erectis umbellisque brevius pedunculatis, foliis paulo majoribus, dentibus minus profundis, a var. α vix distinguenda.

Sect. 3. LEUCOLAENA DC. Involucri foliola magna, involucella petaloidea; fructus multijugi.

5. **Xanthosia rotundifolia DC.** ramulis dense hirsutis aut pube decidua submuriculatis, foliis reniformi-orbiculatis grosse et acute dentatis, umbella 3-4-radiata, umbellis multifloris, involucro et involucello 3-phyllis. 5. DC. Prodr. IV. pag. 75.

In solo subarenoso sylvae ad latum septentrionale montis Clarence, Plantagenet. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2066.

Involucrum in speciminibus observatis tetraphyllum, involucella triphylla, foliolo medio cuneato-obovato, lateralibus obliquis latioribus fere semicordatis acutissimis.

PENTAPELTIS Endl. Endl. gen. n. 4364. c.
Leucolaenae sectio.

Calycis tubus ovatus compressus, limbi laciniae 5 peltatae imbricatae cartilagineae. *Petala* 5 stipitata obovata acutiusecula, lacinula inflexa nulla. *Stylopodia* exigua plana glabra. *Styli* rigidi cornei, basi articulati. *Fructus* compressus turgidulus evittatus, commissura contractus; mericarpi novemjuga, jugis prominentibus.

Herba perennis multicaulis, folia semiorbiculata, basi truncata. *Umbella* composita 3-4-radiata, *umbellulae* subquadriflorae. *Involucra* involucellaeque rigida linearia.

Genus a *Xanthosia* abunde diversum: calycis laciniis, petalis, stylopodiis, stylis et habitu; a *Schoenolaena* habitu, petalis, fructibusque multijugatis.

1. **Pentapeltis peltigera Hook.** foliis reniformi-lunatis grosse dentatis, involucri involucellique segmentis lineari-subulatis striatis, lobis calycis peltatis, petalis spatulatis intus carinatis. Hook. Icon. pl. t. 45. (sub *Leucolaena*.)

Iconem citatam non vidi.

In sublimosis glareosis jugi montium Darling's-range, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2081.

ACTINOTUS Labill. Endl. gen. n. 4387.
Meisn. gen. 141. (103.)

1. **Actinotus leucocephalus Benth.** piloso-pubescens, foliis patenatim 3-4-sectis, segmentis integerrimis 3-5-fidis.

N^o Lium latifolium, L.
Lium angustifolium? Schlicht. pl. 13

Ad rivulos, in pratibus
hæc rarum.

Floriferum novum vidi
in h^{abitu} ~~floriferum~~ in plantam nostram
quadratiflorum & multiflorum
fruticulosum

+ Paenitulum vulgare, Ray.

Ad fl. Torrens sponte.

Anth: vere.

+ Anethum graveolens L.

Hic illi sponte Torrens.

+ Fassinara lativa L.

Ad fl. Torrens prope Kluizing
nunc se opponit.

+ Coriandrum lativum L. (sed a (pauca
prope Bethaniam sponte.)
H. 12. 12.

Xanthoxia leophylla?

A. ? geraniaceus Ser. Mill.

caulib. tenui - puberulis dense tomentoso-
puberulis mox glabrescentibus,
foliis bisinato-multifidis, segmen-
tis incisuris acutis incis, involucri
phyllis lanceolatis pubulato - cune-
atis ~~prode saxatilis~~ umbellatis
brevioribus. -

In collibus ad fl. 14. Darnyport prope
Kivoli - Ray. Flores involuti & parvis
reput. 0.12 48.

+ *Eriogonum* *diversum* *var. pub.*

Genus novum ex pteromiribus paritiformis latrunculis

et perinde ibus ac si de iudicio.

E. angustifolius "pp. In collibus submontibus cretaceis (monte
accidentale "type" Cretaceo 12-14 m
alt.)

*Herba acuta, straminea vel asperum alla in aliquot
partibus, pubescens. fol. alterna remota longe petiolata.*

tributa, sequentes rimatis planimye & teris - then vices rascata

[illegible][illegible][illegible]

1890

Sparganium angustifolium Mill. Pers.

St. Petersburg, Apr. 1843. Dear Sir

of Fortu-range, Apr. 1893, in the

univ. fol. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014

from in herb. Stuartiana. (Parks)

secundum quae in promptu sunt

Silene maritima Diogenes in Hungaria

same material as the
material.

qualunque
3. La pleurite ante

Bois de Laffy - rouge de litige

Quitham Bay, Light-river.

here
Guthrie was
none in plantation business.

судна венецианская с. римской

hanc quadratam uti ad Bathurst

luna valde variat, fœt sceleribus

Large non differt a plantis

Trichostema flavescens, 100 parvulus

... at E. ... (north)

same creek (near production)

cultratu (non ^{folium} striata)

Salicadium prostratum V. 90 (v. p.)

Helopeltis radiata var. *radiata* (Pictet)

Forquanniae, Nov. 1. 968, 1008.

Sp. Schizura fusca Laffm.

+ Periplaneta americana Linn.

Mr. Torrens ultra

of a spring in North - 100 ft. deep

Chelodactylus prostratus Poey.

[illegible]

Eurostichus, a species from the same locality as *Eurostichus*, a species from the same locality as *Eurostichus*.

реакции, вызывающей заболевание, а следовательно, для
прекращения болезни, следует по возможности устранить

disve laciniis linearibus, calycis limbo cupuliformi, corollis pentapetalis. Benth. in Endl. Enum. plant. Hüg. pag. 56.

In limoso-arenosis apertis ad fluvium Canning, 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2056.

Habitus omnino idem ac in caeteris *Actinoti* speciebus, signaque ad distinguendum genus: *Holotome*, levis momenti.

ERYNGIUM Tournef. Endl. gen. n. 4386.

Meisn. gen. 141. (103.)

1. **Eryngium pinnatifidum** Bge. caule superne breviter trichotomo infra ramificationem unifolio, foliis radicalibus in petiolum longe attenuatis oblongis pinnatipartitis; laciniis distantibus; infimis minoribus lanceolato-linearibus mucronatis, superioribus ovato-oblongis inciso-grosse dentatis; dentibus mucronatis, caulino solitario radicalibus simili, foliis subfloralibus ternatim verticillatis late petiolatis apice trifidis, capitulis pedunculatis, involucri foliolis suboctonis lanceolatis integerrimis rigidis spinescentibus capitulum superantibus, paleis similibus minoribus, petalorum lacinulae inflexae tripartitae lobis filiformibus.

In solo fertili montium continuorum Darling's-range, Aug. 1841. Herb. Preiss. No. 2054.

E. ovino Cunn. affine videtur, attamen caulis (e specimine unico) vix erectus neque dichotomus, folia minime bipinnatifida, lacinae nec lineares, nec spinosae. — Glaberrimum. *Folia* radicalia cum petiolo 9-11 poll. longa, pinnatipartita, partitionibus sub 10, infimis integerrimis, minutis, alternis, superioribus oppositis pollice dimidio longioribus 3-4^m latis, summis confluentibus in lobum 7-8" latum, trifidum, grosse inciso-dentatis, dentibus longe mucronatis. *Caulis* pedalis laxis, decumbens (?), striatus, a basi ad duas tertias partes nudas, hic unifolius; folium radicalibus simile 3½ pollices longum, rhachi dilatata, in sicco transverse nodulosa; in apice caulis folia tria verticillata, ad petiolos foliaceos semiamplexicaules apice trifidos, lobis integerrimis redacta; superata pedunculo capituli primarii pollicari, ramisque tribus paulo longioribus bibracteatis, semel dichotomis. *Involucri* foliola rigida, carinato-trinervia, pungentia, 8-9 lineas longa, caerulescentia. *Paleae* similes, at angustiores et breviores, flores parum superantes. *Calycis* tubus obsessus vesiculis ovato-lanceolatis, obtusiusculis; lacinae tubo longiores longe cuspidatae. Petalorum lacinula infracta, apice carinata tripartita, lobis filiformibus involutis.

2. **Eryngium tetracephalum** Bge. caule erecto stricto sulcato infra ramificationem nudo semel trichotomo, foliis radicalibus longe petiolatis pinnatisectis; segmentis remotis linearibus integerrimis vel hinc inciso-uni-bidentatis acuminatis pungentibus, caulinis tribus verticillatis similibus subsessilibus, capituli terminalis pedunculati involucri 8-phyllo, ramis tribus diphyllis monocephalis, capitulis pedunculatis, involucri 6-phyllo; foliolis lanceolatis spinosis capitulum excedentibus, paleis similibus minoribus, petalorum lacinula apice longe fimbriata.

In arenosis sylvae prope lacum Keiermuh, Perth. 27. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2053.

Præcedenti proximum, at notis in diagnosi indicatis abunde diversum videtur. Ad *E. ovinum* Cum., quoad diagnosin hujus incompletam, referri nequit, ob folia simpliciter pinnatisecta, et caulem semel trichotomum quasi umbella 4-radiata terminatum. Longius distat ab *E. vesiculososo* Labill., et *E. angustifolio* DC. — *Folia radicalia* pedem longa vel breviora, petiolo interdum plus quam semipedali, angusto, lineari, rhachis angusta nodulosa, segmenta sub 10, inferiora minora integerrima, media ad summum pollicem longa, lineam lata, acuminato-pungentia, integerrima, vel hinc dente solitario vel binis distantibus subulato-pungentibus munita, extimum elongatum lineare, integerrimum. *Caulis* penna anserina tenuior, cum inflorescentia 1-1½ pedalis, a basi usque ad altitudinem 9-12 pollicum nudus, profunde sulcatus: superne foliis tribus verticillatis munitus, petiolis basi dilatatis; caeterum folia radicalibus similia, inaequalia, uno longiore, ramos aequante. *Rami* 3, circa pedunculum terminalem inaequales, pedunculo breviores vel longiores, supra medium bifoliati, foliis oppositis pinnatifidis, vel rarius integerrimis, in axillis interdum ramulis abortivos gerentibus. *Capituli terminalis* subglobosi, 4-6^m in diametro, pedunculus 2-3 pollicaris, striato-sulcatus; *involucrum* sub 8-phyllo capitulum superans, erectum: foliola 6-8 lineas longa, basi linea latiora, carina nervisque marginalibus subtus prominentibus, rigida, spinescentia; paleae pleraeque minores, flores subaequantes, una alterave longior spinosa, longe e capitulo prominens. *Capitula ramealia* minora involucri sub 6-phyllo. *Calyxis* tubus dense obsessus vesiculis oblongo-linearibus elongatis obtusis, intermixtis brevioribus, limbi laciniae lanceolatae acuminato-pungentes. *Petalorum* lacinula inflexa apice fimbriis piliformibus subquatuor involutis appendiculata. *Stamina* longe exserta.

Observ. Petalorum forma hac species ab omnibus, quae examinare licuit differunt. In plerisque speciebus (*E. campestri*, *Burgati*, *Billardieri*, *Spina alba*, *dilatato*, *amethystino*, *maritimo*, *plano*, *dichotomo*, *pusillo*, *tripartito*, *tricuspidato*, *ilicifolio*.) petalorum lacinula apice obtusa; rarissime fimbria una alterave brevi aucta v. gr. in *E. triquetra*; in paucis (*E. glaciali*, *giganteo* et *alpino*) petala acuminata, acumine inflexo, denique in *E. corniculato* lacinula dilatata lacera.

HELOSCIADIUM Koch. Endl. gen. n. 4397. Meisn. gen. 142. (104.)

- Helosciadium (Cyclospermum) australe** Bge. glabrum; caule erecto parce dichotomo-ramoso angulato. foliis sparsis inferioribus pinnatisectis; segmentis paucis basi cuneatis 2-3-partitis; laciniis lanceolatis acuminatis integerrimis incisive, superioribus trisectis; segmentis basi attenuatis elongatis lanceolatis integerrimis, umbellis oppositifoliis subsessilibus pedunculatisve 4-6-radiatis, involucri utroque nullo, petalis apice inflexis, jugis crassiusculis subserosis.

In solo turfoso ad fluvium Cygnorum, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2052.

Specimina duo pedalia, superne bis vel ter dichotoma, internodia inferiora 3-2½ poll. longa. *Folia inferiora* emarcescentia, petiolis elongatis fere bipollicaribus suffulta, pinnatisecta bijuga; segmenta pollicem longa, lateralia bipartita, lobo altero integerrimo, altero inciso trifido, terminale cuneatum tripartitum, lobis basi lineam, et quod excurrit, latis, lanceolatis acutis integerrimis: *folia superiora* petiolo pollice dimidio breviori, dilatato insi-

Helopseolium (Cyclopernum) parvum Fr.

glabra, caulis erectis simplicibus angulatis,
foliis radicalibus congestis primariis, ^{semen-}
~~rad. bi-trifidis, in trifidis, integris~~
~~in bracte monumbractis longe~~ Dec. 30. 1849.
cum terminali trilobis, lobis obtusis, ^{crenatis} ~~trifidis~~
dentatisve obovatis vel oblongis basi cu-
neatis, ciliis cartilinis minus differtis et fipsis
acutioribus, umbellis oppositifolius vel
~~axillaribus simplicibus~~ 1-2 radiatis, radi-
pedunculatis vel ^{rad. pediculis} ~~scapulis~~ umbellatis
5-8 floris, radiolis ^{rad. pediculis} ~~multis~~ brevioribus vel
brevioribus, involucri utroque nullo
loris inundatis limphis haec rariora per
coloniam!
Herb. vix digitalis! ut th: unc

E. vesiculosum Lab.

Ad flumen Gaurli. Jan. 18. 1848.
 Ibidem in graminibus apud R.
 Hanion! Apr. 14. 1848.

B. prokirscheni Ferd Müller.

partibus omnibus tripla
validioribus, fuitis multo
latioribus, in alacra uiderem
hystaphilla.

Comm. lat. radicalia diffusa
 & A. Steud. fulcum fragmantula
 nonnulla hujus varietatis
 mecum communia vixit, et
 sacrificia diffusa haec outor
 sum, solum sed huius proprium
 In hermites, ad Encarnis Pa
 alilique; Plantam eadem in
 Tasmannia vixit. Ed. Steud.
 putat; ubi etiam Ed. L. Sillard
 E. vixit, solum suum de Lexib.

Asp. South Esk-river Tarmannie,
No. IV, n. 406.

Provenç's

P. papillam, fuscolis dybitum.
Noth. Goculeni. 2nd M.

dentia, trisecta, segmentis basi angustatis, acuminatis 15^m longis, ad summum 1½^m latis. *Umbellae* in superiore caulis parte oppositifoliae, inferiores subsessiles, superiores pedunculatae; pedunculus 3-4 lineas longus, acute angulatus; radii plerumque 6, in umbella deflorata 5-7 lineas longa. *Calycis* margo obsoletus. *Petala* ovata acuta, lacinula inflexa. *Fructus* maturi 0,7^m longi, turgiduli, a latere compressiusculi; juga crassiuscula aequalia, vittae in quavis vallecule solitariae, latiusculae. *Styli* patentes reflexi. *Carpophorum* integrum liberum. — Sine dubio igitur ad *Helosciadii* genus referenda species.

2. ? ***Helosciadium prostratum*** Bge. caule procumbente flexuoso, foliis pinnatisectis segmentis petiolulatis pinnatifidis lacinii 5 lanceolatis ultimis apice trifidis, umbellis subsessilibus oppositifoliis, involucri submonophyllo. Hook. Icon. plant. tab. 305. sub. *Petroselino* (tabula non inspecta). DC. Prodr. IV. pag. 102.?

Apium prostratum Labill. ex schedula Preissii adjecta.

Ad fluvium Cygnorum, 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2051.

Specimina communicata duo vix florentia, igitur genus haud extricandum. *Petala* acuminata! ad *Petroselinum* vel ad *Apium* referre dissuadent. Praecedenti videtur congener, et evidenter affine, at caules multo crassiores profunde sulcati, folia magis decomposita.

DAUCUS Tournef. Endl. gen. n. 4497.

Meisn. gen. 141. (107.)

1. ***Daucus brachiatus*** Sieb. caule erecto foliis bipinnatisectis segmentis multipartitis, lobis linearibus, involucri foliolis multifidis, radiis inaequalibus divergentibus, aculeis fructus apice glochidatis, carpophoro indiviso. — DC. Prodr. IV. pag. 214.

In arenosis sylvae ad fl. Canning, Perth, 31. Oct. 1839 et in Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 2071 et 2073.

Hispiditate tantum a planta Sieberiana differe videtur. Comparatis specimenibus *D. montani* Willd. (*toriloidis* DC.), mexicanis, *D. montevidensis*, II. Berol. cultis et specimine Poeppigiano e Valparaiso *D. australis* Poepp., quorum differentiae vix ad distinguendas varietates suppetunt, sententiae cl. Benthani (Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 56.) assentio qui has species haud diversas esse affirmat.

EPACRIDEAE R. Brown.

(Auctore O. GUIL. SONDER.)

Tribus I. STYPHELIEAE Bartl.

STYPHELIA Smith. Endl. gen. n. 4267.

Meisn. gen. 248. (156. 157.) **STYPHELIA** et **Soleniscia** DC. Prodr. 7. pag. 735 et 737. *)

1. **Styphelia elegans** Sond. erecta, ramulis tenuissime puberulis, foliis ovatis acuminatis rigide mucronatis coriaceis supra nitidis subtus glaucis striatis, corollae tubo elongato intus fasciculis barbatis destituto.

Styphelia tenuifolia Lindl. Swan-River bot. pag. 25.? *Soleniscia elegans* DC. l. c. pag. 738.

In arenosis silvae prope Bellevue, ad fluvium Cygnorum, d. 14. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 468. (Drummond n. 481!)

„Frutex bipedalis erectus.“ *Folia* coriacea 6-9 lin. longa, 3 lin. lata, supra laevia nitida, subtus glauca striata, margine denticulata scabra. *Pedunculi* axillares brevissimi, 1-2-flori. *Bracteae* 4, obtusae apiculatae. *Calyx* 5-partitus, pergamaceus, foliola lanceolata $2\frac{1}{2}$ lin. longa. *Corollae* albae tubus calyce 6-tuplo longior, gracilis, extus glaberrimus, intus apice velutinus, basi glaber, lobi lineares, revoluti, barbati. *Filamenta* exserta. *Discus* hypogynus 5-dentatus, dentibus acutis ovario brevioribus. *Ovarium* 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Stylus* stamina superans. *Stigma* capitella-

*, Characteres quibus cl. DC. genera *Solenisciae* et *Stypheliae* distingui vult, ad corollam gracilem et praesentiam fasciculorum barbatorum in basi corollae redeunt, discum enim hypogynum quem in *Soleniscia* deesse dicit, in exemplaribus ad unum omnibus invenio. Verum neque majorem corollae longitudinem neque absentiam praesentiamve fascicul. barbat. tantum esse ex quibus genus singulare distinguatur, cum *Astroloma humifusum* et *longiflorum*, nec non *Conostephium* species sola praesentia et absentia fasciculorum barbatorum distinguiderimus, nemo est qui concedat. Cum denique fructus *Solenisciae* et *Stypheliae* non differant utrumque genus in unum comprehendere non dubitavi. Etiam *Stenantherae* aliquam speciem nondum descriptam a *St. pinifolia* praesentia fascic. barbat. distinguere, hac occasione significare licebit.

Stenanthera conostephioides Sond. ramulis hirtellis, foliis erectis adpressis, subpatulis linearibus mucronatis margine ciliatis revolutis utrinque pilosis supra scabriusculis, pedunculis axillaribus brevissimis recurvis, cor. tubo intus juxta basin fasciculis barbatis instructo. Ad Port Adelaide leg. Th. Siemssen 1839. (com. amic. Steetz.) *Frutex* erectus ramosus, ramis glabris, ramulis pubescenti hirtellis. *Folia* 8-11 lin. longa, lineam lata, supra viridia subtus pallida striata, mucrone pungente terminata. *Flores* in axillis foliorum solitarii subpenduli. *Bracteae* circ. 8, margine ciliolatae, inferiores brevissimae rotundatae, superiores acutiusculae glabrae. *Calyceis* foliola subacuminata glabra, bracteis longiora. *Corollae* tubus concolor, coccineus, calycem aequans, 5 lin. longus, extus apice pubescens. intus glaber, prope basin vero fasciculatim barbatus, limbi lobis semibarbatis apice glabris. *Filamenta* brevissima alte adnata, antheris linearibus sublongiora. *Gynathus* hypogynus integer. *Ovarium* glabrum 5-loculare. *Stylus* corollam aequans, glaber, stigmate capitellato. *Stigma* glabrata, foliis ciliatis supra laevibus. In regionibus interior. Nov. Holl. legit cl. Mitchell.

Cryptal, brook!

Lefty range, hb. N. n. fr. 24!
In monte Tarrus. G. L. Hart. 1848
in montibus graminosis paucum
Habitat rursus? Apr. 27. 1848.
calyx cum bracteis igneus ruber
corolla pulchra et longa

D. glabrata. Sonder.

fruticulus erectus strigosus 2-3'

In montibus Warosa range
in fruticosis group Tarrum

in aruapis Jul. 1848. Tarrus

Habitat rursus? hb. N. n. 34 & 47

in lapidosis nemorosis Canis

Angl. a Quintus - Bay? In

Maulesveld et in Plongam

in rangaris island

* *Xenanthoxa unifolia*! Fr. R.

In Maulesveld fruticulus


ramulis puberulis.

fruticulus, pedalis ad fl. vi

Pauli Tarrum in raro

occurrens. Rev. 40. hb. N. n.

et. 60.



Spiralama? balaenatum fr. ¹⁸⁴⁴
 (1) *Catara montium*. Serra ¹⁸⁴⁴
 Frut. erectus ad 3' plus minus
 v. multiflori nisi magis in basin
 attenuatis.

7. *Bo. praeor.* 1. p. 338. 29. 4. 4. f. o. 4. p. xli

A. humifusum. R. Br.
Loffy-range. W. — In praeceps
simum rivoli. Bay vesper Oct 48
in collibus frondum fl. South.
Est river Apr. 4. 1844. hb. N. Tarn
In. 573.
Ina Inaortopold et Villiamam
Caris maritima's cult. 50.
Kangaroo island.

A. denticulatum! H. Bn.

Myrsine sp. nov. *St. Laffy range*
n. Dec. 1848. In convallibus ad riv.
Thud. Creek Jan. 48. altilique Laffy-
range febr. - Apr. 48 - In montibus
altissimis calonicis naves Carum
Victoriae Apr. 48 - In communibus
montis Porturi, festa Michaelis
1848. Supra viridi. - nigrescentes. -
In collibus fereis ad fl. Gairdri
Apr. 49. (ex. humiferae) *Myrsine*
In jugo montis Kai-pu-puti, Wang-
sa-range. Apr. 14. 1848.
In portum cognominis Tasmania
(Oct. 1849. h. l. 7. 620. et I, 37.
B. adpressius, f. m.
Plindus - range.

tum. *Drupa* oblonga, styli basi mucronata, calyce duplo longior, coerule-scens, subexsucca, putamine osseo solido.

β. *lanceolata*, foliis lanceolatis acuminatis.

In glareosis inter frutices districtus York, d. 25. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 469.

ASTROLOMA R.Br. STOMARRHENA et ASTROLOMA DC. Prodr. *) Endl. gen. n. 4268. Meisn. gen. pag. 248. (156.)

1. *Astroloma longiflorum* Sond. caule prostrato ramosissimo, ramulis pubescenti-hirtellis, foliis patentibus lanceolato-linearibus mucronatis supra convexiusculis margine ciliatis, bracteis calycibusque pubescentibus, corollae tubo intus prope basin fasciculis barbatis destituto.

Stenanthera ciliata Lindl. Swan-River bot. pag. XXV.

In arenosis silvae prope oppidum Perth, d. 13. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 419. (Drummond n. 474!)

Suffrutex pedalis et ultra, ramis elongatis. *Folia* numerosa, horizontaliter patentia, linearia mucrone subulato terminata, subtus striata, 4 lin. longa, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Flores* axillares, solitarii, brevissime pedicellati. *Bractee* 4, obtusae, apiculatae, inferiores minimae, superiores calyce triplo breviores. *Sepala* ovata, subacuminata, ut bractee extus pubescentia. *Corolla* purpurea, elongata, calyce 3-4-plo longior (circ. pollicaris) tubo intus prope basin glabro, limbo erecto vel subpatente, acuminato, barbato, apice glabro. *Filamenta* brevissima, ad faucem sessilia. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus cyathiformis, subdentatus. *Ovarium* glabrum, 5-loculare. *Stylus* glaber corolla brevior. *Stigma* capitatum. *Drupa* subexsucca, subglobosa, styli basi superata, 5-sperma, calyci aequilonga.

Simillimum *A. humifuso* Br. differt tantum: tubo corollae longiore graciliore fasciculis villorum carente et limbo apice glabriusculo, fructus et reliquae utriusque plantae partes non differunt.

2. *Astroloma foliosum* Sond. caule prostrato, ramis adscendentibus pubescenti-hirtellis, foliis confertis linearibus mucronatis supra convexis margine ciliatis, bracteis calycibusque glabris.

In limoso-calculosis ad rivulum planitiei haud longe a praedio rustico Mad-dington, d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 420. (Drummond n. 472!)

„Frutex bipedalis.“ *Rami* hirtelli ramulis brevibus foliosissimis dense obsiti. *Ciliae* foliorum longae, tenues. *Bractee* obtusae, apiculatae. *Calyces* acuminati. *Corolla* deest. *Drupa* globosa Pisi minoris magnitudine, calyce brevior.

Valde affinis *A. humifuso* et *longifloro*, differt: caule elatiore foliosis-simo, foliis adpressis subbrevioribus, marginae magis revolutis, sepalisque angustioribus.

*) *Stomarrhenae* genus, quod cl. DC. *Stypheliae* proximum judicat, secundum observationes meas ab *Astrolomate* non diversum est, characteres enim *Stomarrhenae* in plurimis *Astrolomatis* speciebus inveniuntur.

3. **Astroloma discolor** Sond. caule prostrato ramoso, ramulis hirtellis, foliis linearibus mucronatis supra convexiusculis viridibus, subtus pallidis striatis, margine rigide ciliatis, bracteis calycibusque pubescentibus, corollae tubo intus fasciculis barbatis destituto.

In arenosis silvae prope oppidum Perth, d. 13. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 419 ex parte.

Rami nunc erecti simplices, nunc humifusi, ramulis adscendentibus brevissimis. *Folia* 3 lin. longa, semilineam lata, ramulorum subbrevia. *Calyces* pallidi. *Corollae* (purpureae) tubus longissimus, intus a basi ad apicem omnino glaber, limbi lobis acuminatis, barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* oblongae. *Discus* hypogynus cyathiformis, subdentatus. *Ovarium* glabrum. *Stylus* filiformis, glaber, non exsertus. *Stigma* subcapitatum. Summopere affine *A. longifloro*, sed diversum: foliis brevioribus discoloribus erectis subadpressis, quorum ciliae sunt rigidiores.

4. **Astroloma dilatatum** Sond. caule diffuso, ramulis adscendentibus glaberrimis, foliis lineari-spathulatis mucronatis, margine revoluta rigide ciliatis, glaucescentibus. bracteis calycibusque pubescentibus.

In arenosis silvae prope oppidum Perth, d. 13. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 419 (ex parte) (Drummond!)

Habitu proxime accedit ad *A. prostratum* et *longiflorum* sed ramulis glaberrimis, foliis linearibus apice latioribus satis distinctum. *Folia* $4\frac{1}{2}$ lin. longa, apice semilineam lata, subglauca, concoloria. *Calyces* $2\frac{1}{2}$ lin. longi, bracteis 4 obtusis mucronulatis. *Corollae* desunt.

5. **Astroloma glaucescens** Sond. caule erecto ramoso, ramulis glabriusculis, foliis erectis subadpressis anguste linearibus planis, mucrone subulato terminatis, margine serrulato scabris, bracteis calycibusque glabris.

In Australasia occidentali. Herb. Preiss. No. 409. (Drummond n. 478!)

Frutex, ut videtur, ultra pedalis. *Folia* 5 lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. lata, conferta, cauli ramisque subadpressa, glaucescentia, subtus obsolete striata. *Bractae* 4, obtusae. *Sepala* lanceolata. *Corollam* non vidi. *Drupa* subglobosa, Pisi minoris magnitudine, styli basi mucronata, 5-locularis.

Propter folia tenuia conferta *Sienantherae pinifoliae* Br. haud absimile.

6. **Astroloma microcalyx** Sond. caule erecto ramoso, ramulis pubescentibus, foliis patentibus linearibus mucronatis margine revoluta rigide ciliatis, bracteis calycibusque puberulis glabrisve.

Inter saxa calcanea clivuli prope Lime-Kiln. Perth, d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 470. (Drummond n. 470!)

„Frutex 1- $1\frac{1}{2}$ pedalis.“ *Radix* ramosa, fibrillosa. *Caulis* sublignosus, epidermide fusco-nigricante rimosa, penna gallinacea subcrassior, nunc a basi nunc apice tantum ramosus, rami erecti, subnudi, ramuli foliosi. *Folia* inferiora sparsa patentia, 4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora magis adpressa confertiora. *Flores* miniati folium superantes. *Bractae* 4, obtusae, mucronulatae. *Calyces* parvuli cum bracteis vix 2 lin. longi, sepalis sublanceolatis, apiculatis. *Corollae* tubus calyce duplo longior, intus juxta basin fasciculis 5 barbatis instructus; limbi lobis acuminatis, barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus cyathiformis, sub-

integr. *Ovarium* discum superans, glabrum. *Stylus* filiformis, glaber, non exsertus.

7. **Astroloma Baxteri** A. Cunn. erectum, ramosissimum, ramulis pubescenti-hirtellis, foliis linearibus mucrone apiculatis serrato-ciliatis erectis, corollae lobis linearibus glabriusculis. — A. Cunningham. ap. DC. Prodr. 1. c. pag. 739.

In arenosis ad Stirling's-terrace, Plantagenet, d. 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 425. New-South-Wales leg. Fraser! (herb. Shuttleworth.)

„Frutex tripedalis“. *Folia* 5 lin. longa, margine subrecurva. *Bracteae* 4 vel 6, inferiores minores, superiores 2 calycem dimidiam aequantes, omnes obtusiusculae, apiculatae. *Sepala* acuminata, corolla duplo triplove breviora, glaberrima. *Corollae* lobi erecti, glabriusculi, apice vix barbupati. *Drupa* globosa Pisi minoris magnitudine stylo longo glabro persistente terminata *).

8. **Astroloma divaricatum** Sond. caule erecto ramoso, ramis divaricatis, ramulis tenuissime puberulis, foliis coriaceis patulis reflexisve lanceolatis basi subcordatis apice mucronatis, margine recurvato integerrimis vel denticulato scabris subtus glaucescentibus, bracteis calycibusque subcoloratis glaberrimis.

Leucopogon epacridis DC. 1. c. pag. 754!

In glareosis silvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, York, d. 12. April 1840. Herb. Preiss. No. 467. (Drummond n. 468!)

„Frutex bipedalis“ ramis valde rigidis, habitu *Acrotriches divaricatae*. *Folia* 4-6 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basi subcordata, sessilia, subtus pallidiora, striolata. *Pedunculi* subreflexi, squamosi. *Bracteae* 4, obtusae vel brevissime apiculatae, calyce subtriplo breviores. *Sepala* obtusa mucronulata colorata. *Corollae* tubus intus prope basin fasciculis 5 barbatis instructus, ad faucem tomentosus, limbi lobis patentibus apice glabris. *Filamenta* fauci inserta antheris lineari-oblongis breviora. *Discus* hypogynus cyathiformis, subinteger. *Ovarium* glabrum, 5-loculare. *Stylus* non exsertus glaber, lente auctus tuberculis obsitus. *Stigma* subcapitatum.

9. **Astroloma marginatum** Sond. caule erecto ramoso, ramis divaricatis, ramulisque glabris, foliis rigidis squaroso-patulis e basi cordata lanceolatis in mucronem subpungentem attenuatis, striatis, glaucis subcoloratisve, margine scabridis.

In solo glareoso sterili silvae prope fontem Pitscharding, Victoria, d. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 471.

*) **Astroloma Drummondii** Sond. erectum, ramosum ramulis tenuissime puberulis, foliis subsessilibus erectis linearibus mucronatis margine revolutis integerrimis, bracteis calycibusque pubescentibus. Swan River. leg. Drummond n. 467. Frutex rigidus, ramis erectis. *Folia* 6-7 lin. longa, explanata $1\frac{1}{2}$ lin. lata, utrinque glabra, subtus pallidiora, petiolo brevissimo insidentia, mucrone subpungenti terminata, ramis subadpressa. *Flores* axillares, solitarii. *Bracteae* 4 vel 6, inferiores minutae. *Sepala* ovata apiculata, 4 lin. longa, margine ciliata. *Corollae* rubrae tubus calyce vix longior intus prope basin fasciculis villorum instructus, medio glaber, apice inter antheras tomentosus. *Limbi* lacinae erectae acutissimae barbatae. *Antherae* lineari-oblongae, glabrae. *Discus* hypogynus subinteger, ovario glabro duplo brevior.

Specimina perpauca deflorata tantum adsunt. *Caulis* ut videtur, ultra pedalis fruticosus, teres, pennae gallin. crassitie, cortice griseo-albo. *Rami* erecto-patentes, rigidi. *Folia* 4-5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basi cordata, sessilia, plana, utrinque nervoso-striata, subglauca vel roseo subcolorata, margine denticulis brevissimis scabriuscula. *Flores* fructusque ignoti. Habitus paene praecedentis speciei. An hujus generis?

10. ***Astroloma pallidum* R.Br.** diffusum, ramis adscendentibus, foliis lanceolatis sessilibus ciliatis imbricatis supra concaviusculis. R.Br. prod. 538. DC. l. c. pag. 739.

Leucopogon blepharodes DC. l. c. pag. 753!

In arenosis apertis silvae caeduae haud longe ab oppido Freemantle, d. 13. Jan. 1839 et in solo sublimoso inter frutices densos planitiei ad fluvium Canning, d. 23. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 424. (Drummond!)

„Frutex spithamaeus, caespitosus“, ramulis pubescentibus. *Folia* 5-7 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, mucrone setaceo pungenti terminata, subtus pallida, striata. *Flores* axillares, solitarii, interdum in apicibus ramulorum aggregati, subspicati. *Corolla* incarnata. *Filamenta* brevia. *Discus* hypogynus subinteger ovarium dimidium aequans. *Stylus* glaber. *Drupa* oblonga vel subglobosa longitudine calycem aequans, stylo persistente coronata, abortu saepe monosperma.

β . **suberectum.** caule erectiusculo, ramis gracilioribus.

Inter formam primariam. An species distincta?

11. ***Astroloma compactum* R.Br.** diffusum, ramulis adscendentibus brevissimis, foliis obovato-lanceolatis ciliatis petiolato-attenuatis supra concaviusculis. R.Br. l. c. DC. l. c.

In arenosis terrae superioris undulatae, York, d. 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 423. In colliculo arenoso et in rupestribus prope oppidulum Albany, Plantage net, d. 28. Sept. 1840. No. 421. (Drummond n. 473!)

„Frutex humilis, diffusus, 3-4-pollicaris, rarius spithamaeus.“ *Rami* abbreviati, ramuli puberuli. *Folia* 4 lin. longa, lineam lata, basi valde angustata, mucrone pungenti terminata supra laevia, subtus pallidiora, margine ciliata, ciliis saepe geminis. *Calyces* pallidi, bracteis obtusissimis apiculatis. *Corolla* sanguinea, gracilis, calyce duplo triplove longior, intus supra basin fasciculis 5 villorum instructa. *Filamenta* abbreviata. *Discus* hypogynus integer. *Stylus* glaber. *Drupa* subglobosa, calyce paullo longior, styli basi mucronata.

Variat: foliis remotioribus vel confertis imbricatis, concavis vel subplanis, glabris vel subtus minute puberulis.

12. ***Astroloma cuneifolium* Sond.** erectiusculum ramosissimum ramulis abbreviatis pubescentibus, foliis obovatis in petiolum attenuatis margine serrato-ciliatis, apice subrecurvo truncatis spinuloso-mucronatis, supra concaviusculis.

In glareosis silvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, York, d. 12. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 422.

„Frutex digitalis“ apice ramosissimus, ramis adscendentibus. *Folia* cuneata, apice truncato vel obtuso integerrima, mucrone pungenti refracto terminata, 3-4 lin. longa, apice $1\frac{1}{2}$ lin. lata, margine serrato-ciliata, ciliis rigidis, basi dilatatis, subtus pallida multinervia, nervis lateralibus ramosis. *Bractae* et calyces pallidae, ab illis *A. compacti* non diversae. *Corolla* deest.

Affine *A. compacto*, sed foliorum forma satis diversum.

13. **Astroloma Stomarrhena** Sond. caule erecto, ramulis hirtellis, foliis rigidis imbricatis lineari-lanceolatis in mucronem pungentem attenuatis concavis margine serrulato-scabris extus pilosis glabrisve, bracteis calycibusque pubescentibus.

In regionibus interioribus Australasiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 410. (Swan-River Drummond n. 467!)

Frutex ut videtur pedalis. *Rami* erecti, rigidi, basi glabriusculi, apice hirtelli. *Folia* subadpressa, imbricata, concaviuscula, supra nitida laevissima, subtus pallida, striata, rigide mucronata, pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, nunc dorso et margine pilis longis albis obsita nunc omnino glabra. *Flores* axillares folio breviores. *Bracteae* 4, oblongae, inferiores glabriusculae, superiores pubescentes. *Sepala* lanceolata, 4 lin. longa, a medio ad apicem usque hirsuta. *Corolla* calyce duplo longior, tubo intus dense tomentoso, limbi laciniis supra glabriusculis et apice tantum barbularis, subtus vel in superficie exteriore pilosis. *Filamenta* brevissima. *Discus* hypogynus subinteger, ovario glabro duplo brevior. *Stylus* corollam aequans. *Drupa* depresso-globosa Pisi minoris magnitudine, styli basi coronata, 5-locularis.

14. **Astroloma xerophyllum** Sond. caule erecto, ramulis pubescentibus, foliis rigidis imbricatis lineari-lanceolatis acuminatis subpungentibus concavis margine integerribus glabris pilosisve, bracteis calycibusque glaberrimis.

Stomarrhena xerophylla DC. l. c. pag. 738!

In colliculis arenosis prope Pine-Aple, d. 14. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 407. (Drummond n. 476!)

„Frutex 2-3 pedalis“ ramis erectis vel subpatentibus. *Folia* petiolulata, concava, supra laevia nitida, subtus nervoso-striata, pallida, inferiora sparsa cauli adpressa 7-9 lin. longa, lineam lata, superiora confertiora imbricata. *Flores* in axillis foliorum superiorum sessiles, solitarii, folio breviores. *Bracteae* 4 obtusae, subapiculatae. *Sepala* pallida, ovata, sublanceolata, glaberrima, margine brevissime ciliata bracteis subtriplo longiora. „*Corolla* alba“ in sicco subarmentata. *Tubus* calyce inclusus, intus dense barbatus, prope basin glaber, rarius annulo piloso praeditus, limbi lacinae erectae vel subconniventes, barbatae. *Filamenta* brevissima, corollae adnata, apice inter corollae lacinas libera, ob barbam densam non conspicua, antheris lineari-oblongis. *Discus* hypogynus cyathiformis, 5-partitus, ovarium pentagonum aequans vel brevior. *Stylus* glaber corollae longitudine aequalis basi sensim incrassatus, per lentem visus tuberculis minutis dense obsitus. *Stigma* capitatum. *Drupa* immatura subglobosa, subcrustacea, glaucescens, styli basi apiculata, 5-locularis, 5-sperma.

Variet: foliis glaberrimis, pilosiusculis et pilosissimis.

A praecedente cui simillimum differt: foliis integerrimis, calycibus albidis glaberrimis, corollae tubo calycem non superante, stylo tuberculato et fructu.

15. **Astroloma macrocalyx** Sond. diffusum, ramis erectis vel adscendentibus, ramulis nitidis glabris, foliis imbricatis lineari-lanceolatis elongatis concaviusculis mucronatis margine scabriusculis, calycibus maximis bracteisque glaberrimis.

In arenosis inter frutices silvae prope Pine-Aple, d. 4. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 413. (Drummond n. 477!)

„Frutex spithameus“ radice crassa, perpendiculari, saepe pedali. *Rami* intermedi erecti, laterales adscendentes, epidermide griseo-alba, ramuli nitidi, glabri, dense foliosi. *Folia* 16-24 lin. longa, 1-1½ lin. lata, in acumen pungens producta, supra nitida, subtus pallidiora, striata, margine denticulis brevissimis scabrida. *Flores* axillares pedunculo perbrevis insidentes. *Bractae* 4, obtusae mucronatae. *Calyces* maximi *Stypheliae*. *Sepala* lanceolata acuminata, 10 lin. longa. *Corolla* purpurea, calyce inclusa. *Tabus* intus juxta basin fasciculis 5 barbatus, medio glaber, apice tomentosus, limbi laciniis acuminatis barbatis, apice flavescentibus, glabris. *Filamenta* brevissima, fauci affixa. *Atherae* lineari-oblongae, inclusae. *Discus* hypogynus cyathiformis subinteger, brevis. *Ovarium* obsolete pentagonum. *Stylus* glaber, corollae limbo brevior. *Stigma* subcapitatum. *Drupa* coerulea, oblonga, pentagona, acuta, styli basi superata, 5-sperma calyce duplo brevior.

Species quam maxime, singularis quae primo aspectu facile pro *Styphelia longifolia* R.Br. haberi potest.

16. **Astroloma Candolleianum** Sond. caule erecto ramoso, ramulis puberulis, foliis imbricatis ovatis basi attenuatis apice acuminatis mucronatis margine rigide ciliato-serratis concaviusculis, bracteis calycibusque glabris.

Stomarrhena serratifolia DC. 1. c.!

In calcuosis cacuminis montis Bakewell (alt. 1300 ped) d. 5. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 466. (Drummond n. 471!)

„Frutex bipedalis“ ramis rigidis inferioribus elongatis, superioribus brevioribus. *Ramuli* foliis imbricatis tecti, inferne plerumque nudi. *Folia* intus laevia, extus glauca, striata, 5-6 lin. longa, 2-2½ lin. lata. *Bractae* obtusae mucronulatae. *Sepala* pallida vel subrosea obtusiuscula, mucronata. *Corolla* purpurea. *Tabus* calycem aequans vel parum superans, intus prope basin fasciculis 5 villorum barbatus, limbi lobis erectis, subconviventibus, angustis acutissimis dense barbatis. *Filamenta* brevissima, longitudine et latitudine antheras oblongas aequantia, fauci inserta et inter tomentum densum occultata. *Discus* hypogynus cyathiformis, subdentatus, ovario glabro brevior. *Stylus* glaber non exsertus. *Stigma* capitatum. *Drupa* coerulea, oblonga, styli rudimento superata, calycis longitudine, 2-5 sperma.

17. **Astroloma latifolium** Sond. erectiusculum simplex, caulibus apice puberulis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis rigide mucronatis basi in petiolum brevem angustatis striatis margine cartilagineo-denticulatis, bracteis calycibusque glabris.

In solo basaltico-glareoso inter frutices densos prope montem Wuljennup. Planta genet. d. 20. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 411.

„Frutex spithameus“. E radice crassa cylindrica perpendiculari subliguosa caules assurgunt plures simplices, quorum laterales adscendentes, intermedi erecti. *Folia* coriacea, concaviuscula, supra nitidula, subtus pallidiora, multistriata, striis lateralibus divergentibus apice ramulosis, 9-11 lin. longa, 3-4 lin. lata. *Bractae* 4, obtusae, vix apiculatae, margine brevissime ciliatae. *Sepala* lanceolata, 4 lin. longa. *Corolla* deest. *Discus* hypogynus cyathiformis, integer. *Drupa* oblonga, calycem subaequans, styli basi apiculata, abortu plerumque 1-2-locularis.

16. *P. brethoflylis* ~~fastuosa~~
In vertice montis Tormus
flor. 1848.

Hunc ut speciem describo

x *V. clausilylis* ~~per~~ Müller
2 3' habet ~~leucopogonis~~
~~cratix~~ ~~cratix~~ ~~in~~ ~~reversis~~

~~Abolens~~ ~~ab~~ ~~vicibus~~ ~~lapi~~ ~~dis~~ ~~tra~~
Ituo Loxij range D. 2 Mart.
1849. Hunc Kensington.

Non distat a *Leucopogone* afro-
conica.

Drupa cylindrica-ellipsoidea striatula in
lapi sumus quam in apicem acutata, ~~lucida~~
actale pura paulisper nitens circ. 3" long 1"
crassa plerumque elicalis. Turcificat
vire.

CONOSTEPHIUM Benth. Endl. gen. n. 4266.

Meisn. gen. pag. 248. (157.)

Calyx 5-phyllus pergamaceus ovoideus vel ovoideo-oblongus, bracteis pluribus conformibus imbricatus. *Corolla* tubulosa extra calycem plerumque ventricosa conoidea, limbo minimo erecto vel subpatente imberbi, tubo intus juxta basin fasciculis 5 villorum instructo vel basi glabro et apice villosus. *Filamenta* corollae adnata linearia brevissima. *Antherae* inclusae bifidae. *Discus* hypogynus 5-partitus vel brevissimus subinteger. *Ovarium* 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Drupa* exsucca abortu 1-sperma, putamine osseo solido.

§. 1. tubo intus juxta basin fasciculis 5 barbatis.

1. **Conostephium pendulum** Benth. calycibus ovoideo-oblongis, filamentis alte adnatis, ovariis stylisque glabris.

Conostephium pendulum Benth. in Hügel. Enum. pag. 76.

In colliculosis arenosis silvae ad Preston-creek, d. 28. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 414. (Drummond n. 466!)

„Frutex 1-2 pedalis“ ramis lutescentibus, ramulis tenuissime puberulis. *Folia* erecta, pollicaria, 2 lin. lata, lineari-oblonga, mucrone brevi rigido nigro terminata, utrinque glabra vel supra glabra subtus villis brevissimis canescentia, margine subrevoluta, denticulis minimis scabrida. *Pedunculi* recurvi squamosi, 2 lin. longi. *Calyx* 4-5 lin. longus plerumque velutinus, rarius subglaber. *Bractee* 8-10 ovato-rotundatae, apiculatae. *Sepala* ovata apiculata margine tenuissime ciliata. *Corolla* 6 lin. longa, aetate juniore calyce inclusa, evoluta infra stamina constricta, pars supra constricturam exserta, conica, subcoriacea, intense purpurea, 2 lin. longa, pars inferior inclusa, tenuis, non colorata, tubus extus glaber, intus villosus et basi fasciculis barbatis instructus, limbus brevissimus, laciniis vix $\frac{1}{2}$ lin. longis, linearibus, erectis, imberbibus. *Filamenta* parti corollae superiori adnata. *Antherae* magnae, lanceolatae, demum profunde bifidae, glabrae, filamentis subduplo longiores. *Discus* hypogynus 5-partitus, ovario glabro duplo brevior. *Stylus* demum longe exsertus, glaber. *Stigma* obtusum.

§. 2. tubo intus absque fasciculis barbatis.

2. **Conostephium minus** Lindl. calycibus ovoideis, filamentis tubo medio adnatis, ovario sericeo, stylo piloso.

In arenosis juxta oppidum Perth, d. 24. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 408. (Drummond n. 467!)

„Frutex pedalis strictus“ ramis virgatis, ramulis glabris vel tenuissime puberulis. *Folia* 6-8 lin. longa, lineam lata, mucrone brevissimo obtuso sphacelato terminata, margine integerrima, supra glabra, subtus striata et villis minimis subcanescentia. *Pedunculi* recurvi velutini. *Flores* purpurei, 3-4 lin. longi. *Bractee* circ. 6, obtusae, apiculatae. *Sepala* obtusiuscula, ut bractee extus velutino-pubescentia. *Corollae* tubus paullo infra medium constrictus, pars inclusa extus puberula, pars exserta conica, glabra, purpurea, lineam longa, intus inferne glaber, a medio ad apicem usque pilosus. Limbi brevissimi lacinae subpatentes, imberbes, rarius basi subpilosae. *Filamenta* corollae tubo paullo infra medium adnata, antheris subbifidis bre-

viora. *Discus* hypogynus brevissimus, 5-dentatus. *Ovarium* sericeum. *Stylus* pilosus, apice exserto glaber. *Stigma* obtusum.

Primo adpectu ab antecedente et sequente distingui potest: caule humiliore debiliore et foliis brevioribus duplo angustioribus revolutis.

3. **Conostephium Preissii** Sond. calycibus ovoideis, filamentis basi corollae adnatis, ovario glabro, stylo piloso.

In arenoso-umbrosis silvae haud longe ab urbe Freemantle, d. 13. Mart. 1839. Ad ripam fl. Canning-River, d. 4. Dec. 1839. In solo arenoso inter frutices ad duvium Cygnorum, d. 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 416.

„Frutex 2 pedalis“ glaber seu velutino-pubescent. *Folia* lineari-oblonga, subpollicaria, 2 lin. lata, apice callosa plana vel margine denticulato scabro recurva, utrinque glabra vel velutino-pubescentia, vel supra glabra subius canescenti-velutina. *Pedunculi* recurvi, 2-3 lin. longi. *Calyx* 3 lin. longus, glaberrimus, rarius velutinus. *Bractae* 6, obtusae. *Sepala* obtusa. *Corolla* pallide purpurea. Tubus conicus, prope basin constrictus, pars inclusa extus velutina, pars exserta (vix 1 lin. long.) glabra, intus basi glaber, a constrictura usque ad limbum pilosa. Limbus brevissimus, subpatens, linearis, imberbis. *Filamenta* imae corollae adnata, antheris lanceolatis bifidis subduplo breviora. *Discus* hypogynus brevissimus. *Ovarium* glabrum. *Stylus* pilosus, apice exserto glaber. *Stigma* obtusum.

Floribus subduplo minoribus et foliis callosis facile distinguitur a *Conostephio pendulo*.

MELICHRUS R.Br. Endl. gen. n. 4270. Meisn. gen. pag. 348. (156.) DC. l. c. pag. 740.

Sect. I.

1. **Melichrus squarrosus** Sond. foliis squarroso-patentibus lanceolato-linearibus basi concaviusculis utrinque marginibusque pilosis.

In glareosis inter frutices circa oppidum Albany, Plantagenet, d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 418.

Fruticulus prostratus ut videtur spithamaeus, dense foliatus. *Caulis* pennae corvinae crassitie glaber purpurascens, superne foliorum rudimentis subsquamosus. *Rami* circ. digitales adscendentes a medio ramulosi, ramulis inferioribus brevioribus, superioribus vix ultra pollicem longis, omnibus foliis squarroso-patentibus basi imbricatis obtectis. *Folia* 5-6 lin. longa, basi lineam lata, subtus striis circ. 5 parallelis discoloribus notata, elongato-lanceolata apice valde attenuata rigidiuscula, squarrosa, aetate juniori utrinque pilosa, superiora stellatim patentia, inferiora remotiora apice subrecurva denum subglabrata. *Flores* non vidi.

A *Melichro rotato* differt: foliis brevioribus basi concaviusculis squarrosis recurvisve, junioribus non imbricatis.

BRACHYLOMA Sonder.

Calyx coloratus ovoideus, 4-bracteatus, 5-partitus, sepalis subinaequalibus. *Corolla* tubulosa calyce inclusa, tubo medio fasciculis 5 sericeis, limbo erecto imberbi lobis linearibus concaviusculis. *Filamenta* brevissima, corollae alte adnata. *Antherae* inclusae. *Discus* hypogynus cyathiformis dentatus. *Ora-*

Syntherisma St. & Br.

C. peltata St. & Br.

Stems upright in herb fine far
manus duas plantas foli-
nervis 71 & 72, quam unam
habet ex parte de quibuslibet
nervis 71 & 72.

In montibus 3000' altitud.
C. peltata St. & Br.

In montibus 3000' altitud. T. D. L. hb. St. n. 25, 26, 27, 28.
C. peltata St. & Br.

In montibus altitud 3000'.

T. D. L. hb. St. n. 25. Diagnosis non
optimum quodam, hanc datae a St. & Br.
adipiscit, quod primum dimidiat nisi magnit.
notat, quales naturae subridet vix in in-
venit. In montibus occidentales T. D. L. 3-4000' alt.
Jan. 4. 1849 p. 1. & p. 2. hb. St. n. 25. fruct. 2-3'

In montibus 3000' altitud. T. D. L. hb. St. n. 25. fruct. 2-3'

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br. }
C. peltata St. & Br. }
C. peltata St. & Br. }
C. peltata St. & Br. }

In montibus occidentales T. D. L. 3-4000' altitud.

Jan. 21. 1849. hb. St. n. 287.

Ex humilione loco

1849 ad St. Paulin. T. D. L. 49. hb. St. n. 287.

C. peltata St. & Br.

ibidem; fr. 2-3' Jan. 21. 1849. hb. St. n.

289.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

C. peltata St. & Br.

Lysanthus
Syntherisma (Cucurbitaceae) 1891

L. glauca (Willd.) Greene
 fruticosa, parte caulescente 5' 6' Nov. 41
 in collibus frequentis ad portum
 regiorum, hb. 1. 5. 625.

Lysanthus puberulus (L.) Greene

Ad portum regiorum & Rivas
 Epuri Formosae, hb. 12. 625,
 ubi non *Cyathodes*.

(Lanth. *Cyathodes*?)

Lysanthus ponderosus Greene

in fl. St. Pauli Form., hb. 11. 697.

Stomachus limbo rufescente
 barbato diffusa retro *Lysanthus*
 montanae (*Cyathodes* a *Pluchea* *peruviana*)
 Form. 1891, fl. reg. 4 p. 221

Leucopogon Kichii (H. & Brown)

Dracopis
 albidus
 asper
 nudus
 nuda
 lar
 dracopis
 fort
 Lin
 ca

1' 1' rufus purpurea
 firma in aruosis nata mura
 sui fruticosa com. *Leucopogon*
 herb. n. 122. In humilis aruosis

fruticosa densus formosus crispis callos
 2-3' asperum *Rivoli* Bay Oct 41
 diffusum quibusque floribus apratis
~~caulis crassus~~ *Rivoli*

In omni aruosis juxta
 latus *Kalbarabag* fruticosa
 fr. for. 10/11. Form. - hb. 1. 11.

Dum. n. 27 In rupibus jugis
 montis Burr fruticosa digitalis
Pythamans ve. Exant. Octobr 48
Formosae (L.) H. & Brown

~~caulis rufus~~ *Leucopogon* *Rivoli*
~~caulis rufus~~ *Leucopogon* *Rivoli*
~~caulis rufus~~ *Leucopogon* *Rivoli*

rium 5 locale: loculis 1 ovulatis. *Stylus* brevis, crassus, cylindricus. *Drupa* sub exsucca, 5 sperma, putamine osseo solido.

Genus habitu *Conostephi*.

1. *Brachyloma Preissii* Sond.

In arenosis prope Bull's-creek, Nov. 1841 leg. cl. Preiss. (Swan-River, Drummond n. 480!)

Frutex erectus, ut videtur, ultra pedalis, ramis teretibus, cinerascen-
tibus, glabris, ramulis hirtellis. *Folia* erecta adpressa superiora subimbricata,
petiolulata, linearia vel oblongo-linearia, mucronata, glabra, supra laevia,
viridia, subtus pallidiora, nervoso-striata, striis lateralibus divergentibus,
plana, margine serrulato-scabra, 6-7 lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Flores*
axillares, solitarii, pedunculati. *Pedunculus* bracteatus, recurvus, 2 lin.
longus. *Bracteae* 4, obtusae, inferiores minores, subcoloratae. *Sepala* ro-
seo-colorata ut bracteae glaberrima, ovata, apiculata, vix ultra 2 lin. longa,
imbricata subinaequalia, inferiora 2-3, subbreviora. *Corolla* parva, roseo-
rubra, calyce inclusa, 2 lin. longa, tubulosa, tubus brevis limbum aequans,
extus glaber intus medio fasciculis 5 villorum sericeorum barbatus, basi et
apice glaber, limbi lobis erectis, linearibus, glaberrimis, concaviusculis. *Fi-*
lamentum brevissima, tubo alae adnata. *Antherae* lineari-oblongae, inclusae,
dorso infra apicem insertae. *Discus* hypogynus 5 dentatus, ovarium dimi-
dium glabrum aequans. *Stylus* crassus, vix ultra ½ lin. longus, cylindricus,
glaber. *Stigma* breve capitellatum. *Drupa* parvula, suborbicularis, calyce
subbrevior, styli basi terminata.

β. *brevifolium*. foliis duplo brevioribus et angustioribus.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Oct. 1840. Herb.
Preiss. No. 426.

LEUCOPOGON R. Brown. Endl. gen. n. 4273.

Meisn. gen. pag. 248. (156.)

§. 1. PSILOSTACHYI.

1. *Leucopogon Richei* R.Br. ramulis tenuissime velu-
tinis, foliis oblongo-lanceolatis extra medium latioribus
3-5 nerviis basi striatulis marginibus subrecurvis, spicis
erectis folia subaequantibus.

Leucopogon Richei R. Brown l. c. pag. 541.

Leucopogon lanceolatus Sieb.! fl. exs. Nov. Holl. n. 102.

Leucopogon Richei et *parviflorus* DC. l. c.

Styphelia Richei Labill.! Nov. Holl. 1. pag. 44. t. 60.

In solo sublimoso inter frutices planitiei ad fluvium Vasse-River, Sussex, Dec.
1839. Herb. Preiss. No. 372 ex parte (King George's Sound, Hügel! New-South-
Wales, Fraser!)

Specimina Preissiana cum Billardierianis et Sieberianis exacte conveniunt
Spicae axillares et terminales. *Drupa* parva ovata, baccata, pulpa coerulea,
4-5 sperma.

2. *Leucopogon parviflorus* Lindl. ramulis glaberrimis,
foliis lanceolatis vel lineari-oblongis planis supra 3-5 nerviis

subtus striatis, spicis sub terminalibus erectis folio brevioribus longioribusve. — Lindl. bot. Reg. t. 1560.

Styphelia parviflora Andr. bot. repos. tab. 287.

In collibus calcareis silvae haud longe ab ora maris Perth, d. 25. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 370, in arenosis umbrosis silvae insulae Rotenest, d. 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 365. (Drummond n. 459!)

„Frutex strictus, 2-3 pedalis“, ramis teretibus ramulisque glaberrimis. *Folia* coriacea, glabra, plana, apiculo brevi, obtuso, lanceolata basi subattenuata, lineari-lanceolata vel lineari-oblonga, inferiora 12-16 lin. longa, 3-3½ lin. lata, superiora angustiora et breviora margine praesertim versus apicem denticulata, scabra, supra laevia nitidula, 3 vel 5 nervia, subtus multinervia nervis 5-7 evidentioribus latere apiceque ramosis. *Spicae* ad apices ramulorum aggregatae erectae, inferiores folio breviores vel aequilongae, superiores saepe longiores. *Rachis* cano-puberula, 10-20 florum, ad basin infra flores bracteolas plures gerens. *Bracteae* carinatae. *Corollae* tubus calycem brevem aequans, lobis superne dense barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* lineares. *Cyathus* hypogynus, 5 dentatus. *Stylus* brevis stigmatum capitato. *Drupa* parva subglobosa, coerulescens, pulpa vix ulla, 4,5 rarissime 6-sperma.

Antecedenti quamquam similis, tamen dispar: foliis multo crassioribus magis oblongis basi vix cuneatis planis.

3. **Leucopogon Drummondii** DC. ramulis glabris, foliis lanceolatis basi subobtusis apice attenuatis acutis callosis planis, supra glabris 5-7 nerviis, subtus tenuiter velutinis 7-9 nerviis, spicis axillaribus ad apices ramorum subpaniculatis folio aequalibus vel longioribus, rachi angulata puberula, bracteis parvis dorso carinulatis, calycis lobis ciliatis albidis, corollae tubo limbum hirsutissimum aequante. DC. l. c. pag. 745.

In turfoso-arenosis umbrosis inter gramina alta silvae prope oppidum Perth d. 1. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 368. (Drummond n. 459!)

„Frutex 4 pedalis“ palleus, caule tereti, pennae corvinae crassitie, ramulis angulatis, glaberrimis, subvitellinis. *Folia* subtus pallidiora et tenuissime puberula, 2-2½ poll. longa, plana, lanceolato-attenuata vel lineari-lanceolata, acuta, rarius mucrone brevi terminata. *Spicae* subterminales, foliis plerumque longiores, rarius aequilongae vel subbreviores 20-30 florum. *Rachis* puberula, basi multibracteata. *Bracteae* carinatae ut calyces pallidi margine ciliolatae. *Corollae* albae tubus calycem aequans, tubus cum limbo 1½ lin. longus, limbi lacinae angustae, dense barbatae, tubo aequales. *Filamenta* brevia antheris linearibus. *Discus* hypogynus dentatus. *Stylus* brevis, ut ovarium glaber. *Stigma* capitatum.

4. **Leucopogon paniculatus** Sond. ramulis glabris, foliis lanceolatis acutis mucronatis margine revolutis subtus tenuissime pubescentibus, spicis terminalibus erectis paniculatis folio multo longioribus, rachi angulata puberula, calycis lobis ciliatis albidis, corollae tubo limbi lobis hirsutissimis brevioris.

In locis subturfosis ad marginem lacus prope Middleton's Bay, Plantagenet, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 367. et in turfoso humidis inter frutices densos ad marginem lacus planitie haud longe ab oppidulo Albany, Plantagenet, d. 11. Oct. 1840. No. 374.

„Frutex 6-8 pedalis“ caule tereti, ramis ramulisque subangulatis, vitellinis, glaberrimis. *Folia* brevissime pedicellata, erecta, adpressa, subopae-

2. *L. parviflorus* Kt. affinis Bn.
Momodora elliptica Kt. 134!

Passim ad rivum Fourth Creek.
Quantum e diagn. brevissima,
extricare quæ. Hinc dubia
relinquo, enim *L. parviflorus*
db. noster plani æqualis
a rt. Sander ad *L. Ritchei*
forte ex errore relatus est!

L. parviflorus Sander (an
Lindleyi) satis superque distat.
In paludosis inter Leptospermorum
& melaleucorum proficeta. vapus
sinum litoratum Rivoli-Way!
Oct. 1848. frut. vitis plurimodis.
Ad litus marium Tasmaniae
4-6'. Oct 48. hb. St II n. 35 (sub.
nom. *L. Ritchei*) In madidis rivuli
Brown hills creek. Frut 3-5'.
Vne.

X *L. Australis*! K. Brown.

Folia adulta majora præcipue
latiora ut rt. db. indicat. *L. affi-*
nis certe cognatus sed foliis sub.
revocis videtur distinctus. *L. Drum-*
moulti db. ¹⁸⁴⁸diagnosis satis quædam
hinc forte referenda.
In solvatis, magis a litore distans
ut *L. affinis*. Fr. 2-3'. Oct 48. hb.
St II n. 56. George Town. hb. St. n. n.

C. Latis vulgatis in Fracta
montibus Loffy-range et
per per totum annum. *Clavus*.

tactu mollia, supra 5 nervia, subtus vix pallidiora, multinervia, apice sphacelata, mucronata, margine revoluta, $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, explanata, 3 lin. lata. *Spicae* ad apices ramorum paniculatae folia plerumque multo longiores, 20-30 florum, rachi puberula, angulata. *Bractae* carinatae ut calyces pallidi margine ciliolatae. *Corolla* alba, lineam longa, tubo brevi, limbi laciniis linearibus, tubo longioribus, dense barbatis. *Filamenta* brevissima antheris sublinearibus subexsertis, supra medium peltatis. *Cyathus* hypogynus, 5 dentatus. *Stylus* calycem aequans, stigmatibus subcapitato. *Drupa* parvula, subglobosa, pentagona, apiculata.

A *Leucop. Drummondii* habitu strictiore, foliis magis adpressis opacis margine recurvis, spicis sublongioribus et tubo corollae abbreviato diversus.

5. **Leucopogon verticillatus** R.Br. foliis interrupto-verticillatis oblongo-lanceolatis apice attenuatis, spicis subterminalibus aggregatis, fructiferis nutantibus, drupis 5-locularibus putamine 5 gono. R. Brown l. c.

L. glaucescens DC.! l. c.

Lissanthe verticillata Lindl. Swan-River bot. pag. XXV.

In limoso-calcareis silvae inter Mahagoni-creek et Halfwayhouse nec non in subarenosis silvae prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 13. Sept. 1839 et d. 23. Oct. 1840. Herb. Preiss, No. 431. (Swan-River, Drummond!)

„Frutex 2-5 pedalis erectus“ apice plerumque ramosus, glaberrimus. *Folia* sessilia, basi subangustiora, subtus glaucescentia, multinervia, supra 5-nervia, utrinque laevia, inferiora saepe 4 poll. longa, pollicem lata, superiora breviora et angustiora. *Verticilli* in parte caulis inferiore intervallo 3-4 pollicari disjuncti, apicem versus magis approximati e foliis 6-8 constant. *Internodia* plerumque nuda sunt, interdum vero foliola nonnulla breviter, reliquis conformia et semper cicatrices foliorum delapsorum in illis inveniuntur. *Spicae* in foliorum superiorum verticillis, elongatae, laxae, sero nutantes, multiflorae, rachi angulata glaberrima. *Bractae* 2 ut calyces virides, margine tenuissime ciliatae. *Corolla* in sicco purpurascens apice pallidior. Tubus calyce duplo longior, extus glaber, intus subpilosus, limbi lobis revolutis basi parce barbatis. *Filamenta* brevissima antheris linearibus subexsertis duplo superata. *Discus* hypogynus 5 dentatus. *Stylus* brevis glaber stigmatibus obtuso. *Drupa* parvula subexsucca (?) oblonga, pentagona, 5 locularis, rarius 4 gona, 4 locularis*).

§. 2. BRACHYSTACHYL.

6. **Leucopogon polystachyus** R.Br. ramulis glabris virgatis, foliis lineari-lanceolatis muticis convexo-con-

* **Leucopogon Shuttleworthii** Sond. ramulis glabris, foliis erectis adpressis, concaviusculis petiolatis ovato-oblongis acutis callosis mucronatis glabris subtus striatis margine denticulatis scabris, spicis axillaribus folio subtriplo longioribus, axi flexuosa angulata puberula, bracteis persistentibus ciliatis, corollae lobis supra dense barbatis. New-South-Wales leg. Fraser! (herb. Shuttleworth). Frutex pluripedalis ramis ramulisque teretibus, subvirgatis, glabris. *Folia* adpressa supra concaviuscula, impressae 3-5 nervia, subtus nervoso-striata, 7-9 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata petiolo brevissimo (1 lin. long.) insidentia, apice acuta et callo brevi obtuso terminata. *Spicae* erectae in axillis foliorum supremorum. *Axis* subflexuosa, tenuissime puberula. *Bractae* persistentes lanceolatae dorso striatae margine ciliatae. *Bracteolae* acutae carinatae puberulae. *Calycis* lacinae acutae, ut bractae pubescentes. *Corollae* tubus calyce brevior, limbi lobis lanceolatis albo hirsutissimis. *Filamenta* brevissima. *Cyathus* hypogynus, subdentatus, ovario glabro duplo brevior. *Stylus* brevissimus.

caviusculis adpresse erectis, spicis axillaribus terminalibusve aggregatis 7-10 floris, rachi hirsuta, drupis exsuccis ovalibus apice depresso. R. Brown l. c. DC. l. c.

In arenosis prope oppidulum Albany. Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 363.

Frutex bipedalis et ultra, erectus ramis virgatis. *Folia* sparsa, sessilia, glaberrima, plerumque 5-6 lin. longa, lineam lata, erecta vel cauli subadpressa, supra concaviuscula, apice callo brevissimo terminata, margine integerrima, in varietate serrata. *Spicae* folio aequales, 5-7 florum vel parum longiores 8-10 florum rachi pubescente. *Bractee* carinatae ut calyx membranaceae, pallidae et rufo coloratae, subtendentes, ovatae, acutae margine ciliato-lanatae. *Calycis* foliola lanceolata, obtusiuscula, margine ciliata, 2 lin. longa. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobi tubo longiores, revoluti, albo hirsutissimi. *Filamenta* brevissima, antheris linearibus. *Discus* hypogynus 5 dentatus. *Stylus* brevissimus stigmatibus subcapitato. *Drupa* exsucca, pentagona, oblonga basi angustiore, apice truncata, stylo coronata, calyci aequilonga, 5 locularis, abortu 1-4 locularis.

β. serratifolius. foliis lanceolatis acuminatis muticis margine serrulatis scabris.

In arenoso-turfosis humidis inter frutices densos prope villam beat Rich. Spencer. Plantagenet, d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 364.

„Frutex 4-6 pedalis“. *Folia* 6-9 lin. longa, 1-1½ lin. lata, utrinque glaberrima, viridia margine serraturis minimis scabra, inferiora saepius margine ciliata et subpatentia, superiora erecta, concaviuscula. *Flores* et fructus ut in α.

γ. monostachys. spica solitaria terminali multiflora, bracteis subtendentibus subfoliaceis.

Habitat cum priore.

7. **Leucopogon brachycephalus** DC. ramulis glabriusculis, foliis obovatis oblongisve erectis vix acutiusculis margine scabriusculis junioribus et summis subtus distincte striatis, inferioribus subtus et omnibus superne laevibus: spicis paucifloris pluribus in capitulum terminalem aggregatis, bracteis subacutis, corollae lobis angustis superne barba candida copiosa hirsutissimis. — DC.! l. c.

In arenosis silvae ad fluvium Canning, d. 23. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 384. (Drummond n. 461 et 463!) (Vasse River, Mrs. Molloy 1839!)

Frutex pedalis subramosus, ramulis glabriusculis erectis. *Folia* sessilia inferiora sparsa, obovata, acutiuscula vel oblonga, rarius oblongo-lanceolata, ramulorum subimbricata, adpressa, omnia supra laevia, subtus striata, margine plerumque denticulato-scabra, rarius integerrima, coriacea, 1½-2½ lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Spicae* terminales, saepius numerosae. *Rachis* pubescens. *Bractee* dorso carinatae, acutae, glabrae, apice ciliatae, subtendente parum minore. *Sepala* lanceolata lineam longa, extus a medio ad apicem puberula et margine ciliolata. *Corollae* tubus calyce subbrevis, limbi lacinae lanceolatae, dense barbatae. *Filamenta* brevissima. *Antherae* lineari-oblongae. *Cyathus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Ovarium* glabrum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum.

β. heterophyllus. foliis inferioribus imbricatis lanceolatis acutis, ramulorum superiorum remotioribus ovatis suborbiculatisve acutiusculis, bracteis calycibusque glabris.

8! Optimum eleganti quodam
exempli solus summi juvenis
vittellinis

Latius frequenter in superatilo
et alio. (L. opicula per
habet, cui etiam finis illi).
in hac sp. ad L. post-
hanc non videtur, et hanc
ad idem genus et aliam sp. sum.

L. aspinilis K. Br

De flumine Torrens. Oct. 1847
hb. K. n. 123. fruct. & pedicel.
fruct. stylos. glaberas in
fere reticulatas, corollis
sine alba in completa.
Innotata exploratio me docuit, pl. a
L. virgato non nisi magnitudine om-
nium partium diffinita.

In limoso-calculosis ad radices jugi montium Darling's-range, d. 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 383.

Folia inferiora $1\frac{1}{2}$ lin. longa et semilineam lata, superiora lineam longa et lata. *Spicae* pauciflorae.

8. **Leucopogon vitellinus** Sond. ramulis puberulis, foliis adpressis lineari-lanceolatis callosis supra laevibus subtus subcarinatis nervosis, nervo medio crassiore, margine denticulatis, spicis terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque glabriusculis.

In arenosis prope oppidulum Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 363 ex parte.

Frutex rigidus, ramis strictiusculis, glabris, vitellinis, ramulis velutino-pubescentibus. *Folia* inferiora sparsa, suprema subimbricata, lineari-lanceolata vel linearia, supra plana, viridia, subtus convexiuscula, nervo medio prominente subcarinata, nervis 5-7 parallelis striata, margine denticulato-scabra, 5-6 lin. longa, lineam lata. *Spicae* 4-6 florum. *Calyx* membranaceus, subcoloratus. *Bractae* carinatae, acutae, apice et margine puberulae, subtendente ovata obtusiuscula striata subbreviore. *Calycis* foliola $1\frac{1}{2}$ lin. longa, tenuissime puberula. *Corollae* tubus calycem aequans, intus prope basin glaber, limbi laciniae tubo longiores, dense et albo barbatae. *Filamenta* brevissima, inter barbam fere occultata, antheris lineari-oblongis breviora. *Discus* hypogynus obtuse 5 dentatus, ovario glabro duplo brevior. *Drupa* exsucca, oblonga, (lineam longa) obsolete 5 gona, apice truncata, stylo superata, abortu saepe disperma.

Num forte idem cum *L. assimili* Brown? Verum enim vero calyces in nostro non foliacei. *L. assimilis* β , *callosus* DC. certo ad *L. vitellinum* pertinet.

9. **Leucopogon polymorphus** Sond. ramulis villosis, foliis adpressis lanceolato-linearibus linearibusve muticis utrinque villosis vel glabriusculis, subtus striatis margine ciliatis denticulatisve, spicis terminalibus subsolitariis aggregatisve, bracteis calycibusque pubescentibus.

Leucopogon assimilis Benth.! in Endl. Enumerat. plant. Hügel. vix Brown.

In arenosis inter frutices prope Pine-Aple, Perth, d. 20. Jun. 1839. No. 392 et in porrectis arenosis inter frutices haud longe a cataracta ad caput fluvii Cygnorum, d. 26. Jun. 1839, Herb. Preiss. No. 402. (King George's Sound, Hügel!)

Fruticulus 1-2 pedalis, nunc villosissimus nunc fere glaber, subsimplex, apice tantum ramosus ramis abbreviatis, vel ramosissimus ramis longis virgatis. *Folia* inferiora seu caulina sparsa superiora subimbricata, inferiora lineari-lanceolata seu linearia, 6 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora breviora, 3-4 lin. longa, lineam lata, omnia sessilia, villosa, glabriuscula vel omnino glabra, supra concaviuscula laevia, subtus nervoso-striata, nervo medio vix aut ne vix elevato, margine pilis longis ciliata, vel glabrata tantum denticulato-scabra. *Spicae* in apicibus ramulorum simplices vel subaggregatae 4-8 florum. *Rachis* puberula. *Bractae* subtendentes plerumque foliaceae striatae, flores aequantes, vel breviores. *Bracteolae* calycesque puberuli subcolorati, interdum subglabri, pallidi, membranacei, margine ciliolati. *Bracteolae* ovatae acutae. *Sepala* ovato-lanceolata. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobis albo-hirsutissimis. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Stylus* brevis glaber ovario aequilongus, stigmate subcapitato. *Drupa* calycem non superans, crustacea, ovato-oblonga, apice depressa, 5 locularis.

10. **Leucopogon pulchellus** Sond. ramulis pubescentibus, foliis erectis vel distiche subpatentibus crassiusculis linearibus obtusiusculis supra planis subtus carinatis uninervis, pilosis vel glabris, margine ciliatis denticulatisve, spicis terminalibus subsolitariis, bracteis calycibusque coloratis puberulis.

In arenosis inter frutices haud longe a valle cataractae, d. 26. Jul. 1839 et in lapidosis ad jugum montium Darling's-range, d. 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 401 et 396. (Drummond n. 460!) (Vasse River. Mrs. Molloy 1839!)

„Frutex gracilis 2-4 pedalis“ ramis ramulisque teretibus. *Folia* caulina sparsa, ramulorum subimbricata, 3-3½ lin. longa, semilineam lata, anguste linearia, supra plana vel vix carinata, subtus carinata, nervis 2 lateralibus obsoletis, intermedia valde prominente ut folium apice fere triquetrum appareat. In nonnullis speciminibus folia omnia pilis brevibus vestita sunt, in aliis omnia glabra, in prioribus margo ciliatus in posterioribus denticulatus. *Folia* ramulorum suprema imbricata a ceteris recedunt quod breviora sint et minus carinata. *Spicae* ramulos terminantes plerumque solitariae, 3-8 florum, rarius aggregatae. *Rachis* pubescens. *Bracteae* ovatae obtusiusculae carinatae. *Sepala* puberula rarissime glabra, membranacea, apice colorata, margine longe ciliata, lineam longa. *Corollae* tubus calycem aequans, lobis lineari-lanceolatis, albo hirsutissimis. *Filamenta* brevissima, antheris lineari-oblongis. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Ovarium* glabrum. *Drupa* exsucca, oblongo-linearis, calyce longior, monosperma.

11. **Leucopogon hirsutus** Sond. ramis ramulis foliisque pilis longis patentibus hirsutis, foliis petiolatis oblongis muticis planis vel margine subrecurvis spicis axillaribus terminalibusque solitariis 3-5 floris bracteis calycibusque glabris, corollae lobis parce barbatis.

In solo limoso inter frutices densos ad latus austro occidentale montis Clarence, Plantagenet, d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 464. (Drummond n. 465!)

Caulis ut videtur procumbens, ramis saepe longissimis (ultra 2 ped.) flaccidis, tenuibus undique pilis patentibus hirsutis. *Ramuli breviores*. *Folia* oblonga, 3 lin. long., 1½ lin. lata, pilis subsericeis utrinque pilosa, supra impressa subtus elevato 3 nervia, breviter petiolata, apice acutiusculo mutica, plana vel marginibus integerrimis ciliatis subrecurva. *Flores* parvi spicati, spicae solitariae 3-6 florum, semper solitariae et in apice ramulorum et in axillis foliorum supremorum. *Acillae* nonnunquam florum abortu pedunculum 1 vel 2 tantum gerunt. *Pedunculi* hirsuti. *Bracteae* et *calyces* obtusiusculi, glabri, apice longe-marginate breves ciliati, bracteae subtendentes minores striatae. *Corolla* ¾ lin. longa. Tubus calyce brevior, intus glaber, limbi laciniis revolutis supra pilis nodulosis parce barbatis. *Filamenta* glabra. *Antherae* oblongae, apice submarginatae, sub apice affixae. *Cyathus* hypogynus obtuse 5-lobatus. *Stylus* brevis, crassus, stigmate obtuso. *Drupa* subexsucca, subrugulosa, globosa, subcompressa, dorso elevato obliqua, stylo laterali persistente, semper monosperma.

Planta insignis, ab reliquis hujus generis habitu peculiari et fructibus obliquis diversa.

12. **Leucopogon revolutus** R.Br. ramulis minute hirtello-pubescentibus, foliis modice patentibus lineari-oblongis obtusis muticis apiculo obtuso calloso, supra convexis scabris, subtus lineatis glabris, marginibus recurvis nudis, spicis subterminalibus aggregatis 4-5 floris, calycibus

L. collinus R. Br. ex H. Sander, quod eratum!

L. ciliatus? All. Cunningham.

Exactissime diagnosi convenit!

Oct. 25. 1848. hb. St. II n. 8. prot. 1'

South-Esk-river, Tasm. Thidm.

hb. St II n. 31. Sept. 10. 48. 1' et 584.

Bundus Ferd Müller foliis ciliis De
Hidm. Nilo-River 1-2'. Oct. 48.

L. apiculatus Ferd Müller hinc
proximus

L. novae-hollandiae, foliis recurvatis Fr.
hb. St I n. 30. Apris river Tasm, 942.

L. areolaris collinis ad por-
tum cyrenum Nov. 1849. hb. St.
T. 642 - 2'.

L. trichocarpa? St. Br

Stiphelia trichocarpa Lab.

hb. St. Tasmanniae. n. 21.

Stelia prostrata prostrata s. m.

at hanc non pro. ~~videtur~~ distri-

guitur. (St. M. M. J., Tasm. 3-6'
Jan. 10. 1849. hb. St II n. 375.

In collibus arenosis ad portum
cyrenum, hb. St. T. Nov 49. hb. 637.

Robert-Town, hb. St T. 795.

bracteisque tenuissime pubescentibus, subtendenti dimidio minore, drupis exsuccis obovatis 4-5 locularibus. R.Br. l. c. DC. l. c.

L. villosus Benth.! in Endl. Enum. plant. Hügel. non R.Br.

In arenosis haud procul ab oppidulo Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 393. (King George's Sound, Hügel!)

„Frutex 2 pedalis“ ramis erectis, substrictis. *Folia* oblongo-linearibus, ramorum floriferorum saepe linearibus, apiculo obtuso terminata, supra scabra margine revoluta, inferiora cauli adpressa, 6 lin. longa, lineam lata, superiora erecto-patentia, 4-5 lin. longa. *Spicae* 4-6 florum, subterminales. *Bractaeae* et calycis foliola obtusiuscula, pubescentia, margine ciliolata. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobis tubo aequilongis, revoluti, barbati. *Filamenta* brevissima, antheris linearibus-oblongis. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevissimus, stigmate subcapitato. *Drupa* parva, obovata, 4-5 locularis.

Leucopogon villosus R.Br. cujus specimen a cl. Mittchel in interiore Nov. Holl. lectum possideo, cum *L. revolutus* confundi non potest.

13. ***Leucopogon angustatus* Benth.** ramulis glabriusculis, foliis ovali-ellipticis sublanceolatisve obtusis muticis supra convexis margine subrevolutis, supra glabriusculis subtus pilosis, spicis paucifloris terminalibus congesto-capitatis, bracteis calycibusque subcoloratis glabris. Benth.! in Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 77. DC. l. c.

In arenosis haud procul ab oppidulo Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 393b.

Frutex pedalis et ultra, ramis erectis, ramulis brevissime pubescentibus. *Folia* sessilia, oblongo-lanceolata, lanceolata vel oblongo-linearibus, acutiuscula, mutica, inferiora sparsa, subplana, superiora subimbricata, margine subrevolutis ciliolata vel denticulato-scabra, supra pilosiuscula, demum glabrata, subtus pilosa rarius glabra, 4-5 lin. longa, lineam lata. *Flores* in apicibus ramulorum aggregati, spicati. *Bractaeae* carinatae ut calycis foliola obtusiuscula, margine ciliolatae. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobis dense barbati. *Filamenta* brevissima. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevis ovarium subaequans. *Stigma* obtusum.

β. hirsutus. ramulis hirsutis, foliis utrinque pilosis margine subrecurvo ciliatis, calycibus bracteisque puberulis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 394.

Folia obscure viridia, supra brevius, subtus longe pilosa, 4-5 lin. long. 1 lin. lata. Indumento densiore excepto nullas differentias inter specimina Preissiana et Hügelianum invenio. Nescio an melius haec varietas pro typo et *Leucop. angustatus* pro forma glabrata habeatur? Ceterum *Leucop. angustatus* a *L. collino* R.Br. cujus specimen anth. in herb. Lehmanniano vidi, vix diversus videtur.

14. ***Leucopogon capitellatus* DC.** ramulis minute puberulis hirtellis, foliis linearibus acuminatis erecto patulis superne et margine minutissime scabridis subtus glabris, capitulis 3-5 floris folio brevioribus ad axillas sessilibus, bracteis obtusis, calycis lobis ciliolatis, corollae lobis barba alba conferta superne hirsutis. — DC.! l. c.

In limoso calculosis silvae prope Mahagony-creek, d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 371. (Drummond n. 462!)

„Frutex 1-2 pedalis“ strictus. *Rami* breves, erecti, hirsuti-pilosi. *Folia* linearia, acuminata, planiuscula vel margine revoluta, supra marginibusque scabra, 6-10 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. *Flores* 3-5 in axillis sessiles, rarius capitula multiflora in apice ramulorum. *Bractae* carinatae, obtusae, subtendente dimidio minore. *Calycis* foliola vix lineam longa, ovata, acuta, margine ciliolata, corollae tubum aequantia. *Lobi* corollae demum reflexi angusti. *Antherae* lineari oblongae, ad sinus corollae subexsertae, lobis breviores. *Discus* hypogynus obtuse lobatus. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum. *Drupa* parvula, suborbicularis, apice depressa, stylo superata, 4 et 5 locularis.

β . sparsiflorus. floribus omnibus axillaribus, axillis 1-3 floris.

In glareosis inter frutices montis prope fontem St. Ronan'swell, d. 25. April. 1840. Herb. Preiss. No. 427.

Folia in hac varietate magis sunt adpressa et 6-7 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, flores non spicati nec capitati, corollae paullo minores.

15. **Leucopogon racemulosus** DC. ramulis glabris rigidulis, foliis linearibus margine recurvatis mucrone subpungenti apiculatis utrinque glabris supra convexis subtus concavis substriatis subglaucescentibus, racemulis axillaribus 3-5 floris folio brevioribus, bracteis minimis pedicello brevioribus, bracteolis brevibus subrotundis, calyce tubo corollae dimidio brevioris, lobis corollae dense barbatis. — DC.! l. c.

In arenosis silvae circa oppidum Perth., d. 10. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 369. (Drummond n. 482! Capt. Mangles!)

„Frutex rigidus, 7 pedalis“, foliis sessilibus, patulis, pungentibus, 8-9 lin. longis. *Flores* omnes axillares, albi. *Corolla* infundibuliformis 3 lin. longa, tubo intus glabro, limbi lobis brevissime sed dense barbatis demum subrevolutis, tubo subtriplo brevioribus. *Filamenta* longiuscula tubo corollae adnata, apice libera. *Antherae* lineares, dimidia parte exsertae. *Discus* hypogynus 5 lobatus, lobis acuminatis ovarium aequantibus. *Stylus* glaber, apice muriculatus, corollam fere aequans, stigmate capitato. *Ovarium* glabrum.


β . pauciflorus. pedunculis axillaribus 1-3 floris.


Huc pertinet specimen Drummondianum sub No. 482 in herb. Shuttleworth. asservatum, alterum Drummondianum a Cl. Alph. DC. necum communicatum racemulis axillaribus instructum est. In collectione Preissiana formas intermedias vidi. Intelligitur hanc speciem eodem jure ad sectionem quintam „Axilliflori“ accenseri posse.

16. **Leucopogon gracillimus** DC. fruticosus erectus ramosissimus, ramis tenuissimis glabris, foliis teretiusculis vix acutis stricte adpressis glabris, spicis abbreviatis terminalibus solitariis aut subcongestis, bracteis obtusiusculis substriatis, corollae tubo calyci aequali, lobis superne villosis albis confertissimis hispidis. — DC.! l. c.

In limoso-calculosis lateris orientalis montis Bakewell, York, d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 395. (Drummond!)

„Suffrutex 1-3 pedalis“ ramosissimus. *Rami* virgati tenuissimi, ramulis glabris foliis dense obsitis. *Folia* subtus plerumque trinervia, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longa. *Bractae* subfoliaceae, striatae. *Sepala* membranacea vel subfoliacea, margine membranaceo, obtusiuscula, apice ciliata. *Antherae* lineares.







L. collinum ! R. L. Br.

Asphodelia collina La Bill
et H. Tassin. n. 50. fol. contra
et *Brachyoparula* 3 contra
et La Billardiere / *harpophana*
no ut R. recte monuit, margi
ne recurvata obscurati. Dr. H.

L. virgatus ! R. L. Br.

Asphodelia virgata La Bill.

L. apiculatus hb. St. Tassin
non R. Br. perobrom.

Similibus huc pertinentibus, etiam si
Dr. dicit foliis *convexa* non pa
vis. Longo caudato. cor. 14 & 20.

apiculata divergit superius sub
globosius calycem pignus autibus
& foliis villosis?

Nunc retuli etiam proximis omnia
alia *L. polydactyla* adordinata,
ex diagnosi brev. hanc ^{hab. 100} Lange (vi.
serpentina.

In locis diversissimis per viles
praesertim montanis, per totum
annuum flores.

Radix lignosa apice nigra!

8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

(L. vir. Tassin. hb. St. 947.

Discus hypogynus lobis 5 obtusis. *Stylus* brevis, stigmatē obtuso. *Drupa* crustacea, subcompressa, calycem aequans, stylo coronata, 2 locularis.

Hic et sequens ob calyces subfoliaceos forsā rectius sect. 4 „*Perojoani*“ conseciantur.

17. ***Leucopogon obtusatus* Sond.** ramulis puberulis, foliis semiteretibus obtusis glabris margine ciliato-denticulatis, spicis terminalibus paucifloris solitariis aggregatisve, bracteis calycibusque obtusis subfoliaceis glabris.

In limoso - calculosis lateris orientalis montis Bakewell, York, d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 395 ex parte.

Fruticulus gracilis, ramosissimus, praecedenti proxime affinis sed ramulis pubescentibus et foliis crassioribus facile diversus. *Folia* lineam longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, supra plana, vix concaviuscula, subtus convexa, carinata, subuninervia, apice obtusa, stricte adpressa, ramulorum subimbricata. *Spicae* in apicibus ramulorum solitariae vel aggregatae, pauciflorae. *Bractae* obtusissimae apice lanato-ciliatae, subtendenti parum minore. *Sepala* obtusa lanato-ciliata tubum corollae aequantia. *Corollae* lobi albo-hirsutissimi. *Antherae*, *discus*, *stylus* et *stigma* ut in antecedente. *Drupa* crustacea, oblonga, cylindrica (non compressa) calyce parum longior, stylo superata, 2-rarius 1-locularis.

§. 3. CARDIOPHYLLI.

18. ***Leucopogon cordatus* Sond.** ramulis glabris, foliis alternis exacte cordatis acutis vel acuminatis planis glaberrimis patentibus reflexisve, spicis ramulos terminantibus solitariis vel axillaribus aggregatis, bracteis inferioribus foliaceis calycem coloratum subaequantibus, superioribus brevioribus.

In Australia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 388.

Frutex erectus, ramis filiformibus glabris. *Folia* caulina 3-3½ lin. longa, 2-2½ lin. lata, ramulorum minora, aequae longa ac lata, basi profunde cordata, subtus pallidiora, striata. *Spicae* in apice ramulorum 5-8 florum solitariae vel ad basim earum spicis 2-3 brevioribus patentibus sub 4-floris munitae. *Bractearum* inferiores 3-4 foliaceae, calycem subaequantes, sequentes coloratae breviores. *Bracteolae* obtusiusculae ut sepala coloratae, margine ciliolatae. *Corollae* tubus brevis, lobi dense barbati. *Filamenta* brevissima, antheris linearibus. *Discus* hypogynus brevis, lobis obtusis. *Stylus* brevis, stigmatē subcapitato. *Drupa* exsucca oblonga cylindrica, striata, apice truncata, stylo persistente apiculata, plerumque 5 locularis.

Plurimis notis convenire videtur cum *L. glabello* R.Br. sed folia in nostro non late cordata. An potius varietas est? *L. cordifolius* Lindl. in Annal. sc. nat. XV. 62. est species valde diversa.

19. ***Leucopogon distans* R.Br.** ramulis glabris, foliis ovatis subcordatis divaricatis muticis supra convexis subtus pubescentibus, spicis terminalibus aggregatis flexuosis, floribus distantibus, drupis crustaceis 5 locularibus depresso-obovatis. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In solo subturfoso arenoso inter frutices densos planitieci prope Albany, Plantagenet, d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 390.

„Frutex 1-1½ pedalis“ erectus, ramis gracilibus ramulisque glabris. *Folia* sparsa, alterna, patentia, inferiora saepius reflexa, omnia lineam circ.

longa, supra convexa profunde striata glabra, subtus dense pubescentia, margine revoluta. *Spicae* terminales subpaniculatae. *Rachis* flexuosa, puberula, floribus sessilibus distantibus. *Bracteae calycesque* fusco coloratae. *Bracteae* obtusiusculae, subtendenti parum minore. *Sepala* ovata, acuta, ciliolata. *Corollae* tubus brevissimus, limbi laciniis supra hirsutissimis subtus tenuissime puberulis. *Filamenta* brevissima, inter barbam occultata. *Antherae* lineares. *Stylus* brevis, stigmate subcapitato. *Drupa* calyce brevior, crustacea, depresso-ovata vel potius suborbicularis, stylo apiculata, 5 locularis.

Variat: calycibus minute puberulis et glabriusculis intensius coloratis.

20. **Leucopogon reflexus** R.Br. ramulis pubescentibus, foliis ovatis subcordatis muticis reflexis divaricatisve, supra convexis, subtus concavis pilosis lineatis, spicis terminalibus confertis paucifloris, floribus imbricatis, drupis crustaceis 5 locularibus. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In turfosis inter frutices densos prope oppidulum Albany, Plantagenet, Decbr. 1840. Herb. Preiss. No. 398. (New-South-Wales: Fraser! herb. Shuttleworth.)

„Frutex 1-3 pedalis“. *Rami* elongati, graciles, simplices vel apice divisi, ramuli pubescentes. *Folia* inferiora angustiora, sublanceolata, mutica, patenti-reflexa, superiora breviora, ovata, subcordata, omnino reflexa, adpressa supra convexa glabra, subtus pallidiora, lineata, pilosa, marginibus recurvis. *Bracteae* acutae, subtendente minore obtusiuscula, ut calycis foliola ovato-lanceolata, subvillosae. *Corollae* tubus brevis, limbi lobis dense barbatis. *Filamenta* brevissima, antheris lineari-oblongis. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Drupa* parvula, crustacea, stylo coronata, 5-rarius 1-locularis.

21. **Leucopogon variifolius** Sond. ramulis glabris, foliis glabris sessilibus patentibus reflexisve inferioribus lanceolatis muticis margine recurvo ciliatis, superioribus ovato-cordatis cordatisve subacuminatis margine subrecurvo denticulatis scabris, spicis subterminalibus multifloris, calycibus bracteisque foliaceis glabris.

In subarenosis prope oppidulum Albany, Plantagenet, Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 404.

„Frutex bipedalis“ ramis erectis, glabris. *Folia* inferiora lanceolata, basi non cordata, 3 lin. longa, vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora ovato-acuminata, ovato-cordata vel cordata acuta et subacuminata, subtus striata. 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, 2 lin. lata. *Spicae* elongatae, solitariae vel aggregatae in axillis foliorum supremorum, 8-20 florum. *Flores* bracteati, bracteis foliaceis, margine ciliolatis, calyce plerumque brevioribus. *Bracteolae* acutae ut calycis foliola lanceolata foliacea, margine ciliolatae. *Corollae* lobis breves, albo-hirsuti. *Antherae* oblongo-lineares. *Ovarium* glabrum. *Stylus* brevis. Stigma obtusum.

A *L. glabellum* R.Br. cui affinis videtur, foliis non coriaceis nec late cordatis et inferioribus lanceolatis, omnino differt.

§. 4. PEROJOANI.

22. **Leucopogon elatior** Sond. ramulis glabris, foliis inferioribus linearibus vel lineari-lanceolatis patentibus deflexisve, superioribus ovatis acutis vel subacuminatis erecto-patentibus, omnibus glabris margine denticulatis, spicis ter-

L. villiger f. *glaber*, ramulis foliisque

glabris, *L. concurvus*? Ferd Müller

ramulis glabris, foliis glabris breviter
pubescentibus ovato cordatis obtusiuscu-
lis cucullatis (saepe ramum intus
vaginantibus) margine laevibus
multinerviis, pinnis axillaribus
terminalibusque paucifloris ca-
pitatis, corymbis apice ciliatis, bracteis
glabris

Fructus erectus vix pedalis, olivaceo
similis ad *L. cucullatum* quarendo
relatus — In arcebis distinctus
juxta finem Encourter Vag-
fili Nov. 1847 hb. St. n.

minalibus elongatis solitariis aggregatisve, calycibus bracteisque subfoliaceis glabris.

In solo sublimoso planitieci haud longe ab oppidulo Busselton, Sussex, Decbr. 1839. Herb. Preiss. No. 391. (Vasse-River, Mrs. Molloy!)

Caulis fruticosus, 3-pedalis, gracilis. *Radix* teres subfusca, ramulis fibrillisque paucis longis. *Truncus* cylindricus, pennae corvinae crassitie, ramis elongatis, teretibus, vitellinis, glabris, sparse foliatis terminatus. *Folia* ramulorum steriliū tenuia, patentia, exacte linearia, 3-4 lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, trunci seu inferiora lineari-lanceolata, mutica, subcoriacea, 5 lin. longa, basi lineam lata, margine subrecurva, intermedia latiora, subbreviora, suprema late ovata, acuta, apice patentia, omnia utrinque glabra, subtus striata. *Spicae* in apice ramulorum graciliū nunc solitariae nunc aggregatae, foliaceae, saepe 30 florum. *Rachis* glabra cum bracteis tendentibus persistens. *Bractea* ovata, acuta, plerumque apiculata, concava, dorso striata, viridis, floribus brevior. *Bracteolae* carinatae, ovatae, acutae, margine serrulatae. *Sepala* lanceolata bracteolas triplo-, corollae tubum vix superantia. *Corollae* lobi albo-hirsutissimi, pilis subplanis margine denticulatis. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Ovarium* suborbiculare basi parum angustatum, glabrum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum.

Ut videtur haec species transitum e sectione praesente ad antecedentem facit, in omnibus quidem speciminibus Preissianis bases foliorum cordatae desiderantur, in uno a dom. Molloy collecto folia nonnulla subcordata video. Habitu et characteribus proxime accedit ad *L. variifolium*.

23. **Leucopogon vaginans** Sond. ramulis glabris, foliis adpressis basi subvaginantibus lanceolatis subacuminatis muticis utrinque glabris striatulis margine vix denticulatis, spicis terminalibus elongatis multifloris, calycibus bracteisque subfoliaceis glabris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis leg. cl. Roe, Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 382.

Fruticis pars inferior desideratur. *Caulis* tenuis ramos habet graciles, glabros. *Folia* in parte speciminum inferiore $1\frac{1}{2}$ lin. longa, sessilia, subcoriacea, basi latiore semivaginantia, ramulorum floriferorum sparsa, steriliū subimbricata, lanceolata supra concaviuscula obsolete, subtus evidenter striata. *Spicae* in apice ramulorum fere semipedalium 1-6 elongatae, saepe 20 florum, basi subramulosae. *Flores* in axillis bractearum foliacearum solitarii, haec bractea ovata acuta nervosa viridis floribus brevior. *Bracteolae* acutae. *Sepala* lanceolata, lineam fere longa, margine ciliolata. *Corollae* tubus brevis calyci subbrevior, limbi lobi hirsutissimi, pilis scabridis incrassatis. *Antherae* lineari-oblongae. *Cyathus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Ovarium* glabrum, disco duplo longius. *Stylus* brevis, stigmatē obtuso.

24. **Leucopogon rupestris** Sond. ramulis glabris, foliis sessilibus planis late ovatis vix acutiusculis supra laevibus subtus nervosis glabris margine cartilagineo-denticulatis, inferioribus sparsis superioribus imbricatis, spicis terminalibus solitariis aggregatisve multifloris elongatis, bracteis calycibusque foliaceis glabris.

In rupestribus collium Konkoberup, promontorii Cape Riche, d. 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 406.

„Frutex rigidus“ ramis ramulisque abbreviatis, subvitellinis, glabris. *Folia* inferiora 2 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, coriacea, glaberrima, subtus nervosa, nervis lateralibus divergentibus, superiora parum minora, dense imbricata. *Spicae* ramulos terminantes, 10-20 florum, solitariae, rarius aggregatae.

tae, lateralibus vel inferioribus abbreviatis, paucifloris. *Rachis* glabra, persistens. *Bracteae* ovatae, acutae, inferiores foliis conformes flores superantes, sequentes sensim minores. *Bracteolae* ovatae acutae, margine ciliatae. *Sepala* bracteolas triplo superantia, lanceolata, foliacea, margine ciliolato-serrata. *Corollae* tubus brevis, limbi lobis albo-hirsutis. *Drupa* immatura obovata, 1 locularis.

25. **Leucopogon gracilis** R.Br. ramulis glabris filiformibus, foliis lanceolato-linearibus erectis concavo-convexis muticis, subtus nervosis trilineatis margine laevibus, spicis congestis 4-6-floris, calycibus bracteisque subfoliaceis glabris, subtendente parum breviori. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In solo turfoso humido inter frutices densos planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 8. et 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 381 et 389.

Frutex pedalis et ultra, ramis virgatis. *Folia* sparsa, alterna, adpressa vel erecta, glabra, 3-3½ lin. longa, ½ lin. lata, subtus convexa, striis 3, in foliis latoribus saepius 5. *Calycis* foliola viridia, bracteis subtriplo longiora, tubum corollae aequantia. *Corollae* lobi albo hirsutissimi. *Antherae* lineares. *Discus* hypogynus acute 5 lobatus. *Stylus* brevis, stigmate subcapitato.

Simillimus *L. virgato* Br., differt: foliis minus acuminatis margine nudis, spicis terminalibus et calycibus foliaceis.

26. **Leucopogon oppositifolius** Sond. ramulis puberulis, foliis oppositis adpressis lanceolato-linearibus muticis supra concavis albo-velutinis subtus trinerviis glabris margine laevibus, spicis terminalibus aggregatis paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis glabris.

Ad sinum regis Georgii, Dec. 1840 et in Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 380 et 400.

„Frutex dodrantalis“ (No. 380) nunc ultra pedalis (400) radice crassa, nigricante, multicauli, caulibus erectis, a basi ramosis, teretibus, striatis, ramis virgatis lutescentibus, tenuissime puberulis. *Folia* sessilia, decussata, lanceolato-linearia vel sublinearia, convexo-concava, plerumque 2 lin. longa et ¼ lin. lata, in spec. majoribus sublongiora et latiora, inferiora remotiora, et praesertim ramulorum sterilium distiche imbricata, omnia cauli arcte adpressa et supra villis brevibus albis velutina. *Spicae* 3-4, terminales. *Bracteae* obtusiusculae, margine ciliatae, tendente subaequali. *Sepala* lanceolata, obtusiuscula, margine ciliolata, bracteis duplo superantia. *Corollae* tubus calycis longitudine, limbi lobi dense barbati. *Filamenta* antheris linearibus breviora. *Cyathus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevissimus, stigmate obtuso.

β. **pubescens**. minor, ramis folisque inferioribus pubescentibus.

In regionibus interioribus Australiae merid. occid. m. Nov. 1840 leg. cl. Preiss.

27. **Leucopogon crassifolius** Sond. ramulis pubescentibus, foliis crassiusculis linearibus apice subtriquetro mucronatis glabris, spicis subaggregatis paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis ciliatis.

In rupestribus collium Konkoherup, promontorii Cape Riche, d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 386.

„Frutex 2 pedalis“ ramis rigidis, sublignosis, elongatis, erectis, ramulis abbreviatis, foliosis. *Folia* inferiora adpressa, sparsa, 3 lin. longa, ½ lin. lata, glaberrima, supra plana sed apice cucullato-contracta, mucrone brevi rigido

L. longati var. ?

~~*L. jacobina*~~ (per Bull.)

30. *L. h. nov. linc. propinqua* var.
a *h. h. (h. f. 2)* a *h. h. h.*
Phillippei differt foliis maj-
oribus, pinnatis, iaculis. *Phillippei*
nominavit. *L. floridissimus* f. m.

grata cum ^{tribus} *h. h. h.* agnitionis gratia (St. Dehler)
qui ^{non} ~~non~~ hant aliis plantis *h. h. h.*
h. h. h. *h. h. h.* communiter.

terminata, subtus carinata, 3 nervia, nervo medio valde prominente et hinc apice subtriquetra, margine ciliolata demum nuda: folia superiora seu ramulorum imbricata, reliquis subbrevia. *Spicae* terminales in nonnullis speciminibus forsan ramuli abortu axillares, subaggregatae, 3-6 florum. *Bractae* carinatae, glabrae, margine ciliatae, subtendente minore. *Calycis* foliola ovata acuminata, apice sphacelato patula. *Corollae* tubus calyce longior, limbi lobis albo hirsutissimis. *Antherae* apice affixae. *Discus* hypogynus obtuse lobatus, ovario 4 plo brevior. *Stylus* subnullus. *Stigma* obtusum. *Drupe* (immatura) lineari-oblonga, turbinata, pentagona.

28. **Leucopogon tetragonus** *Sond.* ramulis, foliis, bracteis, calycibusque hispidulis, foliis quadrifariam imbricatis oblongo-linearibus oblongisve margine recurvo longe ciliatis, spicis terminalibus paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis.

In rupestribus collium Konkoberup, promontorii Cape Riche, d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 387.

„Caulis fruticosus, 2 pedalis“. *Rami* rigidi, sublignosi, ramulis foliosis. *Folia* erecta, imbricata, lineari-oblonga, oblonga vel ovato-oblonga, obtusiuscula, 1-1½ lin. longa, supra scabriuscula, subtus nervosa, nervo medio validiore, margine ciliata, ciliis longis. *Flores* 4-12 in apice ramulorum spicati. *Bractae* ovatae, acutae, margine ciliatae, subtendente parum majori. *Calycis* foliola lanceolata, margine ciliata, apice sphacelato plerumque patula. *Corollae* tubus calyce brevior, lobis albo-barbatis, pilis barbae nodulosi. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Stylus* brevis ovario obovato turbinato aequilongus. *Stigma* obtusum.

29. **Leucopogon corifolius** *Endl.* foliis lanceolatis acutis margine revolutis patentibus vel reflexis ramulisque hispidis, spicis terminalibus paucifloris congesto-capitatis, calycibus bracteisque herbaceis villosis. — *Endl.* nov. stirp. dec. 2. n. 19.

In solo turfoso inter frutices densos prope oppidulum Albany, Plantagenet, Febr. 1840. Herb. Preiss. No. 399.

Folia inferiora glabrata. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus obtuse lobatus ovario glabro duplo brevior. *Stylus* brevis, stigmate obtuso.

30. **Leucopogon squarrosus** *Benth.* ramulis pubescentibus, foliis ovatis lanceolatisve acutis ciliatis subglabris basi subadpressis apice recurvis, spicis paucifloris terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque subfoliaceis glabris. — *Benth.* in *Endl.* Enumerat. plant. Hügel. pag. 77.

Inter saxa calcarea clivulorum haud longe ab oppidulo Freemantle, d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 403. (v. sp. anth. in Herb. caes. Vindob.)

„Frutex 3 pedalis“ apice ramosissimus, ramulis hirtello pubescentibus. *Folia* lanceolata, ovato-lanceolata vel ovata, acuta, 1-2 lin. longa, ½-1 lin. lata, sessilia, squarrosa-patentia basi plerumque adpressa, utrinque glabra, subtus striata, margine ciliata vel denticulata. *Spicae* ramulos terminantes, 2-4-florae. *Bractae* lanceolatae, carinatae, glabrae, margine ciliolatae. *Sepala* lanceolata, lineam longa, pallida, apice serrato-ciliata. *Corollae* tubus calyce brevior, lobis albo-hirsutissimis. *Filamenta* brevissima, antheris oblongo-linearibus. *Discus* hypogynus obtusus. *Ovarium* suborbiculare glabrum. *Stylus* brevis, stigmate obtuso.

β. paradoxus. caule humiliore, foliis inferioribus lineari-lanceolatis planis, superioribus ovatis acuminatis subsquarroso-patentibus. Herb. Preiss. No. 403 ex parte.

31. **Leucopogon cymbiformis** *Cunn.* ramulis glabriusculis, foliis imbricatis lanceolatis mucronatis superne plano-concavis laevibus subtus subcarinatis striatis margine subdenticulatis, spiculis aggregatis paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis ciliolato-serratis, ovario setis circumdato. — A. Cunn. ap. DC. l. c.

In arenosis inter frutices planitiei cis flumen Gordon, Hay, d. 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 385. (Swan-River, Drummond!)

Fruticulus $\frac{1}{2}$ pedalis, a basi ramosus, rami erecti, glabri, ramuli vix pubescentes, foliis sparsis, imbricatis obsiti. *Folia* arcute adpressa acuminata, mucronata, supra concaviuscula subtus-striata, et nervo medio valido subcarinata, pleraque 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, semilineam lata, alia 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longa, semilinea angustiora. *Spicae* 3-4 florum, in apice ramulorum aggregatae, in nonnullis speciminibus ramuli forsitan abortu axillares solitariae. *Bractae* lanceolatae, apice serrulatae, subtendente breviori. *Sepala* lanceolata, acutissima, bracteis duplo superantia, apice ciliolato-serrata. *Corollae* tubus calyce parum longior, intus glaber, limbi lacinae lanceolatae, tubo subbreviores, supra dense barbatae. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Ovarium* sublineare, angulatum, setis numerosis albis disco hypogyno longioribus circumdatum. *Drupa* (immatura) subcrustacea, obsolete pentagona.

32. **Leucopogon elegans** *Sond.* ramulis villosis, foliis ovatis sublanceolatisve acutiusculis convexo-concavis supra pilosiusculis subtus glabris, striis 5 semipellucidis notatis, margine longe ciliatis, spicis terminalibus solitariis, calycibus bracteisque foliaceis glabris.

In glareosis sterilibus collium Konkoherup, promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 378.

Fruticulus humilis, vix spithameus, ramis purpurascentibus glabris, ramulis brevibus, erectis, villosis. *Folia* sparsa, versus apicem copiosiora, subimbricata, petiolulata, petiolo purpureo, erecto adpressa, valde concava, 2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, explanata 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, intense viridia, utrinque concolora, margine ciliis longis obsita. *Spicae* in omnibus exemplar. a me examinatis solitariae, flores inferiores in axillis foliorum supremorum. *Bractae* obtusiusculae, apice ciliatae, sepalis lanceolatis, margine ciliatis triplo breviores. *Corollae* 2 lin. longa, tubus longitudine calycis intus apice pilosus, limbi lacinae albo-hirsutissimae (pilis longiusculis non crispatis, exasperatis. *Antherae* lineares. *Discus* hypogynus 5 dentatus, ovarium dimidium aequans. *Stigma* brevissimum. *Stigma* capitellatum.

β. glaucifolius. ramulis glabris, foliis glabris glaucescentibus. Ad portum regis Georgii leg. cl. Preiss.

33. **Leucopogon tectus** *Sond.* ramulis tenuissime puberulis, foliis imbricatis oblongis sublanceolatisve muticis glabris supra planiusculis subtus convexiusculis nervis elevatis, margine ciliato-denticulato, spicis terminalibus solitariis, calycibus puberulis margine ciliatis.

In rupestribus collium Konkoherup, promontorii Cape Riche d. 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 406 ex parte.



Frutex ultra pedalis, ramis glabris, ramulis abbreviatis foliis imbricatis dense obsitis. *Folia* 3 lin. longa, lineam lata, glaberrima, petiolulata, supra laevia, subplana vel apice cucullato-contracta, concaviuscula, subtus elevato-nervosa, nervo medio valde prominulo. *Spicae* simplices, 6-8-florae, rachi puberula, persistente. *Bractee* tendentes foliaceae, obtusiusculae, striatae deciduae. *Bracteolae* margine ciliolatae calycem dimidium paullo superantes. *Sepala* subfoliaceae, extus puberula, lanceolata, obtusiuscula, margine ciliata. *Corollae* lobi albo-hirsutissimi.

L. nervosus R.Br. similimus videtur, differt tamen ut ex descriptione elucet: foliis ellipticis, spicis congestis et calycibus foliaceis glaberrimis.

34. **Leucopogon ovatus** *Sond.* ramulis tenuissime puberulis, foliis sessilibus adpressis ovatis oblongisve muticis glabris supra concaviusculis subtus convexiusculis nervoso-striatis, margine denticulatis scabris, superioribus subimbricatis, spicis terminalibus paucifloris, calycibus apice ciliatis bracteas duplo superantibus.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, d. 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 375.

Fruticis ramos video semipedales, ramulis nonnullis erectis, tenuibus, abbreviatis, instructos. *Folia* sunt ovata, ovato-oblonga vel oblonga, $1\frac{1}{2}$ - 2 lin. longa, coriacea, supra laevia, subtus striata, inferiora remotiuscula, superiora breviora, subimbricata. *Flores* ramulos terminantes spicam subfoliosam efformantes, spicae rarius solitariae, plerumque subaggregatae, pauciflorae. *Bractee* subtendentes inferiores foliaceae, calycem aequantes, superiores sensim minores. *Bracteolae* calycesque membranacei, obtusi, glabri apice ciliati. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi laciniis revolutis dense barbatis. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevis, glaber. *Stigma* subcapitatum. *Drupa* calycem subaequans, crustacea, truncata, striata, plerumque bilocularis.

Num forte idem est ac *L. striatus* R.Br.? Ab antecedente differt: foliis duplo brevioribus tenuioribus, nervis subtus vix prominulis et spicis subaggregatis.

35. **Leucopogon parvifolius** *DC.* ramulis glabris, foliis ovatis concavo-cymbaeformibus obtusis muticis margine integerrimis subtus striatis utrinque glabris, floribus in axillis foliorum superiorum sensim decrescentium solitariis sessilibus in spicam ideo elongatam foliaceam dispositis, drupis obovato-globosis sub 1-spermis. — *DC. l. c. pag. 752!*

Ad sinum regis Georgii leg. cl. Preiss.

Fruticulus semipedalis. *Folia* ramorum inferiorum $1\frac{1}{2}$ lin. longa, saepe longiora, nunc planiuscula nunc caulem subamplectentia, supra laevia, subtus striata, margine integerrima vel subdenticulata. *Rachis* spicae puberula. *Bractee* subtendentes persistentes. *Bractee* calycesque subfoliacei glabri. *Sepala* acutiuscula margine ciliata, bracteolas triplo superantia. *Corollae* lobi revoluti, albo hirsutissimi. *Drupa* subglobosa, calycem subaequans, bilocularis 1-2-sperma.

Specimen Preissianum bene congruit cum frustulo speciminis Candolleani. Differt a praecedente cui proximus, foliis integerrimis vel subintegerrimis saepe subamplexicaulibus, spicis solitariis et praesertim calycibus acutiusculis bracteisque brevioribus.

36. **Leucopogon sprengelioides** *Sond.* ramulis glabriusculis, foliis parvulis late obovatis vix acutiusculis, basi

cucullatis semivaginantibus supra laevibus subtus lineatis margine nudis glabris, spicis terminalibus solitariis aggregatisve, calycibus puberulis subtendentibus foliaceis.

In Australia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 376 et in arenosa planitie haud longe a Halfwayhouse, York, d. 13. Sept. 1839. No. 397. (Drummond!)

„Suffrutex 1-3 pedalis“ ramis nunc elongatis nunc abbreviatis. *Radix* gracilis nigrescens. *Caulis* prope basin crassitie pennae corvinae. *Rami* ut caulis basi plerumque nudi, glabri, *Ramuli* semper breves vix puberuli foliis tecti. *Folia* imbricata, coriacea, lineam circ. longa totidemque lata apice subattenuata sed non acuta, basibus cucullatis semi-vaginantia, apice patulo vel subadpresso, subtus lineis notata, margine integerrima rarissime subdenticulata. *Spicae* solitariae, rarius aggregatae, 4-8-florae. *Rachis* pubescens bracteolis persistentibus foliaceis margine tenuissime ciliatis, bracteis carinatas obtusas margine ciliolatas aequantes vel parum longiores. *Calyces* foliola subfoliacea, obtusiuscula, extus puberula margine ciliolata, bracteis duplo superantia. *Corollae* lobi elongati, revoluti, dense hirsuti. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus, ovario duplo brevius. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum. *Drupa* crustacea, striata, calycem subaequans, stylo coronata, 4-5 locularis.

37. **Leucopogon cucullatus** R.Br. ramulis vix puberulis, foliis ovatis obtusis muticis cucullatis imbricatis sessilibus subtus lineatis margine nudis, spicis solitariis aggregatisve, bracteis subtendentibus foliaceis, ovariis 5 locularibus. — R.Br. l. c.

In littore arenoso inter frutices Point Possession (sinus regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 377.

„Frutex pedalis“ ut videtur prostratus, basi lignosus, ramis adscendentibus gracilibus plerumque nudis, ramulis glabriusculis foliis imbricatis dense tectis. *Folia* 3 lin. longa, explanata 2 lin. lata, basi vaginantia, ovata apice obtuso subincurvo, utrinque glaberrima, subtus striatula, margine integerrima. *Spicae* in speciminib. Preissianis semper solitariae 4-12-florae, foliaceae. *Bractee* subtendentes (i. e. folia suprema) basi non vaginantes, calyces aequantes. *Bracteolae* calycesque membranacei, saepius subcolorati. *Bracteolae* calyci dimidio aequales, carinatae, obtusiusculae. *Sepala* ovato-lanceolata, obtusiuscula ut bracteolae ciliolata. *Corollae* tubus calyce subbrevior, limbi lobis elongatis, revolutis, supra dense barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* supra medium affixae, lineares. *Cyathus* hypogynus obtuse 5-lobus. *Ovarium* conicum subangulatum, 5 loculare. *Stylus* brevis, glaber, stigmatibus sublobato.

§. 5. AXILLIFLORI.

38. **Leucopogon secundiflorus** Sond. ramulis tenuissime puberulis, foliis erectis subadpressis linearibus cuspidato-mucronatis glabris margine revoluti denticulato-scabris, pedunculis 1-2 floris recurvis, corollae tubo calycem duplo superante, stylo subexserto.

L. pendulus Benth.! in Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 77. non R.Br.

Ad sinum regis Georgii leg. cl. Preiss. (King George's Sound, Hügel! New South-Wales, Fraser!)

37. In circulo per Evolutam pag.
Ab. N. 120.

x L. hirsellus Juss. Mill.

foliis brevissimis hirsutis, foliis
 ovalis, apice attenuatis cuspi-
 datis, margine recurvis supra
 nictantibus, subtus lineasis opa-
 cis; pedunculis axillaribus bre-
 vissimis paucifloris;

Similitudo florum calyc. haud
 eodet. & figende genus facit
 non dubium. Utrumque fragmentum

habet, ramis nictis globis, ramulis
 subhirsutis foliis, fol. plus minus
 palatilis apice nictos paul. recurv.
 hirs. 3" long 2" lata.

L. astrolomoides Juss. Mill. Encountered May.

Ad spec. nect. Marble range
 40. Hinc proxima vel varietas vel
 species distincta: calycis foliis
 latioribus, ramulis glabris, peduncu-
 lis ad 4 floris, brevibus corollae
 (hinc foliis nictis in planta juniori)
 nictis & fragantibus (hinc piloso).

In tractu litorali Encountered
 May hinc inde frequens. fructus 2-3'.
 Hinc prope valoniam hinc &
 nomen ad hunc revocatur ex affinitate
 x Astrolomatidis: L. astrolomoides Juss.

Floris egregia odori. Drupa picea
 angusta elliptica utroque sine
 attenuata nictis fere striata
 3-4" longa nictis lineas duas crassa.
 2-3 lobulata. Sine pulva.

In arenosis in pl. halimaturorum
 nec non collibus piceis inter affinitatem
 H. Murray & opp. Killunga
 Aestate!

Frutex spithameus, erectus. Rami a basi orti, erecti, ramuli digitum circiter longi, lente visi tenuissime puberuli. Folia in parte caulis inferiore sparsa, alterna, adpressa, in ramis densiora, subimbricata et subadpressa, linearia, 4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine revoluta, mucrone subpungenti cuspidata, subtus striata. Pedunculi 1-2-flori, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi, recurvi, squamulis nonnullis obsiti. Bractee 2 obtusae apiculatae. Calycis foliola acutiuscula, 1 lin. longa, glabra margine ciliolata. Corolla 2 lin. longa, tubus calyce duplo longior, limbi lobis brevibus demum revolutis, dense barbatis. Stamina inclusa. Stylus corolla longior, glaber, stigmatibus obtusis.

- 39. *Leucopogon oxycedrus* Sond.** ramulis tenuissime puberulis, foliis patentibus vel reflexis lineari-lanceolatis mucrone pungenti terminatis glabris supra convexis subtus concaviusculis lineatis margine denticulato-scabris, pedunculis 1-2-floris recurvis, corollae tubo calycem duplo superante.

In Novae Holl. ora meridionali-occidentali leg. cl. Preiss. (Herb. Preiss. sine No.)

Frutex valde rigidus, ramis patentibus et divaricatis. Folia sessilia, utrinque glabra, 6-8 lin. longa, lineam lata, nunc erecto-patentia, nunc reflexa, marginibus subrecurvis denticulatis, subtus subpallidiora, striatula. Pedunculi semper reflexi, brevissimi, pubescentes, 1 vel biflori. Bractee obtusae, apiculatae, glabrae, margine ciliolatae, calyce triplo breviores. Sepala lanceolata, glaberrima, margine ciliolata. Corolla 3 lin. longa, limbi lobis albo hirsutis, pilis nodulosis. Filamenta glabra, antheris inclusis, oblongo-linearibus, minimis, infra apicem affixa. Discus hypogynus acute 5-lobus. Stylus glaber, longitudine corollae, stigmatibus obtusis. Ovarium ovoideum, glabrum, disci lobis subtriplo longius.

- 40. *Leucopogon conostephioides* DC.** ramulis puberulis, foliis lineari-sublanceolatis acuminato-pungentibus convolutis glabris subtus striatulis supra laevibus, margine scabris, floribus axillaribus geminis subsessilibus patulis, corolla tubo calycem aequante. — DC. l. c. pag. 753!

In arenosis inter frutices supra urbiculam Perth, d. 26. April 1839. Herb. Preiss. No. 405. (Drummond n. 479!)

Fruticulus pedalis, rigidus, ramosissimus. Folia brevissime petiolata, 5-6 lin. longa, lineam lata, lanceolata sensim in mucronem pungentem attenuata, supra concaviuscula, nitidula, subtus convexiuscula, pallidiora, striata, striis lateralibus divergentibus. Pedunculi brevissimi patuli vel reflexi, 2 rarius 1-flori. „Flores albi“ in sicco subrosei. Bractee obtusae apiculatae, glabrae, ciliolatae. Calycis foliola glaberrima, acuminata, bracteis 3-plo longiora. Corollae tubus intus hirsutus, lobi acuminati, revoluti, barbati, barbae pilis nodulosis. Filamenta antheris linearibus semisextis medio affixa. Discus hypogynus acute 5-lobatus. Stylus longitudine corollae, glaber, stigmatibus subcapitato. Drupa crustacea, parvula, ovalis, striata, 3-locularis, abortu saepe 1 vel 2-locularis.

A praecedente facile distinguitur foliis supra concaviusculis acuminatissimis et corollae tubo brevioribus*).

*) ***Leucopogon similis* Sond.** ramulis glabris, foliis sessilibus patulis lineari-lanceolatis supra concaviusculis laevibus, subtus planis striatis cuspidato-mucronatis margine subdenticulatis, pedunculis 1-2-floris recurvis, corollae tubo calycem subsuperante, stylo exserto. Habitat in Australasia. (H. mus. Paris. No. 83.) Vidi in herb. Caes. Vindob. *L. conostephioidi* affinis, differt: foliis sessilibus patulis cuspidatis non sensim attenuatis, margine vix denticulatis, planiusculis et subbrevioribus (4 lin. long.) florum pe-

41. **Leucopogon flavescens** Sond. ramulis puberulis, foliis glabris erectis lineari-oblongis basi attenuatis apice obtusiusculo callosis planis margine scabris, pedunculis erectis 1-2-floris, calycibus margine ciliatis tubum corollae aequantibus, disco hypogyno acuto, ovario lineari-clavato.

In confragosis prope Two-peopled Bay, Plantagenet, d. 24. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 379.

„Frutex 4-pedalis“ ramis erectis gracilibus, foliis imbricatis dense obsitis. *Folia* pallide flavescentia, 4-5 lin. longa, apice latiore lineam lata, in petiolum brevem attenuata, supra laevia, subtus nervosa, nervis lateralibus divergentibus, mucrone brevissimo calloso terminata. *Pedunculus* pubescens, erectus, 1, 2, rarius 3-florus, basi 2-bracteolatus. *Bracteae* calyci subadpressae, acutae, glabrae, margine ciliatae. *Calycis* foliola lanceolata, lineam fere longa, bracteas duplo superantia, basi saepe pilosiuscula, apicem versus glabra et margine lanato-ciliata. *Corollae* tubus calyce parum longior, intus prope basin glaber, limbi laciniis lanceolato-linearibus tubum duplo superantibus, supra albo-barbatis, barbae pilis nodulosis vel tuberculatis. *Filamenta* brevissima alte adnata, antheris oblongis supra medium affixa. *Discus* hypogynus 5-partitus, foliolis lanceolatis ovarium dimidium aequantibus. *Ovarium* lineari-clavatum, striatum, glabrum. *Stylus* longitudine tubi corollae, stigmate capitato.

42. **Leucopogon corynocarpus** Sond. ramulis fere glabris, foliis glabris oblongo-lanceolatis acutiusculis muticis supra concaviusculis laevibus, subtus convexis striatis margine subintegerrimis, pedunculis erectis subbifloris, calycibus margine nudis corollae tubum subsuperantibus, disco hypogyno obtuso, ovario obovato.

In Novae Hollandiae ora merid. occid. prope promontorium Cape Riche, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 379 (ex parte.)

Frutex ut videtur pluripedalis. *Folia* petiolulata, 4 lin. longa, lineam lata, subtus convexiuscula, nervis tribus validioribus parallelis et pluribus lateralibus divergentibus instructa, crassiuscula, supra laevissima, subtus pallidiora. *Pedunculi* erecti, 1-3-flori, lineam circ. longi, basi bracteolati. *Bracteae* obtusae, extus glabrae calyce 3-plo breviores. *Calycis* foliola lanceolata, glabra, $1\frac{1}{4}$ lin. circ. longa, margine nuda, rarissime apice vix ciliolata. *Corollae* tubus calyce subbrevior, limbi laciniis lanceolato-linearibus tubo longioribus, supra albo-barbatis, pilis brevibus nodulosis. *Filamenta* alte adnata antheris oblongo-linearibus sub apice adfixa. *Discus* hypogynus 5-partitus, foliolis truncato-obtusis. *Ovarium* obovatum, glabrum. *Stylus* glaber antheris aequilongus, stigmate capitellato. *Drupa* pedicellata, erecta, crustacea, clavata, ventricosa apice mammillata, brunnea, nitida, 2 lin. longa, 1-locularis, semine nigro.

A priore cui simillimus est differt: foliis crassioribus magis oblongis et subtus concavis, margine plerumque integerrimis et praesertim disci foliolis obtusis ovarioque obovata.

43. **Leucopogon planifolius** Sond. ramulis tenuissime puberulis, foliis petiolatis erecto-patulis lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis calloso-mucronatis planis margine

dunculo longiore recurvo et antheris duplo brevioribus lineari-oblongis. *Flores* sunt parum majores, corollae intus hirsutae. *Stylus* glaber stigmate obtuso. *Ovarium* glabrum disco hypogyno acute lobato longius.

Leucopogon Stuartii Gardner.

Diffinitate insignis et
L. appresso R. Br. forte pro-
ximus, sed hoc nobis non
nisi e brevissimis diagnosibus
notus!

At v. South Esk river Tarma.
-mire invenit et. Can Stuart
Sept 20. 1849 floriferum. "Rad.
decurrens" hb. K. 586.

natos, demum 5-lobum, lobis apice latioribus, patentibus. *Drupa* exsucca, obovata, 5-sulcata, 1-locularis.

β . **oblongatus** foliis obovato-oblongis subacuminatis; caetera ut in α .

Crescit ad fluvium Canning. Herb. Preiss., No. 434 (ad sinum regis Georgii herb. Kunth!)

46. **Leucopogon ovalifolius** Sond. ramulis glabris, foliis petiolulatis reflexis glabris ovalibus obovatisve mucrone brevi cuspidatis, supra convexiusculis laevibus, subtus concaviusculis striatis, margine serrulatis scabris, pedunculis 2-floris recurvis, disco hypogyno obtuso, stylo longe exserto.

In planitie arenosa Quangen, Victoria, d. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 417.

„Frutex rigidus 1-2-pedalis“ radice perpendiculari, longa, subramosa, nigricante. *Caulis* pennae corvinae crassitie, basi subsimplex, apice ramosissimus, ramulis tenuibus, gracilibus, glabris. *Folia* omnia reflexa, coriacea, 2 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, supra nitida subtus pallidiora striata, striis lateralibus divergentibus, petiolo brevi insidentia, apice mucrone brevi subpungenti terminata, margine serrulata. *Pedunculi* plerumque 2-flori $1-1\frac{1}{2}$ lin. longi, glabri, basi bracteolis minutis obsessi, denum recurvati. *Bractaeae* obtusae, calyce plus duplo breviores. *Calycis* foliola lineam longa, obtusiuscula, apiculata, margine ciliolata. *Corollae* tubus calyce longior, limbi lobis revolutis, pilis subnodulosis barbatis. *Filamenta* alte adnata. *Antherae* lineares faucem superantes, subexsertae. *Disci* hypogyni foliola obtusiuscula. *Ovarium* glabrum. *Stylus* glaber, exsertus, $2\frac{1}{2}$ lin. longus, stigmate obtuso.

Habitu prope accedit ad *L. rotundifolium*, sed foliis concavo-convexis, pedunculis recurvis et stylo longe exserto satis differt.

47. **Leucopogon pungens** Sond. ramulis pubescentibus, foliis linearibus sublanceolatisve, mucrone longo pungenti terminatis glabris, margine recurvo serrulatis scabris, pedunculis erectis axillaribus 2-4-floris, bracteis aristatis, drupa subbaccata maxima.

In locis arenosis Australiae occidentalis, d. 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 366. In solo calcareo colliculi prope oppidulum Freemantle, d. 17. Dec. 1839. No. 373 et ad sinum regis Georgii. (Swan-River: Drummond!)

„Frutex 2-4-pedalis“ ramosissimus, dense foliosus. *Folia* sessilia, erecta plerumque 9-11 lin. longa, lineam lata, (in spec. ad sinum reg. Georgii lectis longissima, $1\frac{1}{2}$ pollicaria, 2 lin. lata.) linearia vel sublanceolata, mucrone rigido pungenti terminata, utrinque glabra, supra impressae 3-nervia, subtus vix pallidiora nervosa, nervis tribus magis prominulis. *Pedunculi* breves, pubescentes, bracteolati, bracteolis acuminatis, plerumque 2-rarius 3-5-flori. *Bractaeae* plerumque 2, rarius 4, exteriores 2 minores, interiores calycem dimidium aequantes, dorso carinatae longe cuspidatae vel aristatae, margine ciliolatae. *Calycis* foliola lanceolata, acuminata, margine brevissime ciliata, corollae tubum aequantia. *Laciniae corollae* revolutae, barbatae. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus lobis acutiusculis, ovario brevioribus. *Stylus* filiformis, glaber, antheris circ. aequalis, stigmate capitato. *Drupa* baccata, (3 lin. longa) coerulescens, ovalis, styli basi mucronata, 5-locularis.

Obs. Flores quidem numerosiores qui in singulis exemplaribus inveniuntur nec non fructus baccati, hanc speciem potius ad sect.: *brachystachyum* quam ad praesentem relegare videntur, sed in centenis fere exemplaribus, quae in herb. Preissiano examinare mihi contigit, pedunculos semper

Monotoca R. Br.

M. limata R. Br.

Adph. Murray, Tarm. hb. St. II n.
294. Tarm. 1849. fr. 6-8'.

M. campetrisfolia R. Br.

Specimen manum. In montibus
Tarmanniae (non regionibus tro-
picis St. I ut in editione prodrumi
ex ipse dictum) 4000' altis. hb.
St. I n. 31.

Viximiliter ab hac non differt:

Monotoca cyathodes Forst. Me.

~~St. I pro forma cognominis. 6" alt.~~
~~Fructuarius. Tarm. 1849. Corall~~
hb. St. I. 625. fin. num. 8 ad loci,
West head litoris boreali occidentalis
Tarmanniae, hb. St. 868. (fructuarius)
1' alt. (an prodrumalis)

2-floros (rarius 1-3-floros) vidi. Etiam habitus, hujus magis quam illius sectionis specierum est. Fructus baccati et bractee 4 hanc plantam *Astroloma* aequant, sed flores omnino *Leucopogonis* sunt *).

ACROTRICHE R.Br. DC. prodr. 7. pag. 756.

Endl. gen. n. 4275. Meisn. gen. pag. 248.

(156. 364.)

1. **Acrotriche subcordata DC.** ramulis minutissime subvelutinis, foliis petiolulatis ovatis basi subcordatis apice callosis muticis planis subtus striatulis, floribus ad axillas paucis subspicatis subsessilibus. — DC. l. c.

Acrotriche cordata et *A. ovalifolia* Br. prodr. *Acrotriche ovalifolia* Hook. bot. mag. t. 3171. *Styphelia cordata* Labill.! Nov. Holl. 1. pag. 46. tab. 63.

In arenosis prope epidulum Freemantle et in insula Rotenest, d. 26. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 435.

*) **L. dasystylis** Sond. ramulis puberulis, foliis erectis subadpressis lanceolatis, mucrone pungenti cuspidatis planis, supra laevibus nitidulis, subtus pallidis striatis, pedunculis brevissimis 1-2-floris, corollae tubo calyce subduplo longiore, stylo piloso, stigmatibus lobato. In Nova Hollandia (Mus. paris. No. 81.) Spec. vidi in herb. Caes. Vindob. Frutex rigidus, ramis erecto-patentibus. *Folia* petiolulata, erecta, superiora imbricata, lanceolata, sublinearia, mucronata, subtus striata striis lateralibus divergentibus. *Pedunculi* bracteolati. *Bractee* carinatae, obtusae. *Calycis* foliola glabra, acuta, 1 lin. longa, margine tenuissime ciliata, bracteis triplo longiora. *Corolla* 2½ lin. longa, limbi lobis erectis, parce barbatis. *Stamina* inclusa. *Discus* hypogynus obtuse lobatus. *Stylus* 2 lin. longus, pilosus. *Stigma* lobatum.

L. abnormis Sond. ramulis pubescenti-hirtellis, foliis erectis adpressis lanceolatis basi attenuatis apice mucrone subpungenti terminatis planiusculis supra laevibus subtus pallidioribus striatis margine scabris, pedunculis brevissimis subbifloris, drupa truncata 5-locularis. *Leucopogon acuminatus* Voyage de la Coquille tab. 53, vix R. Brown. Ille de Waighion, terre des Papoux (d'Urville et Lesson 1825) v. in herb. Kunth. Frutex gracilis, erectus. *Folia* 7-8 lin. longa, 1½ lin. lata, vix ab iis *L. appressi* distinguenda sed basi parum magis angustata. *Pedunculi* bracteolati, bracteis bracteisque obtusissimis, mucronulatis, glabris. *Calycis* foliola ovata cuspidata, corollae tubum aequantia. *Discus* hypogynus 5-dentatus, obtusus. *Drupa* subbaccata, ovata, truncata, stylo rigido terminata calyce vix brevior, 5-locularis, sed abortu interdum 1-locularis. Differt a similibus *L. appresso* et *esquamato* praeter drupam, ramulis hirtellis et forma calycis. *Drupa* in *L. esquamato* est lineari-oblonga, siccata laevis, crustacea plerumque bilocularis rarissime 1-3-locularis.

L. vaccinioides Sond. ramulis glabriusculis, foliis petiolatis imbricatis oblongis concavo-cymbaeformibus muticis margine pellucidis subtus lineatis, junioribus tenuissime ciliatis, pedunculis axillaribus 1-floris. *Epacris vaccinioides* Lhotzky pl. exs. In turfosis humidis inter sphagna vallis Napoleon leg. Dr. Lhotzky. (Vidi in herb. Lucaeano.) Prostratus ramosissimus semipedalis, radice repente. *Folia* dense imbricata, supra concava, laevia, subtus convexa et lineis albidis notata, apice mutica vel subaequalosa, 2½-3 lin. longa, lineam lata. *Flores* solitarii, pedunculo brevi multibracteato. *Bractee* obtusae, ciliatae, superiores calyci adpressae. *Calycis* foliola obtusiuscula, striata, pallida, margine ciliolata apice barbata. *Corolla* infundibuliformis, tubus calyce triplo longior, limbi lobis dense barbatis, barbae pilis nodulosus. *Filamenta* brevia, antheris lineari-oblongis sub apice affixa. *Discus* hypogynus 5-lobatus, lobis emarginatis ovario glabro subpentagona brevioribus. *Stylus* stamina aequans teres, glaber. *Stigma* capitatum.

Folia forma variant, utpote nunc ovalia nunc subcordata, in nonnullis ramis adultis folia superiora basi profunde cordata iconi Billardierii prorsus convenientia video. *Spicae* in plerisque speciminibus axillares, in nonnullis etiam terminales. „Bacca immatura sordide alba, matura violacea“).

NEEDHAMIA R.Br. Endl. gen. n. 4279.

Meisn. gen. pag. 248. (157.)

1. *Needhamia Pumilio* R.Br. l. c.

α. Brownii DC. caule basi simplici apice ramoso, foliis omnibus oppositis dorso obtusiuscule convexis.

In subarenosis rupestribusque inter frutices densos montis Clarence, Plantagenet, d. 31. Sept. 1840 et in arenosis aridis clivuli ad Princess Royal Harbour prope oppidulum Albany, d. 28. Sept. Herb. Preiss. No. 436 et 437. (Swan River: Drummond 1839! et Capt. Mangles!)

Fruticulus 2-4-pollicaris. *Rami* inferiores subadscendentes, reliqui erecti, glabri; ramuli tenuissime puberuli. *Folia* omnia opposita, minuta, lineam longa, arcte adpressa, carinata, utrinque laevia, margine ciliolata. *Spica* terminalis 6-10-flora. *Folia* suprema flores fulcrantes reliquis parum majora concava margine evidentius ciliata. *Calycis* lobi angustissimi hyalini, nervo apice sanguineo percursi, margine longe ciliati. *Corollae* tubus cylindricus calyce longior, intus subpilosus, limbi lobis rotundatis, imberbibus. *Filamenta* brevissima tubo prope basin adnata, antheris oblongis. *Stylus* brevis. *Stigma* subcapitatum. *Drupa* minima, subglobosa, apice subvelutina, 2-sperma, rarius 1-sperma.

β. Cunninghamsi DC. caule a basi ramosissimo, ramis exterioribus adscendentibus, foliis inferioribus oppositis, superioribus alternis dorso acutius carinatis.

(New-South-Wales: Fraser!) (herb. Shuttleworth.)

OLIGARRHENA R.Br. DC. prodr. 7. pag. 759.

Endl. gen. n. 4280. Meisn. gen. pag. 248. (157.)

1. *Oligarrhena micrantha* R.Br. l. c.

In arenosis districtus Hay et ad promontorium Cape Riche, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2099.

*) *Acrotriche Manglesii* Sond. ramulis pubescentibus, foliis petiolatis lanceolatis cuspidatis planis supra nitidulis subtus discoloribus nervosis, margine ciliato serratis, patulis, spiculis rameis. Swan-River Capt. James Mangles. Fruticulus verisimiliter diffusus. *Rami* glabri. *Ramuli* breves puberuli. *Folia* 3-4 lin. longa, e basi lineata sensim in mucronem rigidum attenuata, erecto-patula vel horizontaliter patentia, utrinque glabra, subtus nervis 4 debilibus et intermedio valido in mucronem excurrente, praedita, margine breve et rigide ciliata. *Spiculae* 6-10 florum, in axillis foliorum et semper in ramis adultis non in junioribus. *Calyx* glaber bibracteatus, bractee obtusae sepalis obtusiusculis apice vix ciliolatis lineam longis subtriplo breviores. *Corollae* tubus calyce longior, gracilis, extus glaber intus fauce barbata, limbi lobis stellato patentibus apice barba rara deflexa penicillatis. *Antherae* subexsertae. *Gynathus* hypogynus integer ovario albo-sericeo triplo brevior. *Stylus* brevis glaber. *Stigma* obtusum.

U. i. B. nr 1. p. 332. Häm. d. 2. h. 1. p. 4. p. XXX.

„Fruticulus vix pedalis“ radice bipollicari subfusca simplici vel subramosa. *Caulis* brevis glaber, circ. pollicaris, apice ramosus, ramis strictiuscule erectis saepe fastigiatis, tenuissime puberulis, nudis vel sparse foliatis, ramulis pubescentibus abbreviatis, rarius elongatis, foliis subimbricatis tectis. *Folia* minima (1 lin. longa) sparsa, arcte adpressa, lanceolata, supra canaliculata, subtus carinata 3-nervia, nervo medio valde prominente, lateralibus obsolete, apice subincurva, utrinque glabra, margine tenuissime ciliata. *Spica* ramulos terminans nunc $\frac{1}{2}$ nunc 2-pollicaris. *Flores* iterum racemosim dispositi, in rachi 2-3-lineari pubescenti sessiles. *Bracteae* subtendentes persistentes, ovatae, sublanceolatae, margine ciliatae calyce subtriplo breviores horizontaliter patentes. *Bracteolae* 2 sublanceolatae, calyci adpressae et duplo breviores. *Calycis* foliola 4, lanceolata, subacuminata ut bracteae margine longe ciliata. *Corolla* minima, alba, subclavata, tubo calyce longior intus glaber, limbi lobis brevibus erectis vel subconniventibus imberbibus. *Filamenta* 2 glabra, inclusa, medio tubo adnata, corollae lobis alterna, antheris minimis oblongis. *Discus* hypogynus 4-partitus. *Ovarium* 2-loculare 2-ovulatum suborbiculare compressum, glabrum, sessile. *Stylus* brevissimus, apice bifidus, stigmatibus aequalibus. *Drupa* ovata, (semilinea subbrevior) crustacea, brunnea, nitidula, tenuissime striata monosperma.

Trib. II. EPACREAE Reichenb.

LYSINEMA R.Br. DC. prodr. 7. pag. 764.

Endl. gen. n. 4282. Meisn. gen. pag. 249.

(157. 364.)

1. **Lysinema pentapetalum R.Br.** corollis pentapetalis, unguibus longitudinaliter distinctis calyce longioribus extus glabris, filamentis antheras triplo superantibus. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In depressis arenosis prope oppidulum Perth, d. 21. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 441 (ex parte) et in planitie arenosa Quangen, Victoria, d. 20. Mart. 1840 (fruct.) Herb. Preiss. No. 442 (v. v. c.)

„Frutex 1-2 $\frac{1}{2}$ -pedalis.“ *Ramuli* tenuissime puberuli. *Folia* glabra, trigona, obtusiuscula, ramulorum minora, imbricata. *Bracteae* circ. 10, obtusiusculae. *Calycis* foliola lineari-obtusiuscula ut bracteae margine ciliatolana. *Corollae* tubus 5-6 lin. longus, extus glaber, intus pubescens, limbi lobis ovatis, reflexis. *Filamenta* pilosa tubum aequantia, antheris triplo longiora. *Squamulae* hypogynae obtusae, subdentatae. *Stylus* pilosus, stigmate 5-lobulato. *Capsula* glabra, cylindracea calyce brevior.

2. **Lysinema elegans Sond.** corollis pentapetalis, unguibus longitudinaliter distinctis calyce longioribus extus glabris, antheris elongatis subexsertis longitudine filamentorum.

In colliculis arenosis silvae ad flumen Canning, d. 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 439. (Swan-River: Drummond! et Capt. Mangles!)

Frutex pedalis et ultra, radice subsimplici, perpendiculari, fusca, pennae gallinaeae crassitie. *Rami* erecti, teretes, striati, glabri, ramulis tenuissime pubescentibus. *Folia* inferiora imbricata, superiora remotiuscula, opposita vel subalterna, omnia arcte adpressa, lanceolata vel linearia, acuta vel obtusiuscula, glabra, supra canaliculata, subtus acute carinata, margine brevissime ciliata, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longa. *Flores* terminales spicatae, spica mox 8-12-

flora mox elongata multiflora. *Calyces* fusco-scariosi, in axillis foliorum sessiles, bracteis circ. 15 lanceolatis et linearibus fuscis concoloribus margine ciliato-pilosis cincti. *Calyx* foliola linearia, acuta, margine ciliato-pilosa, 5 lin. longa, tubo tereti demum breviora. *Corolla* alba. Lobi demum reflexi lineari-oblongi acutiusculi ungue 3-plo breviores. *Filamenta* pilosa. *Antherae* glabrae, supra medium peltatae, elongato lineares, unguibus longiores et subexsertae. *Squamulae* hypogynae, lineares, apice bifidae, scabriusculae ovarium angulatum apice albo-velutinum superantes. *Stylus* pilosus, exsertus, in stigma quinquelobum sensim incrassatus.

3. ***Lysinema curvatum* Lindl.** corollis pentapetalis, unguibus apice cohaerentibus subcurvatis calyce longioribus extus glabris pubescentibusve, filamentis antheras longitudine 3-plo superantibus. — Lindl. Swan-River bot. pag. XXV!

In depressis arenosis prope oppidulum Perth, d. 21. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 441 (ex parte) et in planitie arenosa Quangen, Victoria, d. 20. Mart. 1840. No. 442 ex parte. (Drummond n. 494!)

Frutex 2-pedalis, erectus. *Rami* steriles plerumque breves, floriferi longi virgati. *Folia* nunc longiora nunc breviora, ovata, acuta vel lanceolata, apice leviter incurvo, subtus carinata, margine brevissime ciliata, rarius glabra, ramulorum sterilium saepius trigona. *Spica* 1-4-pollicaris. *Flores* in axillis foliorum solitarii, rarius 3-4 iterum spicati. *Bractee* 20-25, lineari-lanceolatae margine lanatae, acutae vel obtusiusculae. *Corollae* albae tubus calycem superans, 8 lin. longus subcurvatus, rarissime inter flores serotinos 1 vel pauci recti inveniuntur — intus tomentosus, extus glaber vel basi pubescens, unguibus summo apice cohaerentibus, limbi lobis lineari-oblongis, acutiusculis, reflexis. *Filamenta* pilis brevibus adpressis velutina. *Antherae* supra medium peltatae, glabrae. *Squamulae* hypogynae ovario albo-velutino duplo breviores, apice emarginatae vel eroso denticulatae. *Stylus* pilosus sensim in stigma clavatum attenuatus. *Capsula* angulata, pubescens, calyce brevior. *Semina* ovata, punctata, glabra.

4. ***Lysinema ciliatum* R.Br.** corollis pentapetalis, unguibus apice cohaerentibus longitudine calycis extus glabris, limbi lobis reflexis tubo 4-plo brevioribus, filamentis anthera duplo longioribus, foliis lanceolatis. — R.Br. l. c.

In depressis arenosis prope oppidulum Perth, d. 21. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 441 (ex parte) et in virgultis inter saxa calcarea prope oppidulum Freemantle, d. 18. Dec. 1838. (Swan-River: Drummond!)

Radix horizontalis, crassa, multicaulis. *Caules* 1-1½-pedales, graciles, stricti, ramulis puberulis. *Folia* ovata, acuminata, erecta, basi adpressa, inferiora seu caulina 3-4 lin. longa, lineam lata, sparsa, suprema et ramulorum sterilium breviora imbricata, omnia glabra, supra laevia, subtus carinata, striata, petiolulata, margine prope basin breve ciliata. *Flores* albi, spicati, spica nunc densa ovata, nunc laxa elongata: floribus in axillis foliorum sessilibus. *Bractee* 8-10, fusco-scariosae margine ciliato-pilosae, inferiores minores ovatae acutae, sequentes acuminatae, superiores lanceolatae. *Corollae* tubus subpentagonus, circ. 5 lin. longus, intus tomentosus, unguibus apice cohaerentes calycem aequantes, limbi lobis ovatis acutis vel obtusiusculis, reflexis, saepius superne transverse rugulosis. *Filamenta* pilosa. *Squamulae* hypogynae breves, obtusae, emarginatae vel denticulatae. *Stylus* pilosus, apice verruculosus, stigmate subclavato. *Capsula* calycem dimidium subaequans, adpresse pilosa.

Variat: unguibus extus glabris et subtomentosis; ad Varietatem posteriorem pertinet: *Lysinema virgatum* DC. l. c.! et *Lysinema spicatum* Lindl. Swan-Riv. bot. pag. XXV.!

Epacris Lavanilles

Epilobella (Fr. Br.) Lavanilles

B. Tasmanica Ferd. Muller
floribus paucis (loco foliorum)
ramulos terminantibus, cor-
ollae lobis acutis. Si ram-
paras cum pl. Nov. Hall.,
forte alias diffinitiones repe-
ris.

In montibus altissimis Tasman-
iae. Jan. 20. 1849. pl. pauci-
pallidaris interdum 1'.
hb. St. I. n. 63 & II n. 288.

Cardiophylla Ferd. Muller
In humidis exst. South Est. river
3. 4' Nov. 10. 1848. hb. St. I. n. 48.

E. imbricata L. B. Willardiere
Lofty-range, hb. St. I. n. 1000.
In locis florilibus montanis ^{ferre in Encouron - Hay}
praecipue circa fructus distinctus
Barkur. Mart. incunt 1848 - ^{habitus} ~~Id.~~
Apr. 1848. frut 1-3' floribus
corollae, incarnatis, luteis va-
riatus. — Lobethal Jan 30. 1848.
Kake's place. Sept. 8. 1848.
Eadem fructus redisse credo in
itinere ^{trans} ~~super~~ fl. Murrays usque
montem Burr, in florilibus cal-
libus passim. Specimen unicum a
St. ex inf. V. D. L. nissum foliis longi-
oribus angustioribus, calycis laciniis
longius acuminatis paululum abhorret
Alice prae ex Tasmania. hb. St. I. n. 66 et 699.
illae communia ex parte natis congruent
Inter Macleayfield et Wilcynam

E. intermedia Griseb.
ramis velutinis, foliis ^{sub} sessilibus
lanceolatis ^{marginatis} attenuatis acutis, mu-
cronulatis, floribus subsessilibus
axillaribus ^{spicatis} cymis ^{dispositis}
patulis corollis calycibus duplo
longioribus, lobis calycis acumi-
natis acutis, siliolosis

E. c. impressa Griseb.
medium dens. Caulis ^{erectus}
paucis utraque. Pet. 3-4^m longa 1^m
latiora v. angustiora. Calyx pallidus
anque fulvidens vix 2 lineas longus
corollae aequo. Antherae fere exsertae
Ad H. Mursy, Tasmania. Jan. 10. 1849.
Hb. H. n. 383. Pet. corollae, Hb. H. 10^e fide sp.
impressa var. Antherae saepe. Florum
color ^{antherae} Griseb. ^{impressa} ^{var.} ^{antherae} ^{saep.} ^{florum}

E. ceraeiflora Graham
Ad H. Mursy. frut 2^o Hb. St. II
n. 381. Novemb. Ramuli folia
velutini.

E. purpurantha Griseb.
ramulis velutinis, foliis brevi-
petiolatis ovato ^{longolatis} ^{marginatis} ^{imbricatis}
mucronulatis, floribus
subsessilibus axillaribus ^{spicatis}
cymis ^{formantibus} anque pa-
lustribus, corollis calycibus duplo
longioribus, calycis lobis
acuminatis, siliolosis

E. stricta Griseb. ^{rigida} ^{forte plurifida}
nec ^{causis} ^{utrumque} ^{imbricatis}
pinnatis

In Australia ^{sub} ^{nucl.} ^{colonia}
Victoriae leg. R. Jaes 1847. Hb. J. R.

E. parviflora Griseb.
In parte australi Tasmaniae, pr.
Hobart. Taron. Hb. St. J. 309
In occidentali vaguata, ab hac alijs
diffinitus, calyci ^{obtusius} ^{obtusius} ^{obtusius}
aut ^{calyci} ^{calycum} ^{brun.} ^{asae}
discrepancia

E. mucronulosa ! H. B.
x *Guercis exserta* H. B.

J. nupivola pro null. ^{calyx} calyx
foliis squarrosa patentibus lati-
oribus crassius et brevius petiolo-
sis acutis breviter mucronatis
calycis lobis bracteisque are-
olatis.

Rarissime inter rupes vallium
prope Cyster tag. 1-2' frut. cratus
Nov. 1849, hb. H. B. 679.
Totum nil nisi *E. exsertae* videtur
varietas sed valde excellens!

In nonnullis exemplis tubus juxta basin tantum tomentosus est, in aliis paene ad apicem. Sed hujusmodi character ad speciem singularem statuendam certo non sufficit. Ungues in flore spec. auth. *L. spicati* quas Vir. ill. liberas esse dicit apice cohaerentes esse et in flore pl. Candolleanae quem Vir. ill. calycem superare dicit, revera non eminere edoctus sum.

5. **Lysinema ovatum** *Sond.* corollis pentapetalis, unguibus apice cohaerentibus longitudine calycis extus basi subpuberulis, limbi lobis ovato-oblongis tubo triplo longioribus, filamentis anthera 3-plo longioribus, foliis ovatis.

In glareosis promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 443.

„Frutex bipedalis“ erectus, ramulis puberulis. *Folia* adpressa, ovata acutiuscula, supra laevia, subtus vix striata, subuninervia, carinata, utrinque glabra, basi margine brevissime ciliata, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, plerumque sparsa, ramulorum sterilium subimbricata. *Flores* in axillis foliorum superiorum sessiles, spicam subcapitatum vel ovatum efformantes. *Bractae* circ. 10, scariosae, pallide fuscae, lanceolatae, superiores magis acuminatae. *Calycis* foliola lineari-lanceolata ut bracteae margine ciliata. *Corollae* albae tubus subpentagonus, 4 lin. longus, extus infra medium subpuberulus, intus tomentosus, limbi lobis reflexis. *Filamenta* pilosa. *Squamulae* hypogynae breves, obtusae, subemarginatae. *Ovarium* albo-elutinum. *Stylus* pilosus, corolla subbrevior, in stigma subclavatum incrassatus.

6. **Lysinema lasianthum** *R.Br.* petalis inter se liberis, unguibus calycem superantibus extus lanatis limbo quadruplo quintuplove longioribus. — *R.Br.* l. c.

In solo turfoso planitiei prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 440. (King George's Sound. Hügel!)

„Frutex $1\frac{1}{2}$ -pedalis“ gracilis. *Caulis* teres, erectus, plerumque a basi ramosus, ramis tenuibus virgatis glabris. *Folia* sparsa, petiolata, subadpressa vel subpatula, linearia vel lanceolato-linearia obtusa supra concava, subtus nervo prominente carinata et apice plerumque trigona, utrinque glabra, $2-2\frac{1}{2}$ lin. longa. *Flores* pauci (3-5) spicati, in axillis foliorum superiorum sessiles, remoti, plerumque distichi, rarius unilaterales. *Bractae* circ. 15, scariosae, pallidae, obtusae, margine ciliato-pilosae, calyce angusto obtuso breviores. *Corollae* tubus subinflatus calycem superans extus dense et albotomentosus, basi glaber, 4-5 lin. longus, unguis liberi sed margines ob tomentum densum non conspicui; concreti non sunt, nam pressione in petala 5 finduntur, limbi lobi glaberrimi, tubo 5-plo breviores. *Filamenta* pilosa, tubo adglutinata sed non adnata. *Antherae* lineares supra medium peltatae, filamentis triplo breviores. *Squamulae* hypogynae obtusae, subemarginatae, ovarium albo-velutinum aequantes. *Stylus* pilosus stigmatibus capitato. *Capsula* brevis, ovata, glabra.

Obs. Haud scio an hoc idem sit ac Brownianum. Quod in descriptione Candolleana *L. lasiantho* folia elliptico-oblonga et flores pollicares adtribuuntur — qua de causa nostrum olim *L. gracile* nominaveram — hoc in pl. Preissian. non quadrat. Cum vero cl. Bentham judicaverit, plantam Hügelianam, quae omnino cum nostra convenit, eandem cum pl. Browniana esse, melius mihi visum est, huic sententiae adstipulari, quam novam speciem temere proponere.

7. **Lysinema conspicuum** *R.Br.* corollis monopetalis, tubo 5-fido calycem superante, foliis lanceolato-subulatis adpressis. — *R.Br.* l. c! *DC.* l. c!

In arenosis juxta oppidulum Albany, Plantagenet, d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 444.

Frutex pedalis et ultra, ramulis glabriusculis. *Folia* 3 lin. longa, adpressa, apice subpatula, carinata, margine ciliata. *Flores* spicati in axillis sessiles, spica plerumque densa, 1-2-pollicaris, rarius elongata subpedalis et apice subramosa. *Bracteae* apice patulae. *Calyces* acuminati basi ciliolati. *Corollae* tubus extus glaber, intus tomentosus, in sicco subroseus, 4 lin. longus, apice 5-fidus, limbi lobis albis, ovatis, subrugulosis, reflexis. *Filamenta* antheras lineares supra medium peltatas longitudine 3-plo superantia. *Stylus* subpilosus, apicem versus verruculosus, in stigma subclavatum incrassatus. *Capsula* cylindrica, calyce duplo brevior.

COSMELIA R.Br. DC. Prodr. 7. pag. 766.
Endl. gen. n. 4285. Meisn. gen. pag. 249. (157.)

1. **Cosmelia rubra** R.Br. DC. l. c.

In solo turfoso arenoso oppiduli Albany, Plantagenet, d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 429.

„Frutex 8-10-pedalis“. *Folia* nitida, margine basin versus brevissime ciliata, pollicem longa, 3-4 lin. lata, dorso laevia vel substriata. *Flores* 9-10 lin. longa. *Calyx* foliola lanceolato-linearis, margine vix ciliolata, circ. 8 lin. longa. *Stylus* filiformis, glaber, corollae limbum aequans. *Stigma* capitatum. *Capsula* matura Pisi majoris magnitudine. *Semina* parva oblonga.

ANDERSONIA R.Br. DC. Prodr. 7. pag. 766.
Endl. gen. n. 4286. Meisn. gen. pag. 249. (157.)

Sect. 1. **EUANDERSONIA**. Sepala lanceolata, filamenta inclusa.

a. bibracteatae.

1. **Andersonia sprengelioides** R.Br. caule erecto, ramis dense foliosis, foliis patulis subspiraliter tortis, acumine plano, filamentis medio piliferis basi dilatatis. R.Br. l. c. Bot. magaz. t. 1645. DC. l. c.

In rupestribus montium prope portum Princess Royal Harbour, d. 28. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 459. (v. v. c.)

Folia 3-4 lin. longa, 1½ lin. lata. *Stylus* glaber. *Stigma* subcapitatum.

2. **Andersonia Lehmanniana** Sond. caule erecto ramoso, foliis basi adpressis, lanceolato-acuminatis subspiraliter tortis apice subtriquetro patulo, filamentis apice dilatata hirsutis.

In solo limoso-arenoso inter frutices prope oppidulum Guildford, Perth, d. 2. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 457. (Drummond n. 496!)

„Frutex bipedalis“ habitu *A. gracilis*, caracteribus fere *A. sprengelioidis*. Differt a priore: ramis densius foliosis et foliis tortis: ab *A. sprengelioides* cum similior: foliis brevioribus et angustioribus magis adpressis. corollae lobis

H. Str. pr. 1. p. 553. Häm. & Loh. jyl. 4. p. XLIIJ

H. Str. pr. 1. p. 553. Häm. & Loh. jyl. 4. p. XXX.

hirsutioribus, filamentis non basi sed apice dilatatis et stigmate exlimie capitato.

Folia 2 lin. longa, lineam lata. *Calyces* pulchre coerulescentes, corolla alba").

3. **Andersonia gracilis** DC. caule erecto, foliis basi cucullatis apice subulatis vix adpressis, summis amplius vaginantibus. DC. l. c.

In locis calcareis ad radices jugi montium Darling's-range, d. 23. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 456. (Drummond!)

Pedalis et ultra. *Spicae* capitatae 3-10-florae. *Flores* majusculi. *Calyces* coerulescentes glabri. *Corollae* in sicco plerumque roseae, intus hirsutae. *Filamenta* glabra aequalia, non dilatata. *Stylus* glaber. *Stigma* subcapitatum.

4. **Andersonia patens** Sond. caule erecto a basi ramosissimo, foliis rectis horizontaliter patentibus cuspidatis margine sublaevibus apice triquetris, sepalis lineari-lanceolatis bracteis cuspidatas duplo superantibus.

In solo turfoso inter frutices densos planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 451.

Fruticulus pedalis, ramis glaberrimis basi plerumque nudis, apice dense foliosis. *Folia* saepe disticha nitidula, patentia, recta, non spiraliter torta, 2 lin. longa, 1-1½ lin. lata, acumine triquetro vix mucronulata, margine integerrima vel denticulis brevissimis scabriuscula. *Spicae* terminales capitatae. *Bractee* ovatae breve cuspidatae, ciliatae, subtendente latiore subbreviore glabro. *Calycis* foliola glabra, margine nuda, lineari-lanceolata corollam aequantia. *Corolla* in sicco rosea, extus glabra intus hirsuta, limbi lobis acuminatis barbatis, tubum subaequantibus. *Filamenta* hypogyna aequalia, glabra, antheris linearibus. *Ovarium* apice puberulum. *Stylus* corollam aequans puberulus, prope basin plerumque tortus. *Stigma* obtusum").

5. **Andersonia involucrata** Sond. caule erecto ramoso, foliis sublanceolatis acuminatis squarroso-patulis vel subspiraliter tortis, margine laevibus, acumine plano recurvo,

*) **Andersonia pubescens** Sond. caule erecto, ramis dense foliatis, foliis pubescentibus erectis subadpressis, subspiraliter tortis, acumine elongato triquetro, filamentis apice latiore pilosis. Swan-River: Drummond n. 495! (Vidi in herb. Shuttleworth.) Fruticulus circ. pedalis, subramosus, supra basin partitus, ramis erectis, ramulisque saepe aggregatis. *Folia* pube densa vestita, apice acuminatissima, 2 lin. longa, basi lineam lata. *Calycis* laciniae lineari-lanceolatae, margine ciliatae. *Corolla* alba, in sicco subrosea, intus pilosa. *Filamenta* calycem dimidium aequantia, apice sublatisiora, pilosa. *Antherae* lineari-oblongae breves. *Stylus* glaber, teres, stigmate capitellato. *Ovarium* glabrum apice puberulum.

) **Andersonia Fraseri Sond. caule erecto ramoso, foliis ovato-lanceolatis cuspidatis subsquarroso-patulis margine serratis scabris, acumine recto subulato, spica oblonga foliosa, sepalis ovato-acuminatis bracteis cuspidatas duplo superantibus. In New-South-Wales leg. Fraser! (herb. Shuttleworth.) *Folia* 2½-3 lin. longa, lineam lata, margine evidenter serrato-scabra. *Bractee* ovatae, cuspidatae, carinatae, ciliatae, calyce duplo breviores. *Calycis* foliola glabra imbricata, ovata, acuminata, margine pallidiora, apice vix ciliolata, 2 lin. longa, corollam aequantia. *Corollae* tubus extus glaber, intus pilosus, limbi lobis tubum aequantibus erectis, acuminatis, basi barbatis. *Filamenta* glabra. *Antherae* minimae oblongae. *Ovarium* apice puberulum. *Stylus* rectus glaber, longitudine tubi.

capitulis involucratis, sepalis lineari-lanceolatis bracteis acuminatas parum superantibus.

In arenosis planitie districtus Sussex, d. 22. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 463. (Vasse River: Mrs. Molloy!)

„Frutex pedalis“ gracilis, ramis erecto-patulis, foliosis. *Folia* nitida, squarrosa, apice recurvato, margine integerrima vel apice summo brevissime denticulata, 3 lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Spica* terminalis ovoidea, subcapitata, basi foliis pluribus apice subreflexis involucrata. *Bracteae* carinatae, acuminatae, dorso ciliatae, subtendenti aequali. *Sepala* lineari-lanceolata, pallida, glabra, margine nuda. *Corolla* in sicco rosea, calycem aequans, extus glabra, intus vix puberula, limbi lobis subbarbatis tubo subtriplo brevioribus. *Filamenta* hirsuta. *Antherae* lineares. *Stylus* glaber stigmate obtuso.

6. **Andersonia parvifolia** R.Br. caule erecto, foliis adpressis rectis acumine triquetro. R.Br. l. c. DC. l. c.

In regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 453.

Fruticulus spithameus. *Folia* 1-1½ lin. longa. *Spica* pauciflora. *Bracteae* mucronulatae calycibus pallide coerulescentibus 4-plo breviores. *Calyces* 2 lin. longi, laciniis margine nudis corollam aequantibus. *Filamenta* ut styli glabra. *Stigma* obtusum. *Ovarium* apice puberulum.

7. **Andersonia pauciflora** Sond. caule erecto ramosissimo, foliis adpressis, acumine triquetro arcuato.

In solo glareoso sterili districtus Grantham, m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 455.

Vix spithamea. *Folia* minima basi vaginantia subauriculata, acumine triquetro erecto incurvo, lineam longa, basi semilineam lata. *Spicae* pauciflorae, rarius flores in apice ramulorum solitarii. *Calyces* lacinae 2½ lin. longae, lineari-lanceolatae obtusiusculae, margine nuda bracteis carinatis 3-4-plo longiores. *Corolla* calycem aequans, intus subhirsuta, limbi lobis apice glabris. *Filamenta* glaberrima. *Stylus* glaber. *Stigma* obtusum.

A. parvifoliae similis, sed foliis triquetris patenti-incurvis distinctissima.

b. multibracteatae.

8. **Andersonia micrantha** R.Br. caule erecto ramosissimo; foliis basi lata subvaginantibus acuminatis acumine triquetro, floribus solitariis aut subaggregatis, stylis infra medium pubescentibus. — R.Br. l. c. DC. l. c.!

In solo arenoso inter frutices ad latus meridionali-occidentale montis Clarence, Plantagenet, d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 461.

„Frutex vix pedalis“ erectus a basi ramosissimus, glaber. *Folia* 1-1½ lin. longa, adpressa, in ramis inferioribus saepe erecto-patula, e basi lata in acumen triquetrum attenuata, acumine basin aequante vel superante, nitidula, margine denticulata. *Flores* ramulos terminantes solitarii, bracteis mucronulatis longiores. *Calyces* in sicco pallide rosei, 2 lin. longi, sepalis lineari-lanceolatis margine ciliatis, extus glabris. *Corollae* calycem aequantes intus subhirsutae, limbi lobis apice glabris. *Filamenta* glabra antheras lineares longitudine subtriplo superantes. *Styli* infra medium incrassati, puberuli. *Capsula* minima apice puberula.

9. **Andersonia brevifolia** Sond. caule erecto ramosissimo, foliis arcte adpressis ovatis mucronato-cuspidatis

margine membranaceis, floribus solitariis aut subaggregatis, filamentis stylisque glabris.

In planitie arenosa haud longe a Halfwayhouse, York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 462.

„Frutex 1-3-pedalis,“ a basi ramosissimus, ramulis abbreviatis subaggregatis. *Folia* vix lineam longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, ramulorum juniorum per lentem visa subpubescentia, margine membranaceo brevissime ciliata. *Bracteae* arcte adpressae, ut *calyces* margine breve ciliatae. *Flores* albi, in sicco rosei. *Corolla* intus hirsuta $2\frac{1}{2}$ lin. longa, tubulosa, calycem aequans, limbi lobis basi hirsutissimis. *Filamenta* glabra antheris linearibus triplo longiora. *Stylus* corollam aequans, *stigmatē* obtuso.

Habitu *A. micranthae*, differt tamen: foliis latioribus imbricatis margine membranaceis brevissime ciliatis et stylis glabris non incrassatis.

10. *Andersonia coerulea* R.Br. caule erecto, foliis modice patentibus, novellis calycibusque extus pubescentibus, filamentis stylisque hirsutis. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In solo turfoso-arenoso circa oppidulum Albany, Plantagenet, d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 450. (New-South-Wales leg. Fraser! herb. Shuttleworth.)

Frutex pedalis et ultra, ramis erectiusculis. *Folia* caulina lanceolata, acuminata, 6-7 lin. longa, basi 2 lin. lata, subadpressa apice subspiraliter torta, glabra, subtus striata, margine scabriuscula. *Flores* in apice ramulorum solitarii, sed ramuli aggregati et hinc flores spicam ovatam referentes. *Calyces* lacinae coerulescentes, puberulae, lineari-lanceolatae, 4 lin. longae, margine ciliatae. *Corollae* tubus intus basi glaber, apice hirsutus, limbi lobi apice glabri, basi albo-hirsutissimi. *Filamenta* hirsuta. *Stylus* corollae longitudine pilis erectis hirsutus. *Stigma* subcapitatum. *Capsula* puberula.

11. *Andersonia prostrata* Sond. caule prostrato ramosissimo, foliis anguste lanceolatis squarroso-patulis vel subspiraliter tortis glabris, filamentis apice piliferis, stylis pubescentibus basi tortis.

In solo turfoso-arenoso ad Stirling's-terrace, Plantagenet, d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 458.

Fruticulus spithameus, ramis glabris adscendentibus dense foliosis. *Folia* concaviuscula, lanceolata, acuminata, glaberrima, nitidula, striata, patula, apice recurvata vel subtortilia, 3-4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. *Flores* ramulos terminantes solitarii vel racemosi et laxè spicati. *Bracteae* exteriores squarroso-patentes, margine glabrae, interiores adpressae, ciliatae, calycem dimidium aequantes. *Calyces* in sicco pallidi, basi virescentes, glabri, margine ciliati, corollam superantes, 4-5 lin. longi. *Corollae* pallide roseae intus pubescentes, lobis hirsutissimis. *Stylus* prope basin semper subspiraliter tortus, pilosus. *Stigma* capitatum.

12. *Andersonia heterophylla* Sond. caule erecto ramoso, foliis ramorum sterilium erecto-patulis subulatis, florigerorum amplius vaginantibus ovatis acuminatis, filamentis glabris, stylis medio incrassatis scabriusculis.

In locis calcareis silvae ad radices jugi montium Darling's-range, d. 29. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 460.

„Frutex pedalis“ ramis erectis inferne nudis. *Folia* glaberrima, subnitida, basi margine submembranacea, ramorum sterilium 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ lin. lata, ramulorum florigerorum 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Flores* terminales solitarii, vel subaggregati. *Bracteae* inferiores subpatentes, superiores plerumque adpressae. *Calyces* bracteis duplo superantes, glabri, in

siccō pallidi, margine nudi, 3 lin. longi. *Corolla* calycem æquans, lobis basi hirsutissimis. *Filamenta* glabra antheras lineares longitudine non superantia. *Stylus* medio vel paulum infra medium subincrassatus. *Stigma* subcapitatum.

13. *Andersonia variegata* Sond. caule erecto rigido subramoso, foliis adpressis acumine triquetro mucronulato, bracteis coloratis, filamentis apice stylisque pilosis.

In regionibus interioribus Australiæ austro-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 454.

Fruticulus 4-pollicaris nunc spithameus, ramis erectis, rigidulis, glabris. *Folia* imbricata, glaberrima, nitidula, basi cucullata, acumine triquetro incurviusculo, adpressa et mucrone brevissimo terminata, 1-1½ lin. longa. *Flores* solitarii, rarius subspicati, ramulis nunc brevioribus nunc longioribus insidentes. *Bractee* arcte adpressae, lanceolatae, inferiores virides apice tantum coloratae, superiores intense violaceae, calyce subdimidio breviores. *Calycis* foliola lanceolata, margine non ciliata, pallide coerulescentia, 2½ lin. longa. *Corolla* in sicco rosea calyce superata, limbi lobis basi hirsutissimis. *Filamenta* basi subdilata, apice subhirsuta, antheris oblongis. *Stylus* corollam æquans. *Stigma* capitellatum.

β. subconcolor caule humiliore, foliis mucronulatis muticisve, floribus saepius spicatis, bracteis superioribus apice tantum coloratis.

In regionibus interioribus Australiæ austro-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 452.

Habitu valde differt ab *Andersonia micrantha*.

Sect. 2. ATHEROCEPHALA. — *Atherocephala* DC. Prodr. 7. pag. 755. Endl. gen. pag. 1411. Meisn. gen. (364.)

ANDERSONIA spec. Lindl. Swan-River bot. pag. XXV.

Sepala cuspidiformia, filamenta exserta.

14. *Andersonia aristata* Lindl. foliis adpressis acumine triquetro mucronulato, spica capitata, corollae laciniis revolutis apice imberbibus, genitalibus exsertis. Lindl. l. c.

Atherocephala Drummondii DC. l. c.!

In arenosis planitiebus haud longe a praedio rustico Maddington ad fluvium Cygnorum, d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 449. (Drummond!)

„Frutex 1-2-pedalis“ erectus, ramosissimus. *Rudix* perpendicularis, subsimplex, nigrofusca. *Caulis* brevis pennae gallinaeae crassitie vel crassior, cortice fusco-cinereo, subrimoso. *Rami* alterni, erecti, glabri, ramulis gracilibus teretibus longioribus vel brevioribus pubescentibus. *Folia* imbricata, glabra, basi subvaginantia lata, cuspidato-acuminata, acumine triquetro mucronulato, 1-1½ lin. longo, adpresso. *Flores* spicati, spica densa capitata vel ovata in apice ramulorum nunc terminalium nunc lateralium, plerumque solitaria, rarius 2-3 subaggregatae. *Folia* floralia reliquis conformia sed basi latiora et evidentius cuspidata. *Bracteolae* 2 foliaceae carinatae, cuspidatae, glabrae, bracteis seu foliis floralibus breviores. *Calycis* 5-phylli foliola albida, glabra, lanceolato-linearia, marginibus demum convolutis aristaeformia, rigida, 4½ lin. longa, basi parum latiora, bracteolis triplo longiora. *Corolla* albida vel (in sicco) subrosea, infundibuliformis, tubo extus glabro intus hirsuto calyce subbrevisiore, limbi laciniis linearibus revolutis, albo-hirsutissimis apice summo glabris. *Filamenta* libera, corolla longiora, glabra. *Antherae* lineares dorso infra medium filamentis affixae.

Frangelia Sm.

x *Succurnata* Venth.

in arboribus aliostris in
arboribus venter Wag. frequent.

hb. St. n. 135. Inuliginosis

Tarm. frut. 3-4" Jan. 1849. hb. St.

n. 316. Thib. Nov. 78. hb. St. II n. 59. et

607

x *Shouana* Sm.

In montibus albis (4000')

Tersmannia. hb. St. Tarm.

n. 61. - Jan. 20. 1849. hb. St. II n.

302. Hui var. St. propinqua

Cunningham habet, vix parum

revera diuina, nam anthraci

initio barbatae mox glabrescent.

Cystanthus R. Br.
C. springelioides R. Br. l. c.
In montibus occidentaliibus
3-4000' altis hb. St. # n. 291. Jan
21. 1849. frut. 2'.

Richia R. Br.
nuda *Billeuriere* R.
Dracophylla R. Br.
In insula *Stemmannia*
hb. St. Salm. n. 79. In mon-
tibus 3500' altis. (Sp. 6 f. 16)
Dracophylla (sp. 11) In montib.
occidentaliibus 3400' altis. 3-4'
floris pallide flavi (pinnati aurum
tint) Jan. 21. 1849. hb. St. # n. 317.
(*Dracophyllum* *Richii* hb. St.)

Squamulae 5 hypogynae, obtusae, ovario dimidio breviores, cum staminibus hypogynis alternantes. *Ovarium* subglobosum, apice puberulum, 5-loculare. *Stylus* filiformis, glaber, exsertus, $5\frac{1}{2}$ lin. longus. *Stigma* obtusum, vix capitellatum. *Capsula* minima subglobosa, 5-locularis, 5-valvis, placentis columnae centrali adnatis.

SPHENOTOMA Sweet. Endl. gen. n. 4293.
 Meisn. gen. pag. 249. (157.) *Dracophylli* sect.
Sphenotoma R.Br. *Sphenotoma* DC. Prodr. 7.
 pag. 770.

§. 1. Stamina hypogyna.

1. ***Sphenotoma dracophylloides*** Sond. caule erecto ramoso, ramis strictis, foliis omnibus rigidis adpressis imbricatis lanceolatis acuminatis glabris margine scabriusculis, supremis basi subciliatis, ramis floriferis spica ovata duplo longioribus, staminibus hypogynis.

In lapidosus inter frutices lateris meridionalis collis Konkoberup promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 446.

„Frutex bipedalis“ strictus. *Rami* glabri, basi nudi annulati. *Folia* pollicaria rigida, arcte adpressa, elongato-lanceolata, parallele nervosa, basi latiore submembranacea, cucullata, semiamplexicaulia, glabra, margine denticulis brevissimis scabriuscula, superiora prope basin piloso-ciliata. *Rami* floriferi $1\frac{1}{2}$ -2-pollicares, foliis conformibus imbricatis dense obsiti. *Spica* pauciflora terminalis, e floribus 4-8 constans. *Bracteae* 2 carinatae, cuspidato-mucronatae circ. 2 lin. longae, glabrae, subtendente longiore et latiore calycem aequante. *Calycis* foliola lanceolata mucronata, 4 lin. longa, glabra, ut bracteae fusca, margine pallidiore. *Corolla* alba hypocrateriformis, tubus fauce subcoarctatus, calyce subbrevis, extus et intus glaber, limbi lobis patentibus rotundatis obtusissimis. *Filamenta* glabra, hypogyna, corollae adglutinata sed non adnata. *Squamulae* hypogynae acutiusculae, ovario breviores. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Capsula* globosa, glabra, Pisi dimidii magnitudine, calyce duplo minor, stylo persistente coronata. *Semina* oblonga, flavescentia.

Planta memorabilis habitu *Dracophylli*, et quodammodo medium tenens inter hoc et *Sphenotoma*, sed propter corollam hypocrateriformem adnumeranda posteriori, ad quod sese habet ut *Dacryanthus* ad *Dracophyllum*.

§. 2. Stamina corollae inserta.

2. ***Sphenotoma capitatum*** Lindl. ramis floriferis spica subcapitata multoties longioribus, foliis caulinis ensiformi-lanceolatis erectiusculis, rameis adpressis. Lindl. in Bot. reg. t. 1515.

Dracophyllum capitatum Brown prodr. 556. Hook. Bot. mag. t. 3624 opt.!

In solo turfoso inter frutices prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 4. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 447. (King George's Sound, Hügel!)

Frutex nunc *spithamaeus* nunc $1\frac{1}{2}$ -pedalis. *Folia* margine ciliata vel glabra, scabriuscula, erecto-subpatentia, rarius adpressa, e basi latiore vaginante lanceolata acuminata subpungentia, pollicaria, basi $1-1\frac{1}{2}$ lin. lata, ramea adpressa amplius vaginantia cuspidato-acuminata. *Spica* subcapitata. *Bracteae* carinatae ut *calycis* foliola pubescentia margine subciliatae. *Corollae* tubus extus glaber, limbi lobis obtusissimis. *Filamenta* brevia, tubo adnata. *Stylus* brevis, glaber. *Stigma* obtusum.

3. **Sphenotoma gracile** Sweet. ramis floriferis spica ovata multoties longioribus, foliis caulinis subulato-lanceolatis patulis recurvisve, rameis adpressis. — Sweet. fl. Austr. t. 44.

Dracophyllum gracile Brown prodr. 556. Bot. mag. t. 2678.

In turfoso-arenosis elevatis circa oppidulum Albany, Plantagenet, d. 21. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 448. (King George's Sound, Hügel! A. Cunningham! Lewin's Land: Ferd. Bauer!)

Bipedalis et ultra. *Folia* in nonnullis specim. ciliata, in aliis glabra; inferiora erectiuscula superioribus saepe duplo triplove latiora, intermedia et superiora anguste lanceolata, acuminata, patula, magis minusve recurva. *Folia* ramea adpressa magis vaginantia, breviora, rarissime patula subrecurva. *Spica* ovata. *Bracteae* carinatae, ciliatae, calycis foliolis subinaequalibus glabris duplo breviores. *Corollae* tubus extus apice subpilosus, limbi lobis obtusissimis. *Filamenta* brevia infra medium tubum adnata. *Stylus* brevis, glaber, stigmatibus obtusis. *Capsula* calyce triplo superata, apice puberula.


4. **Sphenotoma squarrosum** Don. ramis floriferis vix longitudine spicae, foliis squarrosis ensiformi-lanceolatis. Don. gen. syst. 3. pag. 785.

Dracophyllum squarrosum Brown l. c.

In solo turfoso humido ad marginem lacus planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 445.

„Frutex 8-10 pedalis.“ *Rami* subverticillati. *Folia* caulina speciminum sesquipedalia $1-1\frac{1}{2}$ poll. longa, basi 2-3 lin. lata, lanceolata acuminata, glabra, striata, squarroso-patula, suprema villis brevissimis subcanescentia, omnia basi vaginante ciliata. *Spicae* aggregatae, laterales ovatae, ramum floriferum aequantes vel sublongiores, rarius breviores, terminali elongata saepe bipollicari ramo florifero 2-3-plo longior. *Rachis* puberula. *Bracteae* carinatae, ciliatae, calycem dimidium aequantes, subtendentibus in spicis lateralibus parum longioribus, in spica terminali elongatis acuminatissimis. *Calycis* foliola pubescentia. *Corollae* albae tubus longitudine calycis, superne adpresse pilosus, intus vix hirsutus, limbi lobis obovatis obtusis. *Filamenta* brevissima, corollae tubo adnata. *Squamulae* hypogynae breves, obtusae. *Stylus* glaber, stigmatibus obtusis. *Capsula* subglobosa, apice puberula, calycem dimidium subaequans. *Semina* oblonga, flavescentia.





RB
581.9941
LEH
Copy 1

